# 續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

# 續修四庫全書

上海古籍出版社

# 一〇二二・子部・醫家類

痘疹定論四卷 〔清〕朱純嘏撰……一
種痘新書十二卷 〔清〕張 琰撰……七七
麻科活人全書四卷 〔清〕謝玉瓊撰……二六七
引痘略一卷 〔清〕邱 熺撰……三九九
劉涓子鬼遺方五卷 〔南齊〕龔慶宣撰……四一九
重校宋竇太師瘡瘍經驗全書十二卷 〔宋〕竇 默撰 〔明〕竇夢麟增輯……四四三
癰疽神秘灸經一卷 〔元〕胡元慶撰 〔明〕薛 己校補……六九九

# 痘疹定論自序

痘疹者。何原於胎毒。感於時氣。發出而爲痘與疹之證也。定論者。何。前此之論未定。而今日始定之也。何言乎前此之論未定。而今日始定之。必有說也。前此言胎毒有因慾火之所致。有因恣食厚味。辛熱炙煿之所由。有因降生之頃。口中含有穢血。未得取出。嚥下入胃之所自也。殊不知皆非確論。與理不相入也。易曰大哉乾元。萬物資始。資始者氣之始也。又曰至哉坤元。萬物資生。資生者形之成也。夫人之有生受氣於

父。成形於母。則胎毒亦隨之。而根於陽施陰受之始。豈待成胎之後。慾火不忌。厚味不節。降生之頃。嚥其穢血而後有是毒耶。前此又言胎毒藏於五臟。故有痘出五臟。疹出六腑之說。殊不知陽施陰受之始。成其胎元。先有命門。則胎毒必隨其氣化而藏於命門。眞且確矣。自命門之陽動陰靜而生水火木金土。夫天一生水。生腎也。地二生火。生心也。天三生木。生肝也。地四生金。生肺也。天五生土。生脾也。此皆逐日逐月漸次生成。及胎成五月之後。而五臟六腑。始有定

形。豈命門所藏之胎毒至此又將陰毒遷移於五臟而爲痘。復又將陽毒轉移於六腑而爲疹。不惟無此事。並且無此理。然命門體也。五臟用也。六腑又五臟之用也。胎毒藏於命門。所藏者陰陽之氣也。陰陽之氣藏於命門。至深至密。形氣俱泯。必賴五臟六腑。傳送時令之氣。透入命門。感痘之氣而爲痘。感疹之氣而爲疹。他如幼科雜病。命門不相干涉。因以知五臟六腑爲命門之用也。前此言惟腎無候。又曰變黑歸腎。何言之不合於理。殊不知五臟相須而成。缺一不

可也。痘中之漿。血所化也。血非水不生。旣藉腎中之水以生血。烏可曰惟腎無候。至於變黑毒火燥爍。變其色也。豈歸腎之謂乎。前此言胎毒重則出痘與疹必逆。殊不知胎毒有順而無逆。猶人之性有善而無惡。然人之爲惡。氣稟習俗之所移。痘疹之爲逆。時令濁氣之所變。稍能明乎陰陽氣化。鼓舞兩間。其中有清濁邪正之分。乘其清正之氣。得清正之痘痳。種出順症之痘。歷歷有驗。則知胎毒之所以爲痘。止有順而無逆。疹雖無痳可種。然得其清正之氣。亦趨於順。

予經今五十餘年以種痘深得胎毒細微之理并透徹胎毒純粹之精有順無逆決無虛謬前此之名家業是科者代不乏賢而論証用藥不偏於寒則偏於熱惟清江聶久吾諱尚恒者生於隆慶末年著有活幼心法論痘與疹極其詳切有據訂方用藥極其中正無差予乃遵其成規發其蘊奧補前哲之所未詳刪方書之所不合然此痘疹定論稿雖草創於康熙二十年以前尚未全備適值欽差內務府廣儲司郎中徐公諱廷弼者奉旨來饒製造御器特到江省傳皇上旨意命江西督撫考選種痘并明於醫藥調理者兩人有江省 督糧道李公諱月桂凡各屬呈送到來醫家不知凡幾 李公問醫等痘疹始於何時胎毒藏於何處種痘自何人立法痘書以何人爲的議論以何人爲當辨別以何人爲詳痘有虛實寒熱藥有補瀉溫涼方有君臣佐使治有標本先後各晰明白方合吾選獨於儔衆之中挑選予與陳添祥二人於本年七月二十二日自江省起程八月十四日到京次年

奉旨選種試苗俱皆全愈然後奉旨在大內遇喜處種痘復又差往邊外各蒙古地方歷歷俱獲全愈因此身歷邊境南北之水土強弱貴賤之元氣虛實一一判然於中在京二十六年又經見自出之痘內有怪症變症前此所未見者又添一番見解於此分晰臚列始爲全備茲蓋恭逢皇帝陛下御極五十二載天元花甲初週實乃萬壽無疆之期歡騰中外慶溢臣工車書一統海宇昇平時和年豐民安物阜予叨皇恩較之諸醫特恩有加無已賜予居址授爲御醫靜夜自思年將老朽無以仰報高厚隆恩謹將心得之餘分別條例極其明白著爲痘疹定論刊刻流傳將有得是論而熟讀之異日應詔上爲聖子

神孫公主郡主種痘種苗有一定之成規。調理有萬全之法則。不爲淺見狹識所搖惑。亦可以補助國家萬年無疆之福矣。更有高明鑒閱。必再加討論修飾。以補未備。是乃予之深願。而期望於彼此之同志者。寧有既耶。僕生於江右新建。年近八旬。定論之內。未免辨別是非。言辭激切。極知僭踰。無所逃罪。然廣後學之見聞。未必無所資助。是爲之序。

康熙五十二年歲在癸巳春三月上浣之吉太醫院

御醫豫章朱純嘏玉堂氏謹識

## 後跋

大哉定論之書也。探賾索隱。鉤深致遠。有難以言語形容者。而先生發前人之所未發。特揭而指示之。其辭文。其理當。其事直而中。其比類也雜而不越。其辨別也顯而不晦。其立標準也簡而易。其刪削。其存留。俱取正於聶氏。不僅作痘疹之書而已。當與性理大全互相參看。曲禮有云。太上立德。其次立功。其次立言。先生之定論。非止立言已也。澤被天下。非德乎。言垂後世。非功乎。將見普天之下。業幼科者。得是書而熟讀之。知胎毒藏於命門。命門中之陰陽。是痘與疹之胚胎。胎毒之陰發出而爲痘。胎毒之陽發出而爲疹。直破千古似是而非之論。故曰發前人之所未發。由茲反覆玩味。漸得著書立言之旨。將必戶誦家傳。起赤子於襁褓之中。其德與功豈淺鮮已哉。

年家姻弟秦大岡牧伯氏頓首拜撰

痘疹定論卷之一目錄　一集

痘瘡根源論
分别諸家調治論
痘疹原於胎毒論
胎毒蘊於命門論
辨五臟合一論
辨别七暈論
伏陷分别論
逆症一十三條論
鼻衄論

吐血便血論
嘔吐分别論
泄瀉分别論
驚搐分别論
夾斑夾丹夾疹分别論
倒陷倒靨論
空倉論
漏漿論
潰爛論
擦破焦乾論
五陷論
封倉論
寒戰咬牙論
室女孕婦出痘論

痘疹定論卷之一目錄終

岐 音其

# 痘疹定論卷之一　一集

太醫院御醫豫章朱純嘏編輯

## 痘瘡根源論

粤稽上古之世未聞痘瘡之說亦無治痘之書即素問集中並無隻字言及於痘非黃帝岐伯以痘為輕易不必詳加問難而無一言以及之者也蓋三皇五帝之時天清地寧民淳俗朴虛邪苛毒無由而生及至漢時建武年間征邊染毒軍中遂生此疾其說出於萬密齋痘疹心要查建武二十五年征武陵蠻伏波軍次下雋從壺頭進兵會甚暑士卒疫死大半援亦中病卒於軍史乃以疫書之意者其痘乎然傳之年久姑存以俟後之考正總之當日不知是何病症因其生長收藏尖圓紅潤有似於荳故名之為痘

## 分別諸家調治論

後此班師毒氣傳入中國諸家計議調治皆據內經諸痛痒瘡瘍皆屬心火之一言為治痘之要領殊不知痘瘡與諸瘡相隔天壤諸瘡之症未成形可解毒可內消已成形可攻破既破可生肌如痘不可解毒也不可內消也不可攻破也自發熱三日之後始見痘苗放苗之後又三日而出齊出齊之後次第長漿

聶 音業

上由面部次及身上再則脹及腳下務期稠膿充滿徐徐回水結痂大約於一十二日之中收其成功自發熱造端即以熱之輕重報痘之緩急便知痘之疏密看報痘之部位便知痘之吉凶看痘粒之形色便知痘之虛實至於起脹灌漿計時限日觀形察色分別虛實寒熱用藥調治以為灌漿之計失此不治竟不成漿雖有妙劑仙丹不能保其不死久吾聶氏曰痘之生死判於漿之有無有漿毒從外散故生無漿毒留內攻故死膿漿既成結痂又厚色又蒼蠟此順證也總之痘瘡不與諸瘡同治即屬心火之一言於痘原無干涉也前代劉河間錢仲陽立方俱以解毒為主多用寒涼少用溫補張潔古王海藏咸宗之探其意俱本於屬心火之一言而以寒涼瀉火也迨至陳文中力矯其偏專主溫補宜於虛寒未必宜於實熱至朱丹溪立論又矯陳氏之偏而取錢氏之長主於解毒和中安表其失亦起於拘泥內經屬心火之一言也近如黃西丘著順險逆三圖順症不須用藥險症有藥可治若逆症雖勉強用藥斷不得活附立逆症圖三十條予每看痘症逐年經見實有一十三圖果係不可治之症無再生之望雖細心極力變方

設法亦不能出西丘範圍之外其餘一十七症亦皆用藥救活因以揭逆症一十二條分列於後以廣後學之見聞他如保赤全書舛謬甚多至於証治準繩係王肯堂先生居高位之暇念及斯世之男女大小身染沉疴不能起死回生延各大小方脈內外全科校訂方書取名証治準繩以備後學參考可謂詳悉大有功於世獨於痘科悖謬之極或假手於庸醫亦未可定他如金鏡錄痘科正宗痘疹心要痘疹會編等書豈止數十家非無一節之長一論之是一方之妙然皆擇焉而不精語焉而不詳兼之各家痘書流

傳年久不惟深山窮谷之中即各省名邦以及都城輦轂之下凡諸名醫不肯細心究竟辨別是非無不以昔年之痘書為今日之秘訣不知有清江久吾聶氏名尚恒者生於隆慶末年萬曆年間以鄉進士出知福建汀州府寧化縣事卓有政聲惜當時以儒宦顯不列名於醫林故其姓字不傳於今世岐黃之門即著有活幼心法一書亦不傳於今世岐黃之家要知天地氣化生聶氏於豫章之清江非為此一隅之幼兒女起見將令普天之下後世之人提撕警覺救斯世之赤子而令安全於襁褓中也今予獨知久吾聶氏集痘疹之大成開幼科之法門議論精辨症確用藥當不偏於寒涼亦不偏於溫補深得中和之理合宜之用無過不及之差救生也晚不獲親炙門墻恭承面論幸得活幼心法而熟讀之沉潛玩味裘葛三更一旦恍然若有心領神會頓將前此之舊聞洗滌淨盡心胸之茅塞剪鋤豁開又恐天下之大萬方之衆不能遍知歲久年深終成湮沒今特表而出之凡業幼科者必當熟讀活幼心法反覆究竟自然得心應手

## 痘疹原於胎毒論

易曰大哉乾元萬物資始又曰至哉坤元萬物資生夫乾為父資始者氣之始也坤為母資生者形之始也人之有生受氣於父成形於母是父精母血之消已凝聚於陽施陰受之始是胎元之初成即胎毒之蘊蓄故名之曰胎毒夫所謂胎毒者不論富貴貧賤俱皆有之豈待成胎之後歸咎於慾火妄動飲食不節降生之頃嚥其血而後有是毒耶雖然天地有非常之氣即有非常之令或於春而不溫和或於夏而不炎熱或於秋而不清涼或於冬而不凜冽四時之正氣失序兩間之難氣交攻夫然後五臟之邪氣內

侵命門之胎毒外透。痘疹從此而發矣。

## 胎毒蘊於命門論

痘出五臟。疹出六腑。前哲言之。不究其本。後輩傳之。不窮其源。以致以訛傳訛。千有餘年。習為成語。誰能辨其非者。今特表而出之。非無徵而敢云然也。人之有生。受氣於父。成形於母。當陽施陰受之始。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。在胎之內。先有命門。猶混沌未分。先有太極。命門人身之太極也。自其凝而成形言之。先有命門。則父精母血之毒。藏於命門。眞且確矣。外形則先長鼻。故今人稱始祖為鼻祖。內如五臟六腑。外如百骸九竅。俱從此逐日逐月。漸次生長。故胎有十月之期。而始生育。惟命門凝成。於有形之初。則胎毒亦蘊蓄於有形之始。命門即太極也。兩腎兩儀也。天一生水。地六成之。坎中之一陽。命門也。坎上下之二陰。列於兩旁。兩腎也。今人以右腎為命門。不能致知格物也。兩腎列於命門之兩旁。是太極生兩儀也。地二生火。生心也。天三生木。生肝也。地四生金。生肺也。天五生土。生脾也。然地止能成物不能生物。今曰地二生火。地四生金。似與坤作成物說不去矣。然河圖一二三四五者。五行之生數也。六七八九十者。五行之成數也。生數。五行之發端。成數五行之結果。故人生以十月為期。得天地之成數也。間有七個月而生者。八個月而生者。九個月而生者。間亦養育成人。婚配生育。是六七八九十者。五行之成數也明矣。然地二生火。地四生金。天包羅於地之外。其氣常行乎地之中。非地之孤陰能生火與金也。得天之氣。貫於其中。而生火生金。實由天地絪縕陰陽配合。而生此水火木金土也。或問之曰。子言胎毒藏於命門。固言之有理。而心肝脾肺腎。可不必復言矣。即應之曰。是何言也。命門體也。五臟用也。相須而生成也。鼻之氣通乎肺。如遇痘疹之氣。鼻聞其氣。則傳於肺金。肺金傳腎水。腎水傳肝木。肝木傳心火。心火傳脾土。一晝一夜。隨天運轉一周天。次日早脾土復傳肺金。肺再傳於腎。腎再傳於肝。肝再傳於心。心再傳於脾。一晝一夜。隨天運又一周天。次早又復傳於肺。五日五夜。將五臟傳遍。痘疹之時氣。自外而達內。命門之胎毒。從內而發外。至六日而微熱。至七日而身熱大作矣。或又問曰。子何知之詳且悉也。答曰。以種痘而得造化之機緘也。自出之痘。無形之氣傳染也。種出之痘。有形之漸引導也。若夫自出之疹亦

無形之氣傳染也。胎毒藴於命門。其中有陰陽之辨別焉。命門也。人身之太極也。太極所以動而陽。靜而陰之本體也。陰陽互藏於太極之中。陽變陰合而生水火木金土。胎毒藴畜於命門之中。亦有所以動而陽。靜而陰之本體也。陰陽互藏於命門之內。感痘之氣化而出痘。感疹之氣化而出疹。何也。是陰爲痘而陽爲疹也。統言之則爲胎毒。分言之胎毒之中又有陰陽之各別也。當其陽施陰受之始。成胎凝結。先有命門。莫可端倪。無可想像。命門也。胎毒始藏之密處也。體也。五臟者。逆接時氣之傳遞也。用也。胎毒發出而爲痘。則胎毒之靜而陰者盡矣。一發不復再發矣。若出正痘之後。隔三五月。或隔半年一年。或隔七八年之久。如感時氣出疹。胎毒發出而爲疹。則胎毒之動而陽者亦盡矣。所以一出。亦不復再出矣。或又問曰。命門在何處。予應之曰。脊骨自上大椎數下二十一椎。自尾閭尻骨。望上數七椎之上。上從下數二十一椎之下。上下相接之界。命門之所居也。命門居脊骨之前。兩腎列於兩旁。脂膜護之。爲一身之主宰。且出痘與疹。而腰不痛者順也。痘疹初發。即云腰疼。命門傷也。未可以言吉也。故曰一身之主宰也。

## 辨五臟合一論

痘之爲痘。始爲一點紅。紅者血之色也。血之爲血。雖賴氣以生之。究其本則水也。天一生水。地六成之。水乃北方之坎。兩腎是也。腎水充足。而得木火土金之氣。交相養。互相長。而成氣與血焉。是血之源於水。水之源於腎者明矣。雖分屬於心生血。肝藏血。脾裹血。藉令腎中水枯。則心何自而生。肝何自而藏。脾何自而裹。合之則五臟同一太極也。陽動陰靜而生水火木金土也。痘中之一點紅。血也。出齊之後。次第起長。充滿於痘之中者。漿也。漿者血之所化也。化毒而爲漿也。漿既充足。膿成則毒解也。漸次轉褐色。回水結痂之候也。痂結蒼蠟色。此一十二日之成功也。何獨前此之高明。不論陰陽五行之正理。妄立名色。且曰惟腎無候。而又實之以耳冷骫冷。以明腎家無候之証佐。又曰。痘之變黑。始歸腎也。此皆不經之談。千有餘年。誰其辨之。予不得已。著五藏合一論以辨之。

## 辨別七暈論

痘出而根脚有暈。其名有七。爲辨之不可不早也。痘粒之尖圓者。氣充也。實也。痘粒之平塌者。氣弱也。虛也。若以暈言之。老紅也。紅紫也。紅紫乾枯也。淡紅也。

焦紅也鋪紅也淡白也此七暈之分別也其中有順險逆之分焉

老紅者暈色紅而老不嬌妖也不悶燥也不乍紅而乍淡也亦不帶紫也此老紅之暈必發熱三日而始見痘苗也身體必平和不甚熱也必能飲食也二便必調也精神必清爽也此順症也痘出必稀疎即多有百十粒亦順症也

紅紫者痘色深紅而帶紫也必發熱二日即見痘苗也身必熱微煩燥也當以敗毒和中散主之看其出齊即用清毒活血湯催其長漿漿足亦歸於順

紅紫乾枯者初見痘苗即見如此暈脚其症多係逆症必發熱一日即見痘苗報痘必稠密必大熱蒸蒸煩躁昏沉不省人事唇焦口渴此危症也其症多不可救若大便結燥二三日不解小水短澁又黃此毒火內盛急宜下之以清其毒火仍宜用敗毒和中散加熟大黃以利之毒火必從此而少減看其出齊即以清毒活血湯催其長漿向之所謂紅紫乾枯者今見根脚紅活漿在汎起此尚可救若仍復乾枯不見起長不見泛漿加之身熱蒸蒸煩躁頓悶譫語昏沉不省人事不思飲食痘乃平塌中有黑臍此必不可救也

淡紅者暈脚四圍淡紅有嬌嬈之色以紙燈照之若有紅色若紅色不定將來必變淡白色此乃氣血俱虛若初見痘苗之時見此淡紅暈脚寒涼之藥切不可用倘或身不退熱微有煩躁宜用敗毒和中散去芩連紫草茸加羌活蘇葉白芷以托其苗俟其出齊以千金內托散催其長漿漿足仍歸於順若先悞用寒涼暈轉淡白急用參歸鹿茸湯以救之緩則成灰陷矣此淡紅之暈易於變淡白不可不知

焦紅者初見痘苗頂乃先焦根脚紅紫有芒角不見

滋潤暈脚不圓且又帶紅紫乾枯此乃毒火內盛若初見痘苗急用敗毒和中散倍加芩連紫草茸以托之俟其出齊熱不減不能食兼之神昏不省人事煩躁頓悶水漿不入則不可救矣倘或熱少減神氣稍清能食不甚煩躁急以清毒活血湯催其長漿若漿足仍可歸順此在神而明之存乎其人也

鋪紅者痘無紅暈痘粒淡白通身皮肉盡紅故名曰鋪紅良由毒火內盛氣不能統血散漫於皮膚之間也若神清能食痘稀疎者可治若人事昏沉則不可救矣

淡白者痘之根腳四圍無一絲紅色此見有淡白之痘而亦不見其有暈也蓋因氣血兩虛或因久病之後或因吐瀉之後或因生母有病以致折乳或因內有積患或因生大毒膿血出多元氣傷洩之後故出此淡白之痘初見痘苗宜用加味參蘇飲以托之俟其出齊即用千金內托散催其長漿如或漿不足即用參歸鹿茸湯以催之今日不足來日再催予曾治此等氣血兩虛之症竟至一十二日成滿漿者今之庸醫見八九日漿不滿而平塌者盡委而去之皆因內無學問知識平常未見久吾聶氏活幼心法之書

又不能親敬高明未免自以爲是予業痘疹有年此七等之暈辨別極其詳細得之於心而應之於手雖前哲未曾分晰明言今特表而出之以開示後學沉潛玩味廣其知識一臨此等七暈之症內有一定之主意外用合宜之藥味舉斯世之幼穉或出險途而躋壽域豈非仁人君子仁心仁術參天地贊化育之妙用乎

## 伏陷分別論

隱而不出謂之伏出而復塌謂之陷夫所謂伏者如敵兵之埋伏於幽僻之處險隘之地尋之不見其踪聽之不聞其聲倘爲將者失其採聽之機輕忽以進未有不喪師而挫敗者矣如遇此等伏而不出之症先當察其報痘之的確或二三顆或五六顆或上下手足有十餘顆此爲出痘之明證否則止有身熱而無報痘之確據此乃雜病非出痘也辨之不可不明也雜病則以雜病之藥治之出痘則以托痘之藥以宣托之予曾治一伏而不出之症用敗毒和中散去芩連紫草茸加羌活蘇葉白芷煎服本日即出三五十顆來日又照前方煎服通身俱出至於出齊又看其虛實寒熱用藥催其長漿向之所謂伏者今乃盡

出而長漿矣倘或不明宣托之法則伏者必不得應時而出勢必鬱遏於內而項刻告變矣

又有足下先報痘苗此痘中之罕見者也次於手背又見一二顆後又於臂上見一二顆此名倒裝之症猶之船上載貨正理先裝前倉後裝後倉名曰順裝若先裝後倉名曰倒裝今出痘理宜從面部先報痘次及身上次及手足此順報順出也今反從腳下手梢臂上先出痘苗亦此例而言倒裝也予曾治此一症仍用敗毒和中散去芩連紫草茸加羌活蘇葉白芷升麻以宣提之服一劑即上部現出痘苗次日又

服一劑。上身通出。因其淡紅。隨用千金內托散。三日三服。膿漿充滿。而得生矣。因此痘。面部不先報苗。亦有伏之之意。故并言之。

陷乃痘已出齊。頂不高聳。盡皆平塌。蓋緣毒盛氣虛。當細看暈脚。辨別七暈之中。爲何暈主之。則虛實寒熱。一目瞭然。按症用藥。起死回生。實熱者。清毒活血湯主之。虛寒者。千金內托散主之。萬一此症。漿不能滿。則倍加參耆。以攻之。今日不滿。來日再攻。攻之又不見滿。急用參歸鹿茸湯以催之。予遇此等症候。人委之而不治。予接手治之。先與出痘之家。言明險逆之症。大劑濃煎。連進疊攻。十之中常救活五六。

## 逆症一十三條論

蒙頭。一也。面部身上及手足俱稀疎。獨頭上以至髮際。形若蠶種。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

蓋面。二也。他處俱稀疎。獨面上形若蠶種無絲毫空處。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

托腮。三也。他處俱稀疎。獨兩腮頰及地角相連一片。形若蠶種。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

鎖項。四也。他處俱稀疎。獨項間形若蠶種無絲毫空處。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

雲錦鋪胸。五也。他處俱稀疎。獨胸前一處。上連咽喉之下。下及兩乳之間。形若蠶種。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

雲錦鋪肩。六也。他處俱稀疎。獨兩肩及後頸窩。形若蠶種。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

前後補服。七也。他處俱稀疎。獨心窩之下。肚臍之上。脊背風翅骨之下。脊後腰之上。前後如職官穿補服樣。或方或圓。一片形若蠶種。此逆症也。若稠密有地界。又當別論。

斷橋。八也。他處俱稠密。不分地界。獨脊背腰之上下。及臍之上下前後。不見痘粒。此逆症也。猶橋之有梁。而中斷也。及上下別處所出之痘有地界。猶可望生。又當別論。

鼠蕻瘟。九也。偏身上下。瘡出稠密。不分地界。惟胸腹之間。不見痘粒。有似於鼠蕻形狀。故名鼠蕻瘟。此逆症也。若稀疎。又當別論。

無根。十也。通身上下。痘俱稠密。不分地界。獨兩手心兩足心。無痘。蓋以手足爲諸陽之本。陽絕則兩手心兩足心。背不出痘。此逆症也。若通身出痘稀疎。又當別論。不得拘泥於此也。

枯樹挂蛇。十一、也。有單挂。有雙挂。有挂在手肱者。有挂在腿股者。他處俱稀疎。獨挂處如蛇形。而纏繞之。密如蠶種。此逆症也。倘稀疎、有地界。又當別論。

玉帶横腰。十二。也、他處俱稀疎。獨後腰及腰間圍。如玉帶形。密如蠶種。闊不過二寸。此逆症也。倘或、稀、疎。又當別論。

形如瓜瓠。十三、也。痘初見標。尚未出齊。以及將出齊之際。痘未見起發。而面部腮頰。以及兩目。俱皆腫脹。形如瓜瓠。此毒氣內盛。先攻脾肺。此逆症也。煩躁頓悶。昏沉不省人事者。決不可救。

## 鼻衄論

鼻衄之症。毒氣上衝於肺。以致鼻衄。鼻血流出。而毒氣亦隨之以解。宜服清肺飲以解之。將來痘出必稀疎。不必驚惶。

## 吐血便血論

痘初報苗。以及出齊之後。如遇吐血。或大小便下血。俱不可救。

## 嘔血分別論

初發熱嘔血。嘔血之後。神清氣爽。見痘粒亦尖、圓、紅、潤。此乃毒氣因嘔血而去也。此時亦不必用藥。姑少待之。

倘吐出有餿餿氣味。痘見點之後。不甚爽快。且又腹痛。此停食作痛而嘔吐也。其痛多連綿不已。幼童啼叫必甚。多、在、臍、以、上、痛。面必清白。口唇必淡白而不甚紅。手足俱冷。此停食作腹痛也。若毒氣作腹痛者。痛稍延緩。而有作有止。多、在、臍、以、下、痛。或連腰而痛。面必紅。唇必紫。手足不冷。此腹痛之分別也。

毒氣作腹痛者。敗、毒、和、中、散、主、之。大便結燥。兩三日不解。加熟大黃微利之。

停食嘔吐腹痛者。升消平胃散主之。於此兼言腹痛。分晰明白。不必另立腹痛條例。

## 泄瀉分別論

發熱之際。或初見痘苗之時。有泄瀉者。有吐瀉交作者。全、要、辨、虛、實、寒、熱、而、用、藥。

有毒氣作泄瀉者。其瀉必黃色臭穢。肚腹多不痛。亦有毒氣作吐瀉者。其吐必酸刺而有聲。神氣不甚困倦。瀉必黃色臭穢。雖吐瀉交作。肚腹多不痛。此則毒氣由吐瀉而發洩。所謂吐瀉爲順候。而不必止者。惟此一症耳。

有吐瀉交作而胸腹痛甚者。吐則有饑餒之氣。瀉則有淡白之色。亦有饑餒氣。此感寒而停食也。仍用升消平胃散。加羌活五分。一服立効。

有胃氣弱。而中有寒。嘔吐之後。不思飲食。或食下即吐。其吐多順快而無聲。面青白唇淡。精神倦怠。宜用參砂和胃散主之。

有脾氣虛弱。飲食不化。而泄瀉者。其瀉滑利。而色帶白。且不變化。如糟粕樣。亦有饑餒氣。瀉後精神疲倦。宜用朮苓調脾散主之。

## 驚搐分別論

久吾聶氏曰。身熱至二三日。或痘欲出而未出。或出而初見報痘一二顆。忽然驚搐大作。不可驚惶失措。惟詳審虛實寒熱而用藥。

有毒氣壅盛於內。不能驟發於外。而驚搐狂躁者。宜用清解散以宣之。痘出而驚搐自定。

有內毒本盛。外為風寒所束。鬱滯而不得出。以致驚搐者。宜用蘇解散以發散之。

有氣血虛弱。不能送痘出外。而驚搐狂躁者。宜用溫中益氣湯以托之。

辨此驚狂諸症。最宜細心體認。觀、形、察、色、聽、聲、問、症。又參之以脈。然後可以分別。

看其痘暈紅紫。面赤唇紫。聲音嘹。口氣粗。身熱手足亦熱。脈洪數。此毒氣壅盛者也。

或形色多同前。但聲重鼻塞。或鼻流清涕。脈浮緊而數。此毒盛而為風寒所束者也。然此症多在寒涼之月。或不謹避風寒者有之。

看其痘影淡白。在皮膚之間。不見紅活。唇淡面白。或帶青色。脈又遲緩。雖煩躁驚搐。有似於熱。其實因氣血虛弱。送毒不出者也。

前症分別明白。而用藥合宜。當一劑之後。痘出而驚

狂立止。昔人有云。痘未出之前。驚搐為順。可不必治。豈其然乎。然毒氣壅盛。不能發出痘苗。鬱遏於內。而驚搐抽掣。眼目斜弔。口鼻歪斜。予昔年在都門。每用敗毒和中散。加熟大黃一錢二分。羌活五分。蘇葉五分。白芷五分。表裏兼治。賴芩連以、清、毒、火。熱大黃以、逐、毒、火。羌活、蘇葉、白芷、前胡、防風、荊芥。以、散、毒、火。木通、瀉、毒、火。麥冬、滋肺以平肝。紫草茸、涼血分。蟬蛻贊助安驚。有升麻以、提、苗。賴枳殼、以、寬、中、降、火。助大黃直達大腸。使毒火不能凝滯而為難。連翹、牛蒡、敗毒火之聖藥。桔梗快膈利咽。驚搐要藥。甘、草生用、瀉毒

大川芎血中氣藥。通肝部而透痘苗。以此分別調治。則痘出而驚搐自定。此已試之明驗也。切不可用驅痰峻攻之藥。巴豆芒硝之類。蜈蚣全蝎之屬。世人不明此毒火驚搐之由。不極力托苗。而專一作急驚治。悞人多矣。今特逐一表而出之。分別用藥。決不悞人性命。慎之慎之。然其中藥味太多。在臨時核減。

又有用藥而驚搐不止者。幼童牙關咬緊。藥不能進。予曾治此等危症。急以燈心蘸油燃灼。按各穴焠之。頃刻人事甦醒。牙關開合如舊。驚搐即止。今將各穴開列於後。

兩手曲池各一穴。　兩手虎口各一穴。　兩脚三里各一穴。三里在兩脚直下外臁。在膝骨之下正臁之外。以脚之脛骨而通算之。約有一尺長。則上三寸之下也。言三里者。謂此穴去膝蓋最近也。按之正臁骨之外。去臁不遠。陷肉處即穴也。　兩脚鞋帶各一穴。在兩脚直下。與脚背交接屈曲之處。世人繫鞋帶之所。故俗名鞋帶穴。按之骨縫中空有穴。兩脚大指與次指相近之極處。俗名脚虎口穴。

男從左手曲池起。以燈火焠之。隨焠左手虎口。又隨焠右手曲池。又隨焠右手虎口。又隨焠左脚三里。又隨

焠左脚鞋帶。又隨焠左脚虎口。又隨焠右脚三里。又隨焠右脚鞋帶。又隨焠右脚虎口。

男從左上焠下。女從右上焠下。切不可下焠上。左右上下共止十穴。每一穴止用燈心焠一下。不可多焠。

凡用燈心。先取大白燈心一莖。長不過三四寸。蘸香油潤之。又將各穴掐定。用墨筆點定。然後燃灼燈心。按穴焠之。聽燈火有爆聲。上吉。次第如法焠之。抱定睡一個時辰。看見痘苗出現。而驚搐自止。依此治之。百發百中。若煩躁頓悶。昏沉不省人事者。則不可救矣。總之用清解散。蘇解散。溫中益氣湯三方。分門別症。亦可謂詳矣。若毒火壅盛於內。大便結燥。又用加味敗毒和中散以下之。如此用藥。十可十全。然怪症多端。未可以一途而定也。用藥而驚搐不止。則將如之何哉。出於不得已。而設法以救之。再用燈火以攻托之。但穴法要審視的確。方無差繆。

倘或元氣虛弱。又兼大吐大瀉。或專大瀉不止。瀉又淡白色。又有餿餒氣。不惟元氣虛弱。而脾氣又下陷矣。此燈火之不能成功者。必宜用溫中益氣湯。倍加參耆朮苓。以壯脾元。痘出而驚搐自定。要知脾元虛弱。燈火切不可用。火能劫其有餘。不能治其不足。慎

之慎之

## 夾斑夾丹夾疹三症分別論

久吾聶氏曰痘有夾斑而出者初見痘苗一二顆其容處及徧身所出俱紅赤小點而無頭粒不見高聳多隨出而隨沒

又有夾丹而出者初見痘苗一二顆徧身紅赤成片如雲頭突起凡遇此夾斑夾丹之症不必驚惶失措俱用黑參升麻湯一二劑散其遊火其斑丹自退而痘自出即出痘亦不甚稠密

又有夾痳疹而出者初見痘苗數十顆徧身通紅碎

碎紛紛形如出痳疹其實大痘夾疹而出是痘爲正出而疹不過脾肺兩家之游火亦隨夾之而出矣過此亦不必驚慌亦用黑參升麻湯加桔梗酒炒黃芩一二劑宜托其疹盡出而消散正痘自然依期出透而起發此等夾疹之症出痘亦稀疎

## 倒陷倒靨論

在內不出爲伏出而復入爲陷前於伏陷論已辨之詳矣今言倒陷倒靨豈無所分別乎夫所謂倒陷者從上倒下之義痘頂從前俱尖聳而當行漿之際忽然中臍下陷此乃謂之倒陷看其痘色辨其虛實寒熱分別五陷而用藥催其長漿攻其充滿膿成則毒解矣向之所謂倒陷者今乃及時用藥而奏成功也

倒靨者其症有二當長漿之時不能及時用藥及至回水結痂之際漿既不能充足於中靨必平塌於外此名倒靨其症亦危甚矣宜急用攻漿之藥如實熱又兼毒火內盛則以清毒活血湯倍加參耆以攻之若屬虛寒不能載毒出外而足漿急用千金內托散或參歸鹿茸湯以攻之雖至一十二日之久猶可望其足漿若束手無策此倒靨而殺人也

## 空倉論

痘名空倉痘泡內無漿止有外面一層空殼如倉內無穀粟於中非空倉乎急宜詳看虛實寒熱用藥攻漿如實熱又兼毒火內盛者急以清毒活血湯攻之如屬虛寒急以千金內托散或參歸鹿茸湯以攻之雖至日數之多猶可望生若不及時救治則變症蜂生業痘科者當以手指次第挨其痘頂其中空與不空一目瞭然倘疑心未決再以銀針挑破痘頂二三顆則俱空可知又何疑乎

## 漏漿論

痘已成漿而漿自滿者元氣虛弱而肺氣不固也其滿之孔在痘粒之頂上微有小孔而痘漿從此漏出急用松花粉摻之堵其小孔結其厚痂亦外治之要藥也然亦看其虛實寒熱用藥助其回水結痂

## 潰爛論

膿漿充滿而潰爛作臭穢氣多因痘出稠密藥力攻其長漿漿足而潰爛流膿喜其潰爛也喜其流膿也更喜其作臭穢氣也宜用松花粉敷之此膿成而毒解也不必妄加調治若身熱不結痂清表敗毒湯主之若身不熱不渴昏淡食少手足冷不能依時結痂須大補氣血助其收結宜用溫表調中湯

## 擦破焦乾論

痘之行漿務期充滿若不滿而躁癢擦破血出隨即焦乾如鍋焦樣又有一種長漿不濃渾身俱是淡白水漿形如燈籠及回水之際躁癢異常擦破隨即焦乾形如蛇之蛻皮以上二症必死之候也

## 五陷論

痘有五陷辨之不可不早也白陷也灰陷也紫陷也黑陷也血陷也夫所謂灰陷者白陷失於溫補而變成灰陷也所謂黑陷者紫陷失於清補而變成黑陷

若夫血陷者血泡通紅不作漿也緣因氣虛不能統血而血反僭溢於氣分而令泡乃通紅不能及時成漿雖未至於大陷而亦有陷之意故名曰血陷此

白陷之症痘雖稠密其色淡白根無紅暈而頂陷此乃氣血虛寒不能運化毒氣以成漿故陷也宜用溫補之藥初宜千金內托散或參歸鹿茸湯至於白陷失治而變成灰陷乃氣血虛寒之極也仍宜用前二方倍加參耆鹿茸以救之

紫陷之症痘稠密紅紫身必發熱呼吸氣粗根脚紫暈而頂陷此乃毒火內盛挾氣血而俱熱故陷也宜

用清補之藥清毒活血湯主之

如紫陷失治變成黑陷亦有悞服溫補而變成黑陷仍宜用清毒活血湯倍加生黃耆芩連以救之

若夫血陷之症庸醫看之多悞爲紫陷殊不知血陷元屬氣虛呼吸之氣出入平和且身凉不熱痘泡雖紅然淡而不紫也根脚亦淡紅也宜用參耆四味湯服一二劑即化成漿矣

五陷分晰明白用藥救治如此精詳凡司痘科者切不可粗心浮氣視人命如草菅務宜加意辨晰某陷當用某藥起死回生係於頃刻可不慎與既成五陷

攻漿莫緩。一劑不足。再劑攻之。再劑不滿。三劑攻之。必以漿足。方可歇手。若乃進緩。則漿不成。而變症蜂生。不可救矣。予治此五陷之症。獨得攻漿之法。在庸醫則束手待斃。于則此攻漿。而轉移陰陽造化於掌握矣。所謂攻漿者。如玉人攻玉之攻。必以玉之成器而歇手。又如大將用兵克敵。攻賊之城。而攻之必以賊之棄戈解甲。率士歸城。開門向化。方可解圍。此攻漿之法。非有學識者。未可輕易以從事也。

## 封倉論

痘出稀疏。何必以封眼爲順候。若稠密。必須封閉兩月。元氣內固。名曰封倉。若兩目燗然。決難成漿。如五陷之症。仍照治五陷之藥。極力攻漿。兩目自然封閉。倉不期封而自封矣。予昔年奉旨差往邊外。蒙古科爾沁地方。與八德馬親王種痘。伊姊駙馬。自出痘症。十分稠密。予以清毒活血湯攻其長漿。時值長夏炎熱。氈子帳房。廊下捲起一尺。以透風涼。帳房之內。日潑涼水二三次。以解暑氣。始終兩目不封。燗然明白。此又出常格之外。予以膿漿充滿。驗其得生。又不在必以封倉一例論也。此千百之中。僅一見也。不可以爲常例也。

## 寒戰咬牙論

痘已出齊而咬牙者。不必治咬牙。只用攻漿之藥。攻其長漿。漿足而自然不咬牙。若漿已充足。手足微有動意。非寒戰也。此乃漿滿作癢。吉兆也。至於寒戰咬牙。久吾聶氏論之詳矣。但凡八九日而漿不足。則寒戰咬牙之症作矣。蓋肺寒則寒戰。胃寒則咬牙。建中湯主之。今之人有謂熱咬牙而熱戰者。此皆燭理未晰。妄立異議。古人命名。以義既謂之寒戰。豈又有熱戰者乎。夫以寒戰咬牙而立名。則以寒之一字而統咬牙之症。其咬牙亦爲寒也明矣。

故久吾聶氏不爲熱症立方。予昔年在都門。見有一幼童出痘。漿已充滿。八日之間。忽然咬牙。予因想漿已充滿。而乃咬牙。定非寒也。予不敢用清涼之藥。將一雪梨。切作五六片。令其食之。則不咬牙矣。此熱咬牙之一明驗也。故聶氏有云。七八日前間有屬熱者。若八九日之後。則屬熱者寡矣。今逐一表而出之。以明八九日之後。盡屬虛寒。

## 室女孕婦出痘論

室女者。謂十四歲以後。天癸已發。尚未出嫁者而言也。若發熱之際。及報痘苗之時。長漿之頃。忽然天癸

暴至不必驚惶當問其及期否或前後錯亂否又問其腰痛腹痛否惟按發熱之際則用升麻葛根湯或元氣素弱則用加減參蘇飲倘或腹痛加酒炒香附片一錢以和其氣不必因其天癸而妄加施治也且發熱報痘之時天癸恭至喜其毒火隨積瘀而盡去將來出齊亦稀疎至於長漿足漿之期天癸適至亦不必驚惶看其虛實寒熱用藥助其長漿必要攻其充足調其回水結痂

若有孕之婦遇出痘之時或鄰家以及同居俱在出痘急宜到親戚家迴避幾月以避時令不正之氣若

不知迴避以致出痘此時先以托痘爲標次以保胎爲本仍用升麻葛根湯加酒炒黃芩六分土炒白术五分以保護其胎元前哲有云白术健脾能培萬物之母黃芩瀉火能滋子戶之陰若無孕黃芩不敢早用恐寒凉冰伏其毒痘苗不能及時而發出也若有孕毒火薰蒸不用黃芩以清內熱胎必不能保矣至於出齊熱尚未清黃芩不妨再用至於長漿之際痘暈之老紅以及紅紫必用清毒活血湯內有黃芩少加白术五六分以固脾元胎必不動若痘暈淡紅以及淡白必用千金內托散倍加參耆去肉桂外加土

炒白术一錢以固脾元胎必不動刻此兩端分治之法并母子而兼救之學痘科者可不細心而參酌乎予每治此等症候十常保其八九

又有孕婦出痘從前不能按法調治甚至熱氣內蒸而墮胎者予曾治此等症令老成穩婆參扶產婦以熱水淨浴下身仍照半產大產之例扶其上牀不要睡倒必須強扶少坐一二刻用滚水白酒一鍾入童子小便半盞和服行其瘀血痘易出而易起倘痘出稀疎精神清爽二便調飲食如不可妄加施治天氣寒凉則以棉花絮被以保護之天氣炎熱切不可洗

浴受用紙扇以及貪受過門凉風誠恐變生他症不可不知至於長漿仍看虛實寒熱加減用藥助其足漿倘毒火內盛芩連畧用三五分以清之切不可過用寒凉之藥予曾治此等症候不論中國邊外俱皆救活

又有保胎一方

當歸（一錢用尾）不　真川芎（八分）　白茯苓（八分）

玉竹（七分）　川續斷（八分）　杜仲（八分炒）

黃芩（五分酒炒）　白术（五分土炒）　甘草（三分生）

若腰疼用此方

# 痘疹定論卷之二目錄　二集

年長男子出痘論
襁褓芽兒出痘并收靨時日不同論
痘後發癰論
長漿飲食論
食豬肉母鴨論
粥飯南北用米論
清茶白水論
紙撚油燈論
痘分十二日論

痛癢虛實論
紫浮萍論
痘疔論
賊痘論
水疱論
口瘡臭爛論
咽喉疼痛論
失聲論
嗆水論
痘爛生蛆論
異常發癰論
解毒疹論
辨痘形色論
痘頂有疣瘩論
皁刺穿山甲論
子來救母論
濁處流清清中出濁論
痘後毒火攻目論
水痘赤痘論
種痘論

不可種痘論
正心誠意論
續補種痘之法論
預解胎毒論
犀角解毒論
種痘精神形氣論

痘疹定論卷之二目錄終

# 痘疹定論卷之二

太醫院御醫豫章朱純嘏編輯

## 年長男子出痘論

男子出痘。既謂之年長。二十三十。以及四五十歲。俱謂之年長。有婚配多年者。亦有生子及孫者。未免真元虧損。更加時令不正之氣。傳染而痘出焉。順症固不必用藥。若險症易於變逆。一至於逆。則不能救矣。此等症候。中國少而蒙古多。予曾治鄂爾多斯。根都世希牙布貝子。年三十以外。用藥調治全愈。蒙古住牧邊外。本朝分爲四十九旗。自關東海邊。直

至正北。自正北接著正西。自正西接著西南。自正北而言。其地界以黑龍江爲北界。又名烏龍江。即古之所謂鴨綠江也。鴨綠江之北。阿羅蘇住之國。朝差大臣與彼分地界。有鴨綠江北之一大山。名牙撒。以山頂分水爲界。水往南流。中國之山也。水向北流。阿羅蘇之山也。前漢朝刻字分界於山頂之上。今亦仍舊。總見本朝威及於遠。因並記之。蒙古之俗。以水草爲活。牛羊馬匹駱駝。得水草以資其生。人得射獵以供其食。本朝分各旗蒙古。以邊外之地。魚鱗相接。犬牙相交。各耕各地。各守疆界。不許混爭攘奪。此乃今

皇上分邊外之沙漠。令其住牧耕種。看守邊徼。足兵足食之良策也。彼住於此者。氈帳散處。或二三十戶。同住於一村。或四五十家。同住牧於一落。或住一月。草食盡矣。又遷移於七八里之外。如此那移終歲如是。夏天以近水爲樂。冬月依樹山爲居。夏月喫水。冬月喫冰喫雪。交夏四月十五日以後。則耕地耕糜子。或種穀子。要種在五月初旬爲止。人以遷移爲常。部落散處。痘疹之氣不傳。故有年老不出痘者。世有無知之輩。妄曰北方地寒。不出痘疹。何見聞之不廣。一至於是乎。及予奉

旨出邊種痘。俱皆次第而出。豈北邊今日而地反熱乎。及至各蒙古王子入朝。適值京都出痘。其氣相感。遂至出痘。十之中不過活其二三。蓋以蒙古之年長。而真元虧損。氣血兼虛。倘傳染得天地陰陽之清氣。猶可望生。

## 襁褓芽兒出痘并收醫時日不同論

所謂芽兒者。不分男女。或生下不上十日。或半月一月。俱謂之芽兒。以其初出胎懷。隨母在產房之內。未經風日。如種穀之萌芽。此雖吳楚俗語。其中有至理存焉。如身熱一日。切不可指爲驚風雜症。用藥妄治。

予曾治一芽兒出痘先問其家有出痘之男女否乎彼曰有予向主人曰今且勿藥姑少待之俟來早再看至次早看其面部已報痘苗兩三顆矣亦不必用藥俟至三日痘已出齊通身上下手足不滿二三十顆至第四日次第長漿第五日灌漿充滿尖圓紅潤第六日漿足回水先從腎囊結痂有兩三顆黑色予初見之而驚疑因其身又不熱喫乳好睡又安靜因思未出房幃時令之濁氣溝渠之穢氣俱不能侵犯凡腎囊居至下之位天一所生之眞水係焉地六成之是腎氣生於五行之初而亦成於五行之始宜其

光澤及至七日而通身之痘痂已落其半此乃出於常格之外未可以一十二日拘泥也或問之曰予言不出房幃時令之濁氣溝渠之穢氣不能侵犯固言之有理獨不思產婦房中產婦懷內能無產後瘀血而厭穢者乎予笑而應之曰氣血原屬一本非外人可比正所謂毋不厭子也

## 痘後發癰論

痘當起長灌膿之時醫者不能及時攻漿以致膿漿不足亦有僻處山間地之明醫不能依時足漿及至回水結痂之時徧身發熱蒸蒸毒氣凝聚於一二處紅腫堅硬此爲餘毒未淨而發癰也亦有悞服補劑熱藥助其毒火薰蒸而攻於脾肺之間脾肺壯實不受其毒發出而凝結於肌肉皮毛之內蓋脾內主土臟外主肌肉肺乃內主金臟外屬皮毛此發癰而毒有所出不能內攻而傷性命爲吉兆也

亦有發癰而死者此何說也其中有陰陽之分爲紅腫一二處或頭上或手足上初起腫而紅高聳有頂此宜外敷三豆丹內服大連翹飲可消則消之不消則攻破出膿膿盡用生肌藥貼萬應膏則全愈矣所謂發癰而死者痘之漿必不充滿且兼毒火內盛回

水之際發熱蒸蒸頸項兩手兩腿平坡漫腫不分地界又不見其高聳毒無頭腳痛苦十分亦無紅色與肉皮一般此陰毒也症必死也宜用生黃耆炒白朮白苓當歸川芎赤芍生地連翹牛蒡皁刺金銀花麵炒穿山甲玉竹陳皮攻其成形服此藥之後頂漸見高聳腳漸見收束毒內作膿膿成而毒亦解猶可望生若連服此劑不見頂高腳束則陰結之極不能從陽卽加人參以補元氣且又惡食又作嘔吐二便不調不省人事且又昏沈淹延時日膿之不成毒無出處此必死之症也

## 長漿飲食論

痘自發熱。雖未見痘苗。必當避風寒。忌葷物。止可與稀粥淡飯素菜而已。勿謂出痘宜如此。忌葷。即外感風寒。內傷飲食。亦當忌葷。乳母俱同此例。

痘已見苗。及未出齊。數日之內。亦宜忌葷。俱照發熱數日內。一樣禁忌。

痘已出齊。當忌長漿之計。雖日用藥提漿。固爲有理。世人每以素食催漿。不敢輕用葷腥。予則不然。每教人食魚食雞。必藉葷食以助胃氣。此予發前人之所未發也。五味入胃。脾司運化。脾胃得養。輸精於肺。肺

氣灌溉。周流五臟。充滿榮衛。則痘之盤痘之項。必然高聳。而運化氣血。催托痘毒。易於成漿。漿且濃稠。遂毒盡出。漿滿異常。此皆食葷之力。今而後始知葷食之大有益於痘也。若將出齊之際。用香蕈炖豆腐。少加香油。不用鹽。與之食之。亦有起發之理。乳母俱同此例。至於食魚食雞。必待出齊之後。若未出齊。決不可食。

痘當出齊之際。即當預備新鮮鯽魚。或半斤一斤。剖開去腸臟。即用清水。若些須猪脂油。并用生薑切三五片。搗爛入於湯內同煮。再入好酒一鍾。煮熟與之食之。每日得三餐方好。若兒小不能食魚。與乳母食之。亦能從乳生發。

若無鯽魚。有一種魚。名曰鄉牙。又名曰魚鮀。其魚無鱗。或一尾半斤。大則一尾一斤。有似黃桑魚。但鄉牙身不黃。易於分別。若痘出稀疎。食魚即可成漿。屢試屢驗。

白麵饅首。亦有發意。可食。江米粥亦可食。

所謂葷食者。非特特此鮮魚已也。又宜用好肥母雞。剖碎炖爛。揀去雞頭雞爪雞肝。其雞肉盡與之食之。若雞肥大。足供一日三餐更好。如兒小不能食。急與

乳母食之。倘或無肥母雞。肥鵞亦好。起漿亦快。倘遠出邊外。沙漠之地。既無雞。又無鵞。綿羊肉亦好。予曾用綿羊肉炖爛。與蒙古食之。連食三四日。而膿漿充滿。且又稠濃。更比雞鵞力大。予後歸京都。有出痘當長漿之期。令其喫羊肉饅首。果然長漿次第充滿。因筆之於此。以廣見聞。

又有鄉俗。於冬月間。用冬筍催漿。甚至醫家不明。而用筍尖作藥引。可笑其不明物理。不識物性。夫冬筍者。不上林之筍也。冬月生於土中。鄉人鋤來貨賣。富貴人家。買來以供美饌。至正月盡。冬筍伏於土中。或

露尖土外、高不過尺許、根稍黑爛、故曰不上林之筍也。若春筍二三月間出土。生長甚快、此乃上林之筍、成大竹之美材也。倘僧家出痘、并有一種素食之痘、見葷則作吐。不肯食、如出痘在二三月間。遇出春筍之時。用春筍嫩尖。并香蕈豆腐。亦可助其長漿。

## 食猪肉母鴨論

痘漿充足。囘水結痂之時也。鮮魚雞鵞羊肉。俱不可食。此時宜喫母鴨炖爛少着些鹽。以和鴨味。喫三兩日後。可食猪肉。然猪肉。要揀選猙子猪肉方好。若不是猙子猪肉。恐又發毒。（猙子者。公猪之別名也北方俱言猙豕）

## 粥飯南北用米論

南方用旱稻米。或用晚穀秈米。或白赤米。即糯米亦可。北地京都。用粳米、粱穀米。若虛寒。用春熟老米。至毒火內盛、生稗子米亦可。若在邊徼之外。備有粳米老米更好。若未曾預備、即用糜子米亦可。蒙古地方、夏月耕地。種糜子。有黃紅白三種。至秋八月初。成熟。炒乾春米食之。其性補益脾胃。

## 清茶白水論

出痘者口渴。滚白水溫服。若愛喫清茶。淡些更好。茶葉。武彝。六安。北源。西山雲霧茶俱好。陳久者更佳。

## 紙撚油燈論

看痘必用沙棉紅紙作撚子、粗如小牙箸。蘸香油燃灼照之。自上至下。凡痘之有暈、頂之有尖。一一瞭然。若據日光而看。未免不得精詳。凡屋內點燈。俱宜用香油。若白蠟。最上。如無白蠟、即紅柏油蠟。亦可。如牛油羊油蠟。俱不可用。若菜油茶油加白蠟。亦可澆燭海外有鬼子蠟。點之有松香乳香氣味。人俱曰好。予獨以爲不可點蓋。以其烟之大。火之粗。恐驚出痘之人也。若作紙撚蘸香油。必向燈上熏燎、令毋爆炸。

## 痘分十二日論

治痘計日。有一十二日之期。乃按天時十二箇月令也。其中有至理存焉。發熱三日。應天時正二三月也。見苗以至出齊。應四五六月也。長漿以及足漿。應七八九月也。囘水結痂。應十月與十一十二月也。此一定陰陽造化之權衡也。世人不明陰陽造化之理。而乃除去發熱三日不算。乃於見痘苗之日算起。乃曰出三日。長三日。灌漿三日。囘水結痂三日。是將十五日作十二日也。何其不明之甚也。若曰出三日者。無大關係。猶可混得過去。若謂長三日。則長何物。殊不知長者長漿也。既云長漿。又曰灌漿。不亦重疊而言

之乎。唐醫執此當長漿三日之際。總不言漿。且曰長得痘之顆粒好。亦不用藥催漿。及後面部轉褐色、乃同水之候。彼方用藥催漿。痘不甚稠密。尚可延捱。若毒火內盛。及氣血虛弱。鮮有不悞事者。此皆長三日之一言。悞其時日。不能催其長漿。以致膿漿不成。變症蜂生。雖有明醫。難保其後矣。或問之曰。予言一十二日必連發熱三日而算。以合天時。正二三月也。若痘出稠密。倘爲風寒所來。出得遲滯。三日不能出齊者有之。予今乃日見苗。以至出齊。應四五六月。倘後之業幼科者。遵子之定論。不待其出齊。而用藥催漿。

不亦失之於太早乎。予應之曰。善哉爾之問也。旣云出痘。按一十二日之期。應天時。一十二箇月。令有春令發生。夏令長養。秋令成熟。冬令收藏之義焉。倘未出齊。透一日以象閏月也。若明此閏之法。則長漿不能及時充滿。亦可透一日以象閏月。則痘漿未有不成者也。予故曰其中有至理存焉。何前代名醫於此不深講究也。今特表而出之。以與業幼科者共明此一十二日之至理也。

## 痛癢虛實論

諸痛爲實。諸癢屬虛。內經言之詳矣。然所謂癢者。非頭痛腹痛腰痛口舌咽喉疼痛之謂也。乃膿漿充滿。痘粒高聳。內實而作痛也。此吉兆也。用生白芍末一錢。酒調服之立止

若當長漿之際。及膿漿不充滿之時。以至同水之候。作癢異常。皆屬內虛。急宜大補氣血。助其足漿。暈若紅紫。即用清毒活血湯。倍加參耆。若暈脚淡紅以及淡白色。即用千金內托散。倍加參耆。或參歸鹿茸湯。亦倍加參耆。助其足漿。若漿足而癢自止。外治用荊芥穗末。將綿紙捲穗於內。緊捲成筒。火上點灼。拔滅火焰。隔一二層紙於癢處焠之。其癢亦止。

有穢氣觸犯而癢者。急燒蒼木紅棗黃茶葉以解之。再服平和湯。使芬芳藥味達於榮衛。自然止癢。

## 紫浮萍論

痘名浮萍。如浮萍之叢聚也。名之以紫。因其色而名之也。此症時氣出痘。十之中必有二三紫浮萍者。或二三十顆。聚成一片。或五七十顆。叢成一堆。甚至百十顆。湊合一處。其萍之顆粒獨小。週圍之正痘獨大。紫浮萍粘連一片。止見有小小顆粒。俱皆紫色。而根脚亦紫色一片。不分顆粒。其症有三五處者。有七八處者。有十幾處者。凡治此等症候。不必驚惶失措。當

長漿之期。內服清毒活血湯。倍加生黃耆。倘受得補即用人參。外治用真明雄。研細末。用滾白水。炮臙脂。取濃汁。調明雄末搽上。日搽三次。則毒氣盡行拔出。正痘長漿。彼亦長漿。打成一片。不論三五七八處之多。俱皆成漿。按期亦如正痘。同水至於擦破。膿水淋漓。外用松花粉攙上。可以收功。若清毒活血湯。不能足漿。急用參歸鹿茸湯。以收全功。予曾治此等症候。先有四名醫。俱用寒凉解毒之劑。至八日。痘皆平塌。全無膿漿。四醫俱束手無策。主家驚惶。急請予救治。予至伊署。天將薄暮。予作紅棉紙撚照之。詳看通

身。紫浮萍有三十餘處。予向主人曰。可救。問其有鹿茸否。彼曰有。并有乳酥油及明雄否。彼曰俱有。予即用參歸鹿茸湯。人參去蘆三錢。鹿茸酥炙三錢。當歸去尾一錢。黃耆蜜炙五錢。甘草蜜炙五分。引加生薑一錢五分。南酒一大鍾。水二大鍾同煎七分。溫服。隨即又煎再服。未服藥之先。用拔毒散。入臙脂汁調搽各處。次早照前方。再服一劑。外仍用拔毒散。日搽三次。服此二劑。膿漿充滿。各處紫浮萍。俱皆長漿。每一處不分顆粒。打成一片。及至回水之際。擦破數處。內出膿水淋漓。用松花粉攙上。結痂而愈。或問之曰。紫浮萍之症。屬熱者多。予乃以參歸鹿茸溫補之劑而成功。且又迅速。其理可得聞與。予應之曰。醫之用藥。相時而用。彼前此寒涼太過。以致兩目不封。爛然如平日。服此參歸鹿茸湯一劑。是夜兩目即封。元神內固。漿巳上其大半。再照前方一劑。而通身膿漿次第充足。所謂神而明之。存乎其人。

倘元氣虛弱。亦有浮萍幾片。其色淡紅。或淡白。當用千金內托散以催漿。如漿不滿。即用參歸鹿茸湯大補氣血。漿成而毒解矣。切不可用清毒活血湯。外仍用臙脂汁。調明雄末搽之。

## 痘疔論

痘之有疔。毒氣凝結而成也。順症必不生疔。險逆多有之。總在明乎此者。善於燈火挑撥。拔毒化毒四者而已。初見痘疔。外形獨異。根脚獨大。硬而不軟。初則以燈火焠之。再用明雄拔毒散搽之。如此不消。則以銀針挑撥疔頂。必出紫血。用棉花擦淨紫血。隨用四聖膏。塡入疔內。自然化毒去疔。爛去疔脚。膿水淋漓。又有一法。用獨頭蒜。切一片。放在痘疔頂上。用蘄艾作丸。放在蒜上灸三次。疔將自消。

## 賊痘論

賊痘者、較之衆痘、彼之顆粒獨大。光微含水漿、中臍有黑色、後必帶累衆痘、不得依期長漿、名之爲賊、是此故耳、痘疔根脚微腫、外形獨大。賊痘外形雖大。根脚不腫、以此分別、若見有此。即以燈心蘸清油。當賊痘頂上焠之。其賊痘之毒、即化。亦不爲害。若一二顆。則依此法焠之。倘或賊痘出多。燈火恐其難受。可用拔毒散搽之。日搽三四次。亦能解毒。若焠之不退。搽之不起、不能成其大漿。則不可救矣。此言賊痘之多也。

### 水疱論

痘出齊而長漿、未可以一槩而成漿也。若夫順症。次第長漿、決無水疱間雜。惟險逆兩途。則有水疱。多少之不同焉。大約長漿之際、三分之中。有一分水疱。猶可望生、若通身全是水疱。必變癟塌而死、此皆因元氣內虛。不能送毒成膿。以致毒伏於內。水溢於外。泛溢於脾肺之間。不作漿而作水疱。雖有智者、難善其後矣、甚至有水疱大如蛋者。通身一樣、不可救矣。

### 口瘡臭爛論

痘出稠密、口舌必多破爛。但不宜作臭穢氣。若在長漿之際、極力攻漿、不必憂口舌之破爛。倘毒火內盛。以清毒活血湯加煆熟石膏一錢五分服一二劑而臭穢之氣自除、如值同冰之候、即用大連翹飲、去木通車前滑石、加酒炒黃連八分、煆熟石膏二錢、薄荷五分、麥冬一錢五分。花粉一錢五分。桔梗一錢。連進一二劑。可免牙疳之患、若漿不足。服此臭穢不除、愈見破爛串開。是牙疳已成。再加胡黃連七分又將蘆薈煆過、取末一分。入於前方調服、予每治此等症、服之如神。奏功迅速。

### 咽喉疼痛論

痘出稠密、毒火上炎。咽喉必然疼痛。初見痘標之時。

不必專治咽喉。惟有托痘一法。倍加桔梗以利之。若當長漿之際。咽喉腫痛。則以利咽解毒湯。與提漿藥、相間服之。自然腫消痛止。外用玉鎖匙末。吹入咽喉。自然奏効。

### 失聲論

痘當長漿之際。及膿漿充滿之時。忽然失聲。緣因痘漿起長、顆粒飽滿、出入氣粗、呼吸礙於會厭門、故聲不響喨、或因兒小痘多。每日啼哭。以致失聲、俱未可定、總以漿足爲吉。若漿不充滿。又失其聲、形色改變。非吉兆也。

### 嗆水論

痘當長漿之際。飲水而嗆。不必治其嗆水。惟有催漿一法。催其足漿。若漿足則不嗆水矣。至於回水結痂之際。漿又不足。變症自然嗆水。若形色改變。必不可救。

### 痘爛生蛆論

痘出稠密。時值夏令炎熱。痘已潰爛臭穢。貧窮人家。無帳幕藏身。蠅蚋逐臭而至。凡有膿水之處。蛆乃生焉。甚至有拖尾之蛆。藏於爛痘之內。看之令人可怕。然亦不必驚惶。毒火內盛者。用清表敗毒湯。元氣內

虛者用溫表調中湯。催其回水結痂。外用蛆藥末摻之。其蛆自出而死。此予曾治拖尾蛆。而立刻見効者。今特表而出之。

蛆藥原無藥名。因予家居住。濱於大河。每年夏秋之間。鮮魚廣出。居民買來剖而醃之。不過三五日曬乾。蠅蚋叢集。蛆則生於魚上。人往山採此生葉以押之。其蛆即死。後人因呼之爲蛆藥。故不知其本名。然不知他處亦有此苗否。其苗在地。高不過尺許。葉長寸餘而尖。有似於菉豆苗。凡後學於各處見之。當先以魚肉生蛆試之。蛆見即死。苗眞無疑。若要取末。預來以瓦鍋焙乾。研爲細末。凡痘內有蛆者。摻上立刻蛆死。邊外有一種開紫花。約有寸餘長。幹有尺餘。直挺小葉。其根搗碎。可以殺蛆。其花似金銀花。心與花瓣俱一樣。但花之顏色不同。純青翠可愛。

### 異常發癰論

痘當回水之候。忽然通身發熱。看其出痘亦稀疎。漿乃清滿。初轉褐色。間有一兩顆結痂。而於此時發熱。獨於腮頰一處。紅腫一塊。按之疼痛異常。此異常發癰也。緣因出痘稀少。不用意催漿。以致回水之際而於發癰之處。其間有痘。先乃變色。而痘頂內陷。膿漿

內縮。不比餘毒發癰也。此乃時令不正之氣使然。其年雜病。俱腫腮頰。相傳症候。以致出痘有此怪症。予曾治此症。外敷三黃漿不退。內服大連翹飲不消。後合黃連黃柏大黃。等分爲末。用蜂蜜調敷。空頂箍毒出膿。隨服大連翹飲。加金銀花。數劑出膿。貼萬應膏而愈。

### 解毒疹論

痘漿飽滿。初轉褐色。此回水之候也。忽然通身大熱。當先看臍之四圍及腰間。如有小紅顆粒。此乃出解毒疹也。又名蓋痘疹也。宜用宣毒發疹湯。以盡托之

出外。後用大連翹飲。一劑而全愈。

宣毒透疹湯

乾葛一錢　前胡（八分）　荊芥（八分用穗）　防風八分

連翹（六分去心）　牛蒡（六分炒研末）　枳殼（六分麩炒）　木通（七分）

桔梗七分　黃芩（七分酒炒）　薄荷（五分）　甘草（三分生去皮）

淡竹葉八分

燈心二十莖爲引

如口糜爛加煅熟石膏七分

辨痘形色論

萬密齋曰。初出現而涵水。乍起發而戴漿。膿未成而

乾黑。囊未滿而萎黃。此四句出痘疹碎金賦。其發前人之所未發也。今特表而出之。初見痘苗顆粒之中。便涵清水。此名涵水。尚未出齊。其中有痘。乍見起發。於衆痘之中。獨有一兩顆。乍起黃漿。此名戴漿。及當長漿之時。膿漿未成。而痘脚乾枯。痘頂黑陷。此名乾黑。膿漿未滿。而痘之根脚平塌。若有黃漿之樣。此名萎黃。此四症。皆危困之候也。辨之不可不早也。

痘頂有疙瘩論

痘當起漿之時。或漿飽滿之際。痘頂皮內。有微白疙瘩。此乃氣分有熱。上衝痘頂。切不可用辛熱補劑。雖用清毒活血湯。一劑。疙瘩自然化開。而成膿漿矣。

皂刺穿山甲論

皂刺用尖

穿山甲用前足甲片。

久吾聶氏。定清毒活血湯。千金內托散。二方內。並無皂刺穿山甲。予治壞症。漿不得成。用此以攻爛之。令其膿水淋漓。亦可起死回生。此予不得已而權用之。非常試之藥也。

子來救母論

痘有先出。當長漿之際。俱皆平塌。內無膿漿。復又身

熱。於平塌之空處。復又出細小痘粒。此先出之平塌者。又覺多些。此乃子來救母吉兆也。何也。先出者爲母。後出者爲子。子之行漿。不須三日充滿。隨出隨灌。隨灌隨足。子漿充滿。毒以化其大半。母漿亦漸次成膿矣。先凶後吉。非子來救母乎。

濁處流清清中出濁論

濁處者何。一家之中。或有男女三五。或同居前後左右。又有男女三五。其先出之痘。或稠密。或夾浮萍。先或伏。而出之甚難。後或陷。而灌漿不易。雖極力救之。得生。究痘苗之根源。皆感天地陰陽之濁氣所致。因

以出之不順。甚至其中。間亦有不得生者、是濁氣之中、又有邪氣夾雜、陰陽鼓舞。增操必死之權、氣化流行、顯定無生之案、所謂濁處者以此。

若謂濁處流清、或其家本人有世德。天地氣化。五日换一候、十五日换一氣。濁氣逐漸分散、南風吹則望北行。北風起則向南走。東西亦然。向之所謂濁氣者。令得時令轉移。氣候更换、遂出清正稀疏之痘。可以不藥而愈。所謂濁處流清者以此。

若夫清中出濁、多因其家懈怠。因從前所出之痘、稀疏磊落。胃強能食。二便調。精神爽。睡臥安穩。灌漿又滿。結痂依期。整日不避風寒。安然無事。亦不用明醫調理。視若泛常。及至後出之痘。彼不知時令轉移、氣候更换。又不知報痘部位。稀疏稠密。更不知伏而不出之難、陷而不起之逆。彼仍視若輕易。頃刻告變、是謂清中出濁者以此。

### 痘後毒火攻目論

凡人之有兩目。猶天之有日月也。風雨晦冥。朔望薄蝕。日月遭其障蔽。亦有時無光也。若夫薄蝕不過一二時刻。復還本體之光明。風雨晦冥。似其雨罷雲收。日月之光明仍舊。觀此可以悟毒火攻目之根源、欲可以參透。久吾聶氏、訂方命名清毒撥翳之精微矣。夫男女失明、其症不一。有因修造、興工動土、其年值本命之方而成眼患者。名曰犯眼。有因感冒風寒火熱、交併而爲眼患者、名曰火眼。有因內有積熱、熱久成瘡。瘡蝕兩目。或蝕一目。名曰瘡蝕眼。以上諸症。亦有調治得宜、久患而隨愈者。亦有翳障不開。終於失明者。然不過千百中僅見一二而已。惟痘後壞眼者甚多。前哲著書立說。俱言目中有痘。獨久吾聶氏曰。此非有形之痘。乃無形之毒也。痘毒攻眼。皆因長漿之際。醫不能及時用藥催漿。致漿不充滿。及至回水之際、外現身熱頭疼之症、并眼泡紅腫。不能開視。而毒火攻目之症俱已全現。此時稍能用清毒保目湯服一二劑。尚可解上攻之毒火。而乃委而去之、且曰眼中有痘傷壞兩目。痘結成翳。非人力之所能爲也。嗟嗟。庸醫悞人。莫此爲甚。予特表而出之。以救天下後世痘後毒火攻目之症。開一光明坦途。仍令庸醫得見此明白開示。以廣其見聞。蓋有形之痘。發於咽喉者有之。發於口舌者有之。然外痘起脹。內痘亦起脹。外痘收靨。內痘亦收靨。惟入眼之毒。必作於收靨之時。與咽喉口舌之痘迥異。此以知其非有形之痘

乃無形之毒也。明矣。詎祇歸重於無形之毒火。真發前人之所未發。并闡以一己之見闡。擴充其理。眼有陰陽之別。左陽而右陰也。眼有五臟之分。黑珠屬肝。大小眥屬心。白珠屬肺。黑珠中之一點真水屬腎。腎乃天一所生之水。澄清如鏡。萬物畢照。鳶飛則目中有鳶。魚躍則目中有魚。人對面見之。則為瞳人。光目中之水。照見人面為瞳人。非目中實有瞳人也。眼外之上下皮。屬脾也。痘後壞眼。翳膜。獨遮瞳人。黑珠。別處無有翳膜。豈心與脾肺不受毒耶。緣因痘出稠密。先藉五臟之真氣。送毒出外以成漿。殊不知氣血兩虛。毒火內盛。不能送毒成漿。漿既不成。又不充滿。至收靨之時。毒火上炎。攻於兩目。始為外証。身熱。頭更熱。頭疼。兩太陽更疼。總在司幼科者。細看形症。眼泡必腫。緊閉不開。熱淚長出。皆膿粘滯。此壞目之由也。急以清毒保目湯。連服二三劑。以解上攻之毒火。庶可免目患。失此不治。毒火愈炎。攻脾而兩眼泡紅腫。攻心。大小眥紅腫大痛。攻肺而白珠紅絲障蔽。日夜啼叫。痛苦異常。夫然後欲開不得開。欲視不得視。內動肝氣。惱怒實深。肝氣愈動。肝家之相火。與痘家之毒火內外夾攻。烏有不焚燎肝木。燥乾腎水者乎。且肝乃腎之子。肝既受毒火與相火之交攻。腎肝有母子之誼。勢必力爲解救。嗟乎。腎中之真水有限。焉能制伏毒火。而可保肝之不受害也耶。肝既不能保。腎且困於毒火之攻伐。腎既困矣。肝部黑珠之翳膜。漸漸侵入瞳人。或從上而陵下。或從下而犯上。或從左而入右。或從右而入左。甚至有毒火亢極。當頭而遮蔽瞳人。種種不一。雖性命苟延。兩目喪明。不幾成一廢人乎。學痘科者。當膿漿未成及未滿之時。必當細心研究。或氣血兩虛。致膿漿不能及時充滿。急用參歸鹿茸湯以攻之。今日不滿。明日再攻。若毒火內盛。血與氣分。為毒火所爍。因而氣血凝滯。亦不能及時足漿。急用清毒活血湯以攻之。今日不足。明日再攻。攻之不長。又不充滿。處於無可柰何。即於清毒活血湯內。加皂刺尖七分。黃土炒川山甲前足甲片研末五分。入於湯內煎熟。服之。此攻爛之法。救命之權也。如此及時用藥。未有不應手而足漿。決無毒火攻目之症。此端本澄源之論也。

亦有不爽。悞服桂附。不虛而用補劑。至收靨之時。火熱上炎。攻於兩目。此在司幼科者。當悔從前之錯。勿罪已往之愆。急用清毒保目湯。以解上攻之毒火。倘

能紅腫大甚。翳膜遮蔽於肝肺之間。急用清毒撥翳湯。遞進一二劑。自然翳膜退去。若夫氣血兩虛。又兼毒火內蘊。當茲收靨之時。外既不能足漿。勢必餘毒上攻兩目。夫兩目內配五臟。氣血之精華聚焉。而毒火留滯於精華之分。又居至高之位。則其受病也深。故患此者。始宜用清毒保目湯。急服以解上攻之毒火。服一二劑之後。看其目中。果有翳膜遮蓋黑珠。或蓋白珠。或侵入瞳人。則用清毒撥翳湯。從容調治。或隔一日一劑。或隔二日一劑。切不可過用寒涼。責効於數劑之間。計功於旬日之內。又不可聽世俗眼科。

### 用藥點磨

又有一法。用蟬蛻猪肝散。每日清晨。用公猪肝七尖。四兩。按四時也。兔糞八枚。按八節也。清水蟬蛻二十四隻。去頭足。按二十四氣也。先將兔糞蟬蛻。清水二大碗。入於磁礶內。慢火熬濃。令其性味俱出。後將猪肝七尖。切成薄片。入於湯內。一刻即熟。先飲湯後食肝。肝若得黑羯羊肝更好。湯散兼治。有兩月之久。可以消散翳膜一半。若情性不躁暴。不惱怒。有百日之久。湯散奏効。自可全愈。並戒食煎炒辛熱之物。如遇此等大症。必須細心研究斟酌用藥。并出痘之家亦當自責。悔從前之過愆。祈今後之福澤。克去己私。復還天理。未有吾之藥不應。吾之論不驗。此散亦有効驗。倘翳障厚。恐難成功。

或問之曰。痘後患眼。翳膜遮睛。百中不能開一。予何言若是之易耶。請得畢其說。以開示天下後學。予應之曰。治有緩急。用有次序。不怠玩。不急遽。不豫草了事。不憚煩。不較利。不計時日成功。當起脹長漿之時。催其足漿。則無壞眼之症。若他人調治。不能及時足漿。當收靨之時。身熱頭更熱。頭疼。兩太陽更疼。予見之必急用清毒保目湯。速服一二劑。以解上攻之毒

火。若怠玩於旬日半月之外。翳膜根脚固結。則不能清毒撥翳矣。若收靨之際。發熱頭疼。急用清毒保目湯。解之於前。看有翳膜。徐徐用清毒撥翳湯治之於後。雖三四月之久。亦自然奏効。若彼壞眼之時。不曾如此用藥。及至旬日半月之後。欲開其瞽。則根脚固結。翳膜難開矣。此又後學之所當知也。所謂治有緩急者何也。若漿不足。急以攻之。若毒火上攻。急以清毒保目湯。以解其上攻之毒火。此治之宜急者也。若目中有翳膜。宜用清毒撥翳湯。或隔二日一劑。或隔兩日一劑。分兩宜輕。此治之宜緩者也。用有次序者

何也先以清毒保目湯用之於前清毒撥翳湯治之於後用之有次序者此也若漿不足急於攻漿毒火攻目急於清解此所謂不急玩也用清毒撥翳湯必見目中有翳膜然後用藥此所謂不急遽也檢方用藥按此二方藥味缺一不可此所謂不潦草了事也應酬頗多此處該用何藥不可苟簡必詳悉用藥與之此所謂不憚煩也有此症之家或貧乏不能爲禮又或本家吝嗇不可計利推諉不治愈宜精心用藥廣積陰功此所謂不較利也兩目翳障逐日退消應用某藥仍以輕劑進之此所謂不計時日成功也如

此救人痘後毒火攻目之症未有不奏効者天地鬼神昭布森列我以仁德之心救人雖不計利而天地鬼神黙佑於我之身善報於我之子孫亦自然之理也易曰積善之家必有餘慶凡爾後學敬而信之

若夫出痘之後氣血兩虚必藉口味以滋補之鴨肉最好猪肉亦可每餐決不可少倘兒小不能食當與乳母食之至於清毒撥翳之劑藥味未免尅伐必須每食鴨肉猪肉以養其元氣然後易於奏効

## 水痘赤痘論

（此類不關利害易以惑人）

水痘赤痘形色與正痘相似其實非正痘也正痘之根源發於命門自發熱造端以至報苗及出齊灌漿足漿收結刻時限日死生係於頃刻故予編輯定論諄諄告戒詳悉備陳以開示後學若不以水痘赤痘之形色辨別明白誠恐庸醫以紫奪朱以鄭聲亂雅樂也夫所謂水痘者灌漿時全是水泡毫無濃漿所謂赤痘者初出形色紅而微帶赤也是水痘之一類也灌漿仍是清水庸醫往往以此痘誑言正痘以收厚謝及至巧立名色稱爲赤痘亦圖哄人射利世有遭其賛惑者及至出正痘之時乃言於某年出過正痘何得又出一番若遇順症猶可倘或險逆往往悞

人性命予今直指水痘者以灌漿之清水而命名赤痘者以初出之形色而巧立名也總之赤痘以形色而取義水痘以灌漿而立名也其標名雖殊而本則一蓋因脾肺兩家素有濕熱外感風寒風濕相搏寒熱交併而脾肺之濕熱盡發出於肌肉皮毛之間初出亦發熱頭疼嘔吐既出即上漿漿滿即結薄痂矣

## 種痘論

宋仁宗時有丞相王旦初生諸子俱苦於痘後老年生一子名素招集諸幼科而告之曰汝等俱明於治痘否予求應之曰不敢言明於治痘但畧知治痘之

法也。王旦曰。能知之。即能明之也。每年于谷以十金相贈。俟小兒出痘。衆皆請來。共相認症、前方用藥。俟結痂還元之後。再厚賄酬謝。幸好客數推該。時有四川人做京官者。聞其求醫治痘。乃請見而陳說種痘之有神醫。治痘之有妙方。十可十全。百不失一。王旦聞之。喜相問曰。此神醫是何姓名。何處居住也。汝既知之。為我請來。彼應之曰。此醫非男子。乃女人也。傳說生身於江南徐州之地。自幼喫齋念佛。長不婚嫁。亦不披剃。雲遊至四川。峩眉山頂。蓋茅菴而居焉。惟時有上橋中橋下橋三處女人好善者。俱皆皈依。喫

齋念佛。後此現身說法。自出痘症。至一十二日同水結痂。乃命上中下三橋女人曰。此痘痂可種也。一歲之兒女。可用此痂三十粒。於淨磁鍾內。以柳木作杵。研此痂為細末、用潔淨棉花些須。又用潔淨之水。春秋溫用、夏則涼用。冬月畧帶熱些。摘三五點。入於鍾內。乾則又加幾點。總以研勻。不乾。捏成棗核樣。以紅綠線拴定。約有寸許則剪去其線。納於男左女右之鼻孔內。線露在外。以防吸上。未滿一歲之兒種六個時辰取出。若二三歲之兒。種十個時辰取出。即種十二個時辰足亦可。此痘痂春秋二季。即一個月之痂

可種得。若夏五六月。半月二十日之痂亦可種。若冬月嚴寒。四五十日之痂亦可種。蓋以寒、則氣聚。熱則氣散。故時日有不同耳。至種苗取出。約計五月。而五臟傳徧。至七日身必發熱。發熱三日。苗必現焉。見苗三日而出齊。出齊之後。痘必次第長漿。漿長三日而膿漿充足。既曰足漿。則回水結痂之候也。以發熱三日、應天時。正二三月。春令發生之時也。見苗出齊、應天時四五六月。夏令長養之時也。長漿足漿。應天時七八九月。秋令成熟之時也。回水結痂。應天時十月十一月十二月。冬令收藏之時也。若未出齊。以及灌

漿未足。不妨多一日。以象閏月。此在人神而明之也。汝等依予之法。將汝自己之兒女種之。十可十全。百不失一。遂如法種之。皆得全愈。自是環峩眉山之東西南北。無不求其種痘。若有神明保護。人皆稱為神醫。所種之痘。稱為神痘。若丞相必欲與公郎種痘。某當雇人夫肩輿。即往峩眉山。敦請此神醫。亦不難矣。不踰兩月。敬請神醫到汴京。見王素摩其頂曰。此子可種。即於次日種痘。至七日發熱。後十二日。正痘已結痂矣。由是王旦喜極而厚謝焉神醫。年近九十。乃辭厚贈。對王旦曰。我修行人。要金帛何用。汝為丞相。

內則贊助君德。外乃表率臣工。鎮中國而撫四邊。令天下萬民。共享太平。此則我受汝之酬謝也。比金帛更多焉。由是蘇回蛾眉至次年。傳三橋女人前皈依者。明白指示之曰。我非凡胎所生。乃慈悲觀世音菩薩轉劫指出種痘之法。欲天下之幼兒少女。咸躋壽域。吾今以此法傳授汝等。當爲我廣其傳焉。三橋女人皆俯伏求慈悲普度。俱稱讚神功。命我等稱何名號。以垂久遠。神醫曰吾乃天姥娘娘。凡種痘之家。焚香禮拜。稱揚天姥娘娘。吾即於虛空之中。大顯神通。化凶爲吉。起死回生。言畢坐化而去。

予種痘。俱遵天姥垂訓。凡調治俱遵久吾聶氏活幼心法。果然十可十全。百不失一。種痘多順症。調治得宜。不至夭折。此一定之理也。然必要先看自出之痘。十百之中。順逆不一。目力所到。見解便明。某症爲順。某症爲險。某症爲逆。一目瞭然。謹慎小心不可妄作聰見。此學種痘者之當先知也。

## 不可種痘論

彼家無世德。本人無陰功。以不義而得富貴。天道終必厭棄。子孫豈能享長壽乎。勿貪其利。不種可也。

本人門戶衰敗。疾病連年。且健訟不休。屢遭刑獄。彼之怨聲載道。自然殃及子孫。勿種可也。

本人近日之所作爲。皆違背天理。報應必及於子孫。勿種可也。

本人家稍殷實。重利剝削窮人。且恃其有餘錢。交通衙門人役。行賄官府。債剮貧民。墳山佳基田地。當官一斷。彼即得之。鄉愚畏其錢鋒。並家僕使女。疊利算去。予目激此人。不踰二十年。身死家破。現今子孫流落。有難以言語形容者。查其從前。會請一姓楊者。與伊子種痘。先出仍是好苗。及至出齊之後。項刻出一身形如蠶種。彼出痘者自言惡報。非汝種之不善也。

凡遇此等人家。勿種可也。

## 正心誠意論

大學聖經有云。欲正其心者。先誠其意。又云意誠而后心正。今之人上天之所以不然佑者。良由意不誠。而心不正也。予今日告戒後學。如欲學種痘。關係匪輕。必須克去己私。復還天理。忠君愛民。孝親敬長。恤寡憐孤。敬老慈幼。教子孫以義方。待族鄰以仁恕。見色不迷。不欺。臨財毋貪。毋苟。如此者可學種痘。倘於此告戒之言。或有缺一。天報隨之。自謂可以奪天工造化。誰知頃刻之間。痘疹忽焉告變。非由出痘者命

皆夭折或因種痘者學問之不精。德行之有虧。意不誠而心不正也。予今年七十有七。供奉內廷二十五載。十種十全。百不失一。用是以告後學。

續補種痘之法

天姥教人種痘之法。已於前種痘論中。言之詳矣。今復續補種痘之法。此乃後人之變法也。爲之亦似有理。若在大內種痘。必須依天姥之種法。至於窮鄉僻壤。則以續補種痘之法。亦可。其法以紋銀。命銀匠造一銀管。約有五寸長。其管之孔。合鼻之孔。可以入得鼻內。先

著痘痂末於管內。對上鼻孔。輕吹入於鼻內。此續補之一法。又有以出痘之衣。當長漿足漿三四日內痘氣充盛。取其貼身裏衣。與未出痘之兒女穿之。穿兩三日。夜間亦不脫下。至九日十一日。始發熱。曾見七日發熱者。十中不過一二。此乃衣傳。然恐氣薄不透。多有不熱不出。若夫狂妄之輩。挑破痘漿而作種者。此乃不仁之人。不必再言之矣。

選苗有二不用。犯一十三症。濁處流清者不用。恐毒盛仍變逆也。

痘夾紫浮萍者不用。夾一兩片猶可。若太多則不可也。恐氣化相傳。久而仍舊也。

其種之法。總以上好痘痂。爲主。藉其得天地陰陽之正氣。以氣相傳。順而又順。凡一切麝香等味。俱不用。謹記謹記。

當日種痘。男種左鼻孔。女種右鼻孔。未滿一週。種六箇時辰取出。若一週歲之後。十箇時辰取出。三五日之後。男則左頸項之下。與咽喉相隔不遠。微有小疙瘩。此痘苗必發之候也。女則在右頸項之下。亦與咽喉相隔不遠。微有小疙瘩。亦痘苗必發之候也。然此說。不可一槩而論。亦有無疙瘩者。其苗亦發。恐日後

學種痘者。見此疙瘩。勢必驚疑。因筆之於此。以廣後學之見聞。若痘長漿之期。必用藥催漿。催得大漿充足。此疙瘩自然消散。若消散不盡。勢必餘毒凝結。而爲痘毒矣。

預解胎毒論

夫胎毒藏於命門。至深至密之地。藥之氣味。無從而入。譬之火石。火藏於石中。著於硝磺之內。不見其些微。沉於水底之下。未聞其滅光。若以鐵敲之。其火星勃然四出。何世人不究竟胎毒之理。創立奇說。詭訂異方。哄弄愚人。希圖射利。可慨也夫。又刊刻稀痘丹。

彼且月重者可使之輕。密者可使之稀。稀者可使之不出。此皆無稽之言。切不可聽。

### 犀角解毒論

犀角在疹門爲必需之藥。若痘門爲無用之材。況痘當初出及出齊之際。其毒火惟有托之出外。催其長漿之一法。斯爲盡善。若以生犀角解毒。誠恐毒未解而反冰其毒。不得宣發而成漿矣。自朱丹溪有犀角地黃湯。彼盲而無知者。以爲眞能解毒。不論痘之順與險逆。氣血之虛實寒熱。槩用犀角解毒。此唱彼和。相習成風。若曰不如是不可以治痘。且望參者而退

步。見桂附而束手。予告之曰。予之所以用參耆者。氣血虛也。倘氣血自實者。予曾用參耆否乎。予之用桂附者。必氣血虛寒也。倘氣血自實而熱。又兼毒火內盛。予曾用桂附否乎。或曰。予以痘之順與險逆氣血之虛實寒熱。而用參耆桂附。言之辨別。極其詳悉。至若清毒活血湯內。而用芩連。獨犀角爲不可用。豈犀角之性味。比芩連而更寒乎。答曰。犀角專入心經。大寒之物。故疹門爲必需之藥。若痘家始賴毒火以見苗。繼藉毒火以出齊。中資毒火以長漿。足漿若始焉除毒。則痘苗冰伏。必不出矣。繼焉解毒。則痘必冰伏。決不能出齊矣。中焉解毒。則毒火冰伏。必不能運化而成漿。既不能成漿。又烏能望其足漿乎。予之所以用芩連以酒炒之。藉其清毒而使氣分舒暢。血不凝滯。運化毒火。而歸於痘漿。此聶氏訂方之精心熟慮。予則心領神會。此方之妙。全在生黃耆。生地。當歸。引酒炒芩連入氣血兩途。運化毒火而成漿。今特表而出之。犀角在痘家爲無用之材。

### 種痘精神形氣論

種痘之說。治未病也。未病要其必病。已病要其全愈。其中辨別幼稚之精神形氣。未可以一言盡也。予自

辛酉仲秋考選進京。爲　聖子神孫公主郡主種痘。仰賴
皇上洪福。歷二十五年之久。凡所出種俱獲全安。始則愼於選苗。揀擇痘之稀疎。漿之充滿。尖圓紅潤。四字俱全。結痂蒼蠟色。且又厚實。此等痘苗得天地陰陽清正之氣。收其痘痂作種。百發百中。萬不失一。若夫在外所種之幼稚男女。甫及一歲者爲上。歲半者次之。若至二歲三歲又次之。若長至五六歲。知識漸開。未免任其情性。不依調理。不肯服藥。難於種痘。學種痘者當先知之。

至所種之幼稚男女。必要辨別其精神、夫所謂精神者。面部有精采喜色。明亮透達。印堂、山根。年壽無青暗之色。滿面紅光純粹者吉、所謂神者。兩目視瞻平正。愈看有神。至於神之完固乍見奇異而不驚、就看熟識而必要。神情安逸。嬉笑自如、更兼目有精光者吉。若目無神思。昏蒙倦怠者。不種。更要詳察其形氣、夫所謂形氣者。頭面胸背手足。形也。體之各具者也。必要詳看其骨肉相稱、肥不見肉、瘦莫露骨、肉色要緊微帶紫黑色者吉。若鬆寬如發麪樣者不種。所謂氣者體之充也、天柱端正、頸不歪斜、手執物件、把持

有力。站立懷中。脚不倦怠。小便遠而長。腎囊緊小。微帶紫黑色、如荔枝殼者、吉、若形氣倦怠、呼吸之氣不均勻。出入粗細不一者、不種。　目無神者。　面無喜色者。　皮肉如發麪樣者。　形氣瘦弱者。　內有痞積者。　病後虛弱者。　吐瀉纔愈。元氣未復者。　渾身有疥瘡者。　大毒正氣未復者。　聲音不亮。並不長者俱不可種。

---

## 痘疹定論卷之三目錄　三集

面部先見報痘八卦方位之圖（并歌訣）
斷氣血盈虧消長之理
辨虛實寒熱之異
起勢論
初發熱至痘報苗及出齊數日內調治法
痘出齊後起發灌膿數日內催漿足漿法
漿足回水至結痂還元數日內調治法
痘科備用緊要成方
炮製用藥之法

痘後痢疾論
似痢非痢論
神黃荳論
桑蟲論
地龍論
人牙論
人糞論
人中黃論
金汁論
痘疹避忌

痘疹定論卷之三目錄終

# 痘疹定論卷之三　三集

太醫院御醫豫章朱純嘏編輯

## 面部先見報痘八卦方位之圖（并歌訣）

看痘先分部位。乾宮出起定輕。坎宮不美艮三分。震上縱凶現定。巽上先來必重。離宮凶有十分。坤宮七數兌四分。此訣急言人聽。

單粒報痘者稀疎。雙粒出現者稠密。熱退見苗者順。火熱放苗者險。痘已出透而熱不減者逆。顆粒大而尖圓紅潤者吉。顆粒大小不一。微見尖圓紅潤者半吉。顆粒十之中。有一分大。則有二分小。不見尖圓紅潤者凶。

男從左起



女從右起



---

### 晰氣血盈虧消長之理

人吾萬氏曰痘瘡全憑氣血以成功而氣血之盈虧消長其理精微不可不透悟也蓋氣體天而親上血體地而親下痘之出也其高起之泡氣之位也上也氣宜充焉其四圍根脚血之位也下也血宜附焉泡尖而色白潤是氣充而居其親上之尊也四圍有暈而色紅活是血附而安其親下之分也氣居其尊血安其分氣血和順而載毒出外此最吉之痘可勿藥而愈也頂陷則氣反親下此氣虧而不能充也法當補氣四圍根脚無紅暈此血虧而不能附也法當補

氣而兼補血此其理猶易明也其有通項紅色成血泡者是血反親上也此症最險必不能成漿至八九日後則癢塌而死然此非血之獨盈乃由氣虧而失其居尊之常故血得以妄行而僭居其位也急宜大補其氣氣充則能統血血自不得泛溢妄行而泡轉白矣世人不識此理見其泡紅則謬認爲血熱而用涼血行血之劑致令氣愈虧而斃愈速也不亦悲乎故氣血盈虧之理微妙而難識也至於調治痘瘡氣血其氣獨虛者固宜專補氣而不宜補血蓋陽不能從陰陰愈長則陽愈消也其有血虛者多由胃氣損

傷元氣不足所致蓋陰必從陽陽生則陰長也黃汝言明醫雜著乃謂血虛而用參耆以補氣則陽旺而陰血愈消甚矣其不明於陰陽消長之理而謬立此言爲世大害也予每治便血之虛滑者婦人產後去血過多而大發熱者婦人血虛崩漏而下血不止者俱用參耆爲主而佐以血藥與升提藥皆獲奇効安在血病而不可補氣乎若痘瘡以胃氣爲主則補血必先宜補氣也明矣故氣血消長之理不可不深明也

## 辨虛實寒熱之異

久吾聶氏曰凡治病必先辨虛實寒熱四症望聞問切無非辨此四者而已四者了然於胸中則用藥取効其應如響四者不能分別而執成方以用藥鮮有不誤者即或中病而愈亦幸而偶中也至於痘瘡之虛實寒熱尤爲緊要辨之不明用之多致敗事何以成功奈何歷代治痘之家著論立方互相同異至於虛實寒熱多畧而不辨或辨而不明致令檢方者漫無下手之處竟不知某症屬虛屬寒當用某方用某藥某症屬實屬熱當用某方用某藥則雖千百妙方千百妙論無益於用也無怪乎自古至今治痘者之多迷迷而慈幼之術疎也且痘瘡之虛實寒熱與諸病之虛實寒熱其異同固自有辨諸病有虛者元氣自虛也宜補也痘瘡有表虛有裏虛亦元氣自虛也宜補也此其相同者也諸病有實者邪氣實也可瀉也痘瘡有表實有裏實此則元氣完固而毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也此其不同者也諸病有虛之甚者陰有餘陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也痘瘡有虛之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也此其相同者也諸病有寒自外入者外感是也當其在表宜發散之久而入裏

則鬱爲內熱宜清解之痘出而風寒外襲宜溫而散之或外寒入內而爲吐瀉諸症亦宜溫之而已外不可發汗內不可清解也諸病有虛熱者元氣虛津液竭而火從虛中起補之則熱自除也不必解熱也痘瘡亦有虛熱者元氣虛而毒氣肆也當以補元氣爲主而畧兼解毒可也三者相同而亦有不同者也諸病有實熱者血氣未虧而邪氣壅盛單用寒凉瀉之可也痘瘡亦有實熱者稟氣强血氣盛而毒氣亦盛亦單用清凉解之可也此又其相同者也今自發熱之初以至還元之後俱皆辨症之虛實寒熱而遂立

方於其後令人細心審症而後用藥虛不至於虛而實實亦不至於損不足而補有餘又不至於以水益寒而以火益熱也然痘之虛實寒熱較之他症猶顯明而易察蓋自見點以至結痂其形其色既昭然可覩若又聽其聲音觀其靜躁視其飲食之多少審其大小便之利澀三歲以上者診其脈之遲數洪微其辨虛實寒熱當如黑白之分明而用藥取效易易矣

## 起勢論（此言起勢二字其生機有勃然奮發之義）

看痘之順逆更有精微之理又不拘拘於稀疎稠密

中論也此在心思之巧眼法之高看痘粒之逐時起發長大早辰看之如白萊子樣大午間看之如麋子粒大夜來看之則有高粱米大此言初見痘苗之起勢也及至出齊雖有先後之不同細看其起勢其起發長大生機勃然總屬一樣至於長漿必先由痘粒之暈腳起長開盤既已起長開盤便見痘疱之內漿即隨之而長漿既長矣稠膿隨之而上三日灌漿之期不差時刻而膿漿已充滿矣夫所謂起者起發之義也所謂勢者天地生物之機物各以類而生生不已其機不停滯也譬如果木春月開花夏月結實秋月成熟其生機總無停滯今言痘之起勢有以似之稀疎者可稱順症即稠密者亦歸之於順矣易曰雲行雨施品物流形雲行雨施者氣之亨也品物流行者物隨造化之氣以亨也欲學看痘者先要明起勢之理細看起勢之形其中又有尖圓紅潤四者之分別焉若痘不順烏有此勃勃然起發之形像也

## 初發熱至痘報苗及出齊數日內調治法

久吾聶氏曰大凡調治痘瘡自發熱之初見點之時即須思及何如起發何如灌漿何如收結動手用藥便要顧首顧尾慎其初以善其後然後次第調治可

保萬全也

一發熱之初若身熱和緩或熱或退神清氣爽飲食如常則不必用藥發汗但戒葷忌風調護而已蓋痘有順而不必治者不輕治即所以調治之也

其或增寒壯熱頭痛咳嗽鼻流清涕多因外感不可不發散也當視兒強弱而用藥發汗體氣素壯實者用加味升麻葛根湯汗之體氣素怯弱者用加味參蘇飲汗之然不可出汗太多恐發虛其表後難起脹灌膿也

既經發汗而身熱漸緩兒頗安靜者其痘出必稀少

此爲順候且勿服藥以待其報苗

發汗之後或身熱不退而煩躁譫語口渴飲水宜用敗毒和中散清之切不可過用寒凉分兩急於峻攻恐芩連性寒冰伏其毒始焉出之不快繼焉灌漿又難其中妙用神而明之存乎其人或減芩連分兩或用芩而不用連或并芩連俱不用是在用藥者臨時之權變斟酌　倘大便秘澁加酒蒸熟大黄一錢微利之　倘外感風寒此中去芩連加羗活白芷蘇葉各五分發散而兼托痘來日必報苗則中自安也服此煩躁少減即止勿服聽其痘外出則煩悶躁渴譫語必減退安靜

或有腰痛腹痛而煩悶者此其毒氣誠重然只當用此敗毒和中散主之大便秘加酒蒸熟大黄微利之聽其痘出外則內痛自止然後看其痘或稠密或紅或紫或帶焦黑乾枯等色急於此方內倍加芩連紫草茸以清血分之毒火切不可純用寒凉并犀角生地以阻遏其毒出之勢立致內攻告變世人不知此理多用寒凉解毒或用硝黄峻下因而速斃而卒不悟者多矣

當時令衆人出痘時小兒或有發熱稍緩其熱或作或止其紅點或未見或微見而未明或是出痘或非出痘正在疑似之間不如且勿服藥姑少待之但禁風忌葷調護之而已所謂不輕治正所以深治之也

有等富貴之家珍愛太過見其如此悮信庸醫屢投以清凉解毒之劑殊不知胎毒藏於命門全賴五臟之眞氣以領導時令之氣傳送透入命門引胎毒之陰氣發出而爲痘想其勃然欲出之勢决不可阻遏彼之用清凉阻遏其勢即所以廹之內攻而禍速矣故犯此者多有報痘數日即煩悶驚搐而死此解毒之劑殺之也然醫者曰吾用解毒藥何至於殺人病家亦曰彼用解毒藥何至於殺吾人反歸咎痘之症惡難救不歸咎於醫而醫亦不自任其術之疎殺人於冥冥之中而已不悟人不知噫亦可悲也已更可痛恨也已予特表而出之以戒世之愛而反害者殊不知痘毒稟於胎元藏於命門一旦時令之氣觸發於忽然之頃其勢猛鋭欲出斷不可禦必藉氣血載毒出外成漿結痂然後毒散而功成此病機亦化機也此豈若諸瘡之毒可以驟然而解毒者乎故解之於旣出之後是順其欲散之勢猶爲近理若解之於未出之先是遏其猛鋭欲出之勢其禍甚速譬若初

決之堤水勢排山而來而欲捧抔土禦之有是理乎奈何今之治痘者每每於發熱之初或見痘苗一二顆之際輒以解毒爲主且曰服某藥則毒可解而痘出必稀不知痘之稀疎稠密由於感時氣之清濁邪正使然豈臨出之時所能驟解乎訛以傳訛無有辨其非者予不得不再三發明其理以救將來

如發熱之際有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉交作者全要辨虛實寒熱并看腹痛吐瀉條例而用藥

或吐瀉交作而肚腹痛甚者此感寒而停食也用升消平胃散一服立効

或胃氣虛寒而作嘔吐用參砂和胃散主之

或脾氣虛弱飲食不化而瀉者朮苓調脾散主之

身熱至二三日後痘欲出未出或煩悶驚搐或狂言譫語切不可驚惶失措惟詳審虛實寒熱而治之要知此等症皆由毒氣在內不得宣發於外而作然毒氣不得宣發症有不同不可不辨當詳看驚搐條例分別用藥

若幼兒發熱未見痘苗醫者不知是痘而悞作急驚施治或單以寒涼投之或以驅痰藥峻下之其兒必死何也阻遏其毒使不得出而反內攻也故未出痘之兒有此症者即當細心審問恐是出痘權以清解散以宣發之痘出而驚搐即止

又有發熱稍輕至三四日而痘尚隱隱不出最要詳察不可認以爲毒輕痘少慢不加意若發熱和緩精神清爽飲食如常出痘少而點數明頭粒尖圓漸見長大紅活此爲毒輕痘少無疑矣

若身熱雖輕至三四日而倦怠嗜臥不思飲食所報痘苗形影淡白點粒不明此非痘少毒輕乃氣血虛弱送痘不出之故耳急用溫中益氣湯以托之甚者必連服二三劑痘始出齊其痘必多若因其安靜神

手玩視不急托痘出外延至五六日後毒氣內攻須臾告變不可救已甚足畏也昔人謂熱輕則痘輕之說可盡信乎而六日以前痘未出齊勿用湯補可盡拘乎後學於此宜三復斯言

久吾聶氏曰自有方書以來治痘之家其人不止數百求其最精於此者亦有千數人著書立說流傳天下計其時日歷十有餘年之久然皆詳於已出之後畧於未出之先深言出速而稠密之危不言留中而不出之禍不知已出之毒外寇也未出之毒內寇也出速而稠密者外攻也留中而不出者內攻也內寇

與外寇勢孰急內攻與外攻禍孰烈故痘已出而死者多在旬日之外痘不出而死者必在六日之內徒知禦外寇而不知逐內寇自古以來諸賢之爲計踈也然其失計安在惟在痘未出急於解毒緩於逐毒也不知未出之時毒不可解但當汲汲逐之出外也予深悟此理而明矚其失故長顧遠慮爲未出以前諸症設法分晰虛實寒熱以施治實熱者宜發其壅滯以逐毒出外虛寒者補助其氣血以逐毒出外至於急用寒涼過毒內攻等弊則諄諄致戒不厭再三一以救前人之失一以開後學之迷雖岐黃復起不易吾言矣

一發熱至三四日報痘形如大粟口鼻腮耳年壽之間先發數點老紅潤澤者最吉不必服藥

若身熱一二日即出痘先發於天庭司空印堂等處或一齊湧出而稠密或乾枯而帶紫黑或成片不分顆粒或頂平塌而彼此粘連不惟毒火內盛而氣血凝滯亦不能收束毒火以致毒火肆行此症十難救一最爲可憂急宜活血養氣而化毒宜用調元化毒湯其湯內人參看症加減腹痛去參耆加炒枳殼大便久秘去參耆加酒蒸熟大黃微利之若血氣與痘

火俱旺脈又洪數歸芎減三之一仍去參耆不用

若痘出不快其症不同最宜分別

有痘色紅紫乾枯或密如蠶種或一片不分顆粒身熱大便秘而出不快者此毒火鬱滯氣血不流行也宜用調元化毒湯去參耆加小川芎淸之或加熟大黃微利之

有痘色淡白飲食減少身涼手足冷小便淸大便滑而出不快者此氣血怯弱不能載毒出外宜用溫中益氣湯托之

有聲重鼻塞咳嗽惡寒而出不快者風寒蔽之也宜用加減參蘇飲發散之（此參蘇飲與並方藥味不同）

或有因邪穢所觸隱伏而出不快平塌而頂不起其痘必作癢宜用平和湯解之外燒小紅棗蒼术或沉香檀香速香以辟其氣仍看痘色暈脚伏則宜之陷則補之

痘正出時有忽然傳風雙目直視牙關緊咬此皆調護不謹而爲風邪所襲也且勿輕用驅風峻猛之劑宜用薑附湯微汗之立愈

痘正出時身不熱者爲佳或微熱亦無妨惟大熱者可憂若出齊而壯熱蒸蒸更可憂其痘必稠密暈必

紅紫或帶乾枯宜用調元化毒湯主之十之中常救八九但本方湯內有參者且去之俟其痘暈不紫不乾枯再入參者以補助氣血催其長漿此乃屢試屢驗之法也

凡痘出齊與否以脚心爲驗脚心有痘則出齊矣若痘出稀疎不必拘此以身不熱爲出齊

肉食不可太早必俟痘出齊而身不甚熱方可食鮮鯽魚助其胃氣開盤起長易於泛淸漿可連食鯽魚二日至灌膿時食肥母雞或線雞俱可　大漿未滿豬肉亦可　緜羊肉亦可　俱不用鹽

長漿之時幼兒自已能食任其飽餐此時以發物攻毒催其大漿充足方奏成功不比雜病過飽傷脾若兒小不能食此葷物當令乳母按期而食

又有一等素痘長漿之時食葷即吐當以香蕈炖荳腐荳腐皮及春筍用香油些須生薑些須醬醋俱忌

## 痘出齊後起發灌膿數日內催漿足漿法

報痘三日後痘已出齊身體溫和精神淸爽顆粒尖圓潤澤根脚老紅胸背稀疎飲食如常二便不澀此順症也不必服藥但避風寒防穢氣而已

痘出齊後三日內其時日十分緊要其形色症候最宜精察蓋好痘全要痘漿充滿方可保無虞痘一出齊形色顯然其膿之成與不成足與不足皆可逆覩矣除以上順症自然膿漿充足不必服藥其有不順者後必無膿或膿少而淸急於此三日內觀形察色分別虛實寒熱用藥調治以爲灌膿計猶可及也失此不治多有緩不及事而竟不成膿者矣痘之生死判於漿之有無有漿則毒從外散故生無漿則毒留內攻故死是以膿漿滿而痂厚者上也漿未滿而痂薄者次也必有變症生焉其最下者徧身俱水疱然水疱三四分而間有五六分膿漿者猶可望生後必

有痘毒三兩處痘毒成而得生矣更有最下者密不成顆串成一片而皮下又有膿漿又或泡密而潰爛膿水淋漓此生機也惟乾枯無膿或薄漿止有二三分者必癢塌而死無生意矣是以出齊而調治灌膿如拯溺救焚刻不容緩

氣血充暢則毒化爲膿膿之不成其說有二毒氣熾盛則血燥而凝故不能運化而成膿元氣虛弱則血寒而縮亦不能運化而成膿

痘暈紅紫或帶乾枯間有焦黑此毒火內盛而血燥必不成膿急宜用淸毒活血湯倍加苓連紫草茸以

救之

痘色淡白疱不尖圓根無紅暈此氣虛而血縮必不成膿急宜用參歸鹿茸湯救之倘鹿茸難得則以千金內托散救之然終不似鹿茸建功之迅速虛弱未甚者服此一二劑暈即轉紅活立刻起漿

托膿之劑莫妙於此方氣血之屬莫過於鹿茸鹿乃純陽之獸值夏至一陰始生即解角養茸茸之始長一日大如栗三日六如茄五日上即開椏七日又開一椏九日又長一椏十一日又長一椏八椏俱備高有三尺許俗云八椏角鹿至於鹿茸茄茸最上外皮有黃毛中有一包紫紅得之最難收拾予在邊外嘗古射鹿得一茄茸予與彼買此茸來就即鍋燒滚水二大碗將茄茸炮於滚白水之中隨即取出迎風吹之候其京些又入原鍋滚水中再炮半刻又取出迎風吹之如是七八次其茸中之紫血方堅實如角後帶歸京都用之以灌痘漿其効如神若不煮炮生則臭爛若煮炮不得其法則茸中紫血爆破流出此乃蒙古收拾鹿茸之法可稱盡善盡美

若夫店內所賣乾茸外有黑皮堅硬中却無堅實之茸皆因煮炮不得法急於一次炮熟火力煎熬太急爆破流出紫血茸中空無茸或間有半茸者

十一月麋角解塞邊外以之充鹿茸然麋茸小而又瘦不入藥用

鹿有兩種一種梅花鹿身小白點明顯南方有北邊多一種馬鹿身長大如川馬身上白點在毛內隱約亦似梅花鹿但不甚明顯北邊多及川陝雲貴俱有但不似關東黑龍江以及西北之沙漠最多或三五十成羣或七八十成羣蒙古圍而射之以充庖廚生食更美鹿有三寶七珍鹿茸一寶也鹿角膠二寶也鹿角霜三寶也鹿舌一珍也鹿尾二珍也鹿筋三珍也鹿肝四珍也鹿骨髓五珍也鹿雙腰及腸胃鹿血六珍也鹿肉七珍也其中有鹿外腎全副應列於三寶之內以仲秋初旬未交之先得之大能補助陽道老年人修合補藥內煮熟研爛爲丸服之竟能種子何必羨海狗腎乎惜方書不載故詳言之

鹿乃八月始交孕至次年五月而生何前此俱言六箇月而生不亦謬乎

長漿之時有用人乳和藥服者但人乳脾胃弱者忌之大便滑者尤忌之兩乳不和尤忌之

出羊乳熬熟可助乳下芽兒灌漿蒙古經驗

出齊後當治不治則漿不行而五陷之症作矣五陷者白陷灰陷紫陷黑陷血陷也

痘稠密暈紅紫而頂陷下者紫陷也甚則轉而暈脚乾枯中有黑臍而成黑陷也此乃毒火内盛欺侮其元氣爍焦其榮血而陷也宜用清毒活血湯倍加生黄耆芩連以治之并倍加紫草茸然當其紫陷時不過一二劑而痘立起其効如神及至黑陷則毒火亢極内攻已深雖用此方加減分兩救治十之中止能救活一二

痘出稠密其色淡白根無紅暈而頂陷者白陷也甚則進延一二日轉而為灰陷也皆因氣血虛寒不能運化毒氣以成漿故陷也倘乘白陷之時大補氣血即用千金内托散或參歸鹿茸湯一二劑即成大漿失其時日變為灰陷急用參歸鹿茸湯按方加其分兩再添隨症藥味連進二三劑猶可望生若以鹿茸價值太多者費不買是自棄其兒女也予因治此等症候屢用此方建功敢直以告後學

又有一種痘瘡顆粒通紅有似血疱不成漿者此乃氣虛不能統血而血泛上僭居氣位宜用參耆湯大補其氣氣居其上血自安於分所當居之下化毒而成膿漿矣

血疱失治則氣愈虛而成血陷然治之亦不外是方

血陷與紫陷若不細心體認多致淆混不可不辨

血陷雖紅不帶紫色血陷屬虛氣平身涼

紫陷屬熱氣粗身熱

以上五陷之症辨别極其詳悉後學反覆玩味則初起泛漿長漿催漿足漿之法層次工夫不外是已若能依此調治起死回生於頃刻間矣

凡年長男女嗜慾久開氣血久耗時值出痘稠密毒火内盛元氣虛血氣弱津液乾枯不能制火以致虛

火上炎或煩或渴或咽喉痛或唇焦口苦鼻時出血雖任溫補痘必不能成漿結痂最為難治時醫見其多熱俠率用清涼苦寒之劑犀角地黄湯之類不知原因氣血不能勝毒氣而致有此症若純用寒凉則血氣愈虧損而毒氣愈肆行豈復有可生之理久吾聶氏特製參麥清補湯以催漿深得中和之理必須服三五劑方能奏効

起漿灌漿時有吐瀉者症各不同

吐有二端

吐而發嘔有聲吐乾反爽快者毒火上越也痘起之

藥湯主之

吐而有物無聲不酸不苦吐沫困倦不思飲食者胃氣弱也參砂和胃散主之

瀉有二端

瀉而糞黃臭穢小便赤澀毒火下奔也痘暈必紅紫加味四苓散主之

瀉而糞色淡白更兼滑利乳食俱不化此虛寒也痘暈必淡白參苓白朮散主之兼用七味荳蔻丸

足漿之後有身凉而汗不止者歸耆湯主之

足漿之後兒小痰多用白附子熱水磨服

### 漿足回水至結痂還元數日內調治法

痘出八九日膿漿充足而顏色蒼蠟者上也若無他症勿藥可也然痘出稠密而漿不甚滿延至此時飲食多減痰液多盛宜用養胃開痰湯主之

此時漿滿或爲寒所縛一時痘俱紫黑如紫葡萄色不必驚惶急以上好肉桂磨熱水或煎湯服之立見如舊

有寒戰咬牙者此真氣外發而內虛寒也宜用建中湯大補之立愈蓋胃寒則咬牙脾寒則寒戰

痘至十日十一日之間膿漿足而色蒼蠟者必且發熱蒸蒸此回水之候也蓋真陽運化其水自然消爍而收靨也倘元氣不足不能及時回水而當靨不靨者此虛寒症也必身凉而手足冷須大補氣血而助之收結宜用溫表調中湯主之

又有發熱蒸蒸而當靨不靨者毒火未解也退其熱則痘自收宜用清表敗毒湯主之一劑而身熱立退痘自收而結痂矣

或用沙糖半酒杯百沸湯調服謂之甘露回天飲能令熱退痘收若毒盛者恐未必効

痘靨時有外潰而膿水淋漓者謂之水靨用房上多

年敗草末攙上即結痂　蕎麥粉鋪上亦好　松花粉更妙　若在邊外即以多年黃牛糞燒灰攙上亦好

當靨時忽然腹痛其痛著在中脘此熱毒凝滯瘀血而作痛也宜用消毒散血湯主之此症甚少五十年來止經見一箇

十一二日之間結痂後復又身熱或煩渴胸腹手足頭面俱熱大便秘小便赤餘毒盛也急用大連翹飲以解毒若解遲必生痘毒然此湯不可過用

若發熱稍緩頭熱而面不甚熱手心脚心熱而手背

脚背不熱。精神困倦。大小便利者。虛熱也。宜用補中益氣湯主之。

痂落還元後。或痂落一半後。忽然徧身大熱。此餘毒欲發癰也。或頭項胸背四肢。有一二處更熱甚者。即癰之所在也。皆因膿漿不滿。而結痂浮薄。速收速落者有之。急宜用大連翹飲解毒退熱。如熱不退。速進一二劑癰方可內消。

此時又有忽然頭項大痛者。乃餘毒上攻於兩目也。急宜用清毒保目湯。服二三劑。以解上攻之毒火。庶可免目患。

落痂後。精神困倦。飲食減少。或手足心發熱。或手足凉。痘之底盤不高。且又白色。皆內虛之候也。宜用補中益氣湯主之。

又有落痂之後。忽然畏寒。畏寒之後。復又身熱。似瘧而實非瘧。此乃氣血兩虛。急宜用補中益氣湯加酒炒白芍五分。薑製半夏五分。一服立愈。

痘出齊後。有面目腫脹而痘不脹者。此血氣虛弱。不能拘攝毒氣以成膿。故其毒氣散漫妄行肉分。此為危候。急用參歸大補湯。助其氣血。收攝毒氣。則痘灌漿而腫脹自消矣。　此症與十三逆症形如瓜瓠者相彷彿。但不似瓜瓠之甚耳。誠恐後學見此委而不治。另立治法以救之。

又有痘長漿時。原係險症。毒火內盛。攻於口齒。上下唇掀腫。口內牙牀舌上皆糜爛。且有臭氣。此時急於清毒活血湯內去人參。加天花粉一錢五分。煅石膏三錢。一劑而臭氣少減。再劑而臭氣全無。牙疳之患。可以免矣。予第五女出痘。曾患此症。用此方加減調治。由是唇腫漸消。痘漿充滿。潰爛膿水淋漓。用松花粉鋪於蓆上。方能結痂。幾一月始獲全愈。

痘後之症最多。深有關於利害。若不分晰明白。誤人

不淺。若身熱而水不回。乃毒火盛而不及時回水退其熱。則痘自回。宜清表敗毒湯主之。

若身凉而精神倦怠。痘不回水。飲食減少。時又溏瀉。乃元氣虛寒之極。宜用溫表調中湯。進一服而痘立見。次第回結。

又有未出痘之先。一兩月之內。兩目羞光。怕見太陽。今又出痘。痘已收結。惟兩目緊閉不開。急宜用乳酥油搽兩眼縫。潤其沾滯。自然即開。看其兩目若有紅絲纍。即以清毒保目湯主之。一劑不愈。再用一劑。以解上攻之毒火。如有翳膜遮蔽。即以清毒撥翳湯。緩

緩宭一兩月之久。自然翳膜消脫、若無紅絲纍。不必用藥。

又有痘收已過十二日矣、兩目自開、黑白分明、能食安睡、可以不必用藥。彼庸醫乃以安睡爲疲倦、連用參耆三四劑以補之。後添大渴、飲水不止。時飲時小便、彼家延予診視。予曰、此補之過也。因過補而餘毒未盡去者。留滯於胃。故作煩渴。若不及時清解。則變症蜂生。予因用知母石膏湯。內加麥冬。連翹。牛蒡。黃芩、黃連。生地。木通。花粉、乾葛。甘草。彼家仍請原醫斟酌、此方彼乃曰。藥味太寒。此時補之、尚恐不及。若以

寒涼瀉之。恐非其治。彼仍以參耆投之。不越三日。兩目復閉。翳膜遮蓋瞳人。然後。纔知痘後妄補之悞。

又有痘已回水結痂、脫落大半。身熱每夜飲水三五大碗。飲一次瀉一次。不止一二十次。予因想原係不正之痘用藥攻其足漿、雖用清表敗毒湯清之於先、大連翹飲解之於後、未免餘毒未盡、故作大渴大瀉予卽以加味四苓散一劑。其瀉立止。隨用知母石膏湯。內加麥冬。連翹。牛蒡、黃芩、黃連、生地。木通。花粉。乾葛。甘草。其大渴亦減。獨身尚有餘熱。看其尾閭穴上、腫一塊、平坡漫腫、此陰毒也。卽以生耆。玉竹、歸身。熟地連翹。牛蒡。白木。白茯苓。金銀花。皂刺、赤芍、防風、白芷以攻之、兩日連進二劑。其毒高聳。自出清水膿一小碗。予細思元氣虛極。不得稠膿。卽加人參一錢。次日膿漸濃、稠。連進三五劑。貼萬應膏而毒自愈。可知。參耆施之於痘毒破爛之後。有成驗也。凡看痘後大渴引飲。必有餘毒餘火。隱伏於內。然後作渴。當用清涼之劑。以解胃中毒火。庶變症不生。謹記謹記。

痘後有紅痢白痢。紅白相兼之痢。后已論列明白。當照法調治。

痘後有三五日。或七八日。不大解。不論有身熱。無身

熱。看其元氣壯實。卽以大連翹飲。去木通、車前、滑石。加枳殼、熟大黃以下之。

痘後忽然有嘔吐。不思飲乳食粥。若形氣瘦削、此虛寒也。急用香砂六君子湯。引加煨薑以溫之。若用升、消、平胃、其症必死。此後學之所當知也。

若痘後身涼。冷汗不止。形氣雖實。而精神稍覺疲倦。此陰陽交戰。宜用歸耆湯主之。歸身一錢。生黃耆一錢五分。炒熟棗仁二錢。研末。浮麥一錢。煎湯飲之。汗自然止。身體立見溫和。此屢試屢驗者也。

所有痘科緊要成方。臚列於左。藥之分兩多

少俱以半歲孩童爲式。大者添之。再小者減之。

加味升麻葛根湯。

白粉葛（一錢）　升麻（三分）　牛蒡子（五分揀淨炒香研碎）

小川芎（七分）　蘇葉（六分）　桔梗（六分）　山查肉

（八分）　赤芍（五分）。防風（七分去蘆）　甘草（二分生去皮）

生薑三片同煎。熱服。取微汗

歌曰

升麻葛根湯十味、赤芍防芎甘桔是

山查蘇葉及牛蒡　體氣壯强斯藥治

加味參蘇飲（此乃初發熱時所用之加味參蘇飲也）

人參（二分或無亦可倘元氣虛必要）　蘇葉（七分）　前胡（一錢）

小川芎（七分）　山查肉（八分）　桔梗（五分）　白茯

苓（八分去皮）　白粉葛（八分）　陳皮（七分）　半夏（三分）

牛蒡子（五分揀淨炒香研碎）　甘草（二分生去皮）

生薑三片同煎熱服。取微汗。

歌曰

加味參蘇白茯苓　前陳甘桔半芎平

牛蒡查肉和乾葛。體氣虛羸用此靈

以上二方。即是傷感而非痘疹。服之發汗亦無妨。

敗毒和中散

連翹（七分去心研碎）　防風（七分）　荊芥（七分）　黃連（一分）

（不用酒炒）　牛蒡子（七分同前製）　桔梗（六分）　陳枳殼（五分）

---

前胡（一錢）　紫草茸（五分酒洗研末）　小川芎（七分）

升麻（三分）　木通（七分）　蟬蛻（十二隻如有閏月十三隻洗淨甕去）

（頭足）　麥門冬（一錢去心）　甘草（二分生去皮）

生薑一片。燈心五十寸。同煎服。

如大便秘澁。加酒炒大黃八分。微利之。不秘者勿加。如毒火盛。加酒炒黃芩二分。

歌曰

敗毒和中翹桔草　牛蟬前麥芎連好

通麻芩殼紫荊防　便秘蒸黃微利早

升消平胃散

小川芎（七分）　香附（一錢炒）　蒼朮（六分炒）　紫蘇（七分）

厚朴（六分薑汁炒）　藿香（五分）　砂仁（五分研碎）　白芷

（六分）　陳皮（六分去白）　麥芽（八分炒）　山查（八分去核）　甘

草（二分炙）

煨薑三片。同煎帶熱服。

歌曰

升消平胃朴陳芽　白芷蘇芎藿附砂

吐瀉內傷兼腹痛　須加蒼朮草山查

參砂和胃散（即香砂六君子湯）

人參（三分去蘆）　砂仁（七分研碎）　半夏（五分）　陳皮（六分）

白朮（一錢去蘆炒）　白茯苓（八分去皮）　藿香（六分）　甘草

（三分炙）

煨薑去皮三片。同煎服。

歌曰　胃氣中虛嘔吐頻　參砂和胃散尤靈
陳皮白朮煨薑引　藿半隨甘白茯苓

參苓調脾散

白朮（一錢去蘆炒）　白茯苓（八分去皮）　眞神麴（八分炒）　白芍（六分酒炒）　白扁荳（八分薑汁浸去殼炒）　砂仁（六分炒研）　香附（七分炒）　厚朴（六分薑汁炒）　甘草（三分炙）　或加人參（三分）

煨薑三片。大棗一枚。去核。同煎服。

歌曰　脾土中虛泄瀉作　木苓調脾藊荳朴
砂仁草附或加參　神麴煨薑炒白芍

清解散

防風（七分）　荊芥（七分）　蟬蛻（十二隻去頭足如有閏十三隻）　桔梗（六分）　小川芎（七分）　前胡（一錢）　連翹（七分去心）　乾葛（八分）　紫草茸（五分研末）　升麻（五分）　木通（七分）　黃芩（五分酒炒）　山查肉（八分）　牛蒡子（七分製同前）　黃連（二分酒炒）　甘草（三分生去皮）

生薑三片。同煎溫服。

歌曰　清解荊防升葛通　芩連甘桔茸川芎
前胡蟬蛻蒡翹共　查肉生薑引有功

蘇解散

防風（七分）　荊芥（七分）　蟬蛻（十二隻去頭足如有閏十三隻）　桔梗（六分）　小川芎（七分）　前胡（一錢）　乾葛（八分）　升麻（五分）　紫草茸（五分研末）　木通（七分）　紫蘇（七分）　連翹（五分去心）　牛蒡子（五分製同前）　白芷（七分）　羌活（五分）　山查肉（八分）　甘草（二分生去皮）

生薑三片。同煎帶熱服。

歌曰　蘇解前羌白芷同　荊防升葛紫翹功
牛蒡蟬蛻山查肉　甘桔淮通及撫芎

溫中益氣湯

人參（五分）　白朮（一錢）　黃耆（八分生）　防風（七分）　當歸身（七分酒洗）　白茯苓（八分）　南木香（三分）　川芎（七分）　山查肉（八分）　白芷（七分）　官桂（二分）　甘草（三分炙）。

生薑一片。大棗一枚。去核。同煎服。

歌曰　溫中益氣用生耆　參朮歸身官桂宜
白芷防芎查肉草　木香應與白苓陪

調元化毒湯

綿黃耆（一錢生）　當歸身（八分酒洗）　牛蒡子（七分炒研）　人參（三分）　白芍（七分酒洗）　連翹（七分去心）　木通（七分）　黃芩（五分酒炒）　黃連（二分酒炒）　防風（七分）　荊芥（七分）

桔梗（六分）　前胡（一錢二分）　蟬蛻（十二隻去頭足如有悶十三隻）
紅花（三分酒洗）　紫草茸（五分酒洗研末）　生地黃（一錢酒洗）　山
查肉（一錢）　甘草（二分生去皮）
生薑一片。同煎溫服

歌　曰　調元化毒參耆芍　紅紫牛蟬荊芥黃
歸地前通查肉麴　芩連草桔防風度

加減參蘇飲（與前加味參蘇飲不同）
蘇葉（一錢）　人參（二分）　陳皮（七分）　羌活（六分）
小川芎（八分）　防風（七分）　荊芥（七分）　桔梗（五
分）　白芷（六分）　甘草（二分生去皮）　冬月加麻黃（三
分）
生薑三片。同煎熱服。但不可出汗。

歌　曰　驚搐休云作等閑　風寒外束出艱難
參蘇羌芷芎防芥　甘桔陳麻笑解顏

平和湯
人參（三分）　當歸（六分）　桔梗（六分）　白芍（五分）
紫蘇（六分）　黃耆（一錢生）　防風（七分）　白芷（七分）
官桂（二分）　沉香（二分）　檀香（二分）　藿香（二分）
乳香（二分燈心同研）
生薑一片同煎溫服

歌　曰　穢氣相衝不可當　教君急用平和湯
參耆歸芍蘇防芷　桂桔沉檀乳藿香

薑附湯
白附子（三錢）　老生薑（二錢）
濃煎湯灌下一二酒杯。出微汗即愈。

歌　曰　痘出傳風眼直斜　牙關緊閉襲風邪
此時勿用驅風藥　白附薑煎汁當茶

清毒活血湯
紫草茸（七分研末）　當歸（八分酒洗）　前胡（一錢）　牛蒡子（
七分炒研）　木通（七分）　桔梗（六分）　生地黃（一錢酒洗）
連翹（七分去心）　人參（五分去蘆）　生白芍（五分酒洗）　黃芩（五分
酒炒）　黃連（二分酒炒）　生黃耆（一錢五分）　甘草（二分生去皮）
山查（一錢去核）
生薑一片同煎服。
煩渴者。去參耆加麥冬（一錢五分去心）　花粉（七分）

歌　曰　清毒活血紫參耆　牛子當前白芍宜
生地芩連翹桔草　山查薑引木通提

參歸鹿茸湯（此方有起死回生之力分兩因人之大小加減）
鹿茸（三錢酒塗炙稍可用酥炙更好）　嫩綿黃耆（五錢蜜炙）　甘草（五分）
（炙）　人參（三錢去蘆）　當歸身（一錢酒洗）

薑一片。好龍眼肉三箇同煎去渣。入好酒一杯。溫服。

兒能飲酒者。濃煎藥汁。與酒相半。和服亦好。

如因倦。手足冷。飲食少者。加廣木香三分公丁香三分。官桂三分。砂仁三分

如漿不足。九十日之間。或有作寒戰咬牙者。再加官桂二分。熟附子三分。

如大便泄瀉。膿漿難成。去當歸加麪炒白朮一錢酒炒白芍七分。白茯苓八分木香三分。丁香二分。肉桂二分。肉荳蔻五分。麪裹煨熟。搥去油用柯子肉二分煨熟。

倘瀉不止。另用參朮散。兼用七味荳蔻丸。

歌曰

參歸鹿茸用三錢　蜜炙黃耆貴嫩緜
甘草炮來薑一片　福元好酒服安然

## 千金內托散

人參（五分去蘆）　當歸身（一錢酒洗）　嫩緜黃耆（二錢五分蜜炙）
大川芎（七分）　山查肉（一錢）　南木香（三分）　白芍（五分）　官桂（三分）　防風（七分）　白芷（七分）
厚朴（七分炒）　甘草（三分炙）
生薑一片。好龍眼肉三箇同煎。入好酒和服。

隨症加減法同參歸鹿茸湯

歌曰

千金內托十二味　歸芍參耆防芷桂
木香甘草及川芎　厚朴山查薑酒是

## 參耆湯

人參（一錢五分去蘆）　黃耆（三錢蜜炙）　官桂（五分）　甘草（一錢炙）
生薑一片同煎溫服

歌曰

血泡通紅不作漿　惟有參耆四味湯
炙草一錢官桂五　管教服藥得安康

## 參麥清補湯

人參（五分）　麥門冬（一錢酒蒸曬乾）　白花粉（八分酒蒸曬乾）

前胡（一錢）　生黃耆（三錢）　牛蒡子（八分炒研）　炙甘草（三分）　生甘草（二分）　酒炒白芍（五分）　生白芍（三分）　當歸身（七分酒洗）　紅花（五分酒洗）　大川芎（七分）
桔梗（七分）。　生地黃（一錢酒洗）　山查（一錢去核）
生薑一片。好龍眼肉三箇同煎。頻頻溫服。

歌曰

參麥清補甘草芍　半生半熟紅花著
生耆歸地桔川芎　花粉前蒡查肉度

## 梔連二陳湯

黃連（三分薑汁炒）　白茯苓（七分）　梔子（三分薑汁炒）　半夏（二分薑製）　炙甘草（二分）　陳皮（五分去白）

生薑一片同煎緩緩服。吐止即勿服。

歌曰　行漿作吐兩般云　毒火梔連合二陳　困倦參砂和胃散　其間痘色要分明

加味四苓散

豬苓（七分）　木通（一分）　澤瀉（八分）　黃芩（酒炒五分）
黃連（酒炒二分）　赤茯苓（七分）　牛蒡子（炒研五分）　車
前子（炒七分）
燈心五十寸。同煎食前服。

歌曰　行漿作瀉甚難當　小便紅黃毒氣猖　加味四苓車木共　芩連牛子一齊嘗

參朮散

白朮（一兩用裏白無油者去蘆炒）　人參（五錢去蘆）　砂仁（五錢炒）
白茯苓（五錢去皮）　炙甘草（五錢去皮）　南木香（二錢）　廣
陳皮（四錢洗淨去肋膜曬）　山查肉（五錢炒）　家蓮子（五錢炒去心）
肉荳蔻（四錢麵裹煨熟去麵切細用紙包打去油）　柯子肉（四錢煨去核）
真神麯（五錢炒）　薏苡仁（五錢炒熟）
共為極細末每用二錢清米飲。調食前溫服兒
有不肯服者。入稀粥內。和服亦可。

歌曰　參苓砂草薏苡仁　蓮肉山查五麯神　南木三陳柯蔻四　其間白朮兩分明

七味荳蔻丸

肉荳蔻（五錢製同前）　柯子肉（五錢煨去核）　白龍骨（五錢煅）
南木香（五錢）　赤石脂（七錢煅五火）　枯白礬（七錢）
砂仁（五錢炒）
麪糊為丸。如菉荳大、每服用清米飲下。或二十
丸。或三十丸。量兒大小與之。兒有不能吞丸者
將丸研碎化入粥內。服之亦可。

歸耆湯

當歸身（三錢）　黃耆（二錢蜜炙）　酸棗仁（一錢五分炒研）
白水煎服。

歌曰　漿足身涼汗不止
惟有歸耆酸棗是

養胃開痰湯

人參（一錢去蘆）　白朮（一錢五分土炒）　白茯苓（一錢）　桔梗
（五分）家蓮肉（一錢去心炒）　山查肉（一錢）　山藥（錢）
（炒）陳皮（八分去白）　半夏（五分薑製）　甘草（五分炙）
生薑一片。同煎溫服。
灌漿時。忌用朮苓半夏。恐其燥乾津液。膿漿不
行也、至將靨時可用矣。
渴者、去半夏加麥冬。（一錢去心）北五味。（九粒研碎）

吐逆者加藿香七分。砂仁七分（炒研）

此時有欬逆者。乃胃氣上越也。服真黃土鼻邊間之立止。

歌曰　養胃開痰參术草　茯苓山藥山查實
蓮肉陳皮半桔苓　渴服麥冬五味早
若還吐逆藿香砂　黃土鼻間須論討

### 建中湯

人參（二錢去蘆）　黃耆（三錢蜜炙）　乾薑（五分炒）　肉桂（五分）
白术（一錢五分土炒）　當歸身（一錢）　大川芎（八分）　公
丁香（五分）　大附子（五分製熟）　甘草（三分蜜炙）

生薑一片。同煎溫服。

歌曰　咬牙寒戰建中湯　參术黃耆熟附當
肉桂炮薑須炙草　川芎薑引用丁香

### 溫表調中湯

黃耆（一錢五分蜜炙）　人參（一錢去蘆）　白茯苓（一錢）　白术
（一錢土炒）　官桂（三分）　大川芎（七分）　防風（五分）
白芷（五分）　丁香（三分）　當歸身（七分）　乾薑（五分）
熟附子（三分）　炙甘草（三分）
生薑一片。同煎溫服。

歌　溫表調中參术耆　丁香熟附桂當歸
曰　茯苓甘草乾薑共　白芷防芎一處施

### 清表散毒湯

地骨皮（一錢）　麥冬（一錢五分去心）　花粉（一錢酒炒）　牛蒡
子（八分炒研）　連翹（七分去心）　當歸（八分）　豬苓（七分）
澤瀉（七分）　黃芩（七分酒炒）　甘草（三分生）
水煎溫服。

歌曰　清表散毒地骨冬　牛蒡花粉草翹宗
炒芩澤瀉豬苓共　歸與同煎用木通

### 消毒散血湯

牛蒡子（一錢炒研）　生白芍（六分酒洗）　桃仁（一錢炒研去皮尖）

大黃（一錢酒炒）　乳香（五分燈心同研）　沒藥（三分）　紅花（五分酒洗）
水煎溫服。

歌曰　臍時腹痛著中脘　消毒散血湯莫緩
炒過桃仁熟大黃　紅花沒乳芍牛上

### 消毒保目湯

柴胡（一錢）　連翹（七分去心）　梔子（三分炒）　黃芩（五分炒）
荊穗（七分）　防風（七分）　赤芍（七分）　牛蒡子（七分）
（炒研生）蟬蛻（十二隻去頭足如有閏十三隻）　當歸（八分）　甘草（三分）
川芎（七分）　升麻（五分）　薄荷（五分）　桔梗（八分）
引用燈心五十寸

歌曰　清毒保目荷柴蟬　翹桔荊防赤芍緣
升麻牛子歸芎草　酒炒梔芩降火全

大連翹飲（此方內涼表多俱要製過前用）

連翹（一錢去心）　牛蒡子（七分炒研）　山梔子（五分酒炒）　柴胡（八分去蘆）　當歸（八分）　赤芍（七分）　防風（七分）　木通（八分）　荊芥（七分）　黃芩（七分酒炒）　滑石（五分末）　蟬蛻（十二隻去頭足）　車前子（八分炒）　甘草（三分生去皮）

生薑一片。同煎服。

大便秘。加酒炒大黃一錢。微利之。

歌曰　大連翹飲炒梔芩　柴滑荊防赤芍匀
通牛蟬蛻歸車草　便秘蒸黃著意尋

補中益氣湯（此方專治痘後元氣虛弱者）

人參（五分）　黃耆（一錢蜜炙）　白朮（八分土炒）　柴胡（五分）　升麻（五分）　陳皮（七分）　歸身（八分）　甘草（三分炙）

生薑一片。同煎溫服。

虛渴者。加麥門冬一錢去心。五味子九粒研碎。

寒熱似瘧者。加炒白芍五分。製半夏五分。

歌曰　參耆歸朮
升陳柴草

玄參升麻湯

玄參一錢　升麻五分　防風七分　荊芥（七分）　牛蒡子（七分炒研）　甘草（三分生去皮）

水煎溫服。

有夾痳疹而出者。加桔梗七分。酒炒黃芩七分。同煎服。

歌曰　赤點紛紛號夾斑　如雲突起又名丹
碎碎紛紛名夾疹　三症分明在此間
升玄湯草牛防芥　夾疹須知芩桔關

參耆實表湯（此方專治痘作癢者）

人參（五分去蘆）　黃耆（一錢五分蜜炙）　甘草（三分蜜炙）　官桂（三分）　防風（七分）　白芷（七分）　川芎（七分）　當歸（七分）　桔梗（五分）　南木香（三分）　厚朴（五分薑汁炒）

生薑一片。同煎溫服。

歌曰　參耆實表保元湯　官桂芎防芷朴當
甘桔木香薑作引　氣虛作癢賴安康

參歸大補湯

人參（五分）　當歸（八分）　蜜炙黃耆（一錢五分）　川芎（七分）　桔梗（五分）　蜜炙甘草（三分）　山查肉（八分）　紫草茸（五分研碎）　南木香（三分）　防風（七分）　白芷（七分）　厚朴（六分薑汁炒）

生薑一片同煎溫服

此方專治痘不起脹而面目頸項腫如瓜瓠。此厄症也。急以此方連進二三劑治之。必要腫消痘起。方有生機。

歌曰

參歸大補炙黃耆　紫茸川芎白芷宜

桔梗山查防厚朴　木香甘草用休遲

四聖膏（治痘疔聖藥）

珍珠（生研）　豌荳（燒存性）　亂髮（燒灰）　冰片（各等分）

用油胭脂和成膏。先將金銀簪撥開疔口。將藥填入疔內。即轉紅活。

拔毒散（此散治痘疔及賊痘漿浮萍其効如神）

明雄黃

不拘多少。研細末。又將白滾水。泡綿胭脂。取濃汁調點疔頭上。

三荳漿（散痘毒聖藥）

黑荳　菉荳　赤小荳

各一合研爛爲末。用醋研濃漿。時時以鵞翎掃之。紅腫退去。其効如神。

生肌散

地骨皮　黃連（炒）　黃柏（炒）　五倍子　生甘草（各等分）

共爲細末乾摻之。

絲繭散（治餘毒流注各處出清水者）

出蛾絲繭不拘多少。用生明礬末填在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之。

髮灰散（治痘出未齊而鼻衄不止）

用少壯無病人亂髮。不拘男女。用肥皂洗淨油垢氣。又用溫湯洗淨肥皂氣。焙乾量髮多少。用新瓦罐一箇將髮填入內。令滿用淨瓦片蓋口。鹽和泥封之。又全封瓦罐。曬乾。用木炭火圍罐一半。煅一

炷香久取出。俟冷其灰成塊。研令極細。每用二錢。童便七分。酒三分。調服立止。輕者只用灰吹鼻亦止。

此方極妙。不惟可用之痘瘡。凡諸血症皆可用。

清肺湯

花粉（一錢酒炒）　麥門冬（一錢五分去心）　天門冬（一錢去心皮酒蒸）

桔梗（六分）　當歸（一錢不用尾酒洗）　生白芍（七分酒洗）　黃

芩（七分酒炒）　知母（七分蜜炒）　丹皮（七分酒洗）　甘草（三分生）

生薑一片。同煎服。入髮灰一錢。調服尤妙。

訣

毒氣薰蒸鼻流血　毒氣亦因從血泄

門　天麥丹皮知母芩　當歸白芍花甘桔

清上飲

薄荷（七分）　防風（七分）　桔梗（六分）　連翹（七分去心）　白粉葛（一錢）　牛蒡子（七分）　麥門冬（一錢五分去心）　黃連（三分酒炒）　黃芩（七分酒炒）　花粉（八分酒炒）　甘草（三分生）

生薑一片。同煎溫服、

歌曰　口舌生瘡名熱毒　細察痘苗分所屬
清上荷防草麥牛　芩連花葛桔翹逐

赴筵散

薄荷葉（三錢蘇州者佳）　黃柏（五錢川中者佳）

各等分爲細末。入青黛一分。和匀搽之。

利咽解毒湯

山荳根（五分）　麥門冬（一錢五分去心）　牛蒡子（一錢炒研）　玄參（一錢）　桔梗（一錢）　防風（七分）　甘草（五分生）

生薑一片。同煎食後良久。分二三起。緩緩溫服。

歌曰　利咽解毒麥玄參　甘桔防牛山荳根

玉鎖匙

硼砂（一錢）　朴硝（五分）　殭蚕（三條）　片腦（一分）

共爲細末。以竹管吹之。

導赤散

木通（一錢）　赤茯苓（八分）　車前子（一錢微炒）　麥門冬（一錢五分）　生地（一錢）　人參（二分去蘆可有可無）　甘草（三分）

燈心五十寸、同煎饑時服、

清毒撥翳湯

黃連（三分酒炒）　當歸（一錢酒洗）　花粉（七分酒蒸）　桔梗（七分）　川芎（七分）　防風（七分）　薄荷（七分）　柴胡（八分）　牛蒡子（七分炒研）　草決明（七分研）　羌活（五分）　甘菊花（七分）　蜜蒙花（七分）　白蒺藜（七分炒研去刺）　穀精草（七分）　川木賊（五分）　生地黃（一錢五分）　白粉葛（七分）

山梔子（五分酒炒）

生薑一片。同煎食後良久服。

大便秘澁者、加酒炒大黃一錢五分。通仍除之、

歌曰　清毒撥翳草連梔　牛賊蒙精決蒺藜
生地羌防柴菊葛　川芎花粉荷當歸

炮製用藥之法

黃耆毒火盛生用、虛寒蜜炙用。

甘草毒火盛生用。虛寒蜜炙。俱去皮用。

白朮陳東壁土拌炒去土用、半夏薑汁拌炒用。

香附去毛切成片。淘米水拌炒用、蒼朮亦如之。

訶子煨熟去核用。　肉荳蔻麵裹煨熟搥去油用。

紫草茸研末用。整塊煎不化。　縮砂去皮炒研用。

白芍藥大能斂血。歸窩成漿有力。世人罕能用之。予特表揚其功效。亦以見久吾聶氏訂方之深意。毒火盛酒洗生用。虛寒酒炒用。　厚朴。薑汁炒用。

黑附子一兩重。或一兩二錢重爲止。切作四片用。童子小便。入甘草三錢。水三碗。煮兩個時辰取出。埋於土內。一晝夜去其猛烈之毒。取出應用。　麥芽炒用。

乾薑切成片炒黑用。　牛蒡子炒香研末用。

人參去蘆用。若不去蘆。令人作乾嘔。　連翹去心用。

黃芩酒炒用。若孕婦出痘。必用條芩酒炒用。

梔子仁酒炒用。　黃栢酒炒用。　花粉酒拌蒸用。

麥門冬。　天門冬俱去心用。　蟬蛻去頭足用。

地骨用皮。　滑石搗末用。　木通去皮用。

當歸酒洗用。倘滑瀉則以陳東壁土拌炒用。如泄瀉不止。去當歸不用。　歸頭生血。歸身養血。歸尾破血。

南山查去核用。　北山查性寒。不堪入藥。

大黃酒蒸三五次。晒三五次。應用必要蒸透過心黑如墨者更佳。　白附子磨熟水服。　枳殼麥麩炒用。

穿山甲前足中片止炒焦研末用。蓋取前足穵土有力攻鑿。亦取穵痘攻毒之意。　皂刺炙刺尖有力。

車前子炒用。不炒不可入藥。　白龍骨煅過用。

福元補心虛寒用。作引相宜。　公丁香切碎用。

赤石脂火煅七次用。　五味子搥碎用。

酸棗仁炒熟研末用。　山藥炒用。　白礬炒用。

福建蓮肉去心用。他處所產功力不及。

生薑作引。能和胃氣。若嘔吐煨熟用。　燈心清火。

紅棗走表。初用作引。　紅花酒洗用。

酒能活血。長漿時用。其作引導藥味直達氣血之中。

神麯炒用。　川黃連酒炒。若毒火作嘔。薑汁拌炒用。

至於麻疹用引。與痘不同。

淡竹葉清火解毒。　煅石膏清胃火除煩

芫荽能走表透疹。　西河柳性効相同。　燈心清火。生犀角磨水和藥服。能解時令毒火清心膈煩燥內熱。

## 痘後痢疾論

痢疾而言於痘後。乃痘後之變症也。若夫麻疹之後。[illegible]毒注入大腸。百之中常見二三下痢者。久吾聶氏[illegible]痳疹方內立有清毒導滯湯以下之。予曾經見此[illegible]卽用此方一劑以推蕩之。立見裏急後重。卽除血

痢即止。獨痘後痢症。久吾聶氏。並無隻字道及。考之前哲著書立說。亦無言及。於此。意者天地氣化陰陽變幻。隨時更改。因地發生。上古所未有而漢時有之者。痘與疹也。若夫疹後痢疾。由熱毒注入大腸。前哲方論。俱未言及。而久吾聶氏。於活幼心法。立有清熱導滯湯以下之。大約前此疹後之痢症亦少。而久吾始經見之。若痘後之痢症。前此或無。予生平所經見。僅有三症焉。有一赤痢。有一紅白相兼之痢。二者俱活。有一純乎白痢。裡急後重。時刻要大便。所便不多。其便之白痢。如魚凍。不過兩三滴。未逾半刻。又要大

便。晝夜無度。飲食不思。精神疲倦。元氣之虛寒甚矣。脾胃之真上敗矣。初瀉之清之。而裏急後重不除。繼補之溫之。而胃氣不復。變斯症五日。終不可救已。

加減清熱導滯湯（治痘後痢疾）

當歸（七分不用尾）　白芍（五分生）　檳榔（五分）　厚朴（五分薑汁炒）

陳皮（八分）　枳殼（五分麩炒）　連翹（三分去心）　黃芩（二分酒炒）

黃連（一分酒炒）　山查肉（七分）　廣木香（二分）

牛蒡子（三分炒研）　甘草（二分去皮生）　可加熟大黃（酒蒸七分）

生薑三片。作引。　或赤痢。或紅白相兼。可加紅花三分炒。桃仁五分。地榆五分

若白痢。再加陳皮二分。芩連俱不用。

補氣養胃和中湯

白朮（一錢土炒）　人參（二分去蘆）　白茯苓（八分）　陳皮（八分）

砂仁（五分炒研）　藊荳（八分炒研）　廣木香（三分研末）　山藥（八分）

建蓮（八分去心）　甘草（三分炙去皮）　若腹痛。加白芍。（五分酒炒）

煨薑三片。陳老米三錢。作引。

白痢。屬氣分。紅痢。屬血分。疹後熱毒甚。寒涼之藥。用之得當。若痘後。必要固元氣。總以胃強。能食。可治。

似痢非痢論

痢之爲症。險惡異常。若不辨別明白。用藥多有錯悞。如有痘後便膿血。腹中間或作痛。但不作裏急後重。以此迥異。如所便之膿血。或以清水試之。攪動浮有痘痂樣。此因腸胃有痘。收結滑下。此亦無妨。可用大連翹飲以清解之。此症肚腹不痛。爲不同耳

若痘後腸胃發癰。先必作腹痛。癰熱內潰。所便膿血。兼有。方知是癰內破。膿血注下。不過二三日。腹痛自止。仍用大連翹飲以清解之。一劑。即止。不可多服。切不可用大黃下行之藥。痘毒既破。固元氣。要緊。慎之

嗔之

## 神黃荳論

近有自雲南歸者。帶有神黃荳。彼云此荳。得於苗猓之深山峻嶺。彼苗猓服之。終身不出痘。如遇出痘。如不能長漿。以此痘二粒。一生一煨熟研碎。用人乳一五匙酒三五匙和服。立刻長漿。予在都門時試之驗

## 桑虫論

桑之桑椹。以及桑葉桑枝桑根白皮。俱皆入藥。且有桑上寄生。又稱上品。而桑中之蛀虫。食桑之木。故

桑之津液。豈不可以助痘之長漿成漿者乎。然揆之於理。似大有効驗。考之於行漿之時。順症以二三條。入於磁鍾內研爛。又加熱水白酒三五匙調服。果然行漿。若遇險症。不能行漿。即再服亦不能行漿。險症既不能取効。逆症又豈能奏功乎。以此觀之。桑虫亦屬無用之物。至於京都傳聞桑虫大能補助痘漿。及至出痘長漿之時。醫者曰桑虫好。患痘之家以兒女爲重。急令家人。尋覔桑虫。或挾銀急爲搆買。若得眞桑木內者。猶可。曰桑虫。彼乃向劈柴局內。凡得自虫以鋸末養之。以爲奇貨可居。及有人買。則可要幾錢幾兩一條。若不如數。彼必不賣矣。買桑虫者。主人之命。要桑虫者。醫者之方。出於醫者之口也。差去買者。無可奈何。只得重價買來。應用。毫無効驗。且桑虫必於桑樹內取來。猶可言眞。若於劈柴局內。則凡雜木之有虫。皆可混入桑虫名色。且又得其重價。不幾令此薄惡之徒。開一趂錢大法門乎。予故筆之於此。以告同志。

## 地龍論

地龍者。蚯蚓之別名也。曾見有延門乞飯之男女。夜宿神廟。及有兒女出痘。至長漿之時。彼乃空土石之

下。或土屑之間。得紅色小蚯蚓。取三五條。以瓦礶入清水二鍾。煎一鍾。陸續飲之。次日亦如前法。又次日亦同前。後竟足漿。及有險症。亦無効驗。揆想順症不藥亦能足漿。彼之用之於順症者。以爲是丘蚓之効。殊不知丘蚓亦不能長漿。足漿亦筆之於此。以告同志。

## 人牙論

人牙燒存性。研爲末。服之。可起陷下之痘。此不經之談。列於方書。可見世人之不明理者。至於此耶。

## 人糞論

無病小兒之糞。取來以陰陽瓦覆蓋之。擱於炭火上。仍用炭火上蓋之。令其上下有火煆。其烟盡爲度。取出去火氣。長漿之際。以清水調末五七分。亦可解毒。亦可助其長漿。用之亦無効驗。

### 人中黃論

冬至未交之前十日。以大茅竹。或二尺長。或一尺六七寸不等。必取上下有節。鑿一小孔。納甘草去皮切成片者三五兩。入於竹筒之內。用桑樹削成木釘釘上。或杉木作釘亦可。除此二木。他木不合。用長草繩紮定。入於大糞缸內。泡至冬至後十五日。取出竹筒。

愼勿啟木釘。再放於長流水內。漂洗一日。外垢淨盡。然後懸於東屋角下。有風吹日照處。俟至來春驚蟄節前後。啟釘視之。採其筒內甘草乾否。如未乾再懸於原處。俟甘草自乾。要用取出應用。此人中黃亦能解天行疫癘之氣。必於清毒活血湯內用之。方有効。若非參耆以補氣。用之亦不効。此又後學之所當知也。

### 金汁論

糞缸內之糞汁。異其名而稱爲金汁。亦能解天行疫癘之氣。如遇險逆等症。亦未見効

總之痘瘡長漿。必賴參耆。歸芍。補助。血。氣。送毒。出外。運化成漿。豈區區人牙人糞人中黃金汁等所能專於解毒。而使陷者起。發倒靨者灌漿。此理之必不能者也。然方書備載。予不得已而詳辨之。業幼科者當以此再質諸高明。

### 附痘與疹避忌

#### 避穢氣

腋下狐臭氣。　房中淫液氣。　行遠勞汗氣。
溝糞濁惡氣。　婦人經候氣。　諸瘡腥臭氣。
硫磺蚊烟氣。　誤燒頭髮氣。　吹滅燈燭氣。
柴烟魚骨氣。　葱蒜韭薤氣。　煎炒油烟氣。

醉酒葷腥氣。　麝香燥臊氣。

#### 守禁忌

生人往來。　詈罵呼怒。　對梳頭。　對搔癢。
勿掃地。　勿對荒言。　勿使僧道師巫入房。
勿對飲食謌樂。
以上者避忌

## 痘疹定論卷之四目錄　　四集

痲疹
命門包裹陰陽五行論
正疹分別論
四方疹名各別
出疹之家四忌
看疹醫家三忌
豫爲隄防論
初發熱欲出未出時用治法
已現形一二日內用治法
已出面紅腫太甚用治法
疹出四五日同時并疹後各症用治法
附小兒臍風論
小兒相法

---

## 痘疹定論卷之四　　四集

太醫院御醫豫章朱純嘏編輯

### 痲疹

### 命門包裹陰陽五行論

易曰。大哉乾元。萬物資始。又曰。至哉坤元。萬物資生。資始者氣之始也。資生者形之始也。萬物者合天地中之物而統言之也。即以人言之。亦天地中之一物也。但人爲萬物之靈。得天地陰陽五行之正氣以生成。因以得其所賦之理。以爲健順五常之德。人雖天地中之一物。而不與萬物同其形。而同其性也。故三才之道。合天地人而並言之也。人之有生。受氣於父。成形於母。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。在胎之中。先有命門。則父精母血之毒。藏於命門。真且確矣。外形則先長鼻。內如五臟六腑。外如百骸九竅。俱從逐日逐月漸次生長。惟命門凝成於有形之初。則胎毒亦蘊畜於有形之始。命門人身之太極也。陰陽五行包裹於命門之中。痘與疹胎毒之陰陽也。胎毒藏於命門。無聲臭之可覓。必俟外感痘之氣。發出而爲痘。外感疹之氣。發出而爲疹。何世人不推本求源。而乃隨聲附和。曰痘出五臟。疹出六腑。歷今千

百餘年。誰辨其非。予不得已特表而出之。曰痘與疹。俱出命門。或曰。痘出五臟。疹出六腑。前人著書立說。極其詳悉。歷今千有餘年。無有議其非者。今予一旦遽云痘與疹。俱出命門。豈不好奇涉怪。借此至微至隱之形。指此至精至密之理。無可端倪之臟腑。莫可測度之命門。而言前此之非。是不亦私相悖謬乎。誠恐今之議昔。烏知後人之不議今乎。予應之曰。天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其物雖有定名。有定理。而知之有不盡也。予所云疹與痘。俱出於命門。非無徵而敢云然也。夫未出痘之先。疹出多次。俱不

作正疹之數。必俟大痘既出之後。或隔一兩月。或隔半年一年。或三五七年之久。遇正疹之時氣。感而發之。一出則不復出矣。予所以知胎毒藏於命門。發出而為疹為痘也。或又問曰。予言胎毒藏於命門。言之固深切著明也。當出痘之時。胎毒固發出而為痘。何不並發出而為疹乎。必待隔一兩月或半年一年之久。而始出疹。是胎毒在命門之中。止隨痘之氣而出痘。不隨痘之氣而出疹乎。予曰。正在此分陰陽五行也。天以陰陽五行。隨時變化。痘疹生焉。人居氣化之中。感痘氣而出痘。感疹氣而出疹。一定不易之理。次

無痘與疹同出之事。或又問曰。予著定論。前言痘有夾疹而出者。今言痘與疹不同出。何前後之紕繆若是乎。予言痘至回水結痂之際。復又身熱。遍身上下通紅。名蓋痘疹。又名解毒疹。今言出痘之後。必俟隔一兩月。或隔半年一年。三五七年之久。遇正疹之時。氣。感而發之。一出則不復出。是此回水結痂之際。所出之疹。作不得正疹乎。予曰。痘有夾疹之症。當痘出之際。發熱蒸蒸。脾肺兩家風熱。亦隨之而出現。故不甚關利害。止用黑參升麻湯。一劑而疹自消散。痘出亦輕。若夫回水結痂之際。復又發熱。遍身上下通紅。

細看痘粒。膿漿充足。此乃蓋痘解毒之疹也。曰蓋痘者。痘之上蓋一層疹也。曰解毒者。此疹一出。可以解痘後之毒也。宜用大連翹飲。加煆石膏一錢。花粉一錢。淡竹葉一錢。以清解其餘熱。此等症。俟蓋因灌漿之時。痘必稠密。極力用藥催漿。過於補劑。熱滯脾肺。故出是疹。予歷年久。見症多。透徹造化之機緘。究竟精微之奧妙。不敢私之家傳。用以公之於同志者。

## 正疹分別論

痘瘡形如荳。麻疹形如麻。皆象其形而名之也。昔人皆曰。胎毒。言之誠。是蓋以出一次。則不復出。其為胎

毒可知然又曰痘出五臟疹出六腑以訛傳訛誰知有命門予於痘瘡論中言之極其詳矣夫所謂胎毒者人於胚胎之初受氣於父成形於母是父精母血之毒已凝聚於陽施陰受之始豈待成胎之後慾火不節厚味不忌降生之頃嚥其血而後有是毒也若以胎毒言之不論富貴貧賤人人俱有然於中有輕清重濁之分是以出疹有順險逆三等之別推其因由天地有非常之氣陰陽鼓舞卽有非常之令鼻聞其氣傳入於肺肺復傳於各臟漸次傳入命門夫然後五臟之邪氣內侵命門之胎毒外透正疹從此而發矣疹發而熱毒之氣上蒸於肺肺主皮毛實受其毒發熱之初雖似傷寒而肺家見症獨多欬嗽噴嚏鼻流清涕眼胞腫眼淚汪溢面腫腮赤口乾唇焦此所謂正疹由於胎毒者是也身有微汗滋滋潤潤氣不甚粗身不焦熱則疹出必輕若氣喘鼻乾更又鼻掀作嘔吐驚搐狂躁無汗者最重

凡疹初未見標之時先必身熱頭疼咳嗽或作吐作瀉或鼻塞鼻流清涕噴嚏眼胞腫腮赤煩躁不寧細看兩耳根下頸項連耳之間以及背脊之下至腰間必有三五紅點此乃疹之報標若無紅點之證佐當以別症論此屢試屢驗者也如果有紅點與前証相同宜用宣毒發表湯加芫荽作引以托之出外不必拘泥吐瀉疹出而吐瀉自止蓋熱蒸胃則吐熱衝大腸則瀉此乃疹之常候不必憂其吐瀉之不止也昔人云疹出六腑或因有此症而云然也統而言之胎毒藏於命門體也五臟用也六腑又五臟之用也相須而生成也

凡出疹見標之後形似麻粒大粒而尖稀疎磊落再後成片紅色滋潤者順若神清氣爽者更順若初出一時湧出不分顆粒深紫色者險黑色者逆不可視爲泛常不可用藥失序不可過用攻表不可驟用寒涼調治之法避風忌葷兼忌穢污惟在用藥宣發其毒以盡出之於外雖紅腫之甚狀如漆瘡亦不足慮以其出之於外卽可免夫內攻此症若調治得法用藥合宜百不失一若調治失宜則殺人亦如反掌可不慎哉

初發熱時必當發表見標之後發表而兼清涼通身上下通紅總成一片手足之末上下相同無有空處此爲出透可用清涼解毒之劑不必兼用發表之藥一解卽愈

有一種疹初出眼胞腫。白夾赤色。聲啞。唇腫掀番。鼻乾鼻又掀。氣喘。口燥作渴。腰疼。腹脹。人事昏沉。口鼻出血。煩亂狂叫。二便出血。此係毒氣鬱遏於內。名曰閉症。最爲難治。用宣毒發表湯。內加酒炒黃芩七分。麻黃五分。若能托。疹標出。外漸次出現。或可望生。若不出現。則無望矣。但凡疹症。鼻出血者毒重。口出血者毒尤重。二便出血者毒更重。且又危矣。初起手足心如火。熱者毒重。初起脚冷如冰者毒更重。

若初見疹標。尚未出透。失於清解。悞用辛熱之劑。以致毒蘊於胃。口鼻出氣腥臭。必生牙疳。宜用化毒清

表湯加石膏二錢。若已出透。速收速散。身熱不退。餘毒流注大腸。裏急後重。紅白相兼。已成痢症。宜用清熱導滯湯。

若其人素稟虛弱。當出疹之際。過於發散。出透之後。過用寒凉解毒。以致虛弱之極。骨瘦神疲。面無紅色。且又不能多食。食多即吐。急用香砂六君子湯去半夏。加麥冬以補之。種種壞症。不可不慎。

疹之出也。出三日而始盡。每日出二次。子時出者巳時散。午時出者亥時散。經三日而出六次。出透稠密無縫。方爲吉兆。昔人有云。痘喜稀疏。疹宜稠密。雖如漆瘡通紅一片。亦不足慮

若夫甫生一月及至半歲一歲之間。時值天氣炎熱。或出奶疹痧疹風癮等疹。不在正疹之列。亦不由於胎毒而致。可以不必用藥。其疹自散。此類感風熱而出。及皮膚小疾。常見出一次又出一次。及有連出不已者。無關利害。倘要用藥。微用疏風清熱之劑一服即愈。

凡出疹。發熱三日。見標者爲順。遲至五六日不見標者爲逆。神氣清爽者爲順。昏沉者爲逆。病家知禁忌者。逆可以變順。不知禁忌者。順亦變逆。業幼科者當熟思之。當於出疹之家明言之。亦可見仁人君子。救

人之心。防於未然。無所不至。毋以此言爲迂。

### 四方疹名各别

京師內外呼爲溫疹。河南呼爲粰瘡。山陝二西。呼爲糠瘡。山左呼爲疹子。江浙呼爲痧疹。湖廣與江西呼爲痳疹。又呼爲艄子。福建與兩廣雲貴四川。俱呼爲疹子。四方之方語不同。其實皆正疹也。調治之法。俱同。避忌之說。無二。

### 出疹之家有四大忌

一忌葷腥煎炒

疹初出時。以至出淨之日。俱忌食葷腥。卽素菜亦忌煎炒。恐葷腥煎炒。能助胃火。昔人有云。葷痘素疹。誠哉是言也。

一忌恣食生冷飲粥

疹初出時。以至出透之日。未免口渴煩躁。想飲冷水。不妨少飲些。須以解其煩渴。然不可多飲。若欲再飲。仍飲些。須若土產有荸薺。及有秋梨甜者。并柹餅有霜者。不妨間與食之。雖生喫無妨。切不可與粥及米湯。糕餅。糖飴。麵食。枝圓。蜜餞之類。食之恐助毒火。倘或餓極。煮成粥。用滚白水半大鍾。著

飯粕小半鍾。和勻溫服。

三忌風寒

當出疹之時。必宜謹避風寒。若不避。忌風寒外束。疹卽收。囬尋其再出甚爲難矣。愼之愼之。

四忌房幃厭穢

入之生兒育女。當出疹之時。各宜小心謹愼。潔淨內外。勿使穢污氣息觸犯。出疹男女愼之。

看疹醫家有三大忌

一忌驟用寒凉

當疹初出之時。雖有身熱煩躁。口渴等症。卽以宣毒發表湯。少加酒炒黃芩三五分。以清之。切不可遽投黃連。黃柏。梔仁等大寒之藥。恐氷其毒而內伏。疹不得外出矣。後雖設法宣表。而疹終不得出。可不畏哉。

二忌誤用辛熱

疹初出時。或有嘔吐之症。醫家必用蒼术平胃。丁香炒仁暖胃。或手足稍冷。必用桂枝肉桂溫其手足。殊不知作嘔吐者。火熱蒸於胃也。今反以辛溫之味攻之。是抱薪而救火。至於手足稍作冷者。熱極似寒之象。俟疹出透。而手足自溫和。醫不明此。

反以桂枝可達四肢之末。肉桂可以溫經囬陽。誤之又誤。陷人性命。可不畏哉。

三忌兼用補澁

疹初出時。多有瀉而不止者。其毒火亦因瀉而減。此殊無妨。倘或泄瀉過甚。則用加味四苓散。一服立愈。方見痘門。切不可用参术訶蔻補澁之劑。以圖速止。醫家全不細心參酌。乃曰吾於清解藥中。兼用些参术訶蔻。分兩又少。何碍於事。一服不見立效。且曰分兩輕之故耳。於是多加分兩。再服。而疹忽變症矣。重則腹脹喘滿。而不可救。輕則變爲

休息痢纏綿不已也可不愼乎

若痲疹出淨之後瀉黃紅色乃内有伏熱仍宜用加味四苓散服之可也兼用補澁且不可專用補澁又可乎記之愼之

## 豫爲隄防論

凡隣家有出痘與疹者出得氣候清正又有明醫在近調理可以聽其自然俟其自出若氣候不正急宜搬移避之俟兩三月氣候清正再歸古之人有避之而不出者多矣或曰孤村山野可以避患若大鄉村大鎭市及府縣省會烏可以避之乎予曰所謂避者

避其不正之氣也有三里五里之隔不正之氣即不相侵豈必數十里之外乎若痘可種用老成明醫揀上好痘痂乘時種之以引導胎毒出外只二十日而收成功若痲疹無痂可種原以氣候相傳總以氣候之清正者爲足恃否則避之爲吉

初發熱欲出未出時宜用宣毒發表湯（今製方定君臣佐使分兩）

（以半歲男女爲式看其年之大小加減）

升麻三分　乾葛八分　防風六分　桔梗六分

薄荷三分　前胡一錢　連翹（六分去心）　枳殼（五分麩炒）

荆芥（六分用穗）　牛蒡子六分　木通（七分去皮）　甘草（三分生去皮）

淡竹葉一錢同煎服

天氣大熱加酒炒黃芩五分天氣嚴寒加麻黃二分或三分

歌曰　宣毒發表升葛前　荆防枳桔薄牛連
　　　木通竹葉隨甘草　寒熱麻芩著意權

痲疹已出而紅腫太甚宜用化毒清表湯

化毒清表湯

前胡七分　乾葛七分　知母七分　連翹（七分去心）

黑參一錢　桔梗七分　黃連（三分酒炒）　黃芩（五分酒炒）

薄荷五分　梔仁（三分炒黑）　木通八分　防風（三分去之亦可）

牛蒡子（七分炒研）　天花粉八分　地骨皮八分

甘草（三分生去皮）

淡竹葉一錢燈心五十寸爲引可將生犀角用三分同煎服

口渴加麥門冬一錢去心煅石膏一錢五分

大便秘澁加酒炒七分

歌曰　化毒清表葛參蒡　天地翹連草桔防
　　　梔芩通母前荷麥　便秘加膏及大黃

疹已出透身熱未全退毒氣流注而成痢者宜用清

熱導滯湯（此方妙在連翹牛蒡以解疹毒）
黃連（五分酒炒）　黄芩（七分酒炒）　白芍（七分生）　枳殼（七分麩炒）
青皮（三分）　山查（一錢去核）　檳榔（五分）　厚朴（七分薑汁炒）
當歸（一錢）　陳皮（七分）　連翹（八分去心）　甘草（二分去皮）生
牛蒡子（八分炒研）
淡竹葉一錢。燈心五十寸爲引。可將生犀角末。
用三分同煎服。
紅多加紅花三分。地榆五分。桃仁五分。炒去皮
尖。秘濇甚者。裏急後重之極。加酒炒大黃八分。

歌　清熱導滯歸芍朴　芩連查草青陳殼
曰　地榆牛子翹檳紅　秘濇蒸黃須急著。

以上三方。俱遵久吾聶氏手定。不敢僭踰更改。但其中變化。相時看症。或加減一二味藥。又或斟酌分兩。或稍加減一二分。投之卽得心應手。

內廷訂方。藥以十三位爲式。可少。決不可多。如滿十三味。則將淡竹葉煆石膏入於藥引之內。更覺妥當。予每看疹。看其症候。相其時日。聞氣聽聲。觀形察色。然後參之以脈。始用宣毒發表湯。表之繼以化毒清表湯清之。總遵此二方。加減逐日變化。未透則前葛荆防爲必用之藥。旣透則前葛荆防爲可去之劑。氣

---

喘除升麻不用。便秘蒸大黃必需。疹色乾焦。生地歸尾要用。若還紫黑。紅花紫草宜添。欬嗽氣急。清肺飲能除肺熱。口瘡口臭。敗毒散。清胃利咽。成方在此。活法由人。麻疹已出透。用生犀角。磨井水。和藥同服。大能解毒。

一疹後欬嗽氣粗。宜用清肺飲。
桑白皮（五分蜜炒）　地骨皮（五分）　麥門冬（一錢五分去心）
柴胡（六分）　黑參（八分）　桔梗（七分）　陳皮（三分）
黃芩（七分酒炒）　石膏（一錢煆研）　花粉（八分）　生地（一錢）
木通（七分去皮）　甘草（三分去皮）生

燈心淡竹葉爲引。煎出再磨羚羊角汁。和藥同服。
如肺熱極。去陳皮。加丹皮五分。連翹六分。去心。牛蒡子六分。炒研。

歌曰
疹後欬嗽用清肺　麥冬地骨桑皮是
甘桔黑參花粉芩　柴陳生地通膏治
肺家熱極換丹皮　添上翹牛陳可去

一疹後口臭口瘡。唇爛兼以咽喉疼痛。宜用敗毒散。
生地（一錢五分）　丹皮（七分）　柴胡（七分）　桔梗（八分）
薄荷（五分）　連翹（八分）　牛蒡子（八分炒研）　黃柏（五分）

（蜜水炒）花粉（八分）黃芩（七分酒炒）黑參（八分）赤芍（五分）金銀花（八分）甘草（三分生去皮）

引加煆石膏一錢。淡竹葉一錢。燈心五十寸。同煎。再用生犀角磨汁和藥同服。

歌曰

疹後口瘡喉作痛　柴參芩柏翹牛用
金銀甘桔粉丹皮　赤芍薄荷生地種
犀角銹來入藥煎。散稱敗毒膏竹重

以上清肺飲。敗毒散。二方。予每調治出疹。因時設法。想理度情。用之輙有效驗。敢以鄙見續於久吾聶氏之後。

茲有江寧周雨郇。諱京。世之厚道長者也。重刻久吾聶氏活幼心法一書。一字未改。仍存聶氏之名。使天下後世。知聶氏之訂方立論。不偏不雜。亦足徵雨郇重刻是書。可師可則也。雨郇又於正疹之內。取孟介石數方。編入聶氏方後。且又分別用法。足見雨郇婆心。因聶氏止訂三方。疑爲太簡。故引孟介石諸方。擴而充之。有資於世。予不敢盡爲删削。今定論既成。并附其方於後。聽同志者自採擇焉。

一疹已現形一二日。宜用解毒快斑湯。（藥味俱照孟氏本方但分兩之多少俱予予定不致過與不及）

連翹（七分去心）牛蒡子（七分炒研）荊芥（七分用穗）防風（七分）生地（八分）山查肉（八分）蟬蛻（七隻去頭足）黃芩（六分）桔梗（七分）紫草茸（六分）川芎（四分）乾葛（一錢）當歸尾（七分）生甘草（三分去皮）

引加西河柳五分。同煎服。再用生犀角磨汁和藥同服更好（此方可用）

歌曰

解毒快斑疹現形　葛根紫草桔蟬芩
翹芎生地查歸尾　荊芥防牛亦有名

一疹出四五六日。回時尚有餘毒。留於肺胃。欬嗽氣粗。外熱不退。宜用清肺飲（此方可用）

石膏（一錢五分煆）生地（一錢五分）柴胡（一錢）麥冬（二錢去心）玄參（一錢）桔梗（七分）陳皮（六分）殭蠶（五條炒）黃芩（七分炒）歸尾（七分）知母（七分炒）甘草（三分生去皮）

引加淡竹葉七分。燈心五十寸。同煎服。

歌曰

清肺飲麥石膏知　生地參芩竹桔施
甘草柴胡陳橘其。殭蠶白水用當歸

疹後面色清白。唇淡氣弱。宜用調元健脾保肺湯。（方採之於亦可用）

白苓（八分）人參（三分去蘆）黃耆（七分蜜炙）丹皮（五分）白芍（七分酒炒）沙參（一錢）陳皮（七分）當歸（六分去尾）

百合一錢　薏米（二錢炒）　麥冬（一錢去心）　甘草（二分炙）

引加建蓮肉七個去心同煎服。

如大便不實。泄瀉白色。可加廣木香三分土炒。

白术五分煨熟。柯子肉二分。

如泄瀉黃色。加酒炒黃芩五分。車前子五分。

一疹後口瘡牙疳等症。宜用清胃敗毒湯。（此方不敢遽以爲是）

殭蠶（五條炒）　丹皮七分　生地（一錢五分）　桑皮（一錢）

沙參一錢　白苓一錢　金銀花二錢　黃栢（七分）

連翹七分　甘草（三分生去皮）　如體虛加白芍（七分土炒）

他如別方無濟於用者。稍爲刪去。恐亂人視聽

今將有可用者。仍錄於後以便採擇。

口瘡牙疳搽藥

救苦散

人中白（五錢火煅過）　寒水石（三錢井水飛過）　青黛（五分要靛花）

白殭蠶（一錢五分炒）　川黃栢（一錢五分取細末）　氷片（一錢五分）

（取細末）　眞牛黃二分

右藥七味。按法炮製。另研爲極細末。然後和勻。

以苦茶拭淨患處。搽上此散。搽三五次少愈。搽

十數次全愈。

此救苦散亦頗有驗。倘或成走馬牙疳。將必穿

腮漏頰爛鼻落牙。必要請高明口齒科。設法救

治誠恐此散未必能奏全功也。

一出疹咽喉腫痛。不拘初起回時。皆可吹之。宜用二

聖散。

苦參三錢　白殭蠶二錢

共爲細末吹入。不過三兩次。即痛止腫消。

一疹後欬嗽氣喘。唇焦結熱在內。煩躁不安。或口鼻

出血。不拘前後。俱宜服犀角解毒化痰清火丸。

犀角解毒化痰清火丸

生犀角（鎊一兩研成末盃不用）　當歸尾八錢　牛蒡子（五錢

炒）　牡丹皮一兩　連翹（一兩去心）　赤芍六錢　川

貝母（一兩去心）　生地黃二兩　花粉一兩　薄荷（一兩）

紫草茸一兩　甘草梢一兩　黃連三錢

以上各味。按法炮製。俱研爲細末。煉蜜成丸。如

彈子大。每服一丸。淡竹葉湯化下。

一疹後失調。體瘦氣弱。且又泄瀉。將成疳疾。宜用健

脾肥兒丸。

人參（五錢去蘆）　黃耆（一兩蜜炙）　神麯（二兩炒）　山查（二兩去核）

藊荳（一兩炒去皮）　黃連（三錢酒炒）　白术（一兩淘米水浸炒）　白

芍（六錢酒炒）　橘紅五錢　當歸（八錢不用尾）　陳皮五錢

山藥（炒）一兩　地骨皮（炒）六錢　白茯苓（炒）一兩　百合八錢　甘草五錢

以上各味。按法炮製。俱研爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。老米湯化下。（凡蜜丸俱忌食葱）

一疹後咳嗽不止、內熱不清。心神不寧。夜卧不安。或生瘡疥、宜用天真膏、

生地四兩　麥冬（去心）四兩　白茯苓二兩　黑參四兩　知母（炒）三兩　棗仁（炒）二兩　沙參四兩　茯神二兩　黃耆（生）四兩　當歸身二兩　牡丹皮二兩　薏米（生）四兩　紫菀二兩　橘紅二兩　白朮（炒）四兩

桑皮三兩

以上各味。按法炮製。入於砂鍋內。用長流水幾多。隨乾隨添。用桑柴文武火煮。兩個時辰、去渣澄清、復入砂鍋內。再熬用蜂蜜收成膏。另盛淨磁器內、每服三五匙。滾白水調服。

一初起發熱。未見外證、或連熱三四日、始見疹標。不甚煩躁、或係嫺疹、癮疹、風熱客於脾肺二家所致、用荆防發表湯、（此藥大能疏風清熱）

荆芥（五分用穗）　防風五分　乾葛八分　紅花二分
桔梗五分　枳殼（麩炒）五分　蘸葉五分　川芎五分

當歸五分　陳皮三分　杏仁（七分炒去皮尖）　山查一錢（去核）　甘草（三分生去皮）

可去陳皮加牛蒡子七分。連翹五分去心。夏月天氣炎熱、可加酒炒黃芩五分、冬天嚴寒。可加麻黃三分、或用羌活五分、如小便黃澁、可加木通七分去皮。

按此方經予手加減可用

一當出疹之時、發熱三四日、已現疹標。但出得艱難、不能依期出透、或因冬月嚴寒、風寒外束、急宜用砂鍋、注潔淨清水、炭火煨滾、著芫荽帶根共四五兩、熬

熟。送進房內。令馨香之氣。透達上下。自然疹易得出。切不可用湯大洗大浴、恐風寒外襲、更生變症、

一疹後患目生翳。眼赤紅腫、眼皮爛、宜用加減清毒撥翳湯、（方自聶氏痘門摘來）

生地（一錢五分）　甘菊七分　歸尾八分　川芎六分
柴胡八分　紅花五分　草决明（一錢研）　木賊五分
白蒺藜（一錢炒研）　黃芩（七分酒炒）　牛蒡子（七分炒研）　連翹（七分去心）　生甘草（二分去皮）

不用引、可隨症加減屢試屢驗

一出疹之後。面色青白、骨瘦如柴。皆因元氣素弱、或

飲食失調以致食物不化倦怠愛睡眼懶睜開羞光怕日似害非害此乃陰陽兩虛肝脾受病宜用前健脾肥兒丸或服八珍湯及六味地黃丸庶可漸愈如清熱疎風等藥不可妄投不特疹後應如此施治凡小兒病後失調亦當如此調理倘大便泄瀉補中益氣湯夜臥不安歸脾湯皆對症藥也

西河柳又名觀音柳乃透麻疹之聖藥也冬月用枝梗春夏秋用枝葉若在窮鄉僻壤醫藥不便可用一錢煎湯服之疹即出現

秀菜又名芫荽亦透麻疹之聖藥也生取來連根帶

葉搗爛約有三錢入於磁碗內用滚白水半鍾滚白水酒半鍾同入碗內炮少頃其味自出通口服之疹出更快若無芫荽苗葉其子研碎服之亦可屢試屢驗其中再加白芝蔴同研服更妙窮鄉僻壤用此可當明醫

冬笋尖南醫用以催痘長漿北醫習而不察俱於痘長漿時用作藥引殊不知冬笋不上林之笋也至春二三月自死於土中冬月入鋤取之以爲美饌適口果美今南人又不察物理更於表疹藥中又用笋尖作引可笑之極若春笋雖生長上林在疹門亦不可用恐其氣味傷泄元氣冬笋乃死氣隨之安可用乎

孟介石施藥治疹方

石膏二兩（煆）　紅花三錢　桔梗八錢　荊芥（八錢用穗）

乾葛一兩　川貝母（四錢去心）　地骨皮八錢　赤芍五錢

當歸尾一兩　牛蒡子五錢　薄荷五錢　陳皮五錢

桑皮一兩　枳殼（六錢麩炒）　甘草（四錢去皮生）

依予見可加前胡一兩防風八錢酒炒黃芩八錢連翹五錢去心去桑皮不用

以上各味共爲細末每服三錢或五錢用白水二鍾煎湯一鍾濾去渣溫服

此方不論疹之初出以及出透俱可用但醫之懶於人事者甚覺其便若遠方求藥之人不知疹之症候日期以此與之亦無大碍若在附近出疹之男女必宜遵久吾聶氏用藥之次第方與症合

## 分別各疹各樣調治定論

凡小兒乳疹以及癮疹痧疹風熱等疹不在正疹之列亦不由於胎毒此類感風熱而出乃皮膚小疾常見出一次又出一次及有連出不已者無大關利害倘身熱不退可用荊防發表湯以散之（如身不熱不必用藥）

凡正疹由於胎毒其出也必在出痘之後或隔兩三月或隔半年一年之久甚至八九年之遠感正疹之氣而出一次後再不復出矣

有所謂溫疹者感於風熱由於胎毒又值時令疫癘之氣城市傳染迅速異常調治乘張立刻變症予每臨此症俱遵久吾聶氏三方加減變化每獲奇効用是以告後學若先出過正疹再不出溫疹

## 臍風論

臍之生風歷來方書所載俱無一定之論亦無一定之方是不揣其本而求齊其末者也予於痘疹之定

論告成特著臍風論發明治病之源究竟生風之本此所謂調護於未病之先保邦於未危之日嬰孩之初生也以潔淨熱水從頭上漸次洗至脚下恐天氣寒凉時刻以熱水插上將胎垢如鼻涕樣者洗拭令淨長大皮膚潔白滋潤不長粗白厚皮脫一層又長一層冬天嚴寒裂破出血此皆洗不淨之故耳此時混沌初開不妨沐浴至洗淨之後囑託穩婆以舊衣權且包裹不要寒著然後將臍帶以手輕輕牽著又將手靠嬰孩肚皮將臍根守定次第用手指推送臍帶中之水液送出九寸之外又囑託牽臍帶之人急於九寸之上以手指定穩婆隨用捲緞定之紙或江西西山草紙捲作紙筒點灼火於臍帶九寸之內往來熏燎不妨久些一可以熏燎其水液再可以令溫煖之氣透入臍之外皮熏一次又將臍帶中之水液又推送一次送至九寸之下仍復指定如此熏燎之法推送之法三次恰好五次更好熏燎得法則臍之綿軟可知推送得法則帶之水液必淨然後約有七寸許先以綿線去臍半寸紥定然後於帶之七寸處又用棉線紥定七寸之外以翦斷其帶又用舊衣絮乃舊棉花也翦如飯碗口大中穿一孔以臍帶透於

其中盤於棉花之上外又用舊棉絮蓋之再用包緞定油紙蓋於棉絮之外更用紬帕縛之於外如此包紥不令尿濕臍之棉絮也如此沐浴不必再洗三朝也或曰予言胎垢洗之不淨長大必長粗白厚皮何不乘此三朝之內再洗極淨不爲過也且世俗有謝催生送子之神乘其神之在日洗之何妨又穩婆接生例得厚賞必藉此洗三題目便於取錢若以予之一言神不得其謝人弗獲其賞神人豈不其嫉之乎予應之曰此正是揣其本而不齊其末者也若云洗三倘在暑天稍爲近理若值霜雪嚴寒解衣就浴有

不濕棉花者乎有不受風寒者乎風寒侵其外水濕棉花侵其內寒濕交攻透入臍內肚腹因之而痛痛之緩則啼哭亦緩痛之急則啼哭亦急甚至口眼歪斜手足抽製人止知臍之生風而不知洗三之水濕包更不知包紮之不用油紙尿之濕棉花也亦不知解衣就浴之外感風寒也明醫到此誰能辨別是非病從何因風從何起不過以驅風化痰峻樂悍猛之劑攻之十不能救其一二可慨也已

凡嬰兒初生之際沐浴俱照前法洗淨洗後俱照前法熏臍一次推送臍帶之水液一次如此三五次以線紮臍俱照前法剪帶盤帶亦照前法包紮如此詳悉加之油紙隔其尿濕如此詳慎又不洗三水不浸濕棉絮臍風無由而起予所謂調護於未病之先保邪於未危之日者此也

初生嬰孩自生下之時辰算起要過十二個日子謂之小滿月此一十二日之內不發臍風在後則無臍風矣惟此逐時逐日細心體察不可視爲泛常有三日脫帶者有五日脫帶者有七日脫帶者有九日脫帶者有至十一日十三日者予當日以爲出於常格之外蓋以爲老年氣血虛弱之所致也及後又見一

家生一子至十八九日始脫臍帶詢其父母皆係少年壯盛之時此又不可拘拘於常格論也但包紮臍之處三日當解開看一次逐日再解再看其中側看之下要眼法輕揭棉絮要手法若三五七日之內蒂有脫其一半者或脫大半者尚有一二角粘連未脫其已脫之一半或一大半者勢必乾硬或有尖硬角近肉皮礙之則痛痛必啼哭人不知此必以爲臍風遂延醫調治槩以驅風化痰之藥治之殊不知非風也予曾調理此等症候揭開棉絮視之乃臍帶已脫大半尚有一小半未脫大半脫者其帶角乾硬乳母抱之喫乳悞以手按其肚臍按之必哭予想理度情非病非風揭開棉絮將新棉花約有棗大塡於臍之上帶之下令其乾硬者不礙肉皮亦不痛亦不啼哭安靜得睡此予屢試而屢驗者

凡脫臍帶之後以潔淨棉花拭乾臍中之水先用枯礬末少許納於臍窩之中隨用舊褐子衣服剪一塊燒成灰存性研末塡滿臍內再用外科貼風損膏藥剪如大錢大炙熱從外封之仍用棉花蓋於膏藥之上再用油紙隔尿仍以紬手帕縛定守過一十二日萬無一失予當日在都城內值有甫生五日嬰兒腹

痛啼哭之症。見其眼目微紅。又有眼眦粘連不開。此內熱也。隨用平肝降火快膈順氣之劑。微下一二次即安。

清熱順氣湯（用此方之後出大便二次內有黑糞一半黃糞一半自此全愈）

釣藤鈎（七分）　橘紅（五分）　柴胡（五分）　黃芩（三分）（酒炒）　黃連（一分酒炒）　熟大黃（三分）　梔仁（二分酒炒）　薄荷（三分）　山查肉（七分）　枳殼（三分麩炒）　木通（三分去皮）　甘草（一分生去皮）

燈心五十寸。金銀各一件為引。水二鍾。煎三分作五六次。徐徐温服。一劑全愈。

若以庸醫調理。不能察其外症。槩以驅風化痰猛悍之劑。以圖速効。誠恐未必効矣。予以愚之一得質諸同志。

## 小兒相法

欲知小兒壽妖。當於相法推詳。若夫富貴貧賤。善惡窮通。雖由祖父之積德累仁。有以栽培善根。而富貴通達。隨之而至。然能傳此福澤。其形容氣質。天資穎悟。必有大過人者。所謂天之報施不爽也。　聲喜清亮悠長。最忌豺狼音韻。聲如病貓不壽。又喜聲如洪鍾。氣能接續。　頭欲圓。有骨格。前天庭宜高聳。日月角宜峻峭。兩傍頭角要崢嶸。頭後枕骨。分品字偃月。　髮長宜稀而黑。髮際宜高不宜低。　五官宜正。不喜歪斜。　人中宜深。地角宜方而圓。　眉喜清秀而高。　眼喜黑白分明。視瞻平正。一身之精神全在兩目。決斷最嫌雞眼。羊眼。以及斜視。上下露白。更加昏瞭無神。俱非吉兆。　耳愛有垂。輪廓分明。　鼻喜端正豐厚。如垂膽。如截筒。　口宜濶大。切忌吊唇。　面要豐滿。大怕偏陋。　身肥胖。不喜純見乎肉。必要骨格相稱。且肥胖者。肉宜緊密。不喜如發麵模樣。色雖白。必要帶些紫黑色。　身瘦削。不喜脊骨稜嶸。必要肉勝於骨。　腎囊宜緊細。紫色。如荔枝殼者壽。寬大白色者多疾。　又有看小便之法。若小兒尿得遠。且又長。此長壽之徵也。若尿最近。乃腎氣不充。必不壽。　手腕宜長。手指宜纖。手背宜厚。　足骨宜短。足背宜厚。　肩欲平正。背脊及腰。俱喜豐滿。　臍窩宜深。　腹要下垂。　鼻梁不喜帶青色。紅黃色最吉。青色主有疾。　兩口角宜朝上。不宜平而向下。　男子八個月長門牙。女子七個月長門牙。先長下牙者吉。

凡男女能享長年。良由幼小之時。形容體格。有以基之。斷非僥倖勉強而致之者矣。

# 種痘新書序

嘗聞天無私而化生地無私而化成聖人無私而大道行於千古蓋無私者之爲利普也而技藝之中醫利更[illegible][illegible]術余友遜玉張先生少肄舉業[illegible]泮林利濟心殷痌瘝念切奈屢[illegible]試悉落孫山乃退而言曰不爲良相當爲良醫遂潛心醫術而於痘疹愈加意焉夫痘疹之發刻日限期危而且急治之如救焚拯溺非若他症可以遷延時日也況黃口嬰孩五臟未固六脈無憑雖有望聞難於切問藥固不敢猛攻症又不容緩救盤根錯節利器有時而難施惟先生獨神其術遍行州郡濟衆扶危四方咸以二天戴之余乃問先生高術何自而傳先生爲余言曰昔聶久吾先生蒞任寧陽余先祖拜其門下于痘科得其手書又兼口授襲箕裘者已三世矣予曰公家既有秘傳曷不公之于世普利羣生先生嘆曰醫書充棟惟種痘之術不傳蓋術家欲專其利故秘其術以自私也余行術數十年閱歷既深臨症亦衆痘症之險變幻多端余已斟酌萬全投劑輒應今余年將就衰欲將其術傳之天下故纘述遺篇詳加叅考且將祖父秘傳一一書之於冊竟欲付之剞劂以爲濟

世良方公益爲余序之余乃歎曰先生此舉即天地無私之心也蓋秘其術以救人救在一方不可以及天下救在一時不可以及後世此書一出而天下後世之嬰兒如類一家之父母即爲當朝良相未必父母乎天下即父母乎天下未能父母乎後世先生之功不居然良相之上先生之德不儼然與天地聖人參乎予乃欣然握管以弁其首云

筆山伍士玉琢章氏謹題

---

## 自序

今夫創千古未有之奇裁一心獨得之蘊以新岐黃之耳目者乃得謂之新若治痘之家名賢濟濟即治痘之法汗簡盈盈但墨守一室者拘管見而不能通循行故轍者泥常法而不知變率由舊章陳陳相因已耳即以舊章而論宇內方書總無種痘之說豈治痘之方則宜傳之於世而種痘之術不可向人言乎蓋秘其訣而不肯筆之于書私其技而不欲公之于世也余今乃洩人之所未洩傳人之所不傳書不云新亦何云乎或謂痘爲最險之症當天行癘疫人皆惶懼

方思遠避之不暇況集嬰孩小子捕影無端取而種之是猶無疾之人憑空而授之以病也仁者將安忍乎余曰不然痘乃先天之毒方陰陽交感之際早已植根於胎元一遇五運變遷時行疫氣之感從未有不發者若俟其既發而始圖之則疫氣流行症多不順又或付之庸手表裏虛寔之莫辨溫涼和解之不明既不能起死以回生反歸咎于天災之作孽此余所以痛心疾首不能不致嘆於消患於未萌保安于未危者其功為甚鉅也惟于無事之日以佳苗而引胎毒斷毒不橫而症自順故曰人謀能奪造化之柄哉亦趨吉免凶保安無危仁人慈幼之善術耳余祖承聶久吾先生之教種痘箕裘已經數代余讀父書遍臨痘症幾及萬人用數十年艱苦之恩日夏勤於治痘之法師古而不泥於古讀書不盡信其書辨症發藥因病制方重可使輕逆可使順危可使安雖遇不治之症亦或為之治矣但年暮力疲無復四方之志爰將生平學力悉筆於書非敢曰創千古未有之奇也特以獨得而心裁者公之于世以補慈幼之術而新岐黃之耳目云爾故題之曰種痘新書

清乾隆六年辛酉歲次仲春月穀旦
三山汀郡寧陽張　琰遜玉氏
題

---

# 種痘新書凡例

一醫宜首明藥性藥性若熟則左宜右有隨症立方因時加減百無不效故首卷必先藥性次痘症之發限日限時而藥亦有因時而用者故詳辨前後之所忌與先後生熟之所宜令學者覽之知某日當用生某日當用熟某藥忌於前某藥忌於後庶不至於有誤也

一望聞問切醫家之要缺一而不可也但痘症多出小兒既無脉之可憑且痘出則肌肉浮腫而又難于切脉況痘毒雖由臟腑症盡程于皮膚觀其外即可知其內是又不必深求乎脉也故于脉訣畧而不詳欲學者留心于望聞與問而已

一方書極備于往昔余嘗博覽各書採取奇方留心數十餘年擇其效著而存之其不效者而去之更雲遊宇內遍訪高明所得家傳秘訣悉呈于書以傳天下

一書中議論或出于一已之化裁或因乎前賢之故典蓋往昔不刊之論不敢復增一字必傳爲萬代之讀剤删不厭詳明無妨係是法度以爲學者之則此爲述爲作無非互相發明也

一書中分順險與逆順者不必治逆者不可治似祗教治乎險痘也孰知不必治者而妄治之並恐誤投藥餌症之輕者而反變重不可治者而强治之及治而立斃必致旁人之誚故

第一〇一八冊　續修四庫全書

詳而分之使學者固無忽治之弊亦免管見之譏也
一治痘要藥悉集於前令學者依方而製丸散以備緊急之用其餘治痘諸方詳載于後令學者參考擇取以博覽焉
一書中圖歌非取其文之妙辭之雅也是取其理之確議之當爲千古不磨之真訣然後彙叢而直圖至于曲盡之處亦爲緊要之言其或三而圖者或藥名或標方標症庶不孩於諸治學者切宜緊記慎勿泛泛讀過不爲模範致負余之望也
一書分仁義禮智信五部以配天地之五行

---

# 新刻張遜玉先生彙纂種痘新書目錄

## 仁部

首卷
業醫三要　藥性
二卷
十二經絡　痘疹脉法　五臟見症
指南賦　節制賦　權宜賦
金鏡賦　用藥　斷劑藥節
關藥室誤人　痘原賦　臟腑虛寒見症
臟腑實熱見症　虛症似實　實症似虛

虛症變實　實症變虛　表裏虛實寒熱
表虛調治法　表實調治法　表寒調治法
表熱調治法　裏虛調治法　裏實調治法
裏寒調治法　裏熱調治法
汗下論　氣血論
四時調治法　治痘宜審合方水土
輕症歌　重症歌　逆症歌
死症歌　七症不治　辨痘吉凶
死裏復生十症

## 義部

三卷

闢三家怨咎醫人　論痘有種　辨苗吉凶
擇苗秘訣　藏苗法　論苗有新陳舊
施苗秘訣　先觀小兒形色然後施苗秘訣
論要敬神　論宜避穢　論痘後日期
起痘法　寫神位法　起痘總訣
解厭法　解痘法　二十四頂方
備要丹散（附用法）

四卷

調理法三條　小兒進藥法　乳母服藥

入門看痘法　痘疹傷寒辨　將熟照法
痘症日期　痘症傳變　治痘總訣
初熱辨症賦　初熱三日調治法（附推拿法）
初熱三日雜症　驚搐　腹痛　嘔吐　乾嘔
吐黃水　吐清水　吐濃痰　吐臭痰
挫喉　泄瀉　閉結　泄紅　泄白
泄黑　發熱　寒熱並作　口渴　煩燥
亂語　頭痛　目閉　咳嗽　喘急
聲啞　腿痛　心胸痛　腰痛　身痛
手足搐　十指冷　足冷　手心痛　手足痛

眼出血　耳出血　大便血　小便血　口吐血
鼻衄血　諸失血　厥冷　眼露白　齧舌
中風　中痰　噯氣　不食　生疔
腹脹　二便　吐瀉蛔蟲　失瘖咬牙
初熱逆症

補部

五卷

面圖　面部圖　論部位
辨痘標不拘部位　五臟見症治法（五條）
見苗期　見點辨症賦　見點認痘法

見點三日調治法　見點要合常期
見點順症　見點險症
見點雜症（附）　驚譫　腹痛　嘔吐泄瀉
夾斑丹疹癮　夾水痘　痘疔　痘入眼
水痘　瀉痢
見點逆症

六卷

起脹辨症賦　起脹三日調治法　起脹順症
起脹險症　五陷治法
起脹雜症（附）　發熱　口渴　譫語　泄瀉

乾嘔　腹脹痰鳴　煩悶　大小便血
咳嗽　飲水　咽喉　失聲咽疳
起脹逆症

七卷

灌漿辨症賦　灌漿三日調治法
灌漿順症　灌漿險症
灌漿雜症附　發熱　作瀉　咳嗽　痘痛
作痒　吐瀉　腹痛　腫脹　消腫開目
譫語　寒戰咬牙　諸瘡出膿　咽痛
失聲　水泡　紫黑泡　流涎　不食
手足痒　筋骨疼痛　中風　攻痰　倒陷
灌漿逆症

智部

八卷

結痂辨症賦　收結三日調治法
結痂順症　結痂險症
結痂雜症附　倒靨　頭痛　咳嗽　聲啞
手足牽引　手足拘攣　手足冰冷　泄瀉
飲食　腹脹而痛　陰囊腫脹　潮熱
齒痒出血　咬牙寒戰　譫語　面唇紆裂

結痂逆症

九卷

痘後辨症賦　痘後調治法
痘後雜症附　潮熱　痘痂不落　發痒抓破
復發成瘡　唇不蓋齒　坐立戰搖
飲食倍進　諸瘡　痰涎　赤火流丹
走馬牙疳　唇口生瘡　耳病　腹痛
不食　心痛　蟲痛　手足厥冷
昏迷錯語　驚搐　咳嗽　尿血　秘結　汗
諸失血　吐蛔　瘧痢　便下膿血
餘毒痘癰　鼻衄　眼目
痘後逆症

十卷

女子出痘　孕婦出痘

十一卷

麻原賦　麻疹西江月十二首　麻症辨論
緊論治法　麻症與傷寒辨　麻症輕重
麻家四忌　麻症初熱調治法
麻症既出調治法　麻後餘症　孕婦出麻

信部

第六卷　彙集諸麻痘方　共計三百八十八方

稀痘二十一方　發表解毒十五方
驚搐十方　腹痛十方
大便秘結十九方　小便不利五方
嘔吐十一方　泄瀉七方
噎氣不食三方　喘急痰鳴聲嗽失音十五方
口乾咽痛十三方　口瘡口臭牙疳十五方
諸失血症七方　頭痛身痛腰痛癢痛九方
痘出不快七方附治痘母　發癍三方
毒氣熾紫黑乾焦三十二方　起紫黑陷二十二方
起灰白陷三十二方　通起凹陷十二方
四時不起四方　養血活血七方
治癢痒塌七方　痘爛抓破出血九方
復灌難靨五方　痘瘢難落五方
痘疔五方　餘毒二十方
手足痛強麻木三方　痢痢下膿血九方
浮腫三方　治汗二方
避穢解穢三方　眼目十二方
安胎五方　過經二方
調經二方　衄血　肥兒　收靨　虛火

# 種痘新書卷之一

汀郡寧邑張　琰逊玉氏編輯
受業曾衡汲人參

## 業醫三要

一要學變。蓋藥以治病，方隨症立，切不可膠柱鼓瑟，信其書而不泥於書，用其方而不執成方，隨機觀變，加減得宜，方爲良醫。

一要小心。蓋小兒不能言語，又無六脈可憑，其腹中之事，全在醫人觀形察色，審聲問症，細細體察，方知就裏。若心粗氣浮，一概即投，鮮不誤人。

一要輕財。醫爲仁術，當以救人爲急，而時醫偏以獲利爲先。一到人家，乘人慌亂，愈出危言，病止五分，則言八分，病纔八分，（却見咧咧嚷得暢快）則言不治。其意以爲醫之而愈，則顯其能，可以索其厚謝；醫之不愈，則卸辭責，亦不至於敗名。孰知延醫之際，爲父母者早已憂心如焚矣，而故爲恐諕於心，其何忍乎？況索利而後與藥，貧人或未應允，小兒變症易出，未幾病歸臟腑，藥力難功，豈不誤人性命哉？又有其症不必服藥，爲貪脈禮，故出一方；不宜表補之中，誤爲表補，以至輕症變重，貽禍不淺。是皆貪利所致也，學者切宜戒之。

藥性

**升麻**味甘苦氣平微寒浮而升陽也

止瀉蜜炒用　頭面多并有吐者忌

陽明經藥陽明主肌肉欲痘之出必使肌肉疏通送痘毒出方免後患故初發宜用每用五分至一錢直至出齊方止但有汗或體弱者宜減之恐表虛也七日後瀉不止者炒黑用之或痘不起者亦少用之蓋能提清氣上行也　解百毒殺精魅辟疫瘴止喉痛兼治頭痛鼻衄口瘡

**葛根**味甘氣平性輕而浮陽色白而陳久者佳

陽明經藥能解肌熱止煩渴開提胃氣與升麻同功惟虛症

莫用初熱無汗可用既汗不可復用痘出後則不敢用　止嘔吐頭痛散血痢鬱火

**前胡**味苦氣微寒　嫩者佳水洗去蘆

主心腹結氣治風寒發熱咳嗽喘滿解內外諸熱去痰涎七日內熱不退者宜兼用之斷不可缺大有升水之功

**柴胡**味苦微寒氣味俱輕陽也　去蘆用酒水炒

瀉肝火引清氣行陽道體虛不敢過表者宜用　治傷寒瘧疾寒熱往來嘔吐脇痛口苦耳聾目赤頭痛痰實結成五疳羸熱

**紫蘇**味辛甘氣溫

所以發表初熱宜用痘出即止治心腹脹滿開胃下氣

**麻黃**味辛甘氣溫氣味俱薄陽也去根節酒蜜全炒

最發散毒出汗泄衛中實去榮中寒走皮毛開孔竅多用必致表虛惟毒盛喘滿身熱煩人欲出不出者宜暫用之若有實熱險症八九日尚無漿水者可用二三錢加附子數片黃酒數分酒炒與服令出臭汗變為爛痘庶可得生欲行此法必其人能食神清發亮天庭痘有生意方可用也否則不宜

根能止汗

**羌活**味辛苦性濇散而上升陽也

瀉肝氣搜肝風散肌表八風之邪利周身骨節之痛理頭旋

目赤

**獨活**味辛苦微溫氣味輕陽也

理頸項難抒兩足脚濕散寒邪驅熱毒壯熱增寒羌獨宜用但羌氣雄其力廣故上身出不透者用羌活獨氣微而走足故下身出不透者用獨活二者俱能散痘雖不可缺然見點後宜去之

**防風**味甘辛氣溫陽也　去蘆上部用身下部用梢畏萆薢惡乾薑白蘞芫花解附子毒

搜肝風瀉肺實散頭目滯氣除上焦風邪解痘後餘症每用三四分多則損人一出不勻者用之灌膿時亦可助參芪之

凡兒手瘡不起斑白者桂枝亦用瘡大濕亦用之爲能興[illegible]
勝濕也

**荊芥**味辛氣溫　治血炒黑用
驅邪氣利咽喉清上焦火邪止血熱作痒清熱解瘀破結散
毒爲風病血病瘡家聖藥痘出不快者用之但止宜三四分
多則耗氣泄腠時不敢用

**白芷**味辛氣溫輕而揚也　惡旋覆花
散風除濕通竅表汗治頭痛牙痛止眼痒目淚瘡身熱者行
漿排膿止痛托裏生肌是攻痘漿之聖藥八九日間斷不可
缺必其漿足乃止痘後瘡毒亦宜

**桔梗**味苦辛而氣平陽中之陰也去蘆畏白芨猪肉龍膽
開提氣道善理咽喉表散寒邪能開腑臟去痰涎定喘咳爲
藥用楫載之上浮引諸藥於至高之分以成功且養血排膿
始終宜用惟嘔吐氣逆者缺之面部不起者當倍加之入肺
瀉熱咳嗽宜用　取北地者爲佳

**甘草**味甘氣平　生能解毒炙則溫中痘六日以前生用七日
以後炙用稍止莖中作痛節治腫毒諸瘡生肌氣平解胃熱
而瀉心火炙用氣溫補元氣而散表寒入和劑則補益入汗
劑則解肌入凉劑則瀉邪熱入潤劑則養陰血自始至終皆
宜惟腹脹者則當減去爲甘能緩中且不可多用多則和住

君藥而無功

**連翹**味苦氣平微寒　去心蒂
除心經血熱除脾胃濕熱散諸經血凝氣聚消腫排膿爲瘡
家解毒聖藥前後皆宜惟氣虛無毒者莫用

**牛蒡**一名大力一名鼠粘味辛苦氣平　炒用
一瘡解毒通咽喉開風痰去浮腫乃痘家聖藥前後皆宜

**蟬蛻**味酸甘氣清虛而寒
驅風除熱徹上下胎治中風失聲小兒夜啼能發痘毒但不
宜多用多則其後虛枯空殼故每用一二分則止然用在見
點二三日上灌漿時則宜慎之　治目翳與驚癇宜去翅足

若發痘瘡起倒陷則宜留翅足

**殭蠶**味辛微溫色白者佳以糯米泔浸炒乾惡桑螵蛸伏神桔
梗萆薢
主驚風痰壅昏悶失音四肢搐掣消瘰癧拔疔毒滅瘢痕能
瀉膀胱相火引清氣上朝于口瘡痘無頭者燒灰調酒服雄
蠶性淫主固精腸交接不倦　治瘡作癢亦解毒許暫用

**穿山甲**味苦氣微寒炒黃色研末調服
善追毒排膿引藥入臟腑透肌骨凡痘不起者用數分于補
劑中治倒靨者亦宜用之但元氣虛者慎之　通經絡入病
所走肝門下乳通經潰癰消腫竃甲之力更勝

**紫草**味苦氣寒

涼血活血。去血分之毒。凡痘色乾紅、或焦紫、發癍、皆宜用。但色轉即止。不可過用。加糯米亦能發痘。宜用者。涼心開竅。使痘發越而易起。不可過者。恐大便利而氣泄也。故有瀉者用煎過紫草茸。

**紅花**味辛溫

入肝經而破瘀血。入心經而生新血。行滯活血。痘瘡血熱者。宜用之。但少則養血。多則行血。過用則血行不止。又不可不愼也。

**生地黃**味甘苦氣微寒陰中陽。酒洗則上行。忌萊菔鐵器。

止鼻中之衂血。除五心之煩熱。瀉脾胃之濕熱。涼心火之血熱。涼血生血。痘色乾紅焦紫及發疵者。俱宜用。但能滑腸。瀉者欲之。

**熟地黃**味甘而微溫性沉而降。陰也。用酒浸蒸晒九次。

滋腎水。補眞陰。填骨髓。生精血。扶腎中元氣。有補血養血之功。腎經發痘。無膿而血虛者。宜于補劑中用之。但其性濡而沉。須佐以升陽達表之藥。乃能起痘升漿。涼血。用小生地。補血兼涼血。用大生地。純補。用熟地。

**犀角**味苦酸而氣寒。入湯藥。磨汁用。入丸散。剉細。納懷中待熱。搗之立碎。以角尖爲佳。忌鹽。

涼心瀉肝。清胃中大熱。祛風利痰。辟邪解毒。治吐血衂血。諸驚悸。消疳化膿。起痘瘡黑陷。但其性寒涼。不敢多。多則恐損陰血。血虛者斷不可用。

**羚羊角**味鹹而氣寒　以角掛樹而宿。故角有掛紋者眞。

入肝經。散瘀血。祛熱毒。治驚癇。寧心志。理筋風。辟邪。療肝經熱甚。痘瘡黑者。可用少許。但其性寒涼。先人虛弱者不可[illegible]用。

**虎骨**味辛微熱　以頭脛骨爲佳。　虎肚治反胃。

追風健骨。定痛辟邪。理風痺顛癇。痘後風疾。手足拘攣者。宜用之。

**丹皮**味辛苦氣寒　內厚者佳。畏貝母大黃。忌蒜胡荽。

入肝及心胞。瀉血分中火。和血涼血而生血。破積血。止吐衂。除煩熱。療疤瘡。退無汗之骨蒸。痘色紅紫。界地不淸而壯熱者。宜用。但能散氣。氣虛者宜以用

**地骨皮**味甘淡而氣寒

降肺中伏熱。瀉肝腎虛熱。能涼血而補正氣。除有汗骨蒸而解肌熱。凡見點後身熱不退者。宜用一二錢于解毒藥中。熱退即止。

**木通**味甘淡而性輕虛

降心火。淸肺熱。通膀胱。導諸濕熱由小便出。治淋濁。消水腫。能逐毒于孔竅。與川甲同功。有危痘宜。惟起脹時恐水利通

汁不升故不敢用

**通草**味甘色白氣寒
入肺經引熱下行引氣上達下乳汁治五淋通九竅利小便
初熱宜用以開竅逐毒見點後倣之

**滑石**味甘氣寒　滑胎
利竅滲濕益氣瀉熱能降心火上開腠理而發表下走膀胱
而利水為清熱袪濕之要藥初熱時用收靨亦用惟泄水時
莫用爛痘和白朮末摻之

**車前子**味甘氣寒　下胎
涼血去熱明目通淋清肺肝風熱滲膀胱濕熱利小水稀痘

初熱時用痘後水腫亦用

**地膚子**味甘苦氣寒
益精強陰入膀胱以除熱利小便而通淋能除癩疝惡瘡去
目翳有瘡疥者宜用之

**澤瀉**味甘鹹氣寒　酒浸用忌鐵
入膀胱利小便消浮腫止吐瀉能袪六腑之濕熱凡痘六七
日前實症吐瀉者用之收靨痘後亦用惟升水勿用

**豬苓**味苦淡氣微寒升而能降
入膀胱通小便開腠理能發汗治傷寒瘟疫大熱解渴消渴
痘之溏泄宜用惟八九十日戒之

**瞿麥**味苦氣寒
降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥痘後毒入膀胱為
淋為腫者宜用之

**大腹皮**味辛氣溫　鴆鳥多棲其樹宜洗淨服用
利小便解熱毒下一切氣凡腹脹浮腫非此不除并治痰膈
霍亂痘後用氣虛者忌

**石膏**味淡甘辛氣寒甚　火煅過用
瀉胃火凡痘舌焦唇腫初熱口臭咬牙發斑發渴其熱好
飲者俱宜用胃氣虛者忌之痘後齒痒口爛者亦不可缺恐
寒胃氣損宜與倫

**枳殼**味苦辛氣微寒　陳者佳麩炒用
破胸中痞塞散腹中結滯消痛氣走大腸與枳實同但枳實
性速治血分只殼性緩治氣分只寬利胸膈耳若腸胃痘
家初熱毒盛鬱結大便不通而用不快者宜暫用其能破氣
氣虛者忌行漿起脹以氣為主亦不敢用痘後結胸咳嗽亦
用

**青皮**味苦而氣溫　橘之青而未黃者
疏肝瀉肺破滯消積利痰解瘧最能發汗初熱時腹痛可用
虛人亦忌

**陳皮**味苦辛氣溫　去白名橘紅兼除寒發表核治疝氣葉散

乳粉出廣中陳久者爲佳

入脾肺調中快膈導滯消積宜通五臟下氣祛痰且健脾胃
痘之初熱以至結痂俱可用但多則損人元氣

玄參味苦鹹氣寒蒸過用忌銅氣反藜蘆惡黃芪乾薑

入腎壯水以制火益精明目最利咽喉開聲音治消無根浮
游之火止痘之夾斑丹疹瘾者斷不可缺咽痛者亦宜用之

山豆根味苦氣寒

清金瀉火專治喉痛咽瘡齦腫牙疼且解諸藥毒

藿香味辛甘氣微溫　出交廣

快氣和中開胃止嘔去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛
痘家胃寒嘔吐者急宜用之

砂仁味苦辛氣溫

醒胃進食定痛安胎止吐如補脾胃虛而吐瀉者莫缺

麥冬味甘苦氣平微寒　去心惡款冬畏苦參青葙木耳

清心潤肺瀉熱除煩消痰定嗽生津止渴痘出心經煩渴不
寧者宜用氣虛胃寒者莫用

五味子五味俱備　北產紫黑者佳南產者去肺中風寒

收斂肺氣而滋腎水除煩止渴寧嗽定喘痘家初中忌痘後
久嗽方宜蓋欲汗固腸恐閉毒也

黃芩味苦氣寒　枯芩瀉肺火清肌熱條芩瀉大腸火補膀胱

水酒炒或瀉肝膽火用猪膽汁炒與用皮丹砂

清肺熱瀉中焦實火除脾家濕熱止瀉安胎寧嗽解毒痘初
見點熱毒盛者必宜用之而兩顴紅紫且秘者尤不可缺惟
九日後不敢用痘後餘毒亦宜

黃連味苦大寒　出四川生用治心火膽汁炒治肝火酒炒治
上焦火姜汁炒治中焦火鹽水炒治下焦火惡菊花玄參殭
蠶白鮮款冬牛膝殺巴豆毒

入心經瀉熱火益肝膽厚腸胃消瘀血除煩止渴明目定驚
善熱消毒痘初熱而譫語狂言煩燥不寧者非此不能解其
熱大抵稠密心經毒盛大便秘結毒壅腸胃者尤宜痘後下
痢與痘毒入眼俱不可缺惟虛人忌用

胡黃連味苦氣寒　心黑外黃醋炒

去心熱益肝厚腸治骨蒸去煩熱消食積爲疳積良藥痘後
積熱生瘡積瀉潮熱咳嗽俱宜用

梔子味苦氣寒　生用瀉火炒黑止血薑汁炒止煩嘔內熱用
仁表熱用皮

瀉心肺之邪熱解三焦之鬱火引之屈曲下行從小便出治
吐衄血淋痢疾痘家初熱與痘後或用其中不宜

黃柏味苦氣寒

瀉相火滋腎水除濕清熱滋陰降火而治骨蒸外腎經發痘

者宜用之痘後陰虧[illegible]與陰虛火動者亦宜用

【牙硝朴硝玄明粉】味辛苦大寒　硝之在底者為朴在上而有芒者為芒硝用硝大罐火煆成粉為玄明粉三者俱能去胃中之實熱蕩腸中之宿垢乃下藥之猛者痘家用之乃是斷道萬勿輕試

【大黃】味大苦氣大寒　出四川錦紋者佳酒蒸九次用入脾胃大腸其性走而不守酒制亦能引于至高之分用以蕩滌腸胃下秘結而除痰熱凡下利痢疾止衄血閉血中伏火一切實熱其力能祛但致腸胃傷元氣痘以調元為要斷不可輕用也如大便不通不若未去油之豆蔻以潤其腸斯

可矣惟痘後餘毒合敷藥以搽癰疽則宜用之

【牽牛】味辛氣熱有毒　有黑白二種黑者力速瀉氣分濕熱通大腸秘結利大小便殺蟲墮胎亦為下藥痘家所忌

【山查】味酸甘氣溫平
健脾行滯消食去積發痘排膿化痰散瘀痘家初中至尾但宜用又能破參芪之滯亦監制參芪之品也

【麥芽】味鹹氣溫　消米麪果食之積痘後脾積宜用
健脾助胃寬腸下氣消食去積散結祛痰

【神麯】味辛氣散　調中開胃化水穀消積滯

【扁豆】味甘氣溫
調脾燥胃降濁升清泄瀉宜用

【以仁】味甘淡氣微寒
健脾利水瀉濕祛風止泄瀉消水腫理脚氣凡痘泄瀉與收靨潰類俱宜用痘後手足拘攣筋節牽强亦宜用

【當歸】味辛甘氣溫　治血酒洗有瀉用土炒畏蒲黃
入心肝脾補血行血安胎寧志定痛排膿痘必積血以栽漿故首尾俱宜而行漿時尤為要藥惟兩頰通紅不分顆粒者此血熱妄行則宜缺之然滑大腸瀉者亦忌

【何首烏】味甘苦氣微溫　白赤二種赤入血分白入氣分大略

佳忌鉄器用黑豆拌勻入砂鍋九蒸九晒
堅腎補肝添精益髓調和氣血消諸瘡癰瘰癧勞傷久瘧痘至九日後宜用之以能排膿化毒亦可止血熱作痒痘後亦宜用之以消餘毒

【川芎】味辛氣溫浮而升陽
乃血中之氣藥助清陽而上行頭目理一切腹痛頭痛氣鬱血鬱筋攣目淚在痘家有升提起發之功不可不用然亦不可多用多則走人真氣痘起脹後宜去之

【白芍】味苦酸氣微寒　酒炒用惡芒硝石斛畏鱉甲反藜蘆
入肝脾血分瀉肝火安脾肺固腠理和血脈寬中止痛散惡

[illegible]人便治癰腫疝氣斂汗安胎而止瀉痢凡痘血熱者生用則能活血涼血血散不收痘暈不聚者炒用則能斂血歸根痘痛甚者生磨酒服其痛自止目疾瀉痢俱宜倍用之蓋能清肝而目自安制肝而脾乃健也但初熱莫用恐固肌而遏毒也

**赤芍** 主治畧同

能清肝火散惡血白芍兼補而收血赤芍純散而瀉血故六日以前宜用赤芍八日以後宜用白芍白益脾能於土中瀉水赤散邪能行血中之滯

**鹿茸** 味甘氣溫純陽　紅如瑪瑙破之如木者佳用酒炙酥不

可嗅之有虫恐入鼻顙

生精益髓補血助陽强筋健骨乃托漿之聖藥痘之灰白伏陷者非此不能起也托裏之劑安可缺乎

**紫河車** 味甘鹹性溫即胞衣長流水洗淨酒蒸焙乾

本人之血氣所生故能大補血氣但以人補人仁者固不忍用况或有病之婦其胎有毒服之反致害人戒之

**人牙** 味鹹性溫有毒火煅用

可治痘倒陷

**人乳** 味甘鹹

潤五臟補血液澤皮膚本血所化故痘家即用以攻漿然必

---

壯旺之婦乳白而稠者爲良

**人中黃** 性寒　納甘草于竹筒塞孔浸糞缸中二三月取出洗懸風處陰乾取甘草用

入胃清痰火消食積除五臟實熱治天行病役解諸瘡惡毒痘疹血熱凡痘之紫黑陷伏非此不起也

**糞清** 濾過糞汁入新甕埋土中一年乃用亦起痘黑陷

**人中白** 性寒涼以溺器內尿垽焙乾

降火散痰治肺瘀鼻衄起痘瘡倒陷理痘後牙疳口瘡

**血餘** 取頭髮用皂角洗淨燒灰胎髮尤佳　氣微寒

入肝腎補陰消瘀治諸失血痘疹有衄衄不止者吹入鼻中

女子出痘經水不止亦調酒服或吐血便血俱宜

**人參** 生甘苦微涼熟甘而溫畏五靈脂惡皂角黑豆藜蘆

大補元氣止渴生津定驚除痰回元神于無有之鄉返魂魄于危亡之際定虛喘而領毒退虛熱以升漿開胃化食止瀉安胎凡痘漿清灰白痒塌不起非此不能救其危惟紫黑焦枯實熱之症莫用

**砂參** 味甘苦氣微寒產北地惡防己反藜蘆

專補肺氣兼益脾腎滋五臟質陰去內外邪熱排膿定痛除煩止渴熱而不敢用人參者須用砂參易者以此代人參氣爲提故也

黄芪　味甘氣溫　堅實嫩軟皮黄肉白者佳惡龜甲生能達表蜜水炙則可溫中虛四肢不起桂枝煎酒浸透用肺經去表專補氣最固肌生用補而能發無汗可發汗有汗可止汗瀉陰火解肌熱故痘家於六日以前生用痘後餘症亦生用炙則益元氣溫三焦實腠理壯脾胃生血生肌排膿內托誠起痘行漿之聖藥凡痘之皮薄漿清痒塌不起斷不可缺但六日以後宜固肌表乃宜炙用

肉桂　味辛甘性大熱氣上浮而升純陽之品妙在皮宜去粗皮用忌生葱石脂出嶺南桂州嫩枝爲桂枝

入肝腎血分抑肝風扶脾胃補命元陽通血脈能引血化

膿爲托毒成膿之救表虛起伏陷縱頂用參芪非此不能成功誠起脹之妙藥補托之劑所莫缺也其功益精明目消痰生肌續筋骨治風痺但能動胎孕婦忌之

枝溫經通脈發汗解肌調和營衛使邪氣從汗而出且達四肢走手足凡痘四肢不起者宜于補中用少許以爲引痘後四肢腫痛及手足拘攣者亦宜用之

丁香　味辛而氣溫純陽也

泄肺溫胃煖腎壯陽而善攻腫痘之脾胃虛寒泄瀉嘔吐厥白不起者急宜用之惟實熱則忌

乾薑　生薑味辛而氣溫炮黑爲黑薑乾晒爲乾薑

生薑行陽分而祛寒發表宣散氣而解肺調中暢胃口而開痰下食通神明去穢惡救暴卒殺野禽之毒除山嵐瘴氣薑皮能消水腫　炮製黑薑善能煖胃而守中定嘔消痰去臟腑沉寒痼冷能使陰長陽生故痘家虛寒冷症嘔吐泄瀉寒戰咬牙灰白不起一切沉疴等症非此不療惟孕婦忌之煨薑亦煖胃止吐

白豆蔻　味辛而性熱

行三焦而煖胃散肺經之滯氣除寒濕化食積治腹痛嘔逆痘家胃虛嘔吐者可用

肉豆蔻　一名肉果味辛氣溫香　煨去油去油不淨則滑腸

理脾溫胃下氣調中逐冷祛痰治吐沫嘔乳善澁大腸以止虛泄痘家虛寒冷痢急宜用之但初熱痢之邪滯毒於腸胃也

訶子　味苦酸性急生用清金行氣煨用溫胃固腸

泄氣消痰斂肺降火止瀉開胃治腹脹嘔逆痰喘開聲音最澁腸痘當起脹或有虛泄急宜用之若吐瀉並作柯蔻兼用

附子　味辛甘有毒而大熱重者爲佳生用發散熟用峻補

純陽之品浮而不沉走而不守行十二經絡無所不至能引補氣藥以回失散之元陽引補血藥以滋不足之眞陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒引溫煖藥達下焦以祛在裏

者寒濕治中風中痰冷瀉霍亂痘家初出四肢厥冷元虛寒能治痘或偶中風寒而面青唇白痘忽倒陷或氣血虛甚灰白痒塌寒戰咬牙一切虛寒等症非此不能救療但痘平痘起唇舌轉紅卽當去此凡下桂姜附過用則損目發癰以貽後患又不可不愼也

【川烏】卽附子之母

功同附子而稍緩性能祛風故痘後手足拘攣風痺之症宜用　附子川烏俱墮胎孕婦忌

【茯苓】味甘氣溫松根靈氣結成有赤白二色

但能健脾利水但白者補心脾赤者利濕熱俱能通竅除濕

調理脾胃止泄瀉治淋瀝皮則專治皮膚水腫

【茯神】卽茯苓抱根生者與茯苓同用

但茯神多入心主益志寧心安神定魂此皆滲濕利水之品痘若升水未足斷不敢用惟收靨之際正宜用之以成結痂之功

【山藥】性溫而濇

入脾肺二經補其不足清其虛熱固腸胃化痰涎止泄瀉痘家七八日前勿用八九日間漿清皮薄者宜用收結時正宜用　生搗敷痘癤消腫硬　痘有水泡必宜用之

【白朮】味甘氣溫以泔水浸陳壁土炒用

補脾溫中在血補血在氣補氣無汗能發有汗能止利小便止虛瀉進飲食排膿貫漿治痘中水泡之聖藥但七八日前水升未足恐其燥乾津液斷不敢用八九日後若漿清皮薄者尤宜多用收結亦宜用之

【貝母】味苦氣微寒川産開瓣者佳獨顆無瓣者不堪用

瀉心火散肺鬱止嗽化痰解渴除熱治肺癰痿瘡口凡痘有咳嗽痰涎不用恐其性之寒涼也惟痘後痘癤可敷藥內用痘後咳嗽亦用

【南星】味辛苦氣平用薑渣黃泥和包煨又納黃牛膽中風乾則爲膽星避兩七膽可比牛黃畏附子防風乾薑

治風散血拔毒去痰爲肝脾肺三經之藥治驚癇散鬱結用咳嗽破結下氣利水墮胎性更烈于半夏是以痘中罕用惟痘後嗽者亦用膽星然生者搽散癰疽瘡疥癬痘後諸癰爲末敷之可以立愈

【半夏】味辛而氣溫有毒畏薑反川烏能動胎

體滑性燥能走能散和胃健脾除濕化痰下氣逆開痰滯發聲音救暴卒利水燥痰痘家忌用惟痘後乃宜亦可敷痘後痘癤以退腫毒

【馬兜鈴】味辛苦性寒

清肺熱降肺氣治痰嗽痘中少用痘後肺熱而嗽者可用

花粉味苦氣寒
排膿消腫利膈除熱化痰生肌脾胃虛者莫用以其能傷胃
也

厚朴味苦辛氣溫薑汁炒
入脾胃消結散濕平胃調中祛痰化食散結透斑行疏通之
力治霍亂冷痛然多服損人元氣泄瀉則戒勿用孕婦亦宜
莫使

烏梅味酸氣平
斂肺濇腸消痰止渴解毒消腫

杏仁苦甘而溫

散肺中風寒潤腸中燥結治氣止咳肺虛莫用痘家有咳嗽
宜用去皮尖惡黃芪黃芩乾葛

桃仁苦甘而平　雙仁者不可用桃花下宿水療風狂
通大腸入血室行滯血破瘀血生新血治閉經痢疾有力孕婦
人及痘家莫用　杏行氣秘桃主血秘

天竺黃味甘而微寒出南海大竹之津結成即竹內黃粉有節
者真
清心火去風熱利竅豁痰鎮肝明目功同竹瀝而性和緩無
寒滑之患治中風不語小兒驚癇痘症驚搐丸散內不可缺

寄生味甘而溫

安中養脾發脾胃升騰之氣

西河柳能使疹毒外出治疹疹不出喘嗽悶亂沙糖調服治
疹後痢

牛膝味苦酸而氣平出四川
滋肝腎強筋骨行血活血引諸藥下行治癰腫惡瘡金瘡跌
打痘後膝腿腫痛者當以之爲引藥但能墮胎

蘇木　破血排膿消癰去腫治閉經散瘀血痘中莫用痘後症
癬亦宜慎之

石斛味甘氣平
除脾熱平胃氣濇腎氣治滑精壯筋骨除脚軟痘有脾胃虛

熱者亦宜用

苦參味苦氣寒
治時氣惡熱疥疹痒痛痘兼瘡疥者用之

知母味苦辛氣寒而滑
清肺金而瀉火潤腎燥而滋陰消痰定嗽止渴安胎然傷胃
滑腸痘中莫用痘後陰虛火動者宜用之

射干味辛氣平
主喉閉咽痛止咳嗽氣逆

薄荷味辛氣涼　蘇產爲佳　虛人莫用
上升頭目發汗祛風邪清肝風消肺熱引諸藥入營衛治一切

頭面痘嗽甘熱驚風而明目能達痘毒以出皮膚

**山慈菰**　味甘辛氣平

清熱散結毒解諸毒

**紫花地丁**　味辛苦而寒　葉如柳而細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑生者起蔓

最解痘毒及一切無名腫毒

**白芨**　味苦辛性收濇

專入肺經能止吐血肺傷損者可使復生治跌打損傷接骨續筋除痘痙腫痛去朽肌腐肉痘後痘癩用以逐瘀血而生新血痘後手足皸裂者用此塗之能令肌潤　反用烏

**淫羊藿**　味辛甘氣香而溫北地有羊一日百合專食此藿

入肝腎補命門益精氣壯筋骨利小便起陽不興理陰不產及手足麻木善攻痘漿痘有祀不起頂者用之立效但不敢多用多則生痒　用羊脂炒

**白蒺藜**　味苦辛而氣溫

補腎瀉肺而散肝風去眼中翳障治腰痛咳逆催生下胎治瘡痒潰爛去瘀生肌

**龍膽草**　大苦大寒

入肝胆而瀉火入膀胱以除濕熱涼血明目而消赤腫痘後眼睛紅腫者用之

**菊花**　性平和味甘者方可用黃者入陰分白者入陽分紫者入血分

益肺腎制心火而平肝木祛風除熱養目去翳痘後目疾宜用

**款冬花**　味辛氣溫純陽甘草水浸一宿用花未開者佳

潤肺瀉熱消痰止渴明目定驚治肺癰喘嗽口吐膿血之要藥也痘家有嗽宜用以消痰

**百部**　味甘而微溫

治肺熱咳嗽竹積疳癬殺諸虫

**覆盆子**　味甘酸性微溫用葉絞汁滴目中出目弦虫除膚赤收

濕止淚

益腎水而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便澤肌膚烏鬚髮能令男子陽興女子多孕痘後有腎虛流淚視而失明者宜用之

**草決明**　味甘苦氣平

入肝除風熱治一切目疾

**青箱子**　微寒

祛肝經風熱治青盲翳障

**穀精草**　味辛而微溫

入肝胃二經能升上浮明目退翳

密蒙花味甘而微寒

潤肝明目治目中赤脈青盲下淚

石決明味鹹氣平

除肝肺風治青盲內障而通五淋

熊膽味苦而寒通明者佳挨塵水上投膽少許尋然而開

涼心平肝殺蟲瀉熱袪痰去翳明目定驚

夜明砂蝙蝠屎蝙蝠食蚊砂皆蚊眼故治目疾洗淨焙乾

肝經血分藥活血消積治目盲障翳瘧魃疳積

望月砂即兔屎兔性常視日月其目得陰陽之精故明目

治痨瘵五疳善解痘毒入眼痘後眼中翳膜兔肉兔血小兒

常食出痘必稀

蔓荊子味苦辛而微寒上升頭目

治頭痛腦鳴止目淚睛痛搜風涼血凡手足拘攣者亦用

以上痘後目疾備以選用

琥珀味甘氣平松脂入土年久結成色赤而明潤摩熱可吸芥子者真

入肝與心消瘀血生肌肉寧心定魄治痘疹驚搐鬼魅侵驟

又能明目去翳

珍珠味甘鹹而性寒感月而胎水精所孕乳浸研粉用

入心肝二經安神定魄治熱袪痰小兒驚風聖藥善援毒

治痘疔生肌合口其效如神點入目中去除翳膜

牛黃味甘苦而涼牛有黃者肌瘦而毛潤多吼喚以盆乘水令不得飲渴甚其黃自吐水中為生黃有角黃肝黃膽黃心黃膽黃最佳磨指甲上黃而透甲者佳真

清心解熱定魄安魂而辟邪解魅通竅定驚化痰之品無出其右吐出濃痰少許立化為水治小兒驚搐有起死回生之效非凡藥之可比也且苦能解毒痘家紫陷黑陷可以立起

惟孕婦忌

麝香味辛性溫氣香其香聚處艸木皆萎

開經絡通諸竅透骨髓治暴卒驚風中痰中風救痘毒起黑

陷然寶熱而毒盛者用之有回天之力氣虛者而妄投之則殺人如反掌也切宜慎之

青礞石以硝拌勻煅至如金色為度如無金星者勿用

體重而沉平肝下氣為治驚利痰之聖藥

冰片入肺而通心脾走而不守透骨入臟而通諸竅散鬱火

治驚癇痰迷目赤翳障痘家能起黑陷

白附味甘辛性大熱治痘風熱不退引藥上行袪痰治中風

天麻味辛氣溫

入肝經益氣强陰袪風消痰治小兒驚癇與諸風症

鈎藤鉤味苦而微寒

除心熱平肝風治驚啼與盤腸內吊痘後手足牽張一切風疾、

威靈仙性溫

其性善走能疎五臟通經絡

硃砂性平

定心安魂辟邪鬼善解毒能起痘之紫黑治小兒一切驚搐定大人之顛狂

神砂性平如鏡面者佳

鎮心墜痰養血活血善治驚狂凡痘之心神不寧者無論前後俱不可缺

蒼朮味甘辛性溫而烈

燥胃强脾為除濕之聖藥亦能發汗以升胃之陽氣治水腫辟邪瘴痘之初中忌用惟水泡難靨痘後浮腫宜用

遠志味苦辛性溫去心用

主心經兼通腎氣强志益智開聰明而利九竅治迷惑善忘夢遺驚悸痘後心神恍惚者宜用之

石菖蒲性溫

開心利竅而除風濕然能散氣痘家莫用

細辛味辛性溫

散風邪走九竅其性烈痘恐耗氣莫用

---

木賊性溫　發汗解肌善除目翳痘後目有翳者用之

枸杞性平　益氣生精而助陽去風明目腎虛宜用

棗仁味酸性溫　補肝膽而醒脾為寧心之要藥

杜仲性溫　補腎益肝强筋健骨善治腰痛腎經發痘宜用

桑白皮性寒　專瀉肺火治嗽清痰痘後咳逆宜用

桑寄生益血助筋散瘡祛風

川練微寒　導膀胱之熱引相火下行通小便治疝氣之要藥亦能殺虫療疥

烏藥微溫　疏胸快氣消食積治膨脹

五加皮性溫　順氣化痰祛風勝濕逐皮膚之瘀血療手足之拘攣痘後風痺宜用

芙蓉花　清肺凉血散熱止痛消腫排膿治一切癰疽腫毒大有殊功痘後痘癤宜用

皂角性燥烈　氣浮而散入肺經搜風熱通上下關竅一切痰迷搐症為末吹入鼻中可以立甦但痘中恐其散氣不敢妄用其刺能達患處以潰疱痘痘後欲潰疽宜用

沉香性溫　下氣而墜痰涎入腎而煖精壯陽

乳香性溫　通十二經能祛風伸筋活血調氣托裏生肌治諸痘痛痘後治疽宜用

沒藥性平　入諸經散結氣通滯血消腫定痛而且生肌治瘡

後疽瘡惡瘡之要藥也

血竭（性急）入血分補心血之不足專除血痛散瘀生新乃和血之聖藥治跌損打傷止痛生肌以染透指甲者真

蘆薈 味苦而大寒清熱殺蟲涼肝明目治驚癎殺疳蟲吹入鼻內可除鼻痒而疳中勿用

巴豆 性熱有毒 開竅宣滯去臟腑沉寒積滯為斬關奪門之將並可令人泄瀉是痘家之忌藥也

鎖陽 性溫 清心通腎益血固精夢泄遺精必用

猬皮 性平 燒灰存性能起痘倒靨止痘發痒

芡實 味濇 補脾去濕治泄瀉止滑精

續斷 性溫川產 補肝腎通氣血理筋骨煖子宮治腰痛凡痘後筋骨不舒者必用之

骨碎補 性溫 補腎強骨能破血止血治筋骨折傷痘後骨節疼痛筋骨攣強者宜用之

益母草 微寒 消水行血去瘀生新調經解毒治血風血痛為經產之聖藥

青黛 微寒 瀉肝清熱散五臟之鬱火解瘟毒之風熱治發斑定驚癎除肝熱

防己 微寒 行十二經通腠理利九竅瀉下焦濕熱為療風水之要藥降氣下痰而行脾氣痘後足腫宜用

甘遂 寒而有毒反甘草 入腎經祛水濕直達水氣所結之處為下水之聖藥凡痘後腹滿水腫宜用之

大戟 寒而有毒 瀉臟腑水濕行血發汗治十二水凡風毒脚腫宜用通經墮胎而損元氣不可妄施

商陸 寒而有毒 沉陰下行而療水腫然亦不可妄用

常山 寒而有毒 能引吐行水而祛痰專治瘧疾虛人莫用

艾葉 醋煮用生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽煖子宮逐寒濕調經安胎孕婦出痘宜用

玄胡索 性溫 活血行氣調經要藥孕婦則忌

三七 微溫以末調猪血血化為水者真 散血定痛為金瘡折傷要藥

地榆 微寒炒黑用 入下焦除腸風血痢

鬱金 微寒純陰之品 涼心熱散肝鬱下氣破血治鬱結心痛與癲狂失心或痘毒入心者宜用之

莪朮 氣溫 破氣中之血消瘀通經解食積治腹痛

三稜 氣平 入肝經破血中之氣散血瘀氣結破停食積塊

芋根 寒而滑 破瘀解熱搗貼赤火遊丹拱癬疽瘡毒汁能扎蛇

爲水

燈草 微寒 降心火 清肺熱 燒灰搽乳 可止夜啼 吹喉痺 理喉痛

萹蓄 氣平 殺虫疥 利小便 治黃疸 疳積

茵陳 微涼 發汗利水 以除脾經濕熱 治黃疸之君藥也

香薷 微溫 爲清暑之主藥 能利水而除熱也

故紙 大溫 入命門 補相火 以通君火 煖丹田 壯元陽 治腰膝冷痛 腎冷精流

肉蓯蓉 大溫 酒蒸炙用 入腎經血分 補命門相火 滋潤五臟 益髓強筋 治五勞七傷 絕陽不興 絕陰不產 腰膝冷痛 崩帶遺精 爲補精血之峻藥

瑣陽 性溫 酥炙用 益精興陽 潤燥養筋 治陽痿 能固精

巴戟 微溫 入腎經 強陰益精 治五勞七傷 理風氣 腳氣水腫

胡蘆巴 溫而純陽 入命門 煖丹田 壯元陽 治陽氣不能歸元 且治疝氣 理寒濕腳氣

蛇床子 性溫 強陽益陰 補腎散寒 治陰痿寒濕 女子陰痛陰痒 子宮虛寒 產門不閉 一切命門之病 可以兼除 且合瘡藥 則能殺蟲 煎水浴 可去風痒

兔絲子 甘而平 強陰益精 不助相火 治精寒淋瀝 祛風明目 益氣健人

使君子 氣溫 健脾胃 殺臟虫 治五疳 爲小兒疳積要藥也

益智 溫而熱 入心腎 補心氣命門之不足 能濇精固氣 且開發鬱結 使氣得宜

草豆蔻 一名草果 微熱 健脾煖胃 破氣除痰 能除瘴疾

香附 性平 血中氣藥 通行氣脈 主一切氣滯 利三焦 解六鬱 止腹痛 調經行血 去瘀生新 乃婦人之聖藥也

木香 味辛而性溫 形如枯骨者佳 氣分之藥 能升能降 泄肺氣 疏肝氣 治一切氣痛 心痛 寬大腸 消食安胎 痘家內托之劑宜用 但能散氣 亦不敢多用

茴香 味辛而熱 大茴入膀胱 煖丹田 補命門 開胃進食 治疝氣 消陰腫 小茴亦能入腎發邪 但痘家不宜多用

甘松 性溫 理氣醒脾 治腹卒痛 [illegible]牙疳 而消腳腫

山柰 性溫 治心痛冷痛 而理牙風 合香而能辟惡

良薑 辛熱 煖胃散寒 治胃脘痛

土茯苓 氣平 健脾胃 祛風濕 止泄瀉 治筋骨拘攣 諸瘡之毒

白歛 氣寒 解火熱 生肌止痛 斂瘡方多用之

馬齒莧 微寒 散血解毒 能治惡瘡

絲瓜 氣平 涼血解毒 能起痘黑陷 藤燒灰 吹鼻淵

自然銅 氣平 散瘀止痛 能續筋骨 折打損傷 醋用

陀僧 有小毒 止血散毒 桐油調敷 能消瘡癤之腫

水銀 寒而有毒 專殺瘡疥之蟲 墮胎絕孕

赤石脂微溫　止血收濕，治泄瀉遺精，收口長肉，催生下胞

輕粉性冷，殺蟲治瘡，瘡痍疥癬多用之

雲母氣平　堅肌續絕，治癰疽瘡腫

爐甘石性溫　煆紅，童便淬七次

止血消腫，收濕除爛，退赤去翳，爲目疾要藥

鍾乳性溫，忌參朮

強陰益陽，通百節，利九竅，令人陽氣暴充，多服不免斑毒

雄黃性溫　入肝，搜風殺百毒，治驚癇，化血爲水，可辟鬼邪，痘搐入定驚，凡用只能起黑陷

硫黃有毒，大熱純陽　補命門眞火，煖精壯陽，疎利大腸，若陽

氣暴絕，亦救危之妙藥，且殺虫療瘡而辟鬼魅

枯礬微寒　收濕之品，生肌緊肉，治痈瘡而令合口

膽礬微寒　入膽經，性斂而上行，令吐痰涎而立効，且殺牙虫

青鹽微寒，補腎固齒

阿膠性平　清肺養肝，滋腎益氣，和血補陰，除風化痰，潤燥定喘，安胎調經，引血歸元，故止吐血衄血

龍骨微寒，煆用　能收斂，濇腸固精，辟邪解毒，治遺精滑泄

海螵蛸微溫，炙用　通血脉，祛寒濕，治目翳出淚

龜板氣平　滋陰益腎，理陰虛，血熱，治勞傷骨蒸

牡蠣煆用　收濇之藥，治遺精崩帶，固大小腸

---

五倍子氣寒性濇

降火化痰，止血定嗽，療瘡癬，消目腫，斂瘡口

白蠟　生肌止血，解毒定痛，外科必用

斑蝥寒而有毒　潰肉墮胎，通經捷效

丹參氣平而降　破宿血，生新血，安生胎，墮死胎，爲女科要藥

又排膿生肌，治瘡毒癰腫

麥門冬大寒　入肺分，清金降火，止渴消痰而滋腎水

藁本性溫而氣雄　上祛風寒而治頭痛，下行去濕而治泄瀉

秦艽性溫　養血榮筋，祛風寒，除濕熱，治拘攣骨蒸之症

粳米氣平　得天地中和之氣，滋養營衛，人賴以生，痘以者能

補脾胃，止虛泄

糯米氣溫　能補中氣，取自汗，起痘瘡，入補劑，排膿化毒

黑豆氣微寒　活血解毒，能解腎經痘毒

黃豆　能解脾胃痘毒，燒灰可治痘瘡破爛

赤小豆　能解心經痘毒

綠豆氣寒　行十二經，清熱解毒，爲末可治痘瘡破爛

酒　行血行氣，過飲則傷神耗血，動火生痰

韭氣溫　入血分而行氣，益胃助腎，補命門之火

葱溫而散　發汗解肌，以通上下陽氣，痘後及見斑斑服

芫荽氣溫　辟一切不正之氣，擦疹發痘，痘瘡不出，煎酒噴之立效

雞性溫　能補虛溫中可起痘行漿但益肝火痘初出用八九月後宜用雞蛋滯氣不宜用雞冠血可攻痘毒

鹽性冷　老者能滋陰降火痘家莫用痲疹無妨

豬　心血用作補心藥之引故心虛而驚悸者用之　尾血由髓而來故腎經發痘者和片與參能起痘陷　肝主目而藏血用之可以明目　肺則補肺用之可治虛嗽　肚入脾胃和補藥可以健脾　腰通腎豬腰子和胡椒可治腰痛　腸入大腸可治腸風下血　膽瀉肝胆之火而明目　豕胞入膀胱而利小便　豬脂能潤燥而滑大腸　豬蹄可以通乳

豬肉易滯氣不可多食

犬肉性溫　煖脾胃助陽事黃補脾而兼補腎

羊肉性熱　益氣血壯陽道開胃健力通氣發痘　肝能明目　膽止風淚

牛肉　安中補脾　牛乳　潤腸解熱補虛勞

柿乾性平　濇腸潤肺清上焦心肺之熱

梨微寒　潤肺凉心利大小腸治痰喘失音血虛人忌

橄欖微溫　清喉生津核磨泉水點眼去翳

白果性溫　善于收濇縮小便治白濁

石榴皮微溫　能濇腸止瀉治崩帶脫肛

龍眼性溫　益脾長智養心葆血痘將落靨時用

荔枝性溫　入肝腎益氣行血　核能散滯氣辟寒邪治胃脘痛婦人血氣痛　殼能發痘瘡

落花生　潤肺舒脾

蓮子溫而濇　補脾胃濇大腸安靖上下君相之火治泄瀉　心能清心可療產後血渴

荷葉燒灰合藥　助脾胃而升發陽氣可治痘倒靨

種痘新書卷之一終

# 痘疹新書卷之十二

寧邑張　琰遜玉氏編輯
受業曾衡波仝參

## 十二經絡

手太陰爲肺　手少陰心經　手太陽小腸
手少陽三焦　手陽明大腸　手厥陰肝經
足太陰脾經　足太陽膀胱　足陽明胃經
足少陽膽經　足少陰腎經　足厥陰心包

## 痘疹脈法

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命分寸關尺三步以定經絡部位總不外於浮沉遲數四字以決其寒熱虛實但痘自發熱至起脹時毒從內出陽之候也脈宜浮洪而數不宜沉細而遲自收靨以後毒從外解陰之候也脈宜和緩不宜洪數。

## 五臟見症

肝經主　驚搐　頭痛　志怒　摸床　尋衣　眼翻
心經主　睡驚　煩燥　譫語　咬言　蒸熱　見鬼
脾經主　腹痛　狂悶　顛狂　唇紅　口渴　撮口
肺經主　噴嚏　咳逆　悲哭　咽啞　鼻流　氣喘
腎經主　腰痛　身疼　寒戰　咬牙　窩陷　耳尻冷

---

## 指南賦

人參補氣炙草和中用黃芪而實腠理得蝉退而善開提紅花有活血養血之功生地有凉血行血之效痘若乾紅便宜加入紫草滑肌開竅毒蘊周行熱症類之有益而虛症切莫輕投山查善消瘀頗能消食積兼理滯氣於補益方中且解鬱結於透肌湯內輕其表而凉其裏功在荆翹疎其肌而發其瘡貴如蝉蠏退不利咽喉而清氣道能發散而善開提功必資於桔梗木通也分清濁而利小便消痘毒而去脹膨效莫大於腹皮川芎引清陽而達表勿缺於未滿之前芍藥斂陰氣以濟陽可施於行漿之日牡丹皮去血中之毒壯熱煩紅爲聖藥地骨皮去氣中之

毒毛焦熱甚是良功官桂有鼓動陽氣之能補倦而不振者用之以收寬效丁香有賛助元陽之力內虛而不起者得之以奏奇功木香順氣而理脾寒泄瀉湯中必用乾葛解肌而退胃熱渴煩之症宜加白术茯苓健脾胃佐參芪且能益氣當歸生地補陰虛君只芄而能滋腎解縮芍莫如犀角道通惟紫盛乃前後堪用定心煩莫如門冬五味有渴症則終始宜加大附子迯本回陽能理虛寒而定戰慄天花粉消痰清胃且收肺氣而發聲音白芷排膿痘毒蘊之而速化紫蘇發表貴乎頭顛是以膜除羌活有攻毒走表之功防風有散邪逐毒之妙偏祭利于肝筋祛風定痛如神只殼快其胸膈下氣寬腸最速腸脹定消功並

大如麻黃羗活葛根之而發散平胃溫中功則賴於厚朴須腹脹是以消磨能骨枯礬暫爲消瀉之用泄止則不宜施澤瀉朮苓有分利水穀之妙灌腹時當慎用乾姜溫中氣而止嘔吐胃寒虛泄者當用則用大黃蕩腸胃而通秘結熱壅便秘者宜加[illegible]加牛蒡利咽而善解毒升麻發毒而善升提柴胡前胡解肌而能退熱黃芩黃柏清火而可消痲止嗽消痰用貝母清便降火在川楝牛中黃化風痰而療顛癇有扶危救急之功龍腦片涼心血而起黑陷具撥亂反正之才射香通竅入五臟亦能發汗雄黃解毒于六腑效可定驚硃砂寧心定志而有養血涼血之能珍珠透裏入腎能解骨節之毒訶子斂肺氣而濇腸豆蔻溫

脾胃而止泄人齒但能發鬆肌肉過用則肉裂皮崩藥味不求乎與人取效節存乎常品明此一篇思維過半

## 節制賦

夫病深而藥淺終是無功病淺而藥深反增他劇勢緩而投急劑急則拂戕其經病劇須用峻藥非峻難解其危以平藥而治不病病去即當行别議防變症而用變藥變症雖逆乎將來故偏行補法未必盡爲怯弱專用辛溫甚虛樂是疵藥宜用則用當去則去藥隨病更方非可執故升麻進于未點之先非熱甚而減投身無壯熱休加乾葛柴胡陰不煩勿進芩連喬於痘過其詳疏通投補劑則肉膨抵食內熱須清利誤投汗則表

虛痰嗽痰鬱心煩用丁桂須防思胃便濇胃弱投芩連恐致虛亡傷食咽酸先宜消導不食嘔吐須與和中糞焦熱泄溫補豈其所宜便溏糞白涼藥總爲不合胃虛弱而滋陰恐增泄瀉三焦壅而益陽恐發顛狂喘滿便清是虛煩而可補氣粗腹脹加便秘而可通咳嗽有痰切勿妄投半夏胃熱作嘔且教設入乾薑氣虛不振則參芪易于奏捷脾胃虛寒則桂附乃可成功設令煩渴喘秘但投辛熱勢必反生敗症若逆解熱毒于未形之前抑奇清血熱於方脹之始若還勢在行漿此藥皆爲所忌故六七日內不起內托保元無禁八九日外變生木香異攻何疑補法不宜早施溫藥必須在後發散乃作先鋒溫補是爲殿

遊此遺制解致悞人識透玄機方爲妙用

## 權宜賦

痘有緩急治宜權變且如紅紫掀腫今涼血爲上灰白平陷令補氣最良出不快兮爲表塞而發散可用二便秘將爲裏熱而疏利何妨毒不能以速散毒甚者令微汗之發越熱不可以毒除熱劇者使小便之清長三陰甚而多寒藥必投乎辛熱三陽數而多熱治無外乎清涼是故補元氣參芪白朮滋榮血歸芍地黃發表散邪重柴葛而輕桂枝疏通表熱微只殼而大黃解熱毒芩連枝子快痲疹紫草荊防牛蒡連喬甚痘中之要藥涌荷甘草乃藥內之君王玄參桔梗能除咽喉之痛[illegible]

腹脹氣滯兮陳皮青皮胃寒兮丁香木香治泄瀉兮柯子豆蔻止嘔吐兮砂仁霍香祛風熱兮蟬退白附定驚搐兮琥珀牛黄麥冬乾葛清心熱而止煩渴腹皮厚朴療水腫而消腹脹五味杏仁潤肺止嗽而定喘山查只實消食行滯而偏長牛蒡南星貝母悉是消痰之藥麻黄紫蘇羗活皆爲發汗之劑紅花丹皮可解血熱鹿茸山甲能起痘漿消食積神曲麥芽草果理後重只殼檳榔木香犀角羚羊解乎心肺之熱秦艽香附退乎脾胃之黄乳香没藥止痛乾姜附子回陽前胡蘇子能清熱而止風嗽猪苓澤瀉堪止瀉而利小腸此藥味之加減在醫者之權宜而痢症之輕重又因人而立定方慎勿膠柱而鼓乃云醫道之良

## 金鏡賦

痘毒未出之初宜開和解之門既出之後當塞走泄之路壯熱腮紅宜服升麻乾葛面青唇白急進和表參蘇氣粗熱盛心煩悶便秘須當解利升甘芩葛只前羗防芷柴芩各樣喘呼脹滿眼中紅肌燥急宜疎解羗活乾葛芩升麻甘桔牛蒡堪透發痘之門不閉則熱蒸之毒必解未見點前惟茲一法既出痘後又有奇方稀疎而氣血和平須知安表和中之理歸芍藥朮苓甘月用益元飲子稠密而毒氣太盛當識內外分消之妙荆喬歸地芍紅皆通用小連喬飲瘡亦色紫焦枯急進清涼而解

毒盛斑赤柴芩連犀栢當施身熱煩渴乾葛前胡通用氣虚而腹膨脹蟬退只殼木通若遇色來紅潤便宜徹去荆翹如見二便清泄即是地歸俱免宜加白朮茯苓陳神倦而飲食少進以人參出不快而痘不振兼用查退初覺紫紅稠密皆宜用之無疑如見毒盛形焦生了進之何害是以三日以前固宜清解四日以後須要標宜瘡頭放白勢在行漿此際最爲緊要必參看內外虚實之與酌以溫平表裏之宜若神壯而氣盛能食而不泄者痘雖稠密只用和中表發防甘查芎桔歸芪保嬰而已若神倦而氣衰咸食而痘陷者毒若緊縮必用重藥補茹蔘芪甘桔對歸芎托裏宜用設此二方乃作釀膿之具漿泡未滿不可輕易其方痘或變遷不另設便宜妙用至于將成之毒固盡行外化法當漸進于清凉氣血回元復位不可互用乎表補參芪切勿多食胖甚遲難收拾若便實而能食壯熱而不退者便宜疎利爲先升麻乾葛回順清涼倘便溏而減食壯熱而不渴者則以健脾爲貴朮苓通歸防風芍芷假如內外症平不必過服藥餌直至結痂以後再觀餘毒有無當疎利則宜疎利當調補則宜調補餘毒若攻用連喬飲風襲外則進益氣湯治法固自多方總皆因症而治若無餘症則安養氣血調和飲食自可無虞

## 用藥

**補氣**　人參、黃芪、白朮、茯苓、炙甘草、肉桂、丁香

**補血**　鹿茸、當歸、川芎、芍藥、地黃

**發散表熱**　升麻、乾葛、柴胡、前胡、紫蘇、葱白

**清解裏熱**　黃芩、黃連、山梔、黃柏、犀角、羚羊（用）（柏枝犀羚不可輕用）

**表寒**　黃芪、桂枝、生薑、川芎、防風、麻黃（麻黃不可妄用）

**裏寒**　乾薑、肉桂、附子、丁香、木香、豆蔻

**利小便**　猪苓、澤瀉、木通、車前、滑石

**通大便**　枳殼、枳實、大黃、牽牛、玄明粉（不可輕用）

**活血涼血**　生地、紅花、紫草、丹皮、荊芥、歸尾

**理氣**　木香、陳皮、青皮、香附

**咽痛**　玄參、桔梗、牛蒡、豆根、射干

**胃寒嘔吐**　藿香、丁香、木香、砂仁、白茯、煨姜

**驚搐**　天麻、白附、姜蚕、全蠍、硃砂、神砂、牛黃、竹黃

**咳嗽**　桔梗、陳皮、桑皮、杏仁、橘紅

**祛風**　蟬退、防風、全蠍、白附、勾藤、姜蚕

**泄瀉**　白朮、茯苓、訶子、豆蔻

**腰痛**　續斷、故芷、杜仲、牛膝

**頭痛**　川芎、藁本、薄荷、蔓京

**清痰**　牛黃、南星、貝母、麥冬、花粉

**止渴**　乾葛、麥冬、五味

---

**消食**　山查、麥芽、神曲、草菓

**腹脹**　厚朴、蔻花、腹皮

**發斑**　紫草、防風、荊芥、升麻

**解毒**　牛蒡、連翹、紫花、地丁

**起痘攻毒**　鹿茸、山甲、川芎

**腹痛**　厚朴、蒼朮、玄胡、川練、木香

**氣痛**　乳香、沉香（大茴、木香、香附）

**眼目**　菊花、蒙花、膽草、決明、兔糞、蟬蛻

**吐血衄血**　百草霜、血茹、京墨、山梔

此大藥言之以備初學採用，而臨機應變，又不可固執也。

酌量藥品

**牛蒡**　通肌滑竅而解毒，多服恐內動中氣，以致表虛。

**蟬退**　能開肌利竅，使痘上升，多服則泄元氣，以致表疏，痘必虛枯空壳。

**紫草**　解毒涼血而滑大腸，多服恐成溏便。

**白朮**　健脾養胃，其功較勝，乾將初發，恐其澀毒起脹灌漿汁，是以初中皆忌，惟漿清收靨時宜用。

**蒼朮**　去濕辟邪，多服則潤澤之氣不行，痘必難以行漿。

**猪苓茯苓車前木通**　皆利水滲濕之藥，升水之時皆忌用，痘之前後則宜。

【柯子】【龍骨】【枯礬】皆能阻塞肌竅使毒不得外宜雖堪止泄然亦不可多施

【大黃】蕩滌汚穢消耗胃氣雖遇寔熱不得已而用之然亦不可輕試

【只殼】下氣寬中多用則損中氣能令泄瀉惟初發可用起脹收結俱忌

【生地】涼血潤腸虛者恐生泄瀉

【乾葛】退熱解肌多用恐致表虛而痘瘡不長痘出忌用

【山查】消滯解結始終可用然多則恐致內虛

【麻黃】走泄發汗慎勿妄用

【砂仁】和中寬胃多用亦能散氣

【參芪】皆補氣助火虛症則宜若熱甚者誤投之則毒愈盛而血愈熱矣

【桂附】有回陽之功寒戰咬牙用之效捷若寔熱而妄用之則必立變黑啞矣

此藥品過用之弊又爲諄諄致戒也。

關藥宗訣入

病因經絡傳變藥有佐使君臣然驅病猶如驅兵用藥亦當用兵故一方之中必以何者爲主帥何者爲衛餘何者爲鄉導何者爲護衛紀律分明井井有法然後可以驅病也[illegible]

至於倉猝顛頭之利往往不依分兩藥之貴者方雖爲[illegible]亦必少藥之賤者方雖爲佐亦必多施君臣倒置佐使不分其藥安能中病乎及藥之不效祇咎醫人自醫者亦狐疑莫決反欲更方豈知前方對症乃咎爲藥室之誤哉更有惡者或稍中本缺其藥又模糊答應以假爲真有南星而作附子松香而作琥珀者不啻暗箭傷人雖獲其利神必殛之嗟人當用藥之際生死懸于旦夕而猶忍以假藥而圖人之利是可忍也孰不可忍也奉勸藥室思藥爲救命之需必地道得所炒製得法其方若來必依分兩雖重索藥價亦不爲[illegible]

痘原賦

痘本胎毒號曰天瘡傳染雖云外感輕重豈不內傷初起太陽壬水並乎丙火後歸陽明血水化作膿漿所喜者紅活滋潤所畏者紫黑乾焦勢若燎原變如反掌皮膚焦爛血氣枯槁救焚兮徙薪勝於焦額似拯溺兮落井不暇察原夫一元肇起二氣成形慾火積爲痘種胎毒發爲痘瘡命門發原稱毒深藏遇天行之疫癘觸胎毒以爲殃邪氣出於臟腑兮發於肌膚三火相扇四大成瘡毒之輕者貴善調護毒之重者急要良醫先事解散兮十全八九臨時區處兮[illegible]大抵氣[illegible]陽春是爲順兮樂其生長秋冬爲逆兮惡其收藏[illegible]邪毒之機關寒熱兮虛實理之開張水泡灌而[illegible]

夏而爲殃秋痢處甚冬疹非痧此逆四時之令休誇三世之方知其因而治之自求毀謗明其古而往也得號賢良且如諸症（論經絡）殊形六腑異樣肝主淚而水泡肺主涕而膿瘢心藏紅斑脾疹赤黃惟腎經之症險若變黑則危亡觀其外症即可知其內臟呵欠煩悶兮肝木之因咳嗽噴嚏兮肺經之發手足稍冷而昏睡兮脾土困於中央面目帶赤而驚悸兮心火炎於膈上耳尻屬腎溫暖如常二處灼熱水枯火炎而必發四肢厥冷中州土敗而傾亡先分部位次察臭穢陽明佈於面中太陽形於頭上心神屬胸膈之內肝胆主脇肋之傍手足司乎脾胃腰背統乎膀胱外症分明用心想像泄瀉者邪趁乎下嘔吐者毒逆乎上

氣逆而腹痛隱隱毒甚而腰痛怏怏心熱甚而驚搐肝邪盛而癲狂口燥咽乾肺受火邪而液竭尿澀尿濇腎因火旺而精亡氣弱少食者難勝其毒神強能食者不失其常如決輕重但觀發熱若占順逆須認纔身如炎火必然毒盛微微潮熱休試（論症）清涼若乘熱之往來定爲吉兆熱一日而即出必爲不祥若旋出兮春回陽谷一齊湧出兮火烈昆岡齊嚙鼓咬刻則而爲鬼錄蛇皮蚕殼指日而反黃泉不齊未紅頂嫌灰白根宜者蠅切忌紫黃色要明潤又恐嫩薄之易破痒怕乾枯更防搔痒之難當而頗稀而落落滑安可保胸腹密而難出吉因難稱而要災猖切忌平將漿宜飽滿攝於空殼稀若老而愁嫩皮要相恰

痘光焰起根窠終防癍爛丹浮皮肉必主殃傷頭面預腫兮三陽凡甚手足厥冷兮五臟俱傷瘡堆喉舌兮纏頸項咽喉痛而呼吸維艱飲食少而吞吐不易此天命之必辦豈人力之可扶煩燥悶亂兮七神離散譫妄啼哭兮五毒并侵鼓頷戰慄兮肺敗咬牙嚙齒兮胃涼渴不住兮焦膈泄不止兮滑腸失聲兮咽爛吼氣兮腹脹晝夜搔痒兮將發氣之外脫飲食斷絕兮必胃氣之內傷忽陷伏而毒入內攻色變黑而疔起將亡食穀則噦兮斯人懼其將喪飲食則嘔兮醫者難投其長輕重旋而反復由調理之乖張輕變重而可畏重變輕而莫慌風寒柔謹飲食如常出入禁乎男女覆蔽適其溫涼內無妄動治不乖方此則

變輕之候實爲保命良方若或常犯乎禁忌亦或誤服其光湯徒自失其防術不知順其陰陽外感不正之氣內傷不時之糧平人且病犯者勢當無怪順則陽兮陰則逆宜乎輕者重而重者亡發自肺經相傳脾臟氣熱味辛燥金受尅形寒飲冷華蓋先傷消飲則水來傷土而或瀉痢過食則脾不消穀而作痞脹皮毛虛損肌肉羸傷遲發延而不能胖壯收靨緩而久作爛瘡輕則延綿乎時日重則流迯乎郊荒何愚夫之不曉致生死之早亡不信醫而禱諸神鬼祗殺牲而號乎穹藥要中病醫不（論治法）執方專行溫補者動稱乎文中專行清解者輒述乎仲陽孰知因人而治毋偏虛實是寒相時而行必遠熱必遠涼正氣爲之

我閉門而延盜，解表爲急，休視虎而如狼，首尾不宜汗下，總之要畧必急，各有權宜，治之經常，執其纖器者，如守株而待兔，藏於方書者，似多岐之亡羊。且如紅紫掀腫兮，涼血爲上；灰白平陷兮，補氣爲良。出不快兮，其表寔而發散可用；便或秘兮，其裏實而疎利何妨。毒不可以速散，毒盛者，令微汗之發越；熱不可以盡解，熱劇者，使小便之清長。三陰盛而多寒兮，必按羊執三陽盛而多熱兮，無過苦涼。安可惡寒而喜熱，或執貴陰而賤陽。（附藥）是故補氣者參芪白朮，養血者歸芍[illegible]表邪，輕柴葛而重官桂。疎通莫貴枳殼，而甚大黃，[illegible]芩連，枝子快斑兮，牛蒡荊防，逆喬瘡中之要藥，甘草藥中之君王。咽痛求諸甘桔，

頭痛取乎芎防，木通利其小便，人糞救其黑陷。氣逆兮陳皮青皮，胃寒兮丁香藿香，泄瀉莫如柯蔻，嘔吐無過乾姜，麥冬乾葛以止渴，厚朴腹皮而治脹。五味杏仁，傷風者以之定喘；山查只實，傷食者用之消導。良工司命，推測隱之仁心；神乎奇方，起沉痾于反掌。其諸藥品，各有主張：春夏桂枝而少服，秋冬芩連而莫嘗。瘡若乾枯，白朮爲其所忌；色如紅艷，黃芪非其所長。裏寔少食，勿投只寔；表虛多寒，莫用羌蘇。汗自出兮，休用乾葛，以虛其表；水自利兮，莫加木通，再斷其腸。泄瀉黃臭，勿用柯蔻而濇止；嘔吐清冷，豈堪枝連以爲湯。凡用芩連，必須炒製；如加丁桂，必症在寒涼。應制伏，始不爲過；得和平，乃是良方。大執君平餘

邪須講氣流注，慎睛出。發火邪入脾，四肢成瘡爛，皸破舌瘡，胃敗腸（涼後）洗浴太早，因添餘熱，肥甘太過，遂致內傷。若中風寒，多爲咳嗽，無時搐搦，復灌喉痰。既多異症，亦有奇方：望月砂能退目翳，川山甲拔毒無雙，只寔山查消食力，積柴茯骨皮退熱，清涼咳嗽以款冬、杏仁，痂疾以黃連、木香。藥難悉載，因病設方。惟此症候毒非尋常，如蛇退皮，如鱗在傷，淋漓噴血，其奇與常，治之若緩，立見妖亡。但拘于日數者，不知輕重之病；執其偏見者，未察虛實之詳。本溫再熱，已寒又涼，徒自膠而不變，是醫治反增殃兮。也溲骨髓之眞言，非子孫而不示；授肺腑之秘訣，牢記誦而勿忘。

## 臟腑虛寒見症

寒熱往來　惡寒　自汗惡風　面色青白
唇舌淡白　手足厥冷　眼白帶青　目閉無神
斑色青白　倦怠嗜臥　二便清利　吐瀉不渴
口鼻氣冷　飲食不進　乳食不化　聲音微弱
精神困倦　體靜昏睡　哯乳便溏　痘勢不振
痘色淡白　平陷色灰　痘軟不硬　舌無黃苔
咬牙寒戰　吐瀉蛔蟲　痘不起肥　尿清如絲
脉浮細而速是表虛　脉沉細而遲是裏虛

## 臟腑寔熱見症

面赤腮紅　大便閉結　小便赤澀　身體壯熱
毛焦膚燥　手足燔灼　唇紅而紫　舌苔黃黑
心悶口渴　驚悸狂譫　口臭氣粗　大便焦黃
腹脹不食　時作乾嘔　目紅頭痛　眼結淚漿
胸膈痞滿　咽燥喉痛　咳嗽喘促　上下失血
鼻乾氣熱　唇舌破裂　痘色紫黑　焦枯不潤
夜叫不寧　脉浮數而寔大乃表熱也。
脉沉寔而洪數者裏熱也。

### 虛症似寔

夫元氣不能送毒。大熱因而不退。亦有煩悶之處而發譫語之

症。且毒發于中。亦不能閉結。元虛毒盛。豈敢攻下清涼。然此必痘色淡白。隱隱皮膚之間。昏昏內閉而神不振。急宜扶元頂拔。待痘出而諸症自寧。又或虛火上炎。口渴喘急。此必起於泄瀉之後。津液乾枯。故喘渴耳。況灌膿之際。作膿必發身熱。摠膿必致口乾瘡腫。必然啼叫。此不可認為寔熱。其後發痘而亂心神不寧。或有狂言譫語。此症定為虛論。亦或女子經痛之候。男子房勞發痘。陰虛火動。大熱顛狂。俱不可云寔熱。宜痘後陰虛發熱。必出于午未時候。此皆屬其臟腑。宜詳悉以推求。庶不至於有悞。

### 寔症

夫熱盛內蘊。亦日閉昏沉不思飲食。火伏中州。亦四肢厥冷。終日神迷。然此必二便赤滿。舌有黃苔。治用清解。開提毒出而精神始暢。至于毒攻胃管。必為嘔吐。熱注大腸。定然泄瀉。此非脾胃之虛。是乃毒火內擊。以致吐瀉交加。豈敢溫脾燥胃。且毒壅則痘出不快。血熱則痘不升提。必解毒而痘乃出。涼血而痘乃升。又有毒凝血滯而痘不紅者。悞投補藥而反焦枯。必清毒活血而始紅潤。況六日以前。發戰多屬肺熱。四五日內。咬牙非是胃寒。要之寔似虛者。痘色終紫。舌有苔而小便赤。必在七日以前。總以清解為主。若至八九日來。則臟腑空虛。斷不敢云寔熱。其後收靨之際。亦不可謂純痂。此際宜有餘毒。因人而治。慎勿

差訛。

### 虛症變寔

氣虛痘症。用藥對症。調理得宜。則元氣可回。腠理可閉。脾胃可健。飲食能進。二便能調矣。若補益太過。恐有腹脹喘急之患。只宜消導積滯。行氣寬中而已。便寔而渴加麥門冬。或有咽喉種痛。煩燥閉渴之症。亦宜利咽解熱為主。蓋痞急腹脹。大便秘結。煩渴咽痛。皆寔症。然氣虛變寔者。非原寔也。乃病淺而用藥過深之失。只宜畧解。不可疎通。此際若復疎通。則方生之氣又虛。其復虛矣。

### 寔症變虛

瀉熱痘症只宜清涼發散不宜峻用苦寒若過用苦寒必致內傷脾胃外冰肌膚脾胃傷則飲食減而中氣損內臟遂致虛寒肌肉冰則血不行而痘不得成漿痘遂轉爲陷伏此熱症之所以虛也虛症既見當從虛治勿誤前之實熱而終不敢補也

表裏虛實寒熱

夫肌肉皮毛以著於外身之表也腸胃臟腑以藏於內身之裏也表者痘瘡所著現之處爲運化成功之地不可以不調也裏者痘瘡發端之所爲根本滋潤之區又不可不治也然爲表爲裏各有虛實之異寒熱之殊若不分而別之晰而明之恐紊亂倒置用藥不當以貽學者之悞是亦余之咎也故條陳而分晰于後

表虛調治法

夫表之虛者必畏寒畏風瘡淡而青精神倦怠手足水冷其痘出不快亦不起發灰白不紅痒塌而不得乎痘塌玉色不分其後皮薄而軟潰爛成坑或爲水泡而難結痂皆表虛也蓋脾爲肌肉之主肺爲皮毛之樞治此之法在乎脾使脾肺旺用升陽補氣之藥內托是得其宜當此之症清涼發表最所忌也

表實調治法

夫表之實者痘瘡突綻肌肉疼痛舌有黃苔而赤唇燥毛髮直豎皮膚乾燥總無微汗如此之症皆表實也表實則腠理不通壅其瘡毒治宜解表鬆肌而升葛柴芩乃爲對症之藥若誤服黃芪白朮則始也慮其閉毒在內則不能起發終亦難於收靨爲害可勝言哉

表寒調治法

夫表寒者痘不起頂肌肉不秘毛竅屢開自汗時淋戰慄時作咳嗽惡風常謂身寒皆表寒也此必肺氣有虧肌膚不堅氣血怯弱所至若置之不治則外體不壯氣血寒凉何以運化痘瘡而成膿乎其發淸皮薄灰白水泡之患遂于是乎至矣宜湯煎以固表和中之劑倍加黃芪肉桂而後庶無虞也

表熱調治法

夫表熱者腠理素秘熱氣鬱滯于肌肉故潮熱不退面赤唇紅血紫而瘡焦于枯而無水含此不治則紫黑乾焦餓殼空殼之弊至矣然表之所以熱者亦其毒火薰乎肌肉治此之法雖在解表清肌亦宜凉血解毒毒清血活熱退而痘自安寧故柴芩升麻紅花紫草諸藥所以不容緩也

裏虛調治法

夫裏虛者脾胃既虧元陽不旺其見症也飲食少進大便頻泄小便清利精神困倦口鼻氣冷多好睡臥懶於應對此裏虛也其裏既虛則內氣不能送毒其痘必不起發雖起發而頂必陷塌[illegible]瘡必軟而漿必稀若不速治其平塌倒陷之虞[illegible]

而立至矣見此之症而內托之劑在所必用凡參芪朮肉桂姜附諸品萬不可以缺也

### 裏實調治法

夫裏實乃是痘之根苗乃因其飲食如常大便堅小便利而精神清爽者此脾胃安和裏氣充足而痘必能成斯固不必慮也第恐裏實而有積滯以致蘊毒于中氣熱作渴咽乾舌燥煩悶不寧譫狂譫語躁煩氣促上下失血此寔臟曾留毒火不可不急治也急宜涼血解毒以瀉其火而後可免倒紫黑陷之危凡助脾補氣之藥萬勿試焉斯可耳

### 裏寒調治法

夫裏之宜溫而不宜寒不待智者而後知也蓋臟腑寒涼則充內之空虛已甚況痘以陽旺乃升氣溫乃化裏寒則難升難化勢必下陷不亦危乎裏寒之症其氣必涼其便必泄而青唇白手足厥冷寒戰咬牙不思飲食痘色灰白伏陷不起見此之症猶如振溺急與溫中內托之劑而並加以桂附丁香之藥庶可救其危也倘袖手旁觀不幾坐視其斃乎

### 裏熱調治法

夫裏雖畏寒然亦不宜熱也然若臟腑本多鬱火而毒火又且客留故煩渴腮紅腹熱膨脹不息小便為之赤澀大便秘結不通譫語狂叫如見鬼神以致火熾陰枯火炎血紫而其痘也亦爲紫黑焦枯而不能灌汁矣治此之法急宜滋陰解毒然陰盛則火息毒解則熱除若熱結太甚則與通利之劑此喬芳芩連歸芎赤芍紅花紫草所急宜進也然裏熱而寔猶可任其清涼若裏熱而虛則以扶元而兼化毒之方權衡輕重慎勿妄施總而論之裏者表之體而治表亦要和中表者裏之用而治內又當防外故外氣疏通則裏邪得出內臟堅固則外寇難攻至于寒者虛之甚虛者寒之由治虛寒總宜補益但寒症宜加暖補而後可建奇功寔固能滯毒火熱固寔而益炎治寔熱俱要清解至熱結宜加疏利然後乃能安枕隨症加減方謂良醫

### 汗下論

夫汗下之說治痘之家紛紛不一有謂首尾不宜汗下者有謂首尾宜于汗下者其說不同然皆各有所見也謂不宜汗下者以爲汗以疎表下以傷裏方發之初用藥發汗恐表虛而痘必至於皮薄漿清而不堅硬發痒潰爛水泡灰白以貽日後之禍故首不宜汗也用藥而爲之下瀉恐裏虛而痘必至于伏陷不起咬牙寒戰吐瀉不食而有倒靨之虞故首不宜下也若結痂之後則氣血已衰元神已損尤宜表裏堅固倘或汗下則變症立生危如累卵此不宜汗下之意也宜于汗下者謂汗以鬆肌表下以瀉毒氣痘毒方張之際若腠理緊秘則毒氣不宣必至煩悶壅結稠密不堪熱亦閉而錮痘毒極之禍遂于是矣倘

表發汗則邪從汗解而毒不鬱其出亦快且腠理開泄毒氣易透矣則痘出亦稀界地亦分此首之所以宜汗也至于毒氣在裏秘結不通小便赤濇腹痛煩渴若不速下則邪熱鬱留于內腑其痘必致焦紫乾枯腹脹失血喘急痰鳴之患不旋踵而至矣此首所以宜下也若至于尾須防餘毒風寒外搏非汗不散餘毒內留非下不除此尾所以宜汗下也以總論之痘性原欲外化非可在內而消當毒氣發越之時若腠理不秘身有微汗則毒氣得宣最為順症原非表虛不可用黃芪斂汗之藥而預固其表倘身熱燎人唇紅面赤毛髮焦豎而身無微汗則肌膚壅滯慮其遏毒不得不以升麻乾葛參蘇解表之劑急以疏其壅

也但不可用麻黃羌活之湯猛以攻其表耳但既汗不宜復表復發則必傷元故見點忌用乾葛者亦恐過于發表已若痘後元氣已例無故斷不敢汗縱有風寒微熱只可溫中帶發補中益氣湯宜其如痘前吐瀉俱是毒氣外越此際不宜驟止痘由而吐瀉自寧若是熱客留臟腑必有秘結之弊須用解利之藥加酒製大黃通瀉滌腸胃而已慎勿用破氣衝陽之猛藥以圖一時之效而不顧其後也若小便順利腹不脹痛痘色不紫雖大便秘結亦不敢用大黃參嘗見有八九日而不便者余皆不顧六七日前只用清毒活血之方至八九日間純用補藥而大便乃通者往往然也戒之戒之慎勿輕示若痘後作泄其毒盡瀉

則餘毒因之而解亦不可以驟止如腹痛膨脹只宜消導亦不敢用下藥蓋恐誤投藥餌殺人而不見血醫者可不慎乎

## 氣血論

夫人之身氣血為主故五官百骸氣無不充血無不潤血居于前氣推于後遍體周流循環不息此常數也至發痘之時則血以載毒氣以送毒必氣血兩旺然後能送毒出而不少留于臟腑及痘毒現于皮膚其高起者氣之充也紅潤者血之附也故痘之尖圓則氣盛痘之紅活則血足氣血充足乃能運化毒氣其灌漿成膿亦自不必慮矣若氣或不充則痘必頂陷而痒皮薄而軟斯元氣不能勝毒毒必倒戈內攻雜症由是作矣蓋

自汗則元氣已敗寒戰則肺氣已衰咬牙吐瀉則脾胃之氣又虧若至平陷倒靨腹脹痰鳴其毒已攻臟腑雖補益亦自無功是以智者決機於先當痘發之初雖解毒亦恐傷元既出之後貴扶元而兼化毒此抑邪助正理所必然若毒已出外虛臟腑空虛固宜補其元氣且真元壯旺方能剋化成漿至于血也者氣之臣也如灰白雖屬血虛然補血必須補氣頂起而痘乃紅腳潤是為血散然斂血又在扶元蓋氣旺乃能統血血陷雖是血盈然氣充而血自降此養血所以必須補氣也但氣宜行而不宜滯血宜活而不宜凝蓋氣行則毒由氣滯則毒留血活而毒氣易化血凝而毒氣愈狂故為慘暗為紫黑為焦枯推其血

之不活也。然其血之不活者，亦由毒火之熾而燥氣滯所致，不能活也。治當以涼血解毒為佐。倘痘色淡白，則為血虛，宜以補血為君，而稍加之以活血為佐，則血又在觀形察色。但六日以前痘未熟須解毒未盡，故涼血之劑不禁兼施，亦不可損元補。七日以後痘血弱氣虧而毒不化，故補益之藥在所必投，亦要辨其虛實，斟酌合宜，庶無後悔。

論四時調治法

夫天時之變遷既異，則人身之感冒亦殊。治痘者又不可不明時令也。昔人謂春夏為生發之時，陽氣在外，此時痘疹得其時令，故多順症；秋冬為肅殺潛藏之氣，陰氣司令，此時發痘氣不陽和，故多惡候。其說似也，而覺不然。蓋痘發氣流行莫之致而至者，豈得候時而生乎？況五行各有生殺之機，四時恐有不平之氣，如春傷于濕，夏傷于暑，暑濕之邪皆能遏鬱痘氣。故治之之法，春必祛寒而去濕，夏宜解悶而除炎。且木旺兆于春，又宜防嘔吐；火炎土燥夏，又恐生泄瀉。況陽氣發洩，而衣被不宜太厚，恐鬱火毒于肌膚而有夾丹之症。至于秋有金風之虞，冬慮大寒之可風襲，所凝毒何由宣？治此之法，秋則宜于解表，冬宜力去寒邪，且顧護宜慇，更慮中寒而生他症，飲食宜熱，勿令臟冷而有他虞。因時致治，賢者能之，勿執一律以相施也。

余于夏季治痘，凡益元散、無價散、人中黃之類，必預備隨身。其燥烈之劑，必斟酌而後用也。冬季則備人牙散、桂枝羌活，則常用之。且嚴寒之時，痘後必多風疾，皆父母保護之失，又不可不謹也。

治痘宜審各方水土

夫四方之水土各殊，故人生之氣禀不一。西北性剛，東南性弱，北人多肥大，南人多瘦小，皆其水土所致也。且水土熱，則人性亦長熱；水土涼，則人性亦長涼。余遊歷郡邑，所經非一，地所治幾何人，往往見宜于此而不宜于彼者，即數里之隔，其人性禀勢迥不相同。此醫者之至其境，又宜觀風問俗，因地制宜，庶不至于差謬也。

輕症歌

根窠紅活參差出　熱緩神清痘少稀　四肢温煖無寒熱
乳食如常渴瀉除　太陽兩頰俱光潤　手足稀落似明珠
更兼頂頂心胸少　但宜保護不須醫

重症歌

初熱一日即便出　稠密鮮紅減飲食　渴煩泄瀉頭面多
紫黑夾斑二便秘　平濶灰白欠光明　亦有腹脹水泡濕
遇此重病須預防　莫待臨期有疎失

逆症歌

熱極腰疼發一齊　昏睡沉沉不飲食　一齊湧出似紅赭

黑陷藍斑皆不治　斜視皮膚痘若焦　頂似鐵錢如黑漆
面肉先腫目無神　腳冷如冰冷過膝　無分肌肉一般紅
聲啞唇焦言不出　水疱痒塌與空瘡　牙疳臭爛開不得
寒戰咬牙痘後驚　目閉神昏無魂魄　身如熨斗熱燎人
痂若竹衣旋鬼卒　便下膿血亦難醫　吐血尿血均死迫
此等逆候時數終　縱有仙方醫不得

### 死症歌

初出之時即焦紫，發癍之症五日死，初出滿頂連肉紅，七八九日氣絕終，癍有青紋六日死，痧青頃刻入陰中，痘如湯潑勞無縱，損不得手亦難療，若加湯泡及火燒，十日痒塌死難饒，痘出

腰腹痛煩燥紫黑乾焦口臭死，頭面一片似胭脂六日以後死何疑，面肉浮腫瘡不腫，面突胸高總不治，痘白面光腳不紅，久後抓破出無膿，無膿痒塌十二朝，有淡血者猶可治，如麻無縫痘不好，聲啞氣急命歸陰，若是濃燥痘光彩，傷風聲啞亦無妨，或是啼哭咳嗽啞，痘好失聲也不怕，無膿痒塌失聲音，已入黃泉兒卒林，舌捲囊縮目無魂，飲食搖喉命不存，紫泡刺出有黑血，便中腸垢命將絕，若還吐瀉不能止，蛔蟲滾滾死何疑，未出痘已聲音變，完痘後驚齒肚脹，痘出三日猶不起，紅腫如瓜君莫治，頂陷有眼似針穿，痘如紫黑萬難全，根窠紅紫血乾燥，全無起脹內攻燒，伏陷腹脹不飲食，神氣昏沉不可治，恐子不發

---

總難醫，悶亂不寧兼黑陷，目睛上吊死來斑，瘡膿乏時纏清瀉，縱然好看亦難醫。泡內乾枯無血水，鉄殼空瘡何可治，二便若還俱出血，此名內潰真元竭，乳食不化痘潰爛，此爲外潰痘亦凶，腹中脹滿肌肉黑，縱然醫治也無功，當靨伴塌多膿血，皮如血殼乾即絕，寒戰咬牙兼噤口，手足顫掉歸陰走，目閉腹脹冷過膝，縱有神丹也不治。

### 七症不治

一戛齒黑陷痰喘。二增寒困倦痘陷。三爛成坑痘無膿血黑泡。四痘疱變膿牙疳齒落。五聲啞氣喘腹內和鳴。六痘初出半在肌肉帶紫黑色。七蒙頭鎖頸喉痛宮背舌上生疔。

### 辨痘吉凶

咳嗽非爲吉　驚狂豈是凶　頭痛爲常事　手戰莫言風
腹痛須防瀉　腰酸腎已空　聲啞應難治　悲哭話相同
言清何用藥　喜笑自無凶　狂言譫語妄　忽見鬼神蹤
撮口摸床席　施治也無功

### 惡症總訣

初起頂陷即帶白　氣血不充治不得　頂陷若還連肉紅
到了九日一場空　痘發血點帶紅紫　此症斷他六日死
若見黑癍三五只　癍青頃刻去匆匆　無膿痒塌十二日
腰痛煩渴皆不治　痘根無窠無縫線　舌捲囊縮痘歸泉

難痘而腫痘不腫　青色黑陷及無膿　二便滑利下陽塌

更有吐瀉出蛔蟲　此等皆爲不治症　任是神仙也没功

### 逆候

神氣昏暗　舌生黃苔、　飲食不化　形色青黯　昏昏好睡

吐瀉不止　風炎項頸　脣口硬腫　胸高而突　面腫鼻陷

目閉咬牙　鼻生黑色　頭面腫脹　足冷過膝　泄瀉不食

痒成倂塌　聲啞氣粗　飲食挫喉　鼻爛難開　煩燥悶亂

已發驚搐　出而復没　遍身瘡黑　瘡成麻爛

出痘壯熱不退　不時努力如大便　痘與肉色不分

### 死裏復生十症

痘成一片本難生　豈識玄門埋藥金　大陽熱點皆沖灌　狼虎寒內過難禁。

痘瘡本爲如蚕種　誰知方齊有明珠　兩頭頂陵非紅活　雖是凶危也可扶

痘瘡密布寬難醫　全無離症費心機。肺氣情分脾氣健。也能冲[illegible]破皮

痘來傷紫十分凶　兩面中間視委紅　若無泄瀉非焦燥　皆作扶自見奏功

[illegible]勝片是離元。胸背旋樞出更鮮　雖然多有難光象　究竟終可保全

身痘子多更多　自我意裏甚難過　細觀腮頰　相[illegible]

陽蔚本椅

一身痘色似爛皮　見者咸言不可醫。兩陽若帶桃花綻　自有恩光倚上枝

四肢痘塌不充肥。只有喉間美一圍、急宜專補脾元氣　也得收成紫上肴

痘中一等似退蛇。脫皮出血不成痂、隨他痛處隨他發。誰武抚裏有無差

痘中聲啞是難經。連着喉中細紫紋　銀針挑出分心痘　知聲揚命自亭

## 痘新書卷之三

濟邑張 琰逖先氏編輯
受業[illegible]曾衡汝全參

### 闢主家怨咎醫人

夫行術之家一經其手無[illegible]心將發熱時[illegible]不安惟恐症求不順晨昏懇祝冀外及痘出人皆順[illegible]不[illegible]偶或稍有險逆則已驚心動魄俯首發氣[illegible]所以若是者蓋以既膺其責勢難推辭雖其人之本痘若由我之所致將直言道險恐受主人之詬欲隱而不言又致傍人之誚悔任故耳之曰恨無靈妙之丹食不甘寢不寐恐為他人之呃愁哉

雖言猶如自己之危如是之際而猶責之則醫人之方寸易亂矣必有許術乎蓋識由膽張智從勇大心無恐懼則定靜存神識見自明許方自出症不可救之中而亦或可救矣昔余往婺邑江宅放苗三日一兒出痘形如蠶種勢不可療矣往視之直言其危宜另請高明醫治彼應余曰婺邑痘科無出先生右者先生束手他人豈能治乎病即不救亦不敢怨先生余聞是言一時憂懼頓釋明目張膽遂與精思治血托毒之劑藥可數劑至次早往視界地已清大熱已退痘皆起脹其兒竟愈也又千丁宅所下一苗痘色慘暗漸漸轉黑[illegible]血諸方用盡恐無見效其兒之父見余憂悶乃慰余曰此兒不幸乃吾之命耶則然

生之事先生不必罣慮余聞其言心中似開一鎖頓悟一方將紫草飲加人參與服痘色遂回其兒亦愈余又在饒山一兒昏沉不醒大熱不退諸藥無效往視其危症兒母乃曰我兒命滿非先生之咎豈敢有所怨乎余不覺一時心靈解悟與大成散一劑力為攻毒遂出臭汗一身熱退人醒其兒亦愈如是二三以示天下可見主有慰醫之言醫者自膽壯心靈因有神奇之術也況生死各有天數固宜自安于命醫有救人之志原無傷人之心為[illegible]其修短不安于數而嘵嘵致怨亦何益乎

### 論痘宜種

夫世俗之人道及痘症甚難其慎懼恐無措猶欲避之以免其禍孰知此本胎元之毒兼自先天無人不有其毒故無人得免其痘若遇天行疫氣傳染鄉閭則侵淫漸感毒氣必增況發熱之初不知是痘或失於調理為風寒穢氣所觸使痘毒過擁之或醫者誤投藥餌則輕者重而順者逆況痘疫流行古源不順則毒發不由經絡其間逆症恆多余行痘科數十年往往見種順者十無一死苗凶者十祇八存種痘之家醫人必取吉苗苗吉則痘無不吉矣且既種苗則發熱之初知是痘疹凡飲食衣被各思戒慎自可無冒風觸穢之虞而醫者時常省視亦自無誤投滯阻之藥思慮預防與提發散毒得外宣其痘出必稀疏

且建壇奉吳神明默祐其痘又必吉也故余遍歷諸邦經余種者不下八九千人屈指記之所冀救者不過二三十耳若天行時疫安有如是之吉乎是以余勸世人凡有子女斷不能免痘疹當時疫未臨之際宜預請醫人種痘斯爲最得計也若疫氣臨門方請人種恐癘疫之氣預染醫者固不敢妄種即種亦難收全美恐致爛額之驚故呈徙薪之策

## 辨苗吉凶

夫種痘之家全恃苗頭之吉蓋苗之吉者猶之紀律之師進必有序行必有方毒氣之發必由經絡次序傳宣故無一齊湧出之弊達之皮膚洩于毛孔各分道路毒發而出又無鋪聯蚕種

之處且毒不凝於血分而血自榮毒不滯于氣道而氣自暢氣血榮暢則痘必光潤起脹灌膿總無灰白紫黑之患若苗之凶者猶之烏合之衆進止無節尊卑紊淆毒氣一動不由經絡一湧而出不旂手足各無道路以致一片紅瘟又或密如蚕種且毒無所洩非紊于血必纏于氣而五陷痒塌之危不旋踵而至矣是以術家宜取吉苗愼勿妄取凶苗以致誤人而自誤也戒之戒之

昔吾一友在建邑種痘其初吉苗所種無不安泰遠近馳名後往東鄉人多苗少彼貪其利遂將天行痘苗兼而用之及其痘發險逆之症甚多妖折數十餘人怨尤交作夜遁而行不知者謂其流年月限之不利豈知皆取苗不正之過乎或曰彼取之苗雖是天行痘種然亦擇其吉者而取之何致不利余應之曰是年建邑痘氣普邑流行其間痘之美者乃其人稟賦本壯血氣又盛故痘乃佳竟是惡疫之極過稟素弱虛之人必形險逆之症故惡疫之痘萬萬不可取苗以自誤也種痘原無苛術但靠好苗而已特術家秘而不宜恐人識破而輕其術也學者切宜着意擇苗方不負余諄諄告戒之意也

## 擇苗秘訣

夫苗者痘之痂疵也大凡取苗要訪其痘之來路鄉間之中其痘吉多凶寡逆症全無乃往取之又要看其顆粒分明無蒙頭

鎖頸之弊頭面胸背稀疎出齊熱退漿足痂厚潤澤光明不藥而愈者其來路既正氣血又充毒化已盡乃佳苗也痘雖多亦是美種遍体四肢之痂俱好只要厚結光彩往取之時須囑其父母但其兒睡起即將睡衣數抖令痂落于席上檢取包固貯于身傍勿令洩氣若痂薄而白者苗路雖好然亦無力擇多不發若出齊猶熱者乃是險症其痂不可用痂色黑明者熱毒必盛其苗亦不可用惟赤色者上黃者次之切宜照記不可潦草而取以致自誤後悔何及

## 藏苗法

既取苗來用紙包固再納小竹筒中以蠟封其口勿令洩氣予嘗

晒干日中亦不可焙于火上須帶在身邊令其自乾且苗包須寫取苗月日蓋冬月之苗陽氣在內雖留三四十日種之猶發大半夏月之苗陽氣外洩即過二十餘日亦少發矣總之苗必以新為主新則氣盛十常發九稍舊則氣弱祇發其半再舊則無氣雖種亦不發矣若新苗少而人又衆則須兼舊苗而用之但吹苗時要多放些種之亦自能發

## 論苗貴新賤舊

夫痘本胎毒藏于脊骨第七骨節之中無以觸之則終身不發必因外面痘毒之氣沖到命門則氣類相求引之即動新苗氣旺一吹入鼻直沖臟腑故所種必發發亦必輕總苗毒不致逗

留祇為招毒之使而非助伊作惡也其症之來安不順乎故新苗之後七八日間發者其症必輕若舊苗氣弱不能直射命門此非特種而不發以致人之譏誚尤恐外毒容留臟腑反增內[illegible]毒之邪故放苗之後遲之十餘日乃發者重矣加苗後發者[illegible]重此皆用舊苗之過也學者可不審乎

昔吾一友在泰邑向余索苗遲之三四十日方去放苗其所種之兒祇十發其一值鄉中天行痘到其所種者陸續而發皆是逆症以致怨尤交作此用舊苗之鑑也

## 放苗秘訣

昔人種痘則以棉團醮其痂屑塞于小兒鼻孔之內謂之痘[illegible]

後因犯痘之家不肯與人則破痘瘡故取痘痂乳爲細末[illegible]放通關散少許合全乳勻用小竹管裝苗吹入鼻竅男左女右未吹之時令夫鼻孔然後將苗吹入又要使其頭面端正向上執管而吹不歪不斜直透竅中則苗無不到矣然苗太少則氣不盛亦種不發必多放些苗而苗又新則百種而百發吹入之時即將手閉其鼻竅片刻令苗吸歸氣道方妙

通關散　牙皂　北辛　等分爲末　或加雄黃亦妙

一凡種痘必先開小兒姓名觀其多寡然後乳苗蓋乳碎之痘易于走氣更兼通關之藥走而不守其氣尤易洩也故今日所乳之苗只可今日用之他日其氣已洩即種亦不發矣

一凡放苗必其門內無天行惡痘方可與之種苗若門內有痘必其症多險逆故請人種醫者苟不訪察而妄與下苗孰知其兒已沾疫氣之毒及痘發不順致咎醫人縱決西江之水亦難洗其冤矣悔之又何及乎余昔在泰邑有顏姓來請種痘余到其家未曾詳審即與放苗及放苗之後方言天行痘症已進門中二十餘日矣乃引余往視未進房門臭氣沖人形若蛇皮誠惡候也余始悔之亦無及矣後未出三日諸小兒盡皆發熱竟有身已熱亦來吹苗者其間惡症甚多不獲不任其責如拯溺救焚何皆全活其鄰宋姓則惡痘未入其門雖共日放苗而數十餘人悉無險症可見主家須[illegible]

到宅方去請醫種痘術家亦要訪無天行惡症方可與之放苗但痘毒傳染必在起脹灌膿之際毒化成膿方有腥氣傳人若初到門當發熱見點之時其餘小兒即與放苗則天行之痘未染放苗美種先施斯亦必皆順症故天花臨門凡請醫者不可遲延而行術者亦當審察慎勿冒昧施苗遷延觀望以自貽伊戚也

## 先觀小兒形色然後施苗秘訣

夫痘毒之發出自五臟是窠中之盜也發越之際邪正交爭而元氣壯旺力能逐毒則毒氣雖盛亦必退外而自散若元氣怯弱不能勝毒則毒氣愈盛勢必內攻以為殃凡人之內毒雖不

可以遊覘而小兒之氣血觀形察色自可立知未放苗時須察其顏色之榮枯榮則血盛枯則血衰觀其毛髮之焦黑焦則血枯黑則血盛且髮疏而嫩者氣多不足髮稠而粗者氣必有餘既詳毛髮再看顖門顖門闊者胎元未足而腦骨故爾難收顖門小者胎氣甚充而陽會所以易合且五臟之精華皆著于兩目神光烱烱則內精自足無疑瞳子昏沉則元神知其未足山根青者痰多體弱慣驚風而色青者質怯元虧多土瀉髮開路而直豎斷有疳積唇淡白而倦怠定作虛看聲亮而長丹田知其氣足音竭而促氣海自是多虧指有紫紋而浮起其兒驚熱必將宜腹有青筋而硬脹已有食積而當知提以壯其無[illegible]之

小方可與之下種元虧有病之輩切莫輕與投苗外此兒未滿週須慮根基未穩奶娘鮮乳亦防缺養之虞女子若過十四天癸已動須防痘發而行經男人若到十五慾火或張更慮房勞而洩損有孕之婦恐痘出而胎動難安孤身之孩慮風寒而偏淒弱草或腰不挺者其腎必虧膝常軟者其髓必薄偶見令人心怯即此便是凶機父母或出危言究竟終非吉兆過慎之家不宜妄種趑趄之戶切莫輕施此施苗之種訣余嘗屢試而皆然謹囑後賢宜從吾論

## 論要敬神

聖人嘗曰鬼神之為德也其盛矣乎又曰如在其上如在其左

右蓋鬼神皆天地山川之正氣或忠孝節義之英靈方可面不敬乎況司痘之神形于眉睫奉其教者是其弟子弟子於先師而敢或慢乎犯其症者是其司命司命之所臨而敢或藐乎故起壇必要敬謹謝神須要虔誠晨昏必要香燈茶酒祿祀化財壇上務宜酒掃潔淨不可花言亂語冒犯　神聖安奉水碗尤不敢動動則必不吉矣戒之戒之謝壇時要求賜香火將衣紙帶往謝壇燃化壇完則帶香火歸家奉祀則神之揃思必然默祐否則神不我庇焉能感護吉乎余昔在樵邑袁宅種痘主家不敬神明香燈俱無錢財不化忽一日壇上所存紙錢無故自燃衹化紙錢餘皆未燬後其家果不吉又于泰邑丁宅種痘有

入祭盜靈土香者其兒發痘自言腹中有三百蟲者燃燒熱者可當其兒貧斃皆神明顯聖之明驗也姑舉一二而示天下以爲慢神之鑒云

### 論兒避穢

夫痘瘡之毒乃受胎之際父母交媾男女慾火之凝而結成此毒也此毒之性其勢甚熾不動則已動則炎炎莫遏但猖狂於房幃錦帳之中畏縮于耳目聞見之地故痘毒之出一遇風聚穢氣所觸即倒戈退縮而爲內攻之禍是以犯痘之兒宜避之温和清潔之室禁忌生人來往腥羶穢汚之氣邪淫不潔之行梳頭跣足胎産婦經俱不可近古有遺訓不可自作勿訶余言之謬而不聽也

### 論痘發日期

夫痘毒藏于命門此先天之毒是固有之孽也種痘者不過以外苗而引其內毒耳吹苗之後其苗入腹由淺入深一日傳過一經要六日方到命門外苗相感內毒乃乃動至七日其毒乃發若八九日後而發者其苗氣弱而傳送緩故痘發亦稍遲耳七八日必發者乃常數也

### 起壇法

凡下苗後須選吉日起壇要備三牲及齋儀與供谷五味供奉神聖要紅布四尺在神位上掛彩將紅紙一張寫神位神位云

當壇童男童女姓名　要擇潔淨之室以建壇

### 寫神位法

當年恩主至德尊神

藥王會上前傳後教歷代神醫

左輔文班賢聖

行㾓童子調氣血

勅封九天　碧霞仙府至尊神聖痘元君

天府仙宮至慈聖母司痘娘娘　香壇下設發男女童某某奉

佑種郎君保安康

右弼武列神明

痘府宮中散花破脈解厄仙師

本坊社廟感應神祇

### 起壇總訣

一將神位安定然後焚香端拱叩齒三通乃誦曰

太極分高厚輕清上屬天人能修正道身乃作真仙日行三千里時登四萬年丹臺開寶座金母永流傳不可思議功德　謹

誦淨口淨心淨身真言曰

丹朱口唇吐穢除氛舌神正位通命聖神鼻神羅列却邪衛氣

喉神虎賁氣神引津心神丹元令我通眞思神鍊液道氣常存太上台星應變無停驅邪縛魅保命護身智慧明淨心神安寧魂其永久魄無喪傾靈寶天尊安慰身形弟子魂魄五臟玄冥青龍白虎護擁紛紜朱雀玄武侍衛吾身凶穢消散道氣常存急如律令　誦完復焚香三炷向門外請曰

天地神明日月三光虛空過往監察神祇年值公曹月值公曹日值公曹時值公曹五方奏事公曹爲弟子某傳奏到峨眉山頂四洲明覺禪師凡種痘洒痘諸位娘娘案前今據某省某府某縣某鄉信士某人等請弟子某在家佈放天花種子擇取今月今日今時啓建經壇虔備凡儀供奉神聖伏望聖衆高僊祥

雲下降經堂此間土地神祇竭靈升天逆風出入幽冥爲吾傳奏不得留停有功之日文書上請今具甲馬錢財伏望公曹使者即刻登程起馬化財。　再焚香三炷向內請曰

謹焚心香虔誠拜請大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩東方九壇九鳳破穢先師南方淨壇童子解穢靈官西方吞魔食鬼將軍北方降邪去穢眞君九江水府四海龍王清河混濁玉女前傳後教歷代宗師恐迎香壇金仙仙教助弟子神通爲弟子變化將房屋化爲寶殿紅布化爲五彩祥雲紅紙化爲蓮花燭光米斗　化爲珍珠仙子米千人食不盡萬人食不完水碗化爲東洋大海乘載三千變鶴香爐化爲香山一座香烟[illegible]變爲彩霧祥雲燈燭化爲明珠兩顆照退遠近邪魔來往人等化爲金童玉女伏望聖神爲弟子變化　化財。得望皆然後將水碗用雙手捧合盖于水碗之上存神定想默請余之姓字而祝曰伏望吾師降臨以助弟子然後將平指作劍訣書字號于水碗之中

[illegible]三台華蓋隱隱沉沉貪巨祿文廉武破輔弼正大光尊聖救穿鬼心破鬼腹開天門閉地戶留人門塞鬼路　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　（[illegible]）　書完字號乃念曰

道法本無多南城灌北河總書三個字降盡世間魔　乃手持水碗遶壇洒淨口誦心經一遍曰

摩訶般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無聲色香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦眞實不虛故

說般若波羅蜜多咒卽說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶　誦完則安水碗于神座之上戒勿妄動再焚香五炷向外請神曰

謹焚心香虔誠拜請峩眉山頂四洲明覺禪師菩薩下降香筵再奉心香虔誠拜請九天碧霞仙府至尊神聖掌痘元君九天天后仙宮至慈聖母司痘娘娘再奉心香一心奉請痘府班中行漿童子佈種郎君左千里眼右順風耳金花小姐銀花小娘左輔文班右弼武列三十六員天將七十二位仙官再奉心香虔誠拜請雲中得道三位娘娘隨駕龍鳳二船種痘邏痘看痘守痘表花散種娘娘扶瘡起水灌漿滿頂娘娘合船神王船頭稍公船尾水手撐篙搖櫓打旗招呼一切神祇光降經堂再奉心香一心奉請天宮種痘娘娘亮痘娘娘洒痘娘娘解毒神聖分顆郎君灌痘童子疎痘兒郎破厭星君解穢神仙下降經堂再在心香一心奉請　南無救苦救難靈感觀世音菩薩西方極樂世界阿彌陀佛北天鎭武玄天上帝金闕化身蕩魔天尊三元三品三官大帝邱王郭三位眞仙三天門下伏魔大帝關聖帝君張許二大元帥劉柳二氏夫人五通五顯靈官大帝妙吉祥如來再奉心香一心奉請藥王會上前傳後教歷代神醫本師傳下授書付訣眞人（姓）請余名　北降經堂再奉心香一心奉請諸位男童女童本命主照星君本限主照星君大小二運星

君大小二限星君年德月德星君日德時德星君貴人祿馬星君當年恩主至德尊神十二年王十二月將一全光降經堂再奉心香一心奉請本坊福王里社尊王境中古廟有感神靈門神戸尉井灶神祇中庭土地福德正神某　氏家堂先祖一脈派衍宗親上至高曾祖考下及伯叔玄孫合門香火有感神明一全請到香座請不周迎不足請動一神萬神來降一念感格于聖來臨伏乞群仙俯臨法座凡然後將香插於炉內化財爲諸神聖下馬錢財再焚香端拱朝上禮拜而祝曰

謹焚心香虔誠拜請峨眉山上四州明覺禪師高登寶座鑒納心香九天碧霞仙府至尊神聖掌痘元君九天天后仙宮至慈聖母司痘娘娘高登法座鑒納心香天宮種痘娘娘亮痘娘娘洒痘娘娘播痘娘娘行漿童子佈種郎君左輔文班右弼武列左千里眼右順風耳金花小姐銀花小娘三十六員天將七十二位仙官解邪破厭掌鼓搖旗列位尊神悉登寶座鑒納心香再奉心香一心拜請南無觀世音菩薩西方阿彌陀佛北天鎭武三官大帝三位眞仙張許元帥靈官大帝高登寶座鑒納心香再奉心香虔誠拜請天醫會上祖本宗師開法教主傳授眞人高登寶座鑒納心香再奉心香虔誠拜請當年恩主至德尊神本坊社廟感應神祇童男童女年月日時命限主照星君各登寶座鑒納心香再奉心香一心拜請中庭土地香火明神家

堂先祖流派宗親咸登寶坐鑒納心香請來諸神各安座位圓壺奉献執爵觴觴茶奉献献到娘娘聖奶前酒奉献献到天宮聖母前齋儀献献到娘娘聖奶前菓品献献到天宮聖母前香花献献到娘娘聖奶前三牲献献到天宮聖母前酌酒三盃通大道羣仙暢飲紫雲鄉弟子叅前不敢說於發酒後乃開言今據大清國某省某府某縣某鄉某村祈恩求種天花神痘信士某某等為爲男童女童某某等未出痘疹特請壇下弟子某在家術種神痘攝取今日開壇奉聖諸位男童女童各具長命保線投契錢財投拜在娘娘壇下。化財須多伏乞聖慈既許投契則未曾投契先問了既經投契即仙家兒顯禱娘娘賜其神

痘鄭疎薄種早起頂早灌漿早望收結得安康。志心皈命禮奉請天宮天奶娘頭戴鳳冠放毫光毫光朗朗照十方十指纖纖如玉笋兩眼雙雙羅痘瘡身穿鵝黃衣一領足下金蓮三寸長家祖原在四川住峨眉山上立道場七十二八行政令遍遊天下種痘瘡心中有毒心中解腹中有熱腹中凉踈稀金妝果結果前男童女得安康今日許下神仙愿金花表禮謝娘娘大悲大愿大聖大慈四洲名竟稱師書懺層詞讚。志心皈命禮奉請天宮種痘娘種痘娘娘降壇場手执一包珍珠痘遍遊天下種痘疹一更痘子踈踈種二更痘子稀稀秧三更痘子輕輕發四便痘子放毫光種得痘瘡功完滿解壇之日金花表禮謝娘娘。志心皈命禮奉請天宮亮痘娘亮痘娘娘降壇場手执光明燈一盞遍遊天下亮痘瘡一亮痘瘡天神降二亮痘瘡地神臨三亮痘瘡珍珠現四亮痘瘡放毫光胸中有毒胸中散腹中有熱腹中凉亮得痘瘡功完滿解壇之日金花表禮謝娘娘。志心皈命禮敬請天宮灑痘娘灑痘娘娘降壇場手执一瓶甘露水遍遊天下灑痘瘡一灑痘瘡出剛二灑痘瘡放毫光三灑痘瘡珍珠現四灑痘瘡收上漿灑得痘瘡功完滿解壇之日金花禮物謝娘娘。志心皈命禮敬請天宮掃痘娘掃痘娘娘降壇場手执拂雲箒一把遍遊天下掃痘瘡掃盡人間諸厭穢房中房外放毫光掃得痘瘡功完滿解壇之日金花禮物謝

娘娘。志心皈命禮敬請社令與城隍我今請衛衛經堂或有魑魅與魍魎盡皆驅逐在地方保得痘瘡功成日三牲酒禮謝尊王。志心皈命禮敬請地耀共天罡伏望移星皆轉斗懇求解厄賜禎祥保得痘瘡功完滿虔誠禮拜謝罡罡。志心皈命禮敬請某氏祖考及先堂我今請衛保痘瘡不可家神合外鬼不可引鬼入家鄉[illegible]娘娘宜敬奉懇勤保佑小兒而保得痘瘡功成後三牲酒禮謝家堂。請來神聖各安寶座千請千應萬請萬靈不請空中自應伏願諸位男童女童人人清泰個個平安有求皆應无願不從稽首皈依神祇鑒格。如此者皆要求聖稽

**解厭法**　將淨水一碗手作劍訣書左字號

乜㞢胆腦料灘穢囫圇圂[illegible]（書此字號於水碗乃持水噀酒向房中口中念曰）

消法本無多南坡漸北河訣書三個字除盡世間魔弟子發下佛水法水非水在天為天水在地為地水在吾掌中為起殺厭煞破厭聖水北水灑天天開灑地地裂灑人人長生灑鬼鬼邪滅諱按洞山玄虛晃朗太元斬妖縛邪殺鬼萬千中山神咒元始玉文持誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞邪魔束手侍衛我軒凶穢消蕩道氣常存

奉請金吒大聖者神威無比號金吒金吒頂上山頭火脚下威靈踏火輪大聖威光來作主此時變刻食瘟邪百般厭穢盡消

除謁有百累消災瘴化作摩尼七寶傳者有邪魔犯壇城殺伐生辰吐玉中頂禮金吒大聖者願發步步生蓮花惟願諸聖降來臨吾在壇中相泰請

唵齒金吒臨金吒僧金吒吾今為汝解金吒怨不為汝結金吒。

唵强中强結中結波羅會上有殊別一切冤家離了身摩訶般若波羅密解結解結解冤結解了前生冤債並前生冤債有冤仇此咒能令得解脫解了冤滅了罪願見當年龍華會龍華三會願相逢無上菩提心不退解冤釋結大菩薩消災釋結大菩薩南無阿彌陀佛

**解壇法**

解壇宜備三牲齋儀菓供金花表禮五對衣冠五身以整前願須焚香端拱朝上禮拜依起壇時向上請神云云請完亦依起壇時獻茶獻酒云云然後叙曰　某年某月某日某府某縣某鄉信士某某等延弟子某某左家啓建經壇佈延神庇托賴娘娘默佑人人清泰个个安寧。今當啓壇之日虔備凡儀叩謝洪恩志心皈命禮奉請天宮天奶娘娘。斑衣端拱坐經堂七十二人行政合遍遊天下種痘瘡穠得痘瘡功完滿。今當解壇之日虔備金花表禮謝娘娘。依起壇時志心皈命等一一誦請一一求筶乃祝曰

今此經功完滿痘果周全送聖歸宮留恩賜福回向佛法僧三

寶回向天地水萬靈回向當坊社廟香火明神佛慈力恩消禍患回光返駕鸞溪臺天曹升天界地府駕牛車水國送龍宮祖仙歸嶽廟家堂先祖土地龍神各安方位來有香花奉請去當齋語相傳錢財獻金玉廣無邊衣冠獻珠絡纓珠金花獻彩艷燦神仙凡儀滿案惟借火風傳傳到娘娘聖奶前化財及衣冠等又祝曰　仍祈香主以及衆信各人神魂高萬丈壽命得延長星辰光顯祿馬扶昌凶星退吉星臨一年十二月月月保平安三萬六千朝朝朝增吉慶家家添萬石之財戶戶納千祥之福門庭光彩宅舍興隆來時願降千秋之福去後播揚萬劫之災咒諸未兆全仗懺悔弟子自安壇以來言辭褻慢從語[illegible]

香燈不備禮貌不恭赦臣萬罪錫福無邊今弟子復迎聖駕到某處再納香花佈種神痘（或帶香火歸家）乞另發香火一令虔備起馬錢財伏望衆聖高駕祥雲一簪登程起馬。然後去其神位向外化財焚神位取水碗向外祝曰　水碗化為黃河大海香煙化為清河一條佈起龍鳳二船。船尾七長船尾七尺佈起清風五行兵馬送本坊福主送某氏門中三代男女一脈宗親送長生土地送在天還天在地還地泉位仙官各還原位弟子千里有求千里應萬里有求萬里臨來則留恩去當降福稽首皈衣伏惟珍重　化完財將淨水洒入火灰令人送于河中

二十四頂方

一腎經發痘初熱腰痛身如被杖皆不能俯或連尾骶骨亦痛者用雄雞一隻剖開雞腹取出腸肚即將燒酒一盃噴雞腹內放在腰上用帶緊縛限一炷香為度其雞即青臭不可聞犬亦不食連用二三隻其痛自止其痘亦出

二心經發痘忽然發搐症與急驚風同用桃樹皮葱子燈心三樣搗爛敷顖門肚臍及脚手掌心限一炷香為度則驚自解而痘自出又于手足合骨二處用燈火各灸一醮以祛散風痰

三小兒體性怯弱或因吐瀉之後其元愈虧不能勝毒托出變珠四肢厥冷似睡非睡眼中露白症同慢驚此危候也急用大附子四錢丁香壹錢乾姜四錢豉豆豉三錢小雄雞一隻一个搗爛再用燒酒略炒溫即敷臍上及二足底湧泉穴急換一二次其痘自出若有瀉加灶心土

四後生輩或失陽之症方其發痘欲出不出狂言亂語此痘毒不出鬱火攻心既不敢用清凉之藥以解毒又恐驟用補劑以助火此最難措手之症急用雄雞一隻生剖開腹仍以燒酒噴之敷于臍上其痘自出其譫亦寧凡欲補而不敢補其痘不能出者俱用此方即可立效此亦從外托內之奇方也切莫視為等常或遍身疼痛乃毒出腎經用黑豆一升煮

熟搗敷腰上即止蓋黑豆能解腎經痘毒也

五少年出痘或當色後誤為發散傳為陰症用新生雞蛋三个取白調乳服再灸煉臍火又扯起陽物離糞門各一寸灸七醮其陽自回

六女人天癸已動當出痘之際經水忽行一則懼其污氣相冲二則慮其血衰不能化毒此最為危險之候急取桃樹上寄生搗爛敷足底下湧泉穴三炷香為度經水自回痘亦萬全

七有孕婦人出痘激動其胎又不得下或胎死腹中而不能出此至危之候宜取路上推車子及其所推泥丸一并焙乾研為細末加威靈仙同研用酒調為丸納臍中將膏藥貼住三

痊香爲度其胎即下亦經水不動亦可以通

八孕婦出痘腹中作痛乃胎動也若不頂住一經臨產則氣血兩敗痘必不全急宜內服安胎散外用蓮蓬殼燒灰全性益母草亦燒灰存性各三錢艾葉三錢共爲末醋調敷臍中連換三次其胎自安

九少年出痘吐血衄血不止此虛火上炎血不歸經故血妄肆于口鼻而妄能藏毒出外乎宜取白蕻擂水服後將柏樹上寄生一兩山枝根去骨二兩共擂爛敷臍中連換三次其血即止若未止再用犀角地黃湯與服其症自愈

十痘當起脹之時忽然便血血既下崩安能起脹最危急也宜用地榆生大黃紅花根共爲末燒酒調勻敷尻骨三痊香爲度連換三次其血自止　又夾癍夾疹用土硃紫草共爲末敷口即退

十一肝經出痘大便下血眼紅氣粗丹痧滿面紫黑不起用白頸蚯蚓七條焙乾瓜蔞仁三十粒去油杏仁十五粒去皮尖藤茶調勻作餅貼臍一痊香爲度其症漸平連換數次各症俱退

十二肺經出痘滑精夢遺日夜叫哭咳嗽失音不省人事取新生雞蛋一個器開一孔去其黃白只用蛋殼將玄參一兩取汁灌于蛋殼之中用紙封固再將熟黑豆擂爛包裹蛋殼竝火中煨一痊香爲度取出令退火氣乃將玄參汁與服其音自清而嗽自止再用本經方藥治之

十三小腸出痘遍身發斑片紅片紫如雲如霞無痘出現不省人事急將雪梨與食又將芙蓉花川椒胡椒共爲末紙卷爲條蘸麻油用燈盞盛之照于被內覆蓋一時其斑自退而痘自現矣

十四胃經出痘咽喉閉塞或致失聲不思飲食上吐蛔虫下瀉惡血急將菉豆爲末以雞蛋白調之喉閉則呼于頸吐蛔則敷于臍上瀉血則敷于臍下其症自平

十五命門出痘鎖喉刺心煩悶不寧大熱不退用生艾葉一兩黑豆一兩白芥子三錢醋煮一滾爲度共擂爛作餅敷心前連換數次熱退心寧

十六腎經出痘尻骨疼痛日夜不寧用芙蓉根烏槙草共擂爛炒溫敷尻骨上其痛立止　尻骨即尾髓骨

十七時值瘧疾而復出痘口吐白涎咳嗽失聲用生姜切片包大附子煨再取姜汁和當歸生地白芍共搗爛敷臍中一痊香爲度白涎自止

十八痘見脾經甚爲美也然防禁不固致汗相冲痘不能發狂言妄語遍身痒塌抓破出血聲啞氣急此輕症變重也急用石羔寒水石射香硼金甘草共透煮去甘草渣又炭敲爲末

用盞調敷臍前其譫自止而痘亦起發矣

十九痘出太陽舌心黑口氣臭大小便不利而痘紅紫者用青黛、防風、全蝎、石羔、酒大黃合匀為末作餅敷臍中痘色自活。諸症自退

二十痘出太陰夾疵夾疹譫語無停又或誤服鹿血以致失聲用雪梨水磨象牙與服則譫定聲清而疵疹亦退其痘自出矣

二十一痘出而腆胸腰痛與叫不啻用豆豉一碗胡椒一錢共搗爛又將生姜四兩搗汁調匀炒溫敷于胸腰二處其痛立止

二十二痘出腎經腰腹絞痛吐瀉交作手足冰冷大汗如注此陰盛陽衰最危險也急用乳香沒藥人參各一錢為末作丸納臍中又將艾葉炒熱敷于丸上其症自平

二十三痘出不快煩渴悶亂睡臥不寧咳嗽失聲將艾葉一碗胡椒三十粒搗爛調水落過取汁蒸熱作餅放于臍中諸症自退

又或痘如麻子一片成瘤此為風痧非真痘也瘟風痧閉塞皮膚真痘不出故爾用芫荽子煮水洗浴再用猫爪筋燒烟熏之則真痘出而痒自止矣

二十四女人出痘經水忽至用老杉樹皮舊棕胎髮共燒灰

---

酒與服其經立止故名三灰散

以上二十四頂方乃書未載但種痘之家各視為秘傳然亦用之而有效者余故錄之以備急用

## 備要丸散　附用法

### 天保丸

羌活　前胡　法夏　陳皮　柴胡　赤芍　茯苓　川芎
只殼　厚朴　桔梗　蒼朮　升麻　乾葛　甘草　合洲

右方等分為細末以蔴合油調勻米糊為丸如龍眼核大用神砂為衣量兒大小與之治一切傷寒潮熱咳嗽驚風痘疹初熱用以發表鬆肌痘後傷寒則加生姜當歸煎水磨服行泄瀉則兼四加丸全服腹痛則兼消平丸全服

### 蘇解丸

防風（去蘆）荊芥　桔梗（用北）陳皮（去白用）川芎（各五錢）蟬退（三錢）前胡　乾葛
升麻（各五錢）黃芩（炒）紫草（紫草茸更佳）木通（各六錢）牛蒡子（炒去心）連翹（各五錢）
赤芍（八錢）人中黃（四錢）蘇葉　白芷（各五錢）羌活（四錢）天麻　花粉（各四錢）

右方共合為細末米糊為丸如龍眼核大用青代為衣量兒大小與之痘疹發熱一二日用之以開腠理透痘毒解汗以葱白引胃弱以姜引煩悶以燈心湯引有驚搐定心丸牛湯者兼于金丸此方驅風祛寒升提發表消痰化毒退熱行滯最為妙用但痘出後莫用痘後潮熱或餘毒或傷風俱可用

宜兼于金丸則發中帶補方爲得法平常傷寒潮熱亦可用

〔散花丸〕（又名清地丸）

防風　查肉　當歸　紫花地丁（各八錢）　牛旁　絲瓜（各七錢）　荆芥

前胡　青皮　赤芍（各五錢）　虫退　紅花　茯神　通草（各二錢）

人中黃（三錢）

右方共爲細末米糊爲丸如龍眼核大青黛爲衣此方祛風解毒凉血活血能使痘分清界地以免焦紫之患怯弱者以生芪煎水爲引

〔消解丸〕

連翹（去心）　牛旁（炒）　川連（酒炒）　只壳（各七錢）　防風　京芥　木通　[illegible]

前胡（各五錢）　桔梗　紫草茸　蟬退　川芎　升麻（各四錢）　人中黃（四錢）　麥冬（去心八錢）　玄參　黃芩（炒各四錢）

右方共合爲細末米糊爲丸如龍眼核大青代爲衣量兒大小與症之輕重與服治毒氣盛而出不快及出而稠密太熱煩燥三四日與服壯熱燎人者急宜多與出齊與用痘後潮熱亦用平常傷寒熱症亦宜用此丸清毒退熱升發疏滞乃初熱見點之要藥也

〔調化丸〕

生黃芪（八錢）　白芍（炒）　當歸（酒洗各六錢）　牛旁（炒）　連翹（各七錢去心）　黃芩（酒炒）

川連（酒炒各八錢）　防風　荆芥（各三錢）　桔梗　木通（各四錢）　前胡

紫草茸（各六錢）　紅花（酒洗）　大生地（用淨瓦焙酥焙乾爲末四錢臨時焙末如過一刻仍復軟矣）

人中黃（製法詳藥性部各四錢）　虫退（三錢）　查肉（八錢）　丹皮（五錢）

凡酒洗者須先晒乾方可合諸藥仝焙　此方本有人參六錢弱甚者臨時加用　右方仍合末米糊爲丸　此方清熱解毒扶元活血最爲化毒良方痘出稠密紅紫潮熱不退煩悶狂言一切毒盛之症非此莫能解五六七日熱未退者急宜多與必熱退毒清乃止起脹灌漿不用臨時痧後發熱亦必用此此方斷不可缺也

〔千金丸〕

黃芪（蜜水炙）　當歸（用身酒洗）　鹿茸（須取嫩血茸用酒炙酥）各一兩　白芍（炒）　川

川芎（各四錢）　肉桂（上好厚桂去皮）　炙甘草　山查肉　南木香　厚朴

白芷　丁香（各三錢）　防風　桔梗　川山甲（炒各二錢）

右方共爲細末將荔枝四兩連肉及壳濃煎水以入米糊爲丸如龍眼大本方有人參一兩臨時加用　肉桂丁香木香不敢過火切勿仝焙此方大補元氣善于攻毒排膿托漿之劑莫妙如此八九日不起脹與痘灰白者急宜用之蓋黃芪炙草肉桂丁香補氣扶陽歸芎鹿茸補血查木朴香胸行氣防風助參芪之力川甲入臟腑以攻毒白芷排膿[illegible]起漿之聖藥也

〔大成散〕

川甲一兩　人中黃一兩　明雄黃（各三錢）　硃砂（二錢）　麝香（二分）

右方共爲細末最能攻毒痘毒而熱不退及痘稠密乾枯焦紫不起者急宜頻服泄瀉者忌冷症溫酒送下熱症紫草燈心湯送下

### 異攻散

白朮一兩　茯苓（八錢）　黃芪一兩　當歸（土炒八錢）　陳皮（四錢）　半夏（四錢）　木香（四錢）　丁香（三錢）　豆蔻（去油六錢）　柯子（煨去核五錢）　肉桂（去皮五錢）

本方有人參一兩共合爲末治一切虛寒泄瀉灰白不起咬牙寒戰

### 無價散（治痘紫黑稠密一切熱症）

取無病小兒堅實之糞陰乾用火煅灰存性爲末每服一錢入片三厘又用紫草八分煎水調服弱者加人參三分毒氣雖盛者非此不能解其危

### 紫黃飲

人中黃（用甘草末入竹筒中封固其口合糞汁不能入乃浸於缸中浸五十餘日取起陰乾乃破竹筒取甘草末用此藥必須自製藥室所無）　紫草茸二味等分合爲細末治一齊痘色燥脂紅紫乾枯紫黑二陷離人中黃最爲解毒紫草茸能于涼血每服一錢用人參一分煎湯送下其痘色立轉紅活而漸起矣

### 寶發散

黃芪（炙一兩）　當歸一兩　白朮一兩　淮山一兩　白芍八錢　白芷六錢　肉桂（四錢）　木香三錢　丁香三錢　鹿茸一兩　川芎八錢　炙草三錢

右方合爲細末凡痘雖起脹而漿清灰滑淡水泡者急用此方甚者用人參煎湯調服此方補氣血健脾胃固表托裏晃膿漿之良方也

### 除泡散

滑石（飛過四兩）　白朮　白芷（各一兩）

共爲末凡痘有一包清水者是爲水泡若不急治必抓破潰塌而死急須內服實漿散以銀針挑破其痘拿去清水將此藥末摻之使之復灌膿漿乃吉也若痘有水泡卽宜挑破清水以此摻之若置而不治則雖有灌膿者不久亦皆變爲水泡矣可不慎乎如痘有淺爛流水者亦用此末敷之卽愈

### 拔疔散

胭脂米一兩　明雄黃二錢　共爲細末治痘疔賊痘

凡痘有獨大堅硬而紫黑者必痘疔血賊痘也若不急去能閉諸痘須以銀針剔破去其黑血用此藥敷其口卽愈

### 四加丸

白朮（土炒）　豬苓（各八錢）　澤瀉六錢　木通八錢　赤茯苓六錢　車前　牛蒡（各五錢）　黃芩（炒）　黃連（酒炒各三錢）　共合末爲丸滑石爲衣

右方分陰陽利水道清內熱解大小腸之毒火足止熱瀉之

良方也凡瀉小便短赤而糞黄且發渴射而出者是火瀉也　須用此方一服立止但弱者加肉桂肚痛而稀瀉者兼消平丸

**調脾散**（治虛寒泄瀉米湯送下）

白朮　茯苓（各七錢）白芍　神曲（各五錢）炙草　香附　厚朴

木香（各三錢）砂仁　蓮子　訶子肉　苡仁　查肉　豆蔻（去淨油各五錢）

陳皮（四錢）共為細末

右方健脾消積調肝行氣凡泄瀉糞清白而無聲小便清白瀉時消消而不臭或瀉泄者是虛泄也宜用此方與服虛甚者加人參

**九成丸**（治虛泄如神）

白朮（一兩）茯苓（八錢）豆蔻（去淨油）訶子（煨取肉）砂仁（八錢）

木香（四錢）龍骨（六錢煅用）赤石脂（煅）枯白礬（煅各二錢）共為末米糊作丸

右方補脾胃濇大腸善止虛寒泄瀉若前方不能止其泄者須用此方可以奏效痘忌泄瀉此丸不可不備也

**止吐散**（胃寒而吐者用煨姜引）

白朮　茯苓　砂仁　藿香（各五錢）半夏（法製四錢）陳皮（三錢）炙草

丁香（各一錢）共為細末

右方煖胃開痰飲食不納吐而無聲必用此方以止之胃虛甚者加人參

**消積散**（治腹痛如神）

川芎　香附（各五錢）蒼朮　蘇葉　厚朴（各五錢）藿香（四錢）砂仁

白芷　陳皮（各三錢）炙草　木香（各二錢）半夏（四錢）麥芽（六錢）神曲（五錢）

山查（一兩）共為細末

右方消積行滯祛風豁痰寬胸快氣凡有停食積滯而腹痛者一服立止平常積滯腹中有塊而作痛者以使君子煎湯調服打下蛔蟲其痛自安

**清肝丸**

白芍　胆草（各一兩）防風　荆芥　蘇薄荷（各五錢）菊花（五錢）蒺藜（四錢）

連翹　黄芩　辰砂（各四錢）合末作丸辰砂為衣

右方清肝退熱除眼中翳膜凡眼中有痘及痘毒入眼紅腫不開者用飯後服再將此丸磨研淨水濃煎以渣敷眼胞又用胭脂攪汁入藥水時時點入眼則痘毒不能傷眼矣○又祛肝風退潮熱

**清胃散**

石膏（一兩）寒水石（一兩）俱用火煅先以黄芩　黄柏　黄連

南星　貝母　藿香　甘草諸藥煎湯至藥水一盞然後將二石灰煅置藥水中取起晒乾又入藥水如是者數次乃取二石合為末加朋砂善治口瘡舌爛唇裂

**定心散**

第1017冊 續修四庫全書 第10 版正內

滑石（飛過六兩）　甘草（一兩）　牛旁　木通　車前（各六錢）　神砂（五錢）

先將神砂另乳再將諸藥研末後入神砂乳勻神砂不拘多少總以變色紅赤爲度。有力利膀胱瀉君火鎮心解熱用小兒心驚發搐者急宜與服小便若長其驚自退

鎮驚丸

天竺黃　膽星　硃砂（各四錢）　天麻（五錢）　防風（三錢）　甘草（一錢）

蓮肉（炒）　全蠍（去足各三錢）　花粉（四錢）　蒙石（色青而服過俱成金色者乃可用六錢）

琥珀（二錢有此固妙無此亦可）　神砂（一錢）　共合爲末硃砂神砂二味另乳將一半入藥一半爲衣作丸如龍眼核大以燈心湯磨金銀爲引治痘前驚風發搐其效如神

# 種痘新書卷之四

寧邑張　琰逊玉氏編輯

受業曾衡波仝叅

## 調理法（三條）

夫痘毒出于五臟。而必達于皮膚。一遇風寒穢氣。則退縮而歸臟腑。或誤服阻滯之物。則毒留而不外升。故小兒出痘當發熱之時。即宜置之淨室、謹避風寒、厭穢、節飲食。調理得宜。則逆變順。而重轉輕。否則輕變重。而順轉逆矣。爲父母者。可不慎乎。

一冬月宜避風寒。必須置于秘室。令其溫煖。然衣被亦不宜太厚。炭火亦不宜太熱。恐煊熱之氣。反助火邪而爲毒。太厚則毒氣難洩。又不可不知也。若夏月宜取清涼。亦不可當風中併或對之動扇。恐腠理開張。扇風一入。即能閉毒。是不可不慎也

一小兒初熱。則勿對行房。勿對梳頭。勿對洗浴。勿對濯足。勿對搔痒。勿大驚小怪。無故呵叱。凡行經女子、生產婦人。切不可近。或至郊野。積汗流背。身體污穢。亦不可近。禁忌生人往來。禁忌師巫邪說。禁忌腥膻臭穢之氣。禁忌蛇蟲污穢之物。至于猪犬牛羊。俱能帶厭。魚蝦之類。腥氣難聞。厭污不能核染。凡遇不潔之物。總當屏此。切莫與近

一初熱之時。毒火方張。凡荔枝龍眼胡餅冰糖。一切辛熱之物

俱能助火不可與食且雞助肝火魚則生痰豬肉滯氣而濕利麥麵積滯而生脹生冷恐其冰毒而又慮其不化故凡辛熱積滯以及水冷之物總宜戒之只宜吃素不可用葷若至八九日後則辛熱補物方可漸進至是寒涼之類又當禁矣

### 小兒進藥法

小兒多不肯服藥強之亦不能多進然病勢猖獗非藥力又不能驅逐況痘症限時尅日當清則宜急清當補則要速補用藥斷不可緩也故藥宜重劑濃煎止用頭服則藥雖少進亦有力矣

### 乳母服藥

凡兒小不能服藥須隨症立方加以引乳之藥用大劑令乳母服之其乳汁自有藥力此以母代子而進藥也

### 入門看痘法

凡小兒不能言語又無脈之可憑醫者往視當以望顏色聽聲音問其飲食二便潮熱若何方可辨症下藥一切其餘勿先飲酒須先淨手安坐定其精神定其心志然後呼病者於明處之處定睛先看其精神精神清爽者無事神昏目閉者非元虛則毒閉也再看其面部唇舌兩頰及目紅赤而眼有淚鼻唇紅紫舌有白黃苔者熱重毒猛唇舌黑者不治面青者有風唇淡舌無苔者毒輕熱大者毒重熱緩者毒輕言語飲食二便如常者吉又看耳後筋紋淡紅色者吉紫者重青黑亂紋者凶又須看均直上耳尖而無分枝者吉若分枝纏繞或橫過髮際者凶又耳上屬脾熱者重涼者輕耳下屬腎涼者重熱者輕又耳蒼黑者腎熱黑色從太陽繞耳者死　眼內黑珠起浮油者吉神光不明珠色轉綠或赤者危瞳子不明烏珠不亮者死白翻白者凶　鼻青主吐乳鼻有黑氣者死鼻乾流涕者傷寒鼻燥氣粗者邪甚鼻尖紅直上印堂者心經熱盛　肛門如竹筒者死魚目魚口吉進口角黑掩太陽者死

### 痘疹傷寒辨

痘疹發熱之初大抵與傷寒相似但傷寒從表入裏只見一經之症痘疹從裏達表而五臟之症俱見如呵欠煩悶肝症也往寒往熱手足稍冷多睡倦臥脾症也面赤腮紅咳嗽噴嚏肺症也骶冷耳涼腎症也常形驚悸心症也又觀心窩有紅色耳後有紅紋或身熱而腹尤熱惟中指稍獨冷（男左女右）脈從底顯眼有淚影是痘疹也已上五臟之症獨見多者必主其臟之毒尤甚治者又宜知也

### 將撚照法

痘初潮熱二三日尚在疑似之間將紙作撚六兩蘸清油燃于燈上往來燒熏令勿爆響將病者坐于暗門閉令其黑暗為點燃子照之須一手執撚一手用掌遮其火光觀兩顴宜紅

撚子在耳後及鼻邊平照觀中痘且以撚子在兩目角平照則痘疹之在皮膚中皆歷歷而可指矣但麻疹則浮于皮外而肉內無根痘疹則從肉底而出其根脚甚深此又所當辨也

## 痘症日期

凡痘二三日發熱三日出齊三日起脹三日灌漿三日收靨蓋五三一十五日爲正期也惟有出齊起脹六日吉凶皆定于此最爲緊要切莫忽畧痘症之輕者不拘常數或十一二三日亦皆收靨痘之重者則出于常數之外或至二十餘日而後乃全靨也但痘色明潤根脚紅活二便如常又無雜症即遲數日亦無妨設有當出不出當起不起當靨不靨者須詳察之或爲元氣虛弱不能運行則宜補其氣或爲雜症攻剋不能貫通則速去其雜症又六日以前毒未發盡有雜症者常也六日以後毒當盡出而雜症亦當除矣當除而不除者逆也須急治之

## 痘症傳變

痘發自腎而傳肝傳脾傳心傳肺皆自內而出外也故痘發一二日自腎髓而出于肝筋氣血充足者始透于筋而不少留于髓二三日盡出于肌肉而不少留于筋三四日盡出于血脈而不少留于肌肉四五日盡出于皮毛而不少留于血脈五六日盡出于瘡窠而不少留于皮毛八九日漿水漸乾十日而結痂矣十一二日落痂而斑光澤矣若初出于筋而少留于髓則

身壯熱口乾悶亂雖出于肌肉而少留于筋則爲紫窠強硬潮熱雖出于血脈而少留于肌則痘不圓肥雖出于瘡疹而少留于皮毛則痂遲落而多麻瘢此痘傳五臟之說也痘疹將出五臟皆有病症惟腎無留邪者吉若初熱便作腰痛而見黑點者必死蓋毒氣壅盛一發端而腎即絕其毒安能發越乎

## 治痘總訣

夫痘本臟中之毒非猶外染之瘡故諸瘡雖烈而外染之症終不至傷臟腑痘毒雖微倘內攻不出頃刻立夭治之可不慎乎其發熱之初內毒已動而欲出外慮其寒邪襲閉腠理緊秘毒氣難宣治之之法宜開提發散解毒鬆肌此時毒火方張最忌驟投辛熱以致助毒爲虐故桂附干薑諸燥烈之藥勿亂投當此毒邪欲出尤忌藥中滯補以致毒不能宣故參朮熟地諸藥慎之切莫輕試懼發驚宜利小便慮不出當用開提嘔吐多是毒及胃管待痘出而吐自平勿驟用砂香而止若唯面青唇白虛寒可據然後相投和胃之劑泄瀉多是毒氣奔越宜用加味四苓內分清濁以導毒于膀胱俟毒盡而瀉自止凡柯朮豆蔻切勿妄施以滯毒氣惟利清後倘神力困憊方用參苓白朮以固其脾若或寒戰咬牙此際恐爲實熱而清胃解肺其症立平設或頻頻腹痛此內毒作痛須以解毒爲良若是痛叫太甚則寒邪積胃當以和胃爲佳在腰痛最爲不吉須剖生雞以敷

膿或發癢不要驚慌與益元加以鎮驚大發熱固宜發散尤戒發表太過而表虛必成潰爛痘前雖要清解尤慮清之太甚而裏虛後變灰白欲治之于始而必慮之于終不可以不愼也。既詳發熱須論見標未熱先數恐爲疔賊之標見之務宜細別彼次離報點必爲不順之兆方出速用燈燒一日放標者死二日見點者凶必三四日而後見點者乃吉也且標當粗肥而嫌瑣屑粗肥則必稀瑣屑則痘密一齊湧出定作肉餅一片紅斑必歸陰府再如若見魂歸鬼錄焦紫遍身魄赴黃泉二便出血須知莫救痰鳴腹脹總是難醫三五成群如梅瓣後日必成水泡皮搨隱躍似紅莽此際便知不起點如蚕種十死一生形同蚊咬

良醫難治出齊熱退乃爲吉兆若痘齊猶熱急與解毒之劑而牛蒡連翹是其聖藥界地不清速解血分之毒而行花紫黯即謂良方清毒活血之藥此際不容少緩以爲灌膿之計蓋毒不清則必焦血不活則必紫焦紫之痘安能起脹而升漿乎但毒不可以盡解過於解毒其漿必清熱不可以盡除其無微熱其膿不成故一至地滿色潤而清涼在所必屏以顧成漿之地倘至七八日後則臟腑空虛候當用補而清解之藥敢復試乎故治痘之法六日以前不敢温補七日以後不敢清涼若到七八日間總以安裏爲本而大扶元氣使氣血壯盛乃能送毒外出此內托之藥所以不敢缺也但灌水之時忌其泄漏而腸胱

水之劑切不可用又忌止燥制水而助脾乾液之藥不可濫用觀痘之形貝頂平而脚潤然脚潤由于血散治當歛血爲主頂平必是氣虧法以補氣爲先迨水足而漿尤清則補益中須加白术縱或身熱口渴此時定作虛看況作漿定然身熱痂結乃自退潮即有譫語狂言補血寧心自定若或咬牙寒戰理中桂附無疑然痘之生死總看膿漿有無有漿則生無漿則死至于收靨須從鼻準地角先收則腎竭天庭先靨則心焦聲啞痰鳴死期已至一時齊靨頃刻立亡遍身痂皮如竹紙收齊乃爲長逝面部手足盡無痂不久定返泉鄉漿清痂薄必留餘毒漿濃痂厚變症終無餘毒薰蒸狀大而兼化毒冒風潮熱發表而且

溺中熱爲能消餘毒不必驟止盜汗乃是表虛宜固表肌手足拘攣是血氣之不足眼目羞明乃餘毒之傷睛爲疳爲癬毒內實調元爲痢爲疥雖內解亦兼外敷疹症雖多因人調治應實得宜自無不效

## 初熱辨症賦

初發悠悠身熱先宜氣息和平二便如常面容不改乘之痛癢清爽睡臥安寧便見症來順候肌色青而晄白精神少而倦怠此症當作虛看痘出決然不振再見吼乳便溏只宜補益爲先若熱盛氣粗煩燥不寧譫語狂言面紅眼赤均爲內熱如加喘滿腹脹便秘須知熱壅肌膚燥而毛色焦口氣熱而身烁灼

此則毒熱鬱遏內症固重而外症尤烈腹脹口張而喘[illegible]不絕而嗄嗄五竅不通須防失血點痰隱隱出復頓吐乳更兼搭眼而青又見搖頭狂語忽生發驚先兆是故熱盛者只宜清涼發散不宜驟用苦寒發散則毒得外出而熱自解若寒則毒反內伏而出愈難故發散之劑輕則如升麻乾葛以疏其熱而煩燥壯熱者非此何以定其標重則麻黃羌活以開其壅而喘急腹脹者非此何以救其危未萌先泄有熱症莫作虛看無熱症定為虛論止泄瀉以清涼重加發散治虛瀉以溫補仍用開提是以內虛誤用寒涼不特助伊作泄當熱而投補劑尤恐熱增煩劇安靜而能食勿謂便秘而可下泄瀉而煩渴莫言熱

症而投涼宜毒雖當開提恐發表太過有傷真元之氣初熱雖當清利但恐清利太甚以致臟腑之寒慮始焉終方為妙用顧首顧尾乃是良方

## 初熱三日調治法

初熱一日病症未見始稍待之不必服藥至第二日宜以蘇解丸量兒大小與服必使其身有微汗則腠理開通乃不閉毒兒若體性怯者用蘇解丸兼于金丸一粒與服此補中帶散為體怯元虧者計也若至第三日身熱燎人舌有黃苔則其毒必盛此非丸散之力可退其毒急用和中散兼或清解散連進重劑水藥數服以解其毒不可鬆手蓋毒之盛者非[illegible]

藥必不能解於此之際若遲延觀望不急解散則毒出[illegible]而錯過種種之禍至矣

凡痘初熱之時毒之輕重症之吉凶皆兆於此蓋熱之微甚必輕而痘必稀吉之兆也熱之甚者毒必盛而痘必密凶之機也此必然之理醫者宜預知之如身熱和平時熱時退神清氣爽飲食如常大便稠黃小便清利並無雜症者吉兆為而後見痘者吉蓋毒從心經過也　又初熱時或吐或瀉不可驟止蓋吐者邪從上解瀉者毒自下奔因吐瀉發越而毒乃輕是順症也若驟以止之是關門閉盜其輕者反變重矣況毒氣發越之吐瀉俟痘出後則勿藥亦自止矣又何必施

治乎凡不必施治之際而強治焉豈恐復增他症也故但戒葷酒禁風寒善于調護而已若增寒壯熱咳嗽流涕多因外感風寒也恐毒為風寒所閉不可不為之發表但體性壯旺者用加減升麻湯

### 加減升麻湯

升麻（錢）　防風（六分）　桔梗　川芎　陳皮（各五分）　牛蒡　連翹（各[illegible]分）
山查　柴胡（各八分）　蟬退（四分）　赤芍（六分）　甘草（三分）　木通（五分）

體性怯弱者古人用參蘇飲但今世人參價貴人多不肯用參且方無參而復用之豈不反誤人乎愚謂宜用

### 扶元宣解湯

黃芪　當歸（各一錢）　升麻　柴胡（各六分）　川芎　桔梗　陳皮（各四分）

牛蒡　山查（各七分）　甘草（三分）　木通（五分）　防風（五分）

如頭痛則加薄荷　藁本　白芷　如咳嗽則加半夏　炒芩　如腹痛則加厚朴　香附　木香

總于二方之中看症加減不可執一服藥之後既經發汗見點安靜。身熱稍緩則勿峻攻姑稍待之看其痘出如何另施方畧若既汗則不可再發恐表虛而後難收拾也　若既用二方依然大熱譫語眼紅唇紫舌有黃苔口中氣臭狂言譫語二便不通惡風惡寒咬齒咬牙腹中隱隱作痛者必毒氣壅盛急宜解毒為主須用

解毒湯

連喬　牛蒡（各一錢）　只殼　木通（各六分）　防風　桔梗（各五分）　紫草（七分）

川芎　升麻　虫退　黃芩　黃連（各四分）　前胡（一錢）　麥冬（八分）

甘草（三分）

右方喬蒡芩連解毒除煩只桔防木疏風開竅芎升虫退達氣上升消毒之方莫良于此服之覺煩悶少解則止依痘出而中自安而熱亦漸退若發熱以發痘痘未出其熱總不退也若服此仍煩燥不寧症不稍減則毒氣壅盛之甚再一服而可清也須連進數劑其毒乃開但有等愚人不知辨症只以平日而論見人皆用涼藥則曰吾兒素弱不敢用涼或見醫用補藥則曰吾兒性熱不敢用補孰知寇來將抵藥進病當宜清宜補俱因其症豈可以平日無病之時而論乎學者須宜對症用藥切不可聽主家之言以阻其應用之方也至于藥之可止不可止方之宜更不宜更祗看其病勢何如耳

初熱時煩渴腮紅唇乾紫口氣臭氣粗悶亂若有黃苔眼有淚漿二便黃赤而不清利狂語咬牙口中常如食物身體熱如熨汗出而脈浮數者此俱熱症且眼目吊睛手足牽引肝經有風咳嗽喘急痰壅失音肺經有熱驚悸妄言心經熱結腹中疼痛腸胃積邪傷寒則惡寒傷風則畏風俱宜發散清熱因各經而投藥但不可誤用補劑俱宜用上清毒湯看各經

之症而加各經主藥如肺熱宜用黃芩肝風宜用柴胡姜蚕心熱宜用茯神麥冬腹痛則宜消導傷風則宜發表因時制宜難以盡述

初熱時若唇淡面青手足冷舌無苔精神困倦不思飲食二便清利脈沉細而遲緩者乃虛症也若猶大熱灼入心中迷悶則元氣虛而毒氣又盛若不急治恐元虧不能送毒毒不得出三四日間須臾告變良可悲也宜急用

調元解毒湯

人參（八分）　黃芪　當歸　連喬　牛蒡（各一錢）　防風　川芎（各五分）

升麻　黃芩　黃連（各五分）　前胡（一錢）　木通（六分）　炙草　虫退（各二分）

合方參芪當歸扶氣血芎芍苓連解毒此補中兼解毒之

瘍痘瘡者詳也

初發熱或爲風寒所閉一時無表散之藥須用推拿法以鬆肌表其毒自出　又或其兒素怯仍爲風寒所束固不得不發又恐虛虛用藥發表有傷元氣亦用推拿之法　又或其兒既服表藥依然身無微汗寒邪閉錮其症不退欲復用表散之劑又恐過表以損元神亦須用推拿之法蓋發散之藥多能耗氣推拿之法不過鬆肌發竅運動筋骸而已竅開則氣通筋運則血行氣血通暢而邪自出勿謂推拿之無益也

余嘗用之其效甚捷故備其法

推拿法

取溫水一碗先用大指蘸水于小兒兩鼻孔洗擦而上推者二十四下謂之洗井灶再于印堂用兩手指分開擦二十四下謂之開天門又于小兒兩手食指擦下三十六下以瀉三關之火又于中指擦下三十六下以瀉心經與肝之邪又將小指數擺謂之烏龍擺尾再于脉門擦下三十六下復擦上十二下又于掌上順運八卦週旋擦一百二十下然後于虎口及拿足凡掐骨之處其穴有竅于各穴窩間用力但捏一下臍下丹田各捏一下背上兩飯匙骨下及背脊旁骨節間各捏一下任其啼哭冷汗出而肌鬆痘毒亦從而出矣但推拿後宜令兒睡發汗不可冒風腠理既開恐風邪之復乘也

或用頂方將桃樹皮與蔥葱搗爛炒溫敷于臍上一炷香爲度亦取其發表之說也

一初熱時小便如血遍身見紫色斑點者此毒盛血熱也急宜用二寶散或犀角地黃湯

二寶散（治痘紅紫與諸失血之症）

犀角　玳瑁（二味磨水服即愈）

犀角地黃湯（治痘血熱焦紫與諸失血）

犀角　赤芍　生地　丹皮　三味等分水煎另用犀角磨入服之無犀角則用升麻代之

一初熱之時四肢殭直不能舉動或氣粗目閉迷悶不醒者皆爲風寒所束毒不能宣之故也宜用蘇解散加天麻白附全蝎姜蠶治之若元虛弱者用扶元祛風湯

扶元祛風湯

人參　白朮　茯苓　甘草　當歸　川芎　羌活　防風

天麻　虫退　全蝎　殭蠶　木香　鈎藤（各等分）

一初熱時遂變失聲者必風邪傳入肺經重則用清肺飲輕則甘桔湯

清肺飲（治咽乾聲啞）

麻黃（二）麥冬（三）知母（五）花粉（五）荊芥　訶子（八）桔梗（五）玄參（五）

入竹瀝姜汁服

甘桔湯（治咽喉痛）

甘草（三）桔梗（五）牛子（四）荆芥（四）玄參（六）

一痘發熱時或耳下頸上有泡者皆寒氣風痰所結宜用生薑磨地泥敷上散其寒邪俟痘出自愈切不可用癤毒藥妄敷恐水毒氣爲害不小

又方用紫荆皮　防風　荆芥　南星（生）半夏（生）麻黄

白芷　共爲末調酒或醋敷之即愈

初熱雜症

夫痘毒出于臟腑達于皮膚其毒一動五臟皆爲攪擾故其身

症多端況平日所受風寒暑濕之邪皆隨痘毒而出所以雜症紛紛而見焉然痘毒者戕生之巨寇雜症者助惡之群邪雜症不平則痘亦不順必除雜症而痘乃無患也然祛除雜症之中又必以痘爲主其痘既正則雜症自平若渠魁已服羣邪安有不順乎

初熱時要問其大小二便飲食寢處若小便不長夢中或發驚悸其兒必將發搐急與定心散（方見三卷丸散條）以燈心湯爲引不然則驚搐之症必然至矣

驚搐

驚搐之症多出心經有目睛上吊口不能言者有身若反弓者足僵直者有目翻白而雙手緊拳者或牙關緊閉或口吐白涎或舌頻出入名蛇舌風或大叫如鴉聲而即死者名烏鴉風或嘴歪頭搖者名黄揭風或十指拏撻者名鷄爪風如此之症俱爲驚搐此皆毒從心經過故有是症必痘出而驚乃定多在痘將出時方發驚搐但驚搐而隨醒者吉搐醒而有汗者亦吉然邪從汗解痘出必稀搐定而精神清爽面不青藍者吉若面色青藍形神昏瞎醒後目閉無魂不思飲食而反潮熱大作者是惡候也其痘必稠密而難治矣昔人謂未痘先搐皆爲順症然詎然乎遇此之症爲父母者切莫驚慌只可扶持不可把捉恐驚其氣則立斃矣爲醫者不可作急驚施治致用寒涼之藥倘

誤用寒涼冰其毒氣不得發越其兒必斃矣可不慎乎然此等症候皆由毒氣壅盛于内不能宣發所致治此之法須詳審其由不可一槩論也　有毒氣壅盛于内不能宣發于外而驚搐者必痘影紅紫聲音響亮氣粗身熱脉洪而數此毒壅不能發也宜用清解散以宣之

清解散

防風　荆芥　桔梗　川芎　蟬退（各四分）前胡（六分）乾葛（五分）

升麻（五分）黄芩　黄連　紫草　木通（各六分）牛蒡　連翹（各七分）

山查（八分）甘草（分）

若有爲風邪所束痘毒鬱而不宣而發搐者則形色多滯前但

漸重鼻塞或流清涕脉浮而數是為風邪所束也宜用疏[illegible]散以發之

疏解散

防風　荊芥　桔梗　川芎（各四分）前胡（七分）升麻　紫蘇

紫草　木通（各五分）牛旁　連翹（各七分）虫退（三分）白芷（四分）

有元氣虛虛逆毒不出而發搐者則痘必淡白在皮下唇淡面青氣緩神倦脉又沉細而遲緩是元氣逆毒不出也宜用溫中益氣湯以托之

溫中益氣湯

人參　白朮（各五分）生芪（八分）當歸　茯苓（各六分）炙草　川芎（[illegible]）

分　防風　白芷（各三分）木香（三分）山查　官桂（各六分）

凡遇發搐雖要祛風又要顧痘必托痘出其驚乃自退矣

凡驚搐之症必用鎮驚丸方見三卷丸散篇以燈心草磨金銀器為引服之立效百發百中又要用六一散

滑石（六兩飛過）甘草（一兩）神砂（五錢）加木通（六錢）

共為末燈心湯引搐定與服必使小便清長則熱解而驚定矣蓋心與小腸相連心經火邪須從膀胱瀉之此治驚之要訣也

當發搐之際危如壘卵救病甚苦救焚恐藥力一時難及須用火攻以祛散其風痰其效更速燈焰法　先于四肢擦過之處定有一窩卽于各核骨窩中皆下燈火一點又于臍下丹田穴灸燈一點但臍上心前則不敢下燈火恐扯痰上行也

一兒發搐遇一愚僧在心窩灸燈一點其兒卽斃可不慎乎

一兒發搐忽然口歪于左余于其右牙交穴下燈火一點轉盼間其口旋歪于右余又于其左牙交穴下燈一點未幾其口乃漸正矣凡牙關緊閉者亦灸兩牙交穴其口自開

腹痛

初熱無事忽毒氣發越而腸胃不寧多有作痛然腹中痛者其毒必重不可視為尋常但其所痛之故亦有兩端不可不辨

有外感風寒兼飲食停滯而作痛者則其痛多急而啼叫必甚每在臍以上痛痛時面青唇白而手足冷此感冒積滯而痛也宜用

升消平胃散（治感冒積滯作腹痛者一劑立愈）

川芎　香附（炒）蒼朮　紫蘇　厚朴（姜汁炒各五分）藿香　砂仁

白芷　半夏　陳皮（各三分）山查　麥芽（各六分）

有毒氣壅盛而腹痛者則其痛稍緩有作有止痛[illegible]啼叫痛每在臍以下痛又或連腰而痛面赤唇紫手足不冷此毒氣在內作痛也宜用敗毒散以消其毒必毒消而痛乃[illegible]

敗毒散

升麻　乾葛　紫蘇　川芎　防風　荊芥（各四分）　前胡　桔梗
只殼（各六分）　牛蒡　連翹（一錢）　蟲退（三分）　山查（一錢）　木香（三分）　白芷（五分）
地骨皮（五分）　又方去乾葛加紫草

亦有平日嘗有風疾常常作痛者至發痘之時風疾亦發此
不必施治俟痘出其症自平

### 嘔吐

發熱之初毒攻胃管故有吐症毒氣上逆而吐者其吐必頻刺而有聲吐訖反快精神不倦此毒逆上行之吐因吐而毒亦解所謂吐為順症者此也此不必施治俟痘出而吐自止然嘔吐之證自有不同不可不析凡吐有聲有物謂之嘔嘔者熱從吐

解也有物無聲謂之吐吐者因有內熱而胃亦稍虛也有聲無物謂之噦噦則毒鬱不出矣此皆熱毒縱逆于胃口俱不可用燥胃之藥而與之驟止也　又曰上焦吐者從于氣中焦吐者由于積下焦吐者由於寒上焦吐者胃有痰熱必心煩作渴二便不利此熱症也宜用　桔梗　陳皮　半夏　香附　藿香
木通　車前　茯苓　甘草

有食積而作吐者必腹中作膨隱隱作痛治當以平胃散（方見前）兼四苓散　白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　主之

若胃氣虛弱而作吐者其人必面青唇淡精神困倦不思飲食或食下即吐其吐亦順快而無聲此胃寒之吐宜用參砂胃散主之

### 參砂和胃散

人參　砂仁　半夏　藿香（各四分）　陳皮（三分）　白朮　茯苓（各五分）
炙草（一分）

### 乾嘔

乾嘔之症乃毒火內鬱不得外宣故時時張口似吐非吐如見此症其臟已敗其毒內攻最為危險若咽喉作痛不能納物再加失聲其死必矣但初見即宜解毒兼利小便用枝連二陳湯
陳皮　桔梗　茯苓　花粉　黃連　山枝（俱黑炒）　瞿麥　木通

乾嘔者火　于中上不能吐必須引之下行故治乾嘔以利

小便為主若利之不下則難救矣

### 嘔吐黃水

初熱噁心是毒氣上攻亦其常也俟痘出自愈若痘未見標一切嘔吐絕莫驟止恐閉毒也若虛寒見症者乃不容不止耳

肚不痛則無事腹痛則凶不痛則內無積熱必脾胃未進穀氣脾胃空虛本色形于積液而然也稍與和胃平脾飲食得進自無事矣若腹痛則毒留脾胃為禍不淺宜急恒解毒氣可救也然此必大熱薰灼口中作臭唇皮硬舌有苔乃為毒蓄于內也
須用
陳皮　厚朴　山査　牛蒡　慈姑　石羔　石斛　甘草

黃連　木通　白芷

吐清水

無事此胃寒而肝虛也治法宜煖胃平肝而即止矣須用

砂仁　藿香　陳皮　白术　茯苓　白芍　炙草　煨薑引

吐濃痰

無事痰雖火結吐則內寬不必治也

吐臭痰

難治痰氣若臭則胃中毒火難堪急與清胃解毒其止而或可生或痰中帶血者亦然須用　生地　牛蒡　慈姑　人中黃　天花粉　與服

拴喉

拴喉者食則必嘔飲則必嗆飲食不能下咽也初熱有此多凶蓋毒氣壅盛上逆咽喉故飲食難下也急宜解毒利咽為主矣此不治恐變爛咽失音之症則難療矣須用

甘桔湯加減

桔梗　陳皮　牛子　玄參　黃芩　慈姑　甘草　射干

泄瀉

初熱作泄乃毒氣奔越從泄而解既泄其毒痘出必輕故痘前泄瀉是為順症不必施治俟痘出其症自平但泄瀉之症脾經受傷最為小兒痘科所忌其虛實寒熱之異不可不為詳辨而

為調治之方也夫泄瀉有水瀉者有溏泄者各有寒熱之分若小便清利或糞或白或青或食物不化其氣腥其泄則滑瀉自下而無禁者虛泄也宜用參苓白朮散

參苓白朮散（治虛泄甚效）

白术一錢　人參　茯苓　苡仁　蓮子　山查　神曲（各五分）

肉蔻（火煨）　訶子（煨用肉）　陳皮（各四分）　白芍（五分）　木香　炙草（各三分）

右方健脾去積治虛泄者莫此為妙若服此不止又用

九味肉蔻丸（方見三卷丸散篇）

若小便赤而不利其糞或黃或赤或黑其氣甚臭泄時有聲直射而遠者是熱瀉也蓋熱留於中水道不分故作泄耳治

當分清濁利陰陽用加味四苓主之氣弱者加肉桂則名五苓散

加味四苓散（治水瀉熱者加滑）

白朮一錢　茯苓（八分）用赤者　猪苓　澤瀉（各七分）　木通　車前

牛子（各六分）　黃芩（三分）　腹痛加木香　裏重出腸加升麻

若素有食積而作泄加厚朴　陳皮　山查　神曲　木香　胡連　若泄帶紅色加百草霜

若身熱煩渴加柴胡　黃芩　麥冬

若痘隱隱不起在皮間而不出見加升麻以提氣上升若泄瀉不止男左女右在用灸上有一竅即止瀉之大穴也其法

用本人之手下垂肚臍然後將其手曲轉令手負動以曲量下為度此處必有一窩即于窩中用燈火速灸三醮其泄自止但痘前吐瀉總勿亂治恐滯毒氣若痘出不止則宜施治虛中氣虛則痘難起脹矣

又有一等自首至尾終日泄瀉而不能止亦無害者必結痂而泄乃定但知此之症雖日泄瀉而精神如故飲食如常痘亦紅活起脹灌膿俱無變症此毒少氣旺故無害耳久痘出脾經必毒花痂成而脾症乃寧

### 閉結

閉結者大小二便不通也初熱之時凡有此症俱是內熱若小便不利則是熱蘊膀胱宜用六一散以利之（方見發熱條下）或于清毒湯中加車前　木通　滑石等藥以利之而小便自清長矣若大便不通雖是熱注大腸然亦只可于解毒湯中加只殼以破其滯黃連以滌其熱已耳切不可用大黃芒硝斬關之藥而猛下之蓋小兒全以脾胃為本若催動脾胃將何以為行漿起脹之基乎即熱結之甚亦不過于解利劑中加酒製大黃少許而已況內而熱者火灼食消糞自無多倘能清解則火息而便自行矣　余思一方用未去油之豆殼以治閉結既能滑腸又不傷脾最得計也若便秘而能食則雖秘亦無妨也切不可妄下

---

泄紅　此熱蓄于腸胃也宜解臟內之毒用　黃連　牛蒡
　慈姑　人中黃　一服立平

泄白　此脾胃寒涼也宜溫脾胃為主用參苓白朮散（方見前）

瀉黑糞及赤黑水　此臟腑已敗不治

### 發熱

毒發則火動火動故身熱初起之時毒火方張宜乎身熱但熱微則痘輕熱大則毒重必痘出而熱漸除出齊則熱且退矣若當減不減當退不退則速宜解毒然初熱宜表散見標宜清解總以清利為要蓋便利則火從下瀉切不可用補滯之劑

### 寒熱並作

夫火動則熱火鬱則寒痘欲出而不能出氣血與毒火相攻故作寒作熱在宜毒發表俟痘出而自定矣宜用蘇解散　或加減升麻湯（方見前）

痘已出則用調元化毒湯（方見五卷）行漿時則內虛而毒不能出也用內托散（方見五卷）　痂後亦作虛看寒多則用理中湯

### 口渴

初起潮熱而渴無妨若渴甚則毒必盛治在解毒不在止渴蓋毒火清而渴亦自止也

### 煩躁

初熱時火毒薰蒸五臟不寧宜生煩躁然甚則其毒必盛須用解毒湯方見上

### 亂語

初起重。蓋毒氣壅盛朦迷心竅致亂語也宜解毒宜毒清心降火兼之消痰用解毒湯加花粉　硃砂　又兼用定心散方見丸散篇以鎮心利水毒清水利而心自寧

### 頭痛

初熱輕　多因感冒風寒所致也用升麻　川芎　白芷　防風　藁本　薄荷　起發時亦是感冒風寒治同上　收靨重是餘毒將攻目宜解餘毒用羌活　川芎　連翹　牛蒡　防風　荊芥　黃芩　黃連

### 目閉

初起又治　蓋精神已衰不能送毒也急用內托之劑痘若起出則可救　又痘將出時忽爲風寒所束而目閉者用升提達毒之藥爲之法寒發痘或用推拿法以疏通寒邪再用頂對以生雜倒敷臍上令痘出而目自開　八九日起脹而閉是眼胞腫脹不能開也吉若驟開則凶毒未外化而腫消則必入爲內攻矣　十三四日痘毒已退則宜開矣宜開而仍閉者毒未盡化也亦凶

### 咳嗽

初起無事然咳嗽之症多由肺經非肺受風寒自肺受毒火也火薰蒸液化爲痰故有咳耳治嗽必以清火消痰爲主初發用蘇解散加黃芩　花粉痘出齊而嗽漸止者吉蓋毒已盡出皮毛之外而不少留于內也　若七八日不止而愈甚者毒火內留必凶亦有先前不嗽六七日偶感風寒而嗽者表散其邪則無事矣但治嗽消痰六日以前宜于清解方中加花粉七日以後宜于補托方內加款冬而半夏南星則惟收靨時痰重者方敢用也而桔梗陳皮自始至終俱敢用

### 喘氣急

初熱凶毒氣內壅也宜解毒　八九日無事內痘升脹阻塞氣

道也　收靨凶痘若陷塌氣將絕也

### 聲啞

初起不治丹田肺氣損敗也然有嘶咽而失聲者則無妨又有感冒風寒而失聲者則必有嗽而音啞不清者宜用甘桔湯加防風　荊芥以疏其風寒則音亮矣　七八九日而失聲者痘若起脹紅活則是內痘起脹閉塞肺竅故失聲也俟內痘靨而聲自開若痘伏陷倒靨而聲啞者則毒陷內攻肺氣已絕其死必矣

一見痘出稠密胸背甚多至七八日而漸聲啞初見面部痘好不以爲意及見胸背之痘盡皆白陷忽然聲啞始知驚慌急用

黃芪當歸鹿茸人參肉桂附片川芎柯子連進三四劑其痂起而聲亦開矣及至收靨其音復啞余見其喉中痰壅而氣又微弱乃用人參黃芪陳皮桔梗半夏柯子炙草與服乃有聲吐痰服二三劑其聲清亮而愈

### 喉痛

初起難治　是毒鬱之甚其火上炎故也宜用

**敗毒和中**

連翹　牛旁二錢　黃連　枳壳六分　防風　荊芥　桔梗　川芎　紫草四分　蟬退三分　前胡八分　麥冬八分　加元參黃芩

以解其毒　又用理咽散頻頻噙服以滋咽喉但初噙一二

日恐有火毒宜吐之

**理咽散**　治喉痛

桔梗　牛旁　玄參　山豆根　黃芩　甘草

至起脹時喉痛是咽中有痘而痛也雖痛無妨仍用理咽與噙但不可服此際臟腑空虛咽喉雖痛亦敢用補不敢進涼俟內痘靨而喉自不痛矣

或咽爛成坑者以前失于解毒毒火熏蒸所致痘好可救仍用理咽散與噙復用吹喉丹吹入若痘陷則難救矣　若落痂則因毒火未化在胃口熏蒸而元氣又虛難于清解甚至危殆宜內服人參解毒湯仍將理咽散與噙但治咽喉總

---

宜服利藥以瀉之乃不上炎也

**人參解毒湯**

人參　玄參　牛旁　石膏　知母　黃芩　山豆根　甘草

**吹喉丹**

黃連　青黛　兒茶

### 心胸痛　凶

初發若心胸突起而痛此毒壅胸膈凝而不出其痘難發宜寬胸解毒痘出而痛定者可救用解毒湯（方見前）　多用桔梗陳皮加鬱金　亦有誤服熱物或傷力傷異助毒有夙疾者則無妨痘出而痛自止矣

### 腰痛　最危

痘毒發自命門初起腰痛是腎虛不能送毒故毒旋先敗腎經故形于腰痛也痘原于腎而腎已敗豈不危乎若連背脊骨尾而痛者尤危也急與扶腎之劑用人參　生芪　當歸　元支　牛旁　連翹　續斷　故芷　杜仲　枸杞　知母　炙草　與服又外用頂方將生雄雞剖開即敷于腰上須連用二三隻

若痘出痛止可救　若出齊猶痛更凶須用人參豬尾血加冰片少許與服蓋人參補氣尾血從髓而來是入腎者也且冰片直射臟腑其方最妙余嘗用之果效服此而效則可救也其後總以內托滋腎爲主若諸方不效則必死矣　至十三四日潰

痛者則是血虛補血養營自可無虞

遍身痛（無事）

此必平日傷風傷寒至痘發之時一齊攻作所以痛也痘之初風發汗則無事矣

手足搐（不治）

蓋手足屬脾胃此風生脾胃乃為風死症况痘發之時豈不危乎

足冷

十指冰冷不治　此氣血敗絕不能灌溉兩肢也

初起陽氣攻毒未達四肢冷亦是其常也痘將齊手足乃溫但

冰冷過勝則不治矣蓋陽氣幾絕也急宜用參芪桂附歸芍鹿茸大補血氣或可救也

手心痛用一芍散

手足痛（初起有）

此毒氣留滯筋骨不得盡宣于肌肉而氣血又不能活故痛也用桂枝芍藥湯　桂枝　赤芍　柴胡　防風　獨活　羌活　川芎　當歸　芍藤　牛蒡　白芷　與服矣此不治日後雖生必致風攣亦有素受風寒而痛者則以葛蔥灰麫共搗爛用酒炒溫而敷於痛處以散其風邪或加蒼朮兼除濕氣更妙

今九日漿行痘痛是其常也若筋骨痛者即是風疾亦且置之候痘愈然後以驅風兼行氣血于四肢之藥治之自然痂後亦然一若止一二處肌肉中如有核者此疔結于內也用艾火灸之或燈火焠之其痛立除

眼出血（不治）

蓋毒氣橫肆上攻而暴烈于精華其後安可治乎

耳出血（不治）

耳為腎之竅毒氣横烈而腎已敗故遂直上攻出于其竅安可救乎

大便血（可治）

此熱注大腸也用　川連（炒）　牛蒡（炒）　黃芩（炒）　厚朴　香附

只殼　紅花　生地　地榆　木香　百草霜　或用犀地加

亦可此首尾俱可用

小便血（不治）

毒撲命門則膀胱溺血見此之症腐爛難醫痘必焦枯而腹必脹八九日間決死也

口吐血

血鮮而一二口者無妨若不止者初起用犀角地黃湯方見前起脹時亦宜清毒涼血引火下行蓋血熱則妄行火炎則上逆也若吐而不止則鹵黑血則不可救間或一二口者可治

鼻衄血（可治）

此邪毒由竅將達皮毛也而隨出而隨止者不必施治衄而不止者仍用犀角地黄湯並之外以髮灰散吹入鼻血即止　將無病婦人頭髮用皂角煎水洗淨然後將髮燒灰名髮灰散又且一切男婦衄不止者用線在小指用邊着力重紮竟紮盡其指其衄立止但男左女右各有分別此奇方也余試屢驗

諸失血

熱毒之氣泛濫無制而血亦隨之走泄故或吐或衄或便或從瘍發而出者皆惡候也若溺膿血如死肝豆汁者曰爛也從瘡毒而出血者附分在虛元氣爲之走泄也俱不可治惟衄血乃毒氣蘄閉而出爲可治耳但不可妄用寒涼之藥恐冰伏其血

使痘不能成漿則爲害不淺矣　嘗見一人口鼻出血數碗以韭菜汁半碗與服即愈

厥冷（方）

此元氣虛弱不能送毒發于内而陽氣不升故厥冷也急宜以人參　黄芪　當歸　鹿茸　肉桂　附片　川芎　炙草　薑汁引　若緩而不救毒在内攻其兒必斃于三四日内矣然此脫陽之症必唇淡面青氣冷身涼而腹脹

眼露白（方）

目爲五臟精華所萃睛若上翻不能運動則元神將散又焉能送毒外出此最危之症若失智無識則次死矣無論前後若不治

也若必欲强而治之則總以内托扶元爲主　惟痘前發搐

此搐後人醒而即定者則以風論痘出而症自平

唇舌

夫唇與舌五臟皆通而臟腑虛實皆形于此故熱毒輕者其唇不紫其舌無苔而口不臭若熱毒盛者至二三日間其唇必紫黑或硬或裂或兼之口内臭或腫臭難聞此皆毒火内熾所致也急宜解毒爲主其唇之硬裂者最凶宜清脾胃之火解毒湯内須加石羔又以石羔甘草牛蒡連翹煎水時擦唇上口臭者亦是胃熱其治亦同若滿口俱白而生口瘡者用清胃散敷之即（[illegible]篇）敷以丹也痘後亦同　夫舌有白苔其毒已重若生黄苔其毒愈盛

黄苔轉黑則不可救矣故舌有黄苔時須急爲之解毒此際猶可救也　又舌捲縮亦是火鬱火經而難治矣然亦有哺乳火動致舌捲而不能食乳者其舌下之筋必收緊也須用指頭從筋上重按之使舌筋不弦自不捲矣小兒不能言語醫者又不可不詳審也

又或舌有黑點是舌上生疔必主遍身痘皆焦黑而死急宜銀針剔破去其惡血剔去後不復生疔猶或可救

中風

發熱之時腠理開張或中風邪忽然直視張口吐舌不能言語是中風也宜用參蘇飲或消風散一時無藥則以荊芥推下且

用紙傘法又用頂方以櫻桃皮醬葱豆豉川烏共搗爛用炒濃敷臍及顖門二處汗出自愈　若起服藥腹脹與痘後有中風之症則用　人參　黃芪　乾薑　附子　桂枝　麻黃　羌活　炒防風　炙草　若牙關緊閉則于兩牙交穴各下燈火一醮其口自開

### 參蘇飲

陳皮　半夏　桔梗　茯苓　紫蘇　干葛　前胡　甘草
人參　宜加麻黃　薑葱引

### 消風散

羌活　獨活　殭蠶　防風　天麻　白附　蟬退　柴胡

花粉　川芎　人參　炙草　生薑引

### 中痰

發熱之時或有毒火薰蒸痰涎壅盛滯于咽喉不能言語其狀與中風同但喉內痰鳴是中痰也最為危急須以生薑汁灌下若不能進藥須用鴨翅毛透入喉中攪出痰涎令其自吐去咽內痰涎乃可進藥然後用　陳皮五分　桔梗五分　半夏一錢　南星八分　花粉七分　天麻七分　竹黃七分　硃砂　濃煎與服　或加蒙石　或用鎮驚丸薑汁引

此急則治其標也若痘欲出不出急用頂方剖生雞以敷其臍連用二三隻將痘托出庶幾可活凡痘欲出而不能出者

此方最妙余試屢效不可忽也

### 噯氣

此熱毒鬱于胃中欲出不出故噯也宜用　香附　陳皮　桔梗　茯苓　黃芩　木香　山查　生薑引　若不止加赤苓　澤瀉　木通導熱下行

### 不食

夫發痘之初熱鬱于內必然作飽不思飲食此時不可驟用峻胃之藥以滯其毒若無泄瀉而痘紅活雖出齊之後不食亦自無妨俟水足漿行毒氣盡出腸胃無熱乃欲食也不必施治惟吐瀉後而痘淡白不振者乃胃弱不食也宜用　人參　白朮

茯苓　砂仁　丁香　陳皮　山查　神曲　炙草　煨姜引

亦有一種雖焦陷而飲食如常者是毒火內燥易于消化雖能多食亦必死矣總在看痘吉凶而食與不食豈足定其生死哉

### 凡汗

初熱之時身有微汗其毒乃出有汗則不宜發散然有自汗有盜汗自汗者不發而汗自來乃腠理不密也盜汗者汗出其人不知乃表虛也其痘未出之先縱有自汗盜汗而皆不可驟止恐閉其毒氣也但不敢用表散之藥而復傷其表耳　如痘既出之後或盜汗如雨自汗如淋者恐表虛後必癢塌而過于痘

必皮薄慎勿補手旁觀急宜用人參　炙芪　當歸　白芍
桂枝　麥冬（炒）以斂汗固表　若身冷惡寒則宜用人參
炙芪　當歸　川芎　白芍　肉桂　附子　泡薑炙草　起
水後加白朮　淮山服此若仍大汗如珠寒戰不已加之昏沉
不醒及汗流煩渴者俱屬亡陽之症不可救也

〔腹脹〕

初起重中後難救　俱是熱鬱脾胃不能發泄而然也治法宜
升發解毒而消導之　大便秘而脹者用只殼湯　只殼三錢
生地一錢紫草二錢酒製大黃八分　小便赤澀而脹者用四苓散
紫草　黃芪　木通　甘草加澤瀉　豬苓　車前　此皆痘

色紅紫塞熱秘結者方可用　若二便清利手足冷痘淡白而
脈微緩者則臟寒不能發毒而脹也宜用理中湯　人參　白
朮　黃芪　附子　泡薑　炙草　茯苓　或用異功散人參
白朮　當歸　陳皮　半夏　厚朴　茯苓　丁香　木香
豆蔻　附子　若痘陷伏不起喘急神昏則毒在內攻而脹也
治之亦無益矣

〔二便〕

人身之有二便猶天地之有江河也江河不可壅塞而二便不
可不通若或不通則腸胃壅而毒不得內攻矣然便之所以不
通者亦因火閉而然也治宜清火解毒而便自行故大便秘者

須解火毒而芩連在所必用既有芩連以蕩滌腸胃之垢而毒
火自不內攻慎勿用大黃芒硝之藥破下以取速效恐大便秘
者其毒必甚一切解毒涼血之藥又皆滑利大腸脾胃堅固則
涼血補血任意施爲若預以下藥傷其脾胃則用涼血解毒之
劑及滋陰養血之品皆畏首畏尾而不敢用致後日之束手莫
措者皆前此悞投下藥之弊也況痘家全以脾胃爲主脾胃若
損則泄瀉伏陷不旋踵而至矣其害豈勝言哉余濟閉結所以
在解利而不在斬關也

治大便秘而潤腸湯間或用之　歸尾　生地　桃仁　或蜜
導法煉蜜二兩滴水成珠入于皂末攪勻候冷作條搯冷水內

令硬乃將蜜條插入穀道須臾蜜融而便自通　又用麻油以
竹筒灌入穀道即通　又火結者取豬膽一個將竹筒入膽內
以線繫之然後以竹筒插入穀道令膽汁射入即通　又方用
豬膏一塊煮熟連汁服之以潤大腸亦通如此之類不傷脾胃
是可用也至于小便不利或用導赤散益元散俱可利矣

〔吐瀉蛔虫〕

蛔虫在脾胃之間消化食物初熱毒火扇動虫不能安故逆上
胃口或因吐甚而觸動其虫者出一二三條無妨若滾滾而上則
火灼內傷脾胃已壞不能療矣其後則臟腑寒虫亦不安故
亦時從口吐蛔虫者死世有以川椒黃連等藥以安蛔者雖

知其本既敗縱定其標亦何益若蛔從便出少則無妨多亦凶

## 寒戰咬牙

小兒素受風寒當發熱之際毒出而寒邪亦出固有惡風惡寒者所謂傷寒　傷風則惡風也表散其邪則無事矣若寒甚而作戰慄者則其寒也出于肺臟六日以前多屬肺熱熱極而生寒也然肺熱之症必唇紅脉數痘紫舌苔治宜以清毒涼肺為主不可誤投辛熱之劑七日以後多屬肺寒肺寒之症必唇淡脉緩痘色亦白治當以辛補之藥以回陽咬牙之症亦如此辨但咬牙屬胃獨見症者用藥宜從經絡但此二症初起難治八九日後可治蓋至此毒出陽衰則用補可救也

## 初熱逆症

初熱頭面一片紅如胭脂者六日後死

初熱身如熨斗眼紅唇裂而紫黑者凶

初熱腹中疼痛及腰痛如杖逆尻骨俱痛者不治如痛不甚而有止者解腎邪可治

初熱時心窩中及遍身皮内有成塊紅者不治

初熱時七孔二便出血不止者必死

初熱時遂見紫黑斑者不治

初熱自閉無魂昏睡不醒者不治　然有或為風寒所閉而昏昏好睡者宜散其寒邪宜其毒氣則愈矣

初熱寒戰咬牙者凶　口吐蛔蟲而不止者死

初熱舌頭紫黑者死　聲啞神昏者不治

初熱口吐臭痰或腹脹痰鳴者不治

初熱胸高而突者不治

初熱四肢厥冷舌捲囊縮者凶

初熱口中常如食物者凶

初熱目閉咬牙鼻生黑氣者不治

初熱欲食不化形色青藍者不治

初熱唇頂硬腫或神氣昏憒者不治

未熱先出賊痘數粒至熱時而畀沒者不治

種痘新書卷之四終

種痘新書卷之五

汀郡寧陽張琰　遜璧氏編
受業曾衡波仝參

## 面分八卦之圖



中庭
離
天庭
印堂
太陰
方廣
風池
太陽
方廣
風池
髮際
巽
辰
乙
震
甲
寅
艮
丑
髮際
坤
申
辛
兌
戌
亥
山根
準頭
人中
顴
臉
腮
頤
顴
臉
腮
頤
乾
承漿
子
癸
壬

## 五臟面位之圖



離
心火
曉星
巽
坤
震
肝木
兌
肺金
脾
胃土
艮
小腸
乾
大腸
腎

心主印堂脾鼻端
肝左右肺腎承漿
耳屬膀胱先須驗
太陰太陽仔細辨

## 吉凶痘位之圖



兩凶
太陰凶
太陽凶
兌吉
震吉
吉
乾吉
艮吉
坎凶

乾宮先出方為吉
坎離首出定然凶
艮宮報點三分敗
震宮出處喜多多
巽上見標斑甚險
坤為逆痘治難功
將行在前個當
順逆分明八卦

## 凶痘面部之圖

凡痘周面凶痘先出俱能閉毒初見急宜去之



曉星凶
凶
凶
標凶
關凶
鎖口凶
鎖口凶

兩顴及眼上下先
出者唇口兩旁出
者定壽人中先出
最凶天庭太陽承
漿先出者總之上
十二位水火交攻
之位先出必凶初
見以燈烙之可減
三分之痘

## 面部訣

一看天庭幷太陽　二看鋒口舌尖方　三看梁上梁下穴
四看喉吻定陰陽　五看諸陽觀氣色　六看週圍八卦方
仔細推尋依法斷　神仙妙道自非常　天庭太陽若明朗
此痘從變也無妨　二部痘瘡如慘暗　十個孩兒九個亾
喉吻之中怕痘多　再加黑陷死來磨　飲食挂喉難下嚥
七朝端的要商榷　舌尖一穴統心經　痘瘡紫黑令人驚
再加舌有黑疔見　此見三日見閻君

## 論部位

痘瘡初出紅點，先察部位，可知吉凶。蓋人之面部，左顴屬肝木也，右顴屬肺金也，天庭屬心火也，地閣屬腎水也，准頭屬脾土也。正額者，太陽脈之所會；唇頰者，陽明脈之所經；兩耳後廼少陽脈之所過。痘爲陽毒，故隨陽而先見之于面也。但陽明者，胃與大腸所經之地，故先于口鼻兩傍、人中上下、腮耳元壽之間先出者吉。若太陽者，水火交戰之處；少陽者，水火相併之衝，故其位而先見者凶。其起漿收靨，亦皆如是。至于頭乃諸陽聚會之處，面爲五臟精華之府，咽乃飲食之道路，喉爲呼吸之要隘，胸背爲心肺所居之地，此五處最宜稀疏，切嫌稠密。蓋頭額多者謂之蒙頭，喉頸多者謂之鎖項，胸背多者謂之瞞胸覆是，皆險惡之症也。大忌蒙頭則視聽惑而陰陽絕，鎖項則飲食

而氣易衰，蒙胸覆背則臟易傷而泄瀉，失所以爲難治也。如兩頰兩頤，亦要界地清而顆粒明，若成一片如塗硃者，此肝熱盛而尅脾，肺留毒而內蘊，其後必泄瀉而至喘嗽痰鳴。惟有四肢無碍，雖多亦不爲凶。以上諸症若見，治之之法要清熱解毒，疏通榮衛，調和表裏，使血活氣行而能宣毒化毒，庶無乾枯紫黑之虞，症之重者亦可輕矣。

## 辨放標不必拘部位

標者，初見之點也；部位者，臟腑各部之位也。天庭屬心，地閣屬腎，左顴屬肝，右顴屬肺，元壽屬于脾胃。若謂承漿見點乃腎經出痘，爲不可治；天庭見點乃心經出痘，亦凶；惟兩頰及腮准頭見點最吉。此其所以然者，蓋痘毒原于相火，發于命門，理宜由相火以傳君火，自君火再傳肝肺與脾。毒之輕者，其勢必緩，循序而出，猶源泉之水盈科後進，必傳之肝肺始見點也，故兩顴及鼻俱點者吉。若毒之盛者，一身而出，若決江河，不由科次，其毒一發，故即見于腎位，次即見于心經，此其所以爲凶也。然毒之盛者，多在發熱一二日即出，或一齊湧出。若熱和緩，至三四日始報點，點出又甚粗肥，則雖報于坎離二宮，亦無妨。若報太速，或隱于皮下，瑣屑稠密，或一片紅艷，雖兩顴報點，亦爲凶也。

## 五臟見症治法

五臟者肝肺心腎與脾也痘疹之毒發于五臟故五臟而皆見症第取其尤者而治之庶其不變于其臟其臟乃不傷耳如肝症甚則用藥宜走肝經肺症甚則制方宜平肺腑其餘則兼理之斯可矣試舉各經而條陳之

心屬火火性上炎而為陽故其位居于天庭方廣之區痘出而天庭稠密則心經之毒盛無疑法當清心而解毒其參冬連喬黃連硃砂不可不用且心為藏神之舍而譫語狂言搖頭驚搐皆是心家之症然虛實不同又不可以概論如初發之時多為實熱屬實熱者其唇必紅其舌有苔目多上視口必渴飲此火燥而神昏亂也必宜清解為主然心與小腸相連

而清心必須利水小便通而心火自降矣故清心之劑多宜加以車前木通也若灌膿收靨之際或有狂譫驚悸此時定是心虛治當補血寧心凡歸茸棗仁在所必投　況心為生血之源毒多附血而化治者宜視痘色血熱則涼而活之血衰則補而溫之又當審機觀變而治也　然天庭是為純陽此處不可先收若滿面未靨而方廣先焦則火烈心灰此症斷然莫救治之必致無功白當若見黑點則胸前舌上定有疔傷視顯可知其隱又不可不詳也

腎屬水水性就下而為陰故其位居於承漿地閣之地痘出而擦下此則知其腎精充足雖多亦可無虞地閣若形焦黑則其腎源竭矣痘毒何以成膿再或兼之腰痛則為腎敗無疑縱治亦為難救然不忍袖手旁觀法祇滋陰補血方發之初內服解毒養血之劑務須歸首元枝故仲為佳更以川甲雄黃為引外刮生雞以救腰痛其亦或者能發出齊其痘不損用豬尾血與人參又加麝香少許痘將有水則純用內托補腎之藥而不可以緩也但承漿有黑點陰中必有疔此又不可不知也若諸部未靨而地閣先收則腎竭源枯其死必矣縱有良醫莫能救乎倘陰囊腫脹則腎毒外泄不至內攻有生理也見此且莫慌張只宜力為托毒收靨之後再解膀胱之熱以加味四苓散加梔仁少許則其腫自退矣

肝屬木而居左左頰是其位也兩頰紅而左頰尤甚者則肝熱盛而可知法當清肝化毒且肝以藏血血不熱活皆由毒熱肝經治此之法而鬆肝活血為宜故芍藥丹皮必用而紫胡生地宜施再加紅花紫草兼用紫花地丁則兩頰界地自明至于痘生水泡皆因肝盛剋土脾土不能制水故使水不成膿是制肝又為承漿之妙用也但肝木剋土又有濕青之症故健脾方中加用白芍則肝斂而泄自安況肝木又生心火木盛而火愈炎故驚風顛癇雖出心經必伐木而心火乃平矧肝統筋膜而司眼目或手足牽引目睛上吊皆是肝經風熱治此又必平肝至于立方之化裁全在良醫之妙用必見

其症乃設其方不可膠固而不通也

肺屬金而居右右顴是其位也兩顴多而右顴更密者則肺經毒盛堪知但肺主皮毛毒雖盛而藏亦淺故兩顴部點稠無凶機其見症也多在咽疼咳嗽治之之法祇宜發肌解表理氣寬胸而桔梗陳皮芩連荊防爲可用必痘譜出而咳漸減痘起脹而嗽已除則毒不留于肺自是可以無虞若治之不早至起脹而嗽愈甚則毒凝于肺勢必不可成漿迫至轉爲聲啞則肺氣將絕其症亦云莫救是又不可忽也若寒戰亦屬肺經虛寒又宜詳辨六日以前寒戰其或熱盛唇紅必是肺經熱甚投以清金解表之藥其症可以立除七日以後寒

戰則肺寒當補何疑此際急施桂附恐臟虛痘致頭花必寒退而肺乃安但肺宜清而不宜斂斂則腠理不通而毒何由宣化故未脹之時而五味柯子凡斂肺之藥不可先嘗若漿成之候恐肺虛易中風寒故炙芪諸品須秘勝以固肺腑治法權衡斟酌瀉補須要因時始不至有悞也

脾屬土而居中元壽是其位也此間見點百無一凶但脾乃衛之樞氣血賴其滋養百骸悉望分潤脾土堅强則毒不致陷且易成漿脾胃若敗則五臟立虛毒氣須臾伏陷變症必至內攻然痘毒方出之際毒以留當雖吐亦非胃弱即服煖亦爲胃熱此際雖爲胃熱而石羔甘草恐敗胃亦不敢多

宜或泄瀉毒奔腸府以安脾利水兼解毒四苓散微甚宜酌加秘結脾燥雖潤投亦當微利然亦不可猛攻恐傷脾土之元若瀉痢之候純以健脾爲主但木能剋土恐肝盛或致損脾故健脾又要平肝更念土雖剋水然水塞而土亦崩又宜疏通水道水洩而脾乃寧故止泄又當利水只有升水之防白术淮山莫用恐土燥而水不升將屬尤宜土旺補脾自是良方前後治之得法用藥乃不差訛也

### 異症類

夫痘有吉凶症有生死吉者生而凶者死理固然也必先識其吉凶乃敢決其生死論症豈可差訛況有似吉而凶似凶而吉

者在不可不詳而辨之使學者庶不誤也

### 天根痘　生

天根者諸痘不起惟天庭太陽起灌也蓋天庭乃諸陽之首此處若起則陽氣必旺將漸傳次而起十有九生陽氣爲痘根本天庭起者其根本固也故名天根而必生

### 天空痘　死

天空者諸痘雖起天庭曉星不起也此必其陽氣已虧不能植灌于陽首之處即諸部起者必漸剝落而成空殼故天庭不起十有九凶其餘諸痘悉是虛花故曰天空

### 明暗痘　生

明朗者，諸痘不起，而太陰太陽獨起也。蓋太陽太陰乃日月光華之照，二處灌漿，則陰陽之血氣俱盛，故直達于日月高懸之所，日後諸痘無不漸暗而不升，故曰明朗而生。

明蝕痘　（死）

明蝕者，諸痘雖起，惟太陰太陽不起也。日月當明而不明，猶如天狗之蝕矣。此處不明，則氣血兩虧，故不能充灌乎陰陽聚精之位，其後諸痘安能運化而無虞乎？故以死而論也。

海溢痘　（生）

海溢者，諸痘了、一而耳後方圓一寸獨起也。蓋此處屬腎，名星宿海。此處升灌，故名海溢。海而充溢，則腎經壯旺，精髓已足，而血不虧，故可治。

海枯痘　（死）

海枯者，諸痘俱起，惟耳後方圓一寸不起也。此處不起，其腎已敗。若不調元補腎，後變唇裂齒崩之症，則難救矣。

有根痘　（生）

有根者，地角方圓，其痘起脹，明潤如珠者，十有十生。蓋腎部明潤，腎水足也。腎為人之根本，故曰有根。

無根痘　（死）

無根者，諸痘雖好，而地角之痘乾枯不灌，及灰陷白陷者，腎水絕也，不治。

抱鼻痘　（險）　余遇是症未嘗不治

抱鼻者，面部雖稀，而鼻梁左右密如蚕種者，名為抱鼻。此毒聚于脾胃故也，其症甚險。

單鎖口雙鎖口　（危）

鎖口者，嘴角有黑痘一粒而獨大者，名單鎖口；兩嘴角俱有黑痘者，名雙鎖口。皆惡候也，主不食而死。見此須宜剔破，令出惡血，以拔疔散敷之，或可救。此毒聚于胃也。

鎖項托頤　（危）

遍身俱稀，惟頸項稠密，絕無界地，不分顆粒者，名鎖項；竟至于頤者，名托頤。主飲食不進，聲啞而死。蓋頸項為陽道上升之要

樞，毒凝于此，則陽不能升，焉有不死。

猪頸痘　（險）

痘出而喉嚨及頸甚多者，名猪頸，必主喉痛咽爛，不進飲食而死。急用　豆根　玄參　桔梗　甘草　生地　川芎　歸尾　木通　牛蒡與服。緩則毒結于喉，必難治也。

兩頭痘　（險）

自胸以上、自臍以下俱有，而中間一截全無者，名兩頭痘。此氣血不能貫通于上下，而腰臍之間恐為莠毒凝滯也。若不急治，七日之後，必變灰白之症矣。見點時急用　生芪　當歸　赤芍　桔梗　防風　厚朴　續斷　白芷　山查　木通

入黃豆三十粒服此中間有痘乃可無虞

逆痘　生

上身絕少下身絕多或從下身先出而升漿收結俱從下身先行此雖出於常數之外其實無妨

鬼捏痘　死

通身全無點粒各處一片紅靑形若打傷之狀擬爲鬼所傷也故名鬼捏此症七八日內必死何用施治

鬼痘　險

手足胸背俱多而頭面全無者其痘如鬼不敢現于陽道也故名鬼痘又曰無頭痘此氣血不能上升故頭面絕無點粒急于五日之內提氣上行令頭面略見痘點乃可不然諸痘雖出亦難起脹行漿即痘無虞其後亦主曲池生瘡見骨而死然四肢胸背俱稀者不在此例　治法宜用　升麻　川芎　白芷　防風　羌活　前胡　牛蒡　當歸　桔梗　甘草　笋尖　生薑引

賊痘　死

初出便如菉豆過一日大如黃豆再一日大如龍眼其大甚速者是賊痘也此痘根窠與頂全無血色形雖起脹而按之虛軟痘中有此是爲閉毒之寇故以賊名其後必上下穴血而死又有一種於將熱之時或初熱一二日悶亂于天庭太陽見標數顆大如赤豆光亮好看過一二日即收沒者猶恐賊欲攻壞臟地先命一二細作探其虛實故名賊標此標既沒隨即大勢攻來遍身之痘必如鋪氈蚕種不可救療甚可畏也凡見此痘但急用銀針挑去其惡血以拔疔散敷其口猶或可救

蛇皮痘　死

頭面遍身俱無空地狀若蛇皮故以是名必乾枯不能作漿至十二三日而死

昔余孫女出痘如此發熱之時其饑咬牙口氣臭甚常如食物余因此惡候也急與解毒用解毒湯日進三四服及痘出密如蚕種顆粒不明乃用　前胡　川芎　丹皮　元枝　紫草茸　人中黃　連翹　牛蒡　紅花　黃芩　連進數服乃分顆粒其後加生芪白芷去人中黃紫草紅花黃芩等藥其水漸升乃用參歸鹿茸湯加丁桂白芷白芍炙加白术其漿乃足漿起之候竟似蛇皮落痂之際成片連皮而去遍身如蛇退殼手足指甲無一不落毛髮悉皆脫換其痘果蛇皮也善以治之亦見安全可見不治之症亦須藥而不治也但症遇惡烈藥必猛攻而遲延觀望豈能救乎

雞退痘　險

初標紅潤至八九日忽變陷伏此必其人氣血虛弱而勞及感庸人見其初標明潤而玩忽不治當藥不藥故有此變或用醫

痘症未明誤投藥餌致有此變皆爲患也故名藥患試觀此條當顧名而思其義慎勿潦草而治也

九焦痘　死

天庭地角右顴左顴耳後胸背手足九處皆有一二點黑陷焦枯者名九焦也此臟腑皆滯留內毒將漸遍身焦黑而死誠不可治之症也

伏陰痘　險危甚

痘不起漿而爲膿血此毒氣陰伏于內而不行出于外故名陰伏十一日死但痘方不振之際七八日上急用溫中內托稍可救療

空瘡痘　死然善治亦可救

痘雖肥滿內是乾枯全無血水乃空瘡也其痘硬者名鐵殼空瘡症至如是其必死矣此等之症其氣雖盛其血必虧或又以前失于解毒致毒火內熾其血愈涸漿汁乃血之所化血枯故是空瘡

一兒出痘甚多體性又弱醫人不明氣血之理只用保元湯乃治痘至穩之劑人參用去數錢其痘竟無漿汁請余往視余曰此空瘡也汝試以針刺之刺破之痘俱無血水其家大驚余曰無妨此氣有餘而血不足也人參可以不必乃用　川芎（八分）炙芪（八分）當歸身（二錢）鹿茸（二錢）白芍（一錢）白芷（八分）大生地（三錢）

牛蒡（八分）川甲（四分）肉桂（八分）速進二服漿即來矣乃去牛子而又以補血爲君補氣爲臣其漿乃足而愈

石白痘　死

其痘四弦起而中落窩雖明亮好看內並無漿以手摸之其硬如石形若石白故名石白此毒凝于表血涸于中不能運化其症必死不可治也

茱萸痘　險

其痘不甚起脹四弦起而中略陷痘有亂紋于頂上形若茱萸名茱萸痘其後必空漿倒陷而死此毒盛而中氣又虛故痘頂有紋而不尖圓也

一兒出痘如此諸醫皆云難治請余往視見痘中間多有黑眼余曰此毒凝而氣不能升其毒將入臟腑急爲解毒行氣猶爲可救蓋此時祇六日也乃用　川芎（六分）升麻（六分）生芪（錢）赤芍（八分）牛子（一錢）連翹（一錢）黃芩（五分）黃連（四分）蟬退（三個）白芷（六分）甘草（三分）外以楊柳水洗之遂服數服其痘漸圓淨紋與黑眼俱無其後乃補氣爲君補血爲臣治之竟愈余治此症甚多其症必須解毒行氣茱萸紋乃可除也

虫痘　險

蠅[illegible]瘡而痘內生蛆故其痘痒甚用針挑去蛆虫自愈或用柳條[illegible]鋪于牀上令兒睡臥其蛆自出此亦毒火留于皮膚

故有此症猶之腐草生螢之義也

血痘　死

初出血點其色紅紫七日之內斷其必死　又遍身如硃筆點者內根已腐外苗必萎無生理也

血泡痘　險

滿泡通紅其內是血故名血泡此血熱毒熾不能運化以成漿故有此症急宜涼血清毒爲主用　生地　赤芍　紅花　紫草　丹皮　牛子　黃芩　白芷　弱者加人參　身熱加前胡

血靨痘又名珍珠痘　生而甚佳

痘出稀少四五日胖紺黃豆七八日帶血而靨十日落痂痂若明珠故名珍珠痘此氣血充足而毒又稀故隨出隨結而不及釀膿也此痘最佳百無一凶而且主貴

白漿痘　死　古以死論愚斷險也

初起發時瘡頭即有白漿其後必成灰白痒塌而死蓋漿必由腳而起乃爲順症此毒參陽分而陰血不能運化故不久而即陷伏也但初起之際間有數點即刺去其漿旋有此者又刺之時時瞻顧不可忽玩內服千金散大補氣血而乃可無虞若徧身如此則難治矣

四圍痘　死

其痘出後四圍又旋出小痘崇簇本痘者乃四圍也後必串成一痘而爲水泡不可治也但此症僅見于手足者則無妨若遍身如此其死必矣

漏痘　險　古人斷死

痘未成漿頂上有孔漏出汁水堆聚而結形若癩頭俗呼瀝瘡此因表虛不能養漿故不傷而自潰也急宜補氣使肥同其肌肉乃可救也若遍身俱潰則必死矣　須用　人參　炙芪　當歸　官桂　川芎　白朮　白芷　炙草　丁香　淮山　加龍眼連子同煎

蛀痘　險

痘有小孔如針嘴大似蟲蛀之眼故名蛀痘此腠理不秘乃有是症若不急治大泄元氣必成灰陷而死須用　人參　炙芪　當歸　炙草　桂心　丁香　加荔枝爲引必孔秘而痘乃起脹行漿也

瑠璃痘　又名隱血痘　險甚危

痘雖光亮全無血色明若瑠璃略擦即破內俱清水而或出血總無膿漿此氣血不能運化毒氣而然也後必音啞而死痘若起脹見有此等急取其尤者而刺去其水再用奪命散　人參　黃芪　當歸　鹿茸　白朮　淮山　山查　扁豆　白芷　炙草　加黃豆四十九粒

赤疿紫疿白疿　皆死

痘出之後形若浮疿連片虛浮不分顆粒又無起脹之勢其色赤者名赤疿紫者名紫疿白者名白疿余見此症十無一生不必施治

蚩尾珠　生

遍身俱陷惟尻骨一團飽滿潤澤其明如珠猶之蚩尾露珠也故以是名蓋尻為腎部此必腎强精髓充足急用內托之劑則遍身之痘旋復起矣

黑痘　死

痘毒隨血而出毒盛血熱之甚故其痘乃黑也此必死之症古方雖有數條總以涼血解毒為主姑載于後以俻參用

初見黑點在皮膚之間者用硃砂冰片牛黃　或用猪尾血調入牙散好酒同服

初出點必黑者用紫草茸二三錢好酒調服

又皮膚發青紫紗者用紫草一錢紅花京芥防風牛子貝母（分）

甘草（三分）升麻（五分）木香（三分）

又黑陷無黑靨者用蟬退五个紫草茸一錢

又黑如煤炭血不紅活者用紫草紅花生地牛子赤芍

又黑而軟者氣弱而血熱也用保元湯加紅花紫草生地

又焦黑如熱煤燥者外以胭脂塗之內服加紫草生地紅花蟬退調服

氣血兩收痘　死

近看猶如小麥花遠望胭脂甚可誇臨漿清水無膿汁古聖名醫束手嗟

復出痘　險

有等痘出甚稀依然起脹收靨完竟皮膚之內有痘未出靨後隨下發熱而死此皆元氣虛弱不能送毒故也凡痘出稀者須用燃子照之若皮下隱隱有點是痘未齊出宜急用千金散（方見九卷）托出其痘方可無虞

需貌二十八般怪痘

丹雲繞頂　遍身痘俱好惟頭頂一片通紅也此虛火上炎故耳宜滋陰降火通利小便則火瀉下行矣

紫雲蓋頂　遍身痘好但頭頂一片焦紫陷伏者不治此毒凝陽分陽氣貫升不久而皆陷伏也若不焦紫子陷而不起者則非此症蓋頭為純陽足為純陰凡痘之起脹必下至于足而頭乃行漿收靨亦然

烏紗復頂　頭上一片其痘皆黑而連皮膚俱有黑氣此元陽將脫陽血已死故不治也

梨花覆頭　頭上一片俱白陷此元陽虛弱故也急用保元湯加肉桂附子鹿茸川芎猶或可救

**霞掩天庭**　遍身之痘皆落光明惟天庭一片俱是血泡連皮俱紅此心經鬱積客熱而故有是症也急宜清心解熱以用角黃湯麥冬連翹加猪心血與服

**紫霞鋪額**　額上之痘形若紫霞此心經熱毒之甚其人悶亂不寧若諸部痘好宜用小無比散二十加玄參升麻角刺之或可以救

**烏紗蓋頂**　天庭額上俱是黑痘而難起毒氣也不治

**灰撲印堂**　印堂之痘有灰色也此心經血虛所致宜用千金散（方見丸散篇）加猪心血與服

**紅紗拂面**　滿面雖分顆粒但帶子紅若硃砂人皆以為好痘孰知此由血之太盛若不急治其紅將變紫矣速宜涼血乃能起脹成漿

**楊花拂面**　滿面之痘俱白而不振此氣血兩虧也宜用千金散多用鹿茸加附子治之

**赤硃纏唇**　唇若塗硃而或破裂此脾經熱極也治法宜清脾胃之熱

**烏被沾唇**　唇皆黑痘而或唇黑甚必死也

**霞錦穿胸**　心胸一片痘無顆粒界地不明紅紫滿胸如霞如錦此心經毒火散漫而不能收斂也不治

**紫雲佈胸**　其症略與上同但其色紫甚死更速不治

**黑棋排胸**　胸前盡是黑痘死于三日之內

**楊花飛胸**　胸前盡是白痘全無紅暈界地此心經血虛所致失治則轉灰陷急用參歸鹿茸湯加猪心血治之

**桃花映背**　背上痘稠密而淡紅但其紅散漫界地不分此是心經火毒未清也宜用元支白芍川芎丹皮紅花連翹麥冬生地甘草　失治則不能成漿　但如此者令宜側睡恐正臥則背上之血不行也

**紫萍浮背**　背上之痘形若浮萍而色俱紫此毒盛滯于血分而腎氣又不能送毒須用調元化毒湯去防風荊芥加猪尾血如效可救不效必死

**黑砂滿背**　背上盡是黑點不治

**雲鋪魚背**　滿背青黑如雲痘似魚鱗之布此血氣已枯而毒凝不化決無生理

**赤鱗穿腹**　腹上痘密如鱗而色紅也此脾胃經多火毒宜清胃退火用人參白虎湯加丹皮生地治之

**黑蝦纏腰**　腹上連皮及痘俱黑必腹脹背啞而死

**白梨落地**　痂薄而白遍身痂痕盡無血色此氣血兩敗也急用十全大補湯加鹿茸以救之不然半月之後必生發癬而死矣

**葡萄落地**　痘前痘後忽然片片青紫若葡萄者兩日必死

【飜漿痘瘡】遍身痘俱好惟脊及髓尾如粟之祟見爛斑開者此下元虛也宜大補湯以扶之

【榴花遍野】諸痘俱好惟四肢紅紫而唇口如硃或破裂者乃脾肺二經。甚也宜用赤芍生地紫草牛子石羔甘草桂枝與服可解

【黑珠遍體】遍身之痘盡皆枯黑四肢手足形若柴炭命在旦夕不可用藥致人譏誚

【楊花發枝】諸痘俱好惟手足灰白蓋手足屬脾胃營衛之血氣虛也宜用人參鹿茸白术黃芪丁香附子當歸肉桂桂枝炙草　加煨薑引

【見點辨症賦】

痘初見點宜觀痘色榮枯一來便覺粗肥稀疎可必見點如灑瑣屑綿密堪知熱毒攢隊陸續出來雖稠密猶為可救一齊湧出縱稀疎未必全生細細白頭如麻子乾枯頂作內攻形啾啾紅點如一粟焦萎定成憔悴勢肥粗蓬頂似佳（[illegible]）齒而點子不紅終白陷皮薄頭尖如美種葉萸紋起定空漿肌嫩則皮薄嬌紅黃痍則痘成褐色人黑皮粗痘色必然慘暗是故見之肌肉不同不可一例而斷只要縱突有神（吉症）不甚煩紅乾燥（凶症）色潤身溫見點如珠（吉症）如粟毛焦（凶症）皮燥敷瘡或紫或焦雖然帶熱而出亦恐容似針頭縱是陸續出來尤忌形如蚕種如麩也麥殼如屑如疹

如疥根氣不立腳地全無犯此數端皆云莫救點出如同蚊咬惡烈勝似蛇傷一片紅若鋪毡神醫也言不治況或煙霞此症孰是能醫未熱先數數點俗名報痘若遲熱久不敗此症便作疔瘡先發塊而後敷瘡塊名痘母而必生先發瘡而後發塊塊名鬼痘而難痊避痘避于隱僻眼胞痘內定多內悶痘悶于要處胸心舌喉皆不吉順不畏多逆嫌一點冷疔先現諸痘安敢張形賊痘若生諸痘莫能灌汁辨症若得真詳急宜剔破與灯燒是以夏痘未平痘雖出而毒猶在內透肌發散尤加解毒為良便調人靜身雖熱而毒已在表痛漸發除仍以安表為先設使內外症平此候不須過治再觀見點之後審詳時補何加

【見點認痘法】

夫痘與蚊蚤所傷自異亦與痲丹瘡疥不同蓋蚊蚤所傷雖有紅點其紅必散摸之而不礙手痲丹乃浮游之火亦不礙手瘡疥乃肌肉之毒雖或礙手而皮必癢惟痘毒從骨髓而出又係精血所運故方出之時摸之自然礙手而且潤滑此痘所以異于凡瘡也

【見點三日調治法】

見點用藥與初發略同但初發之藥在發散而兼解毒見點之藥宜解毒而佐升提凡補滯辛熱之品此時猶不敢妄投故肉桂附子丁香干薑炙芪炙草鹿茸鹿血白术茯苓佳山棗仁遠

解熱地黃芩砂仁豆蔻柯子五味一切溫濇之藥止瀉切忌誤之即用黃芪甘草亦用生而不用炙芍藥用赤而不用白地黃用生而不用熟恐壅其滯毒氣而助毒火以貽禍于其後也

## 見點要分前期

夫人之一身皆統于五臟故骨髓屬腎筋膜屬肝心主血脉而肺主皮毛脾胃主乎肌肉而又司乎手足盖痘乃先天之火其毒發于命門當命門毒出而始發熱一日送于筋膜二日出于血脉三日傳于肌肉四日乃至皮毛至于皮毛方見點也故四日而始見標者吉若一日見點者甚凶二日見點者亦凶三日見點者次之古人謂一二日出痘者爲火裏而不治以毒火方

熾之時而痘即見是不應出而出者皆爲不順之症也雖然不應出而出其症固重若應出而不出其症亦不輕此時急宜詳察慎勿袖手旁觀倘不急治則點子不見毒在內攻須臾告變不可救矣嗟夫自古方書皆詳于已出之後而于未出之前深言出而稠密之危不言留中不出之禍不知已出之毒外寇也未出之毒內寇也速出而稠密者外攻也留中而不出者內攻也內寇與外寇孰烈內攻與外攻孰甚故痘已出而死者必在旬日之外未出而死者必在六日之中此余所以長顧深慮而詳爲天下警也凡小兒發熱三四日而未見點者急用撚子照之其痘隱于皮膚之間者盡歷歷可指辨其虛實寒熱而速治之

庶不致毒在內攻而速死也

若皮下點子紅紫其人唇紅舌苔臍下腹痛煩悶咬牙目赤口臭者是毒氣壅盛滯于氣道不能出也急用　升麻　防風

川芎　蟬退　牛子　連翹　黃芩　黃連　只殼　麥冬

桔梗　陳皮　紫草　甘草　山查　川甲　前胡

若皮下之點不甚紫而其人聲重鼻塞咳嗽惡風迷悶不醒膚起雞皮者是爲風邪所閉腠理不通故不能出也然此二症必以前先于表解身無微汗故有此症若爲風寒閉而不出者仍用前方加紫蘇去芩連弱者加生芪用葱白引熱服服後以被蓋片時令有微汗痘即見矣再或用推拿法以鬆其肌表而痘

自出矣

若皮下之點不甚紅潤唇淡倦臥二便清利手足冰冷目閉無魂者是元氣虛弱不能送毒故不出也急用補中益氣湯

人參　當歸　生芪　白术　升麻　柴胡　陳皮　甘草

若無人參須加官桂　鹿茸

大抵痘之所以不出者惟此三者詳審而善治之自無有不出也

## 見點順症

熱至四日于耳目口腮元壽之處先見數點者吉或兩顴或鼻者亦吉或面部未見而手足先見者亦吉此標從肝肺脾經

來也惟手足元壽見者是肺經發痘必至稀少百無一凶爾額來者是肝肺二經發痘雖多寡不同究皆可治是以俱爲順症也

報點之痘肥大皮粗堅硬碍手者吉此元氣旺而毒氣少也必主其痘稀疎始終無事

痘作三四次出到五日後手足方纔出齊頭面胸背以及頸項俱稀疎者吉蓋面爲五臟之府頭乃諸陽所聚兩處若稀則五臟不留毒氣諸陽恐得上升且頸疎疎則咽喉要之區不致胸背不容則週身之血皆榮各處稀疎所以云吉縱四肢稠密亦自無妨

痘出遍身稀疎者上吉蓋痘少則毒稀其血氣必能運也故痘少之症百無一危

痘初出即有起發之勢日漸起脹頭面淨皮又粗老堅硬結實摸之碍手此元氣充足故然也此等終無變症

痘初出即紅活潤澤光明可愛摸之潤滑脚有紅暈而不散漫痘與肉色紅白分明者佳此榮血週充必能化毒起脹灌漿悉可無虞

痘見點後潮熱漸減雜症漸退飲食漸進吐瀉皆止至五六日上痘齊熱退雜症全無飲食如常精神清爽者吉蓋毒盡出于肌膚而不少留于臟腑也又安有他虞乎

以上數條俱爲順症凡如此者固諸出肩端然亦要避風寒節飲食避脈穢慎起居葷酒不可多與藥餌不可妄投蓋痘毒雖出肌膚而臟熱未曾盡退氣血爲攻痘氣陰陽未免不寧更慮虛隱肌肉表裏皆虛此際若或不慎而風寒穢氣所衝毒反倒陷內向枯或妄施藥餌又恐另生他症以致輕變重而順變逆者深爲可太息也余故不憚至再至三而叮嚀之

一兒以痘身熱已退痘又稀疎起居飲食已如無事之時人人皆曰此順症也不必服藥余亦曰然忽爲風與穢氣所衝身復大熱結胸咳嗽至于失聲余以　升麻　前胡　陳皮

桔梗　炒芩　連翹　防風　川甲　川芎　甘草　諸藥與服此時已七日矣連服二劑至八日遍身復出痘甚稠密余將前痘置而不理只以後痘爲主但理肺升提又用陳皮桔梗　牛子　川芎　前胡　川甲　紫草　白芍　山查甘草　與服其後痘升漿行乃其咳漸止其聲漸開而愈此亦可爲不慎者鑒也

一痘出潮熱方退不可驟投辛熱恐火熖雖息而餘燼猶存一遇燥烈其火復炎煩燥狂譫之症不旋踵而至矣

一後生出痘至五日上醫人見其熱退悞投桂附其人遂發狂譫口鼻出血夜半請余往視聞其房中狂叫冤甚余取冷水

一痘進房即噴乳面其痘略定方得細觀見痘雖淡紅而顆粒明朗知為服熱所致乃以川連麥冬生地黃芩加百草霜煎服仍調定心散與服即愈

一見點之後其痘之輕者其熱即退毒稍重者熱略緩而不退也必至五六日上出齊其熱方退其痘若分雖熱無妨不可妄用寒涼以退其熱恐後難于起脹也

一痘方出三四日上手足冷者不要驚慌諸陽氣上達以逆毒未及下行于手足也必五六日上痘將出齊乃温耳

一痘未出齊其兒不食此是胃中有熱故不食也不可認爲胃弱而投燥胃之藥滞其毒氣貽後日之患也

## 見點險症

痘既見點吉凶攸分當知其吉宜識其凶火裏苗來痘方出而苗已槁一齊湧出毒甚猛其勢難禁至于天庭地角乃水火交攻之所此處不宜先見鎖口攔門爲飲食呼吸之關有痘即宜剔去臉星報點非爲吉賊疔痘現總皆凶鎖項蒙頭毒攻陽而截要腑胸背痘逼臟以多成群大點來沉隱是毒多而氣滯逆痘色慘暗是毒凝而血不榮界地不分是熱血散漫于皮膚不得附根而領毒治此須當凉血一片紅色是惡毒根聚于肌肉不能出外以成瘡遇此斷乎不治如見黑癍青點與血知其已死初出白頭不振氣血知其將亡此等皆爲逆症點來即[illegible]

預知痘其肥粗而起發長潤滑而粗顆粒分明終為吉兆稀疏佈點亦無一凶是以痘方見點可決死生豈待變症將危而始知其壽夭乎

一諸痘未出獨于印堂先見一顆者名曉星報點此痘能閉諸毒熱宜以燈絡之但小兒畏燈必然躲閃須用銅錢一个印于痘上令痘從錢眼發出然後烙之乃不差誤

又承漿廣額先見數點將此心腎二經之苗必凶又恐為賊痘之賊標似速以燈烙之或用銀針剔破吮去惡血旋用拔疔散（方見丸散篇）敷之亦可此標一除能減無許之虐

一嘴角有痘曰鎖口鼻孔發痘曰攔門二者皆爲凶痘喉舌之

痘主咽痛心窩之痘主煩悶凡耳後窩中頸項窩間有痘皆不吉或痘出不拘何處有獨大異常者非賊痘即痘疔也能閉通身痘毒俱速宜去之

一見出痘稀疎潮熱亦退余見天庭有痘一顆其大異常余曰此宜去之其家不信余言至次晚復來請余謂其兒潮熱復作煩燥驚譫痘皆變色余往剔去其痘以藥敷之熱退人安痘遂起脹勿謂此爲無害也

一至四日上痘一見點則毒氣將達皮膚此時熱宜漸退諸症亦當漸平若熱不少減宜用清解丸次服散花丸（方見丸散篇）

倘猶大熱煩渴悶亂不寧或點來塌陷者其毒必重其痘必

後急進水藥一日須二三服以解毒湯爲主（方見初熱潮熱）際速爲解毒或可減若忽忽視之則綿延不捷毒氣蘊結之弊至矣熱四五日內正宜解毒若宜清不清遲延數日痘成焦紫而又不敢用凉悔之作何及乎

至五日上頭面胸背俱宜出矣至此猶隱于皮膚之內欲出而不出者謂之不快然痘出不快亦有數等或爲風寒所閼或爲熱毒所壅或因元氣不足而已明辨其症而立其方矣又有爲穢氣所冲而忽然退縮痘出不快者其痘必痒急宜內服平和湯以托毒解穢外以紅棗沉檀乳香燒烟薰之則穢解而痘毒出矣古方用蒼朮全燒余謂痘貴潤澤而蒼朮去濕以此薰之恐致于燥之弊余故辨此以戒之　痘外齒黄而惡臭宜清淨而惡污濁一遇厭穢則肌退縮紊亂于肌肉之間後雖托出亦輕症變重痘稀變多余隣是症往往然也可不慎乎

平和湯

人參　黄芪　當歸　川芎　白芍（各四分）　防風　白芷　官桂

桔梗　沉香　乳香　檀香　藿香　生薑（引）

右方參芪歸芍補氣活血以托毒諸香解穢透肌以達毒除厭之藥莫此爲妙

一夏月天炎暑氣所遏痘出不快以致煩渴者用人參白虎湯或用五苓散　或神砂益元散用香薷煎水調服暑退而痘自出　凡小兒出痘之時痘毒達于皮膚宜熱氣透洩不可包裹太甚鬱其熱氣余嘗見恒仰卧者其背必多頸將靠枕之處者其項必密此皆氣血不行則毒必壅熱氣難洩則症必多之明驗也况覆蓋既秘則內熱蒸而外莫洩或致鼓動浮游之火而有疢丹疢癮之虞是又不可不知也

人參白虎湯（本方去人參即白虎湯）

人參（五分）　石膏（四錢）　知母（一錢五分）　炙草（三分）　加糯米一撮

五苓散（分陰陽利水道止熱瀉之良方也）

白朮　赤苓　猪苓　澤瀉　官桂　木通　加干葛生薑引

神砂益元散

滑石（飛過六兩）　甘草（一兩）　神砂（五錢）　余加車前木通牛子

凡治傷暑總宜利水蓋暑不可發亦不可下當從小便所瀉也

有因服寒冷氣所侵以致肌表不温而痘出不快者其必皮膚粟起時作戰吟用陳氏木香散或用五積散或麻黄桂枝湯主之

陳氏木香散（其爲末量兒大小與之）

木香　腹皮（淨洗）　赤苓　前胡　青皮　法夏　丁香　訶子

炙草（各二錢）　肉桂（一錢五分）　加紫蘇（二錢）

五積散

川芎　當歸　白芍　茯苓　人參　陳皮　蒼朮　厚朴（薑棗引）
炙草　半夏　白芷　桔梗　加乾薑　肉桂　麻黃

## 麻黃桂枝湯

麻黃　桂枝　乾薑　炙草

或因以前勞力傷神以致元氣虛弱而出不快者宜用補中益氣湯加官桂與之

或因初出時吐瀉過甚以致脾胃虛弱而出不快者宜用理中湯　若瀉未止加茯苓豆蔻訶子

人參　白朮　炙草　乾薑　加官桂

或因前有房勞以致腎虧而出不快者多有腰酸腹痛宜用

人參　生芪　當歸　川芎　元支　白芍　杜仲　故紙
續斷　枸杞　肉桂　炙草　或煩渴者加麥冬通苓

或痘正出時忽然中風眼目直視牙關緊閉者不可用驅風之藥急以薑附湯濃煎灌下令出微汗即愈（附子乾薑）

或又熱症又形虛症又見是元氣不虛而毒氣猛烈而痘出不快者解毒既恐傷元扶元又恐助熱此京熱俱忌之症最難措手必用頂方剖雞敷臍以托之其痘自出余遇此症屢用是方百無不效

至五六日痘當出齊凡看痘齊與否必以腳心為驗腳心有痘則出齊矣然痘稀少亦不拘此總以熱退而痘齊為出齊也若熱後身雖加脹有痘終恐未齊不可謂毒輕痘少而謂不[illegible]意也

一兒痘出疎甚四肢俱有所出之痘又皆起脹但熱不退人漸浮腫時至八日其熱與脹愈甚乃請余往視以燈照之皮下又無點粒余思痘稀則無熱熱則毒留于中余乃以內托之劑與服其熱稍輕連進二三服然後復出其痘甚稠及痘出齊而熱退人安

又一兒痘齊熱退但人不寧靜不肯眠于床上必向地上搦衣覆睡晝夜如此余思此必火伏中州其腹中熱故必欲覆于地也余用頂方仍剖雞敷臍復托出痘一層其兒乃安

又一兒痘出一半忽不能言語手足冰冷目閉無魂面青唇白氣息俱涼余曰此厥陰症也一時無參且不能進藥仍用頂方以雞敷臍之法連換四雞其痘乃齊其人方愈

又一兒痘出甚稀潮熱亦退但其體性怯弱余見週身之痘未上百顆此毒輕痘少何足介意且其家又貧遂未用補至十日上其痘將靨忽然咬牙寒戰乃用桂附理中湯連進二三服其空地忽出小痘然時日已緩不能成漿後于足心胸俱發癰毒反用去人參二三錢其兒又受餘毒之痛楚皆忽而失補之過也可不慎乎

## 觀形色而調治

矣痘毒之輕重氣血之虛實要皆顯著于痘瘡此由外可徵其內也痘既出見急宜觀痘之形察痘之色辨症立方速爲調治預爲起脹之計也

痘色滯暗不明者是邪火鬱于肌肉之間而血不榮活也宜用

### 加味升麻湯（症入中黃亦可甘草更妙）

升麻　防風　牛蒡　連翹　赤芍　川芎　當歸　紅花　紫草　甘草　大便暗加麥、黃連　兩頰暗加丹皮黃芩

發熱一二日即見標者曰火裏苗若不急退其熱則苗稍尖焦

### 清地退火湯

地骨皮（一錢）地膚子（八分）牛蒡（七分）柴胡（一錢五分）紫草（八分）干葛（八分）連翹

赤芍　紅花（各六分）木通（一分）虫退（二十一）次服去柴葛

一方用茶光以酒洗淨然後煎水與服

痘出大熱不退一切紅紫乾枯界地不分者皆毒壅血熱所致若不治必忽然焦黑八九日間必腹脹氣喘痒塌而死故見此症即宜清毒活血以涼血解毒湯或大成散治之

### 涼血解毒湯

紫草（一錢）生地（八分）赤芍（七分）紅花（四分）防風（三分）荊芥（三分）黃連（三分）牛蒡（錢）前胡（一錢）木通（五分）人中黃（四分）天麻（三分）丹皮（八分）川芎（三分）

右方以生薑糯米引弱者加生芪人參

大抵毒盛血熱之症不敢用當歸恐其[illegible]

### 大成散

川用（一兩酒炒）甘草（三錢）雄黃　硃砂（各一錢）麝香（二分）共爲末

右方服能攻毒出臟腑若痘出不快與毒而不起則熱不退者用此立効　怯弱者人參煎水調服　狂躁者麥冬燈心車前木通煎水調服　痘紅紫不起者紫草紅花赤芍人中黃煎水調服　有虛寒泄瀉不敢用

痘或一齊湧出大熱煩悶稠密難起痘反形焦而色黑此皆熱毒猛烈而氣血凝滯不能拘攝毒氣外出以成膿不急治將變紫黑一陷決死于十二日間甚則發于十日之內一見此症速宜活血調元透肌解毒宜用

### 調元化毒湯（若無人中黃用甘草）

生芪（一錢）人參（五分）赤芍　當歸（各八分）牛蒡　連翹（各一錢）黃芩　黃連（俱炒各五分）防風　荊芥（各三分）桔梗　木通（各五分）前胡（八分）紫蘇　生地（各七分）紅花　人中黃（各三分）虫退（三分）山查（一錢）

右方以參芪補氣歸芍紅地活血翹蒡芩連解毒防荊蟬桔疏風達表最爲穩妥　有嗽加陳皮花粉　實熱或四五日內去參芪芩連亦當略減六七日來恐防荊散氣亦宜少減或去之血熱者去當歸全要因時因症善於加減乃能成方

痘出稠密干紫不起身熱氣粗而譫亂驚搐時常咬牙手足[illegible]此熱毒壅滯于臟腑故肝木動而生風心火炎而驚搐

[illegible]風痰熱邪攻內臟之邪當用

烏金丸

殭蠶（酒洗炒）　全蠍（去尾）　甘草　紫草　白附　麻黃（各五錢）　川甲（一錢五分）

蟬退（二錢）　加木通　桔梗　柴胡　石羔　白芍　犀角（各二錢五分）

共為末，另將紫草紅花各一兩，以好酒一碗，慢火熬減酒至半碗，乃去渣，將酒入蜜共熬成膏，滴水成珠為度，和前藥作丸，如龍眼大，硃砂為衣，量兒大小與之。

痘雖見點，其毒鬱而壯熱煩渴，唇口燥裂，而痘紫黑不起者，此由毒留脾胃，治當內解脾胃之鬱，外清肌肉之邪，宜用

防風　白芷　紫草　甘草　紅花　生地　虫退　木通

川芎　赤芍等藥，煎水調下小無比散治之

小無比散

滑石（六兩）　石羔（一兩煅）　甘草（五錢）　寒水石（煅過五錢）　鬱金（五錢甘草水煎透焙干）

右為細末，量兒與服，熱甚者加犀角磨水，和前湯藥調此散服。黑陷不起者，加川甲二分，麝香五厘，紫草煎湯調下。

痘初出有如雲霧突起，紅丹遍佈者，此浮游之火，散漫于肌肉之間，以邪而亂正，治當凉血解肌以退邪火，須用

玄參升麻湯

玄參　升麻　甘草　加紅花　紫草　黃芩　荊芥

凡痘[illegible]外白者，是毒凝于表[illegible]

三黃湯

黃連　黃芩　炒支　加紅花　紫草　人中黃　川山甲　人參

又痘有內白外黑者，是毒滯于表也，當解肌毒而活血

升麻湯

升麻　連喬　黃芩　乾葛　加紅花　紫草　赤芍

凡痘初出，雖貴紅活，然其紅也亦要明潤而鮮，若紅而兼紫與黑者，皆毒氣凝于血分，以致痘瘡紫黑而成焦枯也，總宜凉血解毒為主，失此不治，必成黑陷，速用凉血化毒湯

凉血化毒湯

歸尾　赤芍　生地　木通　連喬　牛子　紅花　紫[illegible]

山豆根（入人齒煅過為末調服）

痘出頂上有黑莿紋者，是毒凝而氣滯也，色不甚紅者，用調元化毒至之色紅紫者，用凉血化毒湯加川芎虫退防風，若不急治，後必成紫瘡之痘，而死於十三日矣。

以上俱毒盛血熱之症，固宜清毒凉血，一用辛熱，必轉為險，惟清凉之劑，乃對症也。然熱亦不可驟退，毒亦不可過清，若痘轉紅活，人稍安靜，即宜止清凉，而漸進溫補，以為成漿之地也。若過用寒凉，恐冷氣變為虛寒，又更為可畏矣。一見出痘稠密，其發熱壯盛者則宜解毒，遂以芩連枝佰為清解

其證似是而狂亂矣請余往視余見痘色淡而不紫其身又不甚熱知爲內虛之症心血不能養神故如是之狂亂也雖僅五日亦當用補乃用人參黃芪炙草當歸棗仁硃砂入猪心血與服狂譫即定又見其大便紅赤余曰此熱毒淫于腸胃也遂以人中黃牛子蒸拌一服即愈此亦過用清凉所致也學者切宜鑒之若五六日上見其便秘或黃而反用下藥痘即陷伏致不可救者又屢見也可不慎乎

### 見點虛寒諸症

凡痘出而熱不退痘頂不起根窠欠紅若隱若見出而復沒者兼之唇淡面青雙眸不炯聲氣不雄此氣血兩虧不能鼓發

其毒也若不急治則毒陷內攻甚則死於六日之內否則八九日間必變灰白痒塌而死矣一見此等宜速用千金內托散以托毒出外而後乃能起脹

### 千金內托散

人參（五分）　黃芪（六日前生用）　當歸（各一錢）　白芍（炒六分）　川芎（四分）　官桂　炙草（各三分）　山藥　木香　厚朴　防風　白芷　桔梗（各三分）　薑棗引

又痘出雖稀其痘與肉色無異而根窠絕無紅暈者此血虛而氣亦不振也宜用人參黃芪當歸鹿茸川芎白芍

又方用保元湯

人參　黃芪　加當歸　川芎　紫草　紅花　肉桂　防風

---

初出之時痘雖不紅而粗肥起頂者是氣至而血未至也又不可一槩以血虛而論至起脹時其腳自紅

又有痘出身涼不思飲食痘色灰白吐乳瀉清手足厥冷腹或脹痛者此純陰之症最爲危險速用起死回生丹或異攻散救之

### 起死回生丹

丁香（十粒）　干薑（一錢）　水煎熱服被蓋片時令脾胃溫暖陰退陽回痘自紅活矣若吐瀉不止再用

### 異攻散

人參　白朮　茯苓　當歸　陳皮　半夏　厚朴　木香

丁香　肉蔻　柯肉　官桂　炙草　加薑棗引

右方調陰陽救表裏治虛寒吐瀉灰白不起但非虛極不可輕用

凡痘初出形貴蒼實而厚勢宜起脹而堅若皮薄而不蒼厚痘軟而體不堅此皆毒在氣分或氣虛而不振也不急治之則必變爲灰白塌陷而或爲一包清水致潰爛不痂而死矣必于初出之時速以固陽散火湯治之

### 固陽散火湯

人參　黃芪　當歸　白朮　升麻　防風　連翹　木通　甘草

右方以參芪白术補氣升防連翹八氣分疎通而解毒故氣旺不滯而毒得宣也

以上諸症俱是虛寒然痘色白者亦非可以槩例或有熱毒鬱結於中使氣血不能舒暢而痘色亦起皖白者必解毒活血其痘乃紅不然三日後漸變紫色而轉焦枯矣然此實熱似虛者痘色雖白其人脣紅舌苔煩悶不寧宜以調元化毒湯治之（前方見）若虛症既形而痘又白則必以補爲主

凡痘初出即有起發之勢者是氣血不虧而不滯也雖毒盛稠密亦可以治只怕隱匕在皮膚之間摸不碍手則毒盛元虧是難療矣

大凡看痘須看面部蓋面爲五臟精華所著面上之痘若好則臟氣充實毒不內留雖遍身稠密不起亦可以治

大凡痘至五六日上痘已出齊必要退熱若熱不退是可憂也蓋毒猶在內而未盡出于肌膚也若增大熱更可憂是毒由留將爲內攻其痘必爲焦枯也

痘出點來稠密其天庭地角雖然明朗而兩顴甚秘一片丹紅不分界地此毒在肝肺二經是爲逆症若不急治斯必變失聲痒塌死矣已未年建邑最多此症余用前胡赤芍紫草茸生地丹皮牛子連翹川芎黃芩黃連木通甘草　外用冰柳草煎水屢拭其面其痘立即轉色後皆色得外洗之法此內外交攻之義也又或以胭脂米搗水搽于痘上亦能解毒活血但更難于辨色耳此皆屢試屢驗之方不可忽而不用也

## 見點雜症

痘毒方發之初凡風寒暑濕俱先毒氣而出故發熱之初雜症甚多若痘出齊則餘邪盡退雜症同當除矣然亦或有未除者非餘邪爲亂是痘毒爲殃也治者當以治痘爲主痘若起脹諸症又烏有乎故一切雜症俱詳于發熱之篇而茲編祇數條耳

驚搐譫語見點之後亦常有之此皆痘未出齊熱毒內壅所致也痘若出齊其症乃定仍用鎮驚丸與定心散治之古謂先

痘後驚爲凶者蓋以出齊後驚言也

腹痛前已辨明但有痛而發厥其痘出不快者用蟬退去翅足爲末每服一錢痘出自定　有煩燥叫痛者用芍藥防風湯

白芍　陳皮　升麻　防風　桔梗　川芎　枳殼　厚朴
牛子　有大便秘結而痛者用大黃化毒湯　白芍二錢
厚朴一錢五分　陳皮七分　大黃一錢

嘔吐泄瀉最傷脾胃脾胃一虛必難起脹此際急宜詳辨虛實而調治之其方已詳初熱篇

夾瘢丹疹癮　凡痘方出之時有夾瘢夾丹夾疹夾癮而出者不可不辨瘢則點稍大而不紅此皮膚毒受風寒也宜用立

參升麻湯治之宜以玄參爲君藥（方見前）、丹則其點甚紅而小粒狀佈若丹砂此乃皮膚之毒也治當以解毒湯加玄參爲君 疹即痳也其毒發於六腑亦宜清毒活血其法詳後痳症卷但痳痘齊出宜先治痳蓋痳毒屬陽其火更烈速宜升提清解先去痳毒以治其標然後乃扶痘以行漿收靨況痳症易于收成痘前又宜解毒七日以前普于解毒則二症並行亦不足也 斑則紅點隱于皮膚之間而不現耳以上四者俱是浮游之火散于皮膚總以清解爲主多加玄參一二服即立退矣彼世愚夫愚婦不知此症疑皆是痘相類驚慌醫者雖識此症不肯明言其說反謂其有刪痘之方以

邀一時之厚恩余深惡之故詳辨焉

夾水痘 水痘者亦在胎中其母飲食之毒或成胎而再交之火也其毒不藏臟腑所以不致傷生依然潮熱起水其形與痘無異但不灌膿亦無甚痂疕而易收結正痘未出或水痘先出或水痘與正痘並出者但水痘易于起水正痘必如其期有分辨耳正痘若好見有此等不必過慮特行家遇此則謂吾能去惡痘而復出好痘甚可惡也

疔痘 痘中有紫黑乾硬異脹獨大那無紅暈者即痘疔也痘疔能閉諸毒不發若有疔則諸痘不能出現既有疔則諸痘不能起脹行漿時有疔則諸痘必致倒陷其爲禍也豈勝言哉故初出之時見有紫黑獨大之點恐其成疔即宜以銀簪刺破吸盡黑血然後以拔疔散（方見丸散篇）敷其瘡口次日復看若再硬脹仍然刺破以前藥敷之必轉紅活方可已也若針挑不動手捻有核則成疔矣須用針從四邊刺開以小鉗鉗出其形如疔有半寸許長拔去其疔仍以前藥敷滿瘡口乃可無虞 又手足四肢有痘深暗堅硬而甚痛或外無痘而內有核作痛者亦痘疔也宜以艾火灸之即愈或以燈火焠之亦效若不急治則其疔深陷穿筋透髓而爛見骨甚可畏也 又天庭有黑點心窩舌上必有疔掖傍有黑點陰囊必有疔兩顴有黑點兩腋必有疔鼻頭有黑點四肢必有

疔此觀顯可知其隱又不可不詳也 又治疔法用巴豆一个去皮硃砂一分研爛點入一時即愈

一婦人出痘稀疏明潤似爲順症但熱不退已而明潤者漸覺慘暗其人亦煩悶不寧矣余詳觀面部見地角一痘紫黑將焦乃命其夫察其陰中有痘疔否未幾其夫出曰陰戶之上果有黑痘一顆其形甚大余曰是疔也仍教其夫用銀針剔破鉗出痘疔以拔疔散敷之其熱遂退諸痘悉皆潤澤起脹而即愈矣凡遇是症不可忽也

一兒出痘至六日上變症請余往視余造其廬則言已收靨余觀其痘稀朗而起乃自思曰此非死症胡爲致死又見諸痘根

脚猶紅心口微溫余曰此兒未死須解衣視之見心窩中有一疔余遂與之刺鉗拔去其疔將獨參湯漸口灌下不一時遂回陽而愈若謂逆痘　點遂致殺人者是痘疔也

一痘初出三五成群聚成一簇者俗謂梅花痘其後必連串一个不能成漿而為水泡凡見此症惟四肢有者則亦無妨若其遍身頭面多有此痘則不治矣

痘瘡入眼　痘出之時有眼紅而不敢開者是眼中有痘也任其眼白黑珠有痘亦自無妨只用清肝丸（方見丸散篇）磨水蒸出藥性又用胭脂米研爛入藥水中頻頻點入又以藥查敷于眼上數日毒散痘收自不傷目即用胭脂水點入亦可

小痘　痘之大者俗謂大痘小者名亦痘蓋以形而名也亦痘雖不甚起脹而尖圓可愛此乃毒稀之症故易齊易靨不如常期亦無恙也

余見有遍身之痘一齊湧出一齊起脹一齊收靨而無恙者然其痘自光明潤澤痘出熱退此氣血兩盛易于送毒故也

瀉痢　此皆熱毒下注大腸故有是症亦或值時疫所染而然也此時五六日上痘與痢症俱宜清毒活血用四物湯加黃連木香紅花木通則二症兼治矣此時若曾解毒至痘起漿用補亦不妨于痢也

## 見點逆症

凡痘初熱一日即出者凶二日出者次之一齊湧出者不治此皆惡毒猛烈不由經絡斬關破壁而出故如是之速也此時急宜解毒涼血猛以治之若熱退毒清猶可救也不然必轉焦黑而死矣

凡痘于天庭方廣印堂承漿先見點者此痘出心腎二經此固毒發陽位火臨水府再加天庭地角稠密條暗則心腎受敗水火交傷如或唇紅目赤色白痰鳴則斷不治矣

痘已出後熱一遍復出一遍者凶

凡痘密如蠶種或如釜中滚沸而無縫者不治

凡痘初出全不起頂形如燈燒湯泡者不治此氣血不和毒無

由化也九日後必痒塌而死

凡痘初出遍身之痘猶如蚊咬者不治此毒氣留于肌肉不能透出以成瘡也必在十日內死

凡痘初出連肉通紅不分顆地形若紅毡者不治　或以化毒湯加紅花芩連紫草辰砂蘇木治之界地能分則可救否則必死

凡痘稠密其根窠絕無紅暈或紅而散慢者不治此氣不能領血而血又不能載毒也急以八珍湯治之若紅活起頂或可救

凡痘初出即白皮肉色無異久而不轉紅潤者不治

痘初出即紫黑焦枯如乾疥瘡者不治

凡痘初出即預陷中有黑點如針眼者不治此毒入臟腑不出也

凡痘初出即含水珠皮薄易破者不治

凡痘初出皮薄色光明若瑠璃雖然好看而根窠全無血色一二日間即大如菉荳者決不灌漿必成一泡淸水八九日擦破而死大補血氣或可救

一痘先於天庭不麻忽現賊標光亮好看倏然而沒者不治

一痘出而煩燥不寧腰腹仍痛口鼻氣粗繼來紫黑者死

一痘初熱腰痛痘出而痛愈甚兼之標如蚕種煩悶不寧者死

六日間口唇青黑舌上生疔而死

一痘出不似痘形滿面血點如噴丹砂者七八日內即死

一痘既出狂言如見鬼神好飲冷水點從腰上先出者不治

一痘初出未見痘形祇有紅斑如錦如霞者急用玄參升麻湯或犀角地黃湯退之若不能退必死于六七日間

犀角地黃湯

犀角（磨）　生地　赤芍　丹皮　牛子　桔梗　升麻　玄參
防風　甘草

又有痘出而或青或黑猶如痣者或肌肉有成片青黑者俱死

又有痘出稠密嘴唇崩裂腐爛發斑者不治此毒攻脾胃火旺解利若下膿血十可救二

一痘出而舌捲囊縮者死

一痘初出即有紫赤之點大如菉荳現于兩脥及腹上者此肝肺與脾皆中毒也不過三日遍身之痘俱紫黑而死

一痘既出後發無名腫毒者十有九死此毒氣不能洩之于痘而致發此腫也較之餘毒發癰爲更烈耳

一痘既出而吐瀉不止蛔虫從口鼻大便滾滾而出者不治此脾胃已敗蛔不能安也雖極力健脾亦難補救

一痘遍身發紫泡刺出黑血者必死

一痘出斜視若有正視則無面如橘皮者死

一痘出形如蚕壳又似蛇皮者不治　或以芎歸均氣飲治之若轉紅活尚或可救若不轉紅則血斷已甚斷不治也

芎歸均氣飲

人參　當歸　川芎　赤芍　防風　荊芥　青皮　木香
官桂　麥冬　薑引

一痘初出數粒于山根之上其色深紅而紫者凶此氣弱不能主血血與熱毒乘虛而犯上也宜用涼血化毒飲主之

涼血化毒飲

歸尾　生地　赤芍　木通　連翹　牛子　紅花　紫草
豆根

凡痘初出口中腥臭之氣勃勃冲人者此肺中毒火熬煎肺將潰爛故也急以清金湯治之如遲不救必變失聲喘急而死

### 清金湯

知母　黃芩　石羔　桔梗　甘草　天冬　麥冬　地骨　木通　山枝　花粉

痘初出之時或含水泡或將起脹即帶膿漿或膿水漿[illegible]然後監此皆毒火太甚失其自然之序不應至而至謂之逆

---

## 種痘新書卷之六

三山汀郡寧邑張　琰逊玉氏編輯
受業胥衡波全參

### 起脹辨症賦

五六日間痘出齊矣點至足心勢方安定倘有陸續不出之狀或隱隱于皮膚之間而不見其起發者名不快若非風寒壅遏之因必有氣虛不振之過是故五六日間痘已出齊身表宜涼八九日後痘欲離腠身表宜溫涼則痘之毒氣出于皮膚而內不留彌熱溫則人之血氣自爾流通在外易于運化至此而身不微熱雖未至于水伏而痘瘡斷乎弗長六七日來痘顆已成瘡宜肥大而粗頂要發光而自有行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅有可愛延綿八日依然到頭空亮虛花其內無漿影若皮薄而光亮如燈內含是水雖頭尖而根脚不紅行漿亦實如熱蒸鬱而未解則爲紫爲黑壅而不起則爲陷爲塌滯而不榮則爲乾爲枯爲青爲灰怯而不振則爲不快爲停漿或有因此腫脹而痘反不起者寒則滯而不行而色雖浮而痘反退伏者毒則壅而不行均不熱而痘不起恐成水伏之形此際宜行濕藥氣血弱而不興恐成陷伏之弊治此斷用補劑仙如紫色乾枯切忌溫中滯補只宜活血鬆肌若或皮薄漿清則宜健脾助氣切勿解毒清涼爲甚爲滯烈藥雖然可發透肌尤甚

亘乃瀉泄雖宜温補瀉甚當佐升提界地不分安能起火焦紫不退必致內攻頂有亂粒宜解毒衛營眼現是危機此際猶攝解毒急施拯救之功遲之二日則難措手遮何及乎

## 起脹三日調治法

痘出皮膚要漸漸起脹蓋痘起一分則毒出一分必痘脹滿而毒乃盡出倘痘不起脹則痘雖見點其毒仍留臟腑數日之後其毒內攻不可救矣故出齊三日之內其時日十分要緊急于此時觀察形色審証用藥猶如拯溺而不可緩救焚而不可遲也夫痘之安全必要漿膿飽滿其次亦要膿漿六七分方保無虞痘瘡既出形色顯然其膿之成與不成漿之足與不足此時

皆可逆睹蓋痘出齊後潮熱已退雜症又除稀疎明朗尖圓紅潤皮粗而厚體質而堅者氣血俱盛毒氣又清必能起脹必能成漿此固可預知也若或稍生不順或熱不退雜症不除色暗而不明勢弱而不振界地不分顆粒不圓紫而不鮮焦而不潤淡而無血薄而不堅者非毒盛之失解則氣弱之當扶此症若無藥救則必不能起脹不能灌漿亦可以先知也故必于此時力為調治猶可救也失此不治則不能起脹又安望其成漿乎症之生死決于痘之起伏痘起則毒從外出而可化痘伏則毒留內攻以為殃故起脹方有生機陷伏必徐死例此萬古不易之論決無倖全之理此際可不慎乎

## 論出時發癢

痘毒有氣而無形必藉氣以送之血以載之毒附于血送至皮膚以成痘瘡故有形也方出之時毒與氣血後為一團乃成點子及痘既出則氣充其上以升毒血附其下以化毒故頂尖而圓者其氣上升也腳有紅暈者其血下附也分清氣血之時頗多作癢及氣血各定其位則氣上升以化毒血下附以養其痘自不癢矣痘雖忌癢惟初出時癢乃不懼也

## 出齊發熱

凡痘出齊必要退熱潮熱已退則毒盡出于皮膚矣若出齊猶熱是毒猶少留于內也出齊大熱是毒甚滯於中也必宜寬毒

出外毒不留滯則熱自退矣而痘亦自長矣但熱之所以滯留亦有兩端　有毒氣壅盛乃滯留而不出者其痘必紅紫乾焦兼之煩悶宜用調元化毒湯以解之若仍不退則用大成散以攻之服此而痘光潤起水即熱未盡退亦當更用補劑蓋八九日上候當用補不敢復試清涼也　有元虛不能送毒者痘必淡白雖見點稀疎其熱不退亦是留毒未出不可玩忽視之必宜用千金內托散托出痘毒方可無虞

宜固表安脾

痘當出齊宜固肌表安脾胃蓋肌表為痘瘡造化成功之地肌表不固則有皮薄漿清潰爛難痂之患故八九日上必用參芪以實表以其補氣而實腠理也脾土不堅則有泄瀉下陷之

不宜用利水之藥

論忌燥藥

治痰法

虛而痘安能起脹以成漿故凡滑利下瀉之物戒之切莫與服且痘當起水之際又忌利水之劑雖小便不長乃津液上升之故切不可疏利膀胱而通小便益小便太利則痘瘡之水不能起矣是故木通車前猪苓澤瀉滑石茯神一切利水之藥此時禁而不用又恐土能制水凡補脾之藥能燥乾津液其痘必致乾枯故蒼朮白朮淮山棗仁苡仁茯苓訶子粟殼霍香砂仁一切乾燥除濕之劑總不宜投況津液盡行痘內多好飲而常口干勿用葛根知母而漸與之止渴益此時忌發表宜此清涼也縱有痰涎止宜用款冬花粉而南星半夏恐燥烈而痰不行川貝竹瀝又寒涼而痘毒必伏至不得

用藥法

血熱症用藥去留宜分血不宜補血

毒盛者用藥只解毒而兼發毒

外疏起脹要藥

已而用芩連八九日來須用參芪監制若有熱而水不灌柴胡在所必用頭面之痘不起川芎在所必加血熱而界不分紫草紅花生地赤芍以及丹皮是活血之聖藥而補血之歸茸則禁而莫用恐血既熱而復補必成一片紅艷或頃刻轉爲焦紫惟血虛而痘不紅則歸茸必當重用兼以川芎白芍大元枝以助補血之力而紫草紅花是血虛之忌藥遇此症切莫輕投若熱盛而毒壅不起則連喬牛旁地丁慈姑理必用之而解毒毒之熾者當用此等以爲君略用荊防以達表更加陳枳以疏通蟬退提毒上行不可多與多則恐致泄瀉山查宜通滯氣或清或補皆當以之爲佐其毒乃不滯留[illegible]

發詳在熱之宜

又論此時忌藥

治頭面起脹

中透裏攻發或托或解總宜以之爲便臟毒乃得外宣芍藥雖皆行血之藥然赤能涼血白能聚暈故血熱用赤六日以前多取赤芍而生用血散用白七日以後須用白芍而炒之黃芪雖最補氣然生則補中帶發熟則專秘腠肌甘草雖謂和平然生則清胃解毒熟則補氣温中是以二者之藥六日以前生用七日以後炙施至于升麻乾葛羌活柴胡紫蘇麻黃防風荊芥只殼桔梗皆走表散氣之藥至此皆不敢用即不得已而用之此等但雖少與亦要兼參芪以扶正氣而後乃不傷元他如人中黃雖善解毒用此必合人參始不至於桂本淫羊藿雖善攻漿然亦不敢多服多則痘必生痒遍身

法

治四肢起脹之法

治氣虛之症用藥

治泄瀉訣

起而頭面猶伏則重川芎而加升麻炒爲引用虫退而以鈎尖作湯若頭面起而四肢不脹則去川芎而除桔梗用桂枝以達四方若皮薄而軟頂白而平總以氣虛而斷必用人參黃芪川芎肉桂以補氣藥爲君若或赤色貫頂久而血不下附頂不放光亦是氣虛不能統血陰盛陽衰之義宜以扶陽爲主而參芪丁桂總要多施最忌此時泄瀉則中虛內陷頃刻立變白灰此症最爲險要必須補氣安脾參芪更加柯蔻甚則荳蔻丸施雖謂起水忌脾強而急則治標爲貴脈朮苓淮山莫用以柯蔻爲便宜猪苓方能止泄泄定痘乃灌提氣虛下泄待何醫士炒升麻堪爲提氣上行能止泄[illegible]

論聲啞證

論失聲咽喉痛喰水嗆食

以下係論惡症

係言雜症凶危

起痘以高飛此方奇妙少人知曾經屢驗休疑惧或搔[illegible]頷其間尚有驚風莫謂痘出此為凶鎮驚丸猶堪用七八日上或朦朧未免心經熱壅若用寧心補血定加變症無功若夫失聲咽痛此際不必驚慌定是喉中有痘痘脹故不能揚嗆水而兼吐飯總因內痘擱當迨至十日以後此症一槩平康最怕痘瘡陷伏孩兒十个九亡又畏痘色青黑十日內返泉鄉頂焦終不放毫光有如痘瘡橫塗十日舌上生疔十一日見開玉紅毡一片勢難當又怕面如錫盜蚕形蚊跡沉泥常無藥能醫此恙湯泡燈燒莫治灰黑二陷難醫若見紫白血陷此症尚可維持此時雜症是危機勿謂餘常容易脫謝喘嗆痰湧皆為毒陷內攻大小二便來血悉為臟腑衰傷時張口欲吐是毒變而不祥頻來行而咬牙寒戰此症已為難治痘不起而失智無魂吾知立見妖亡目上視而不轉或牽衣而弄裳此等已為鬼錄何須懇禱穹蒼

### 起脹順症

痘出齊後熱退身涼飲食得進精神清爽體暢心寧上無咳嗽吐逆之弊下無泄瀉秘結之虞痘稀而朗顆粒分明頂沒圓而日起脹脚不潤而聚紅暈痘頂於光而起瘡底帶漿而升先出者先起脹痘若出齊至足而面部水汁俱行天庭地閣總光潤左右頰腮俱潤澤水至八分其脚便有淚痕[illegible]

者莫為氣強血盛此等易發易靨尤為至美之當其[illegible][illegible]升灌亦為大吉之痘吉症何須用藥只要飲食調和起居謹慎自獲平安切莫妄服藥餌恐庸醫反致誤人又莫冒犯穢氣勞碌邪而觸內毒且肥滑不宜與服恐滑利而生泄瀉以犯痘家之忌生冷不可與食恐冰滯而生腹痛以致終身之疾此係余之直言故向天下而致囑

凡遇順症自不藥而愈不必強而治之　余見一兒痘出雖參而皆起脹余謂安然無事矣二日未嘗往視一庸醫見是兒數日未曾大便遂與下藥一服未泄又進一服孰知一泄之後痘遂倒陷此輕症變重之故雖出庸醫之誤亦其父母不慎之過也藥能救人亦能殺人而可冒昧以用乎

### 起脹險症

夫痘之起脹雖在六日之後而其調治之藥當施於七日之前蓋痘之所以難起者必是毒盛痘稠也凡解毒之藥多是清涼惟七日以前可用若八九日上候當用補劑若未清則畏首畏尾難施治矣故于六七日間毒之甚者急宜解之斷不可稍遲延也

痘之毒氣出於臟腑氣血拘攜送于皮膚故成瘡形初出乃是血然其後漸漸運化血化為水水化為膿必漿足膿成毒乃化盡然必出於皮膚而毒始能化也故痘必起而水乃行水將行

則痘光潤是以痘宜光而不宜晦宜滑而不宜濇[illegible]伏究痘之起與不起毒之化與不化皆氣血盈虛之故邪正盛衰之由也必正氣盛而邪氣衰陰陽調和血氣通暢乃能化毒以成漿

一有痘色紅紫而焦枯者乃毒氣熾盛血燥而凝不能起脹而化也宜用清毒活血湯主之

清毒活血湯

前胡　紫草（八分）當歸　生地（七分）白芍（八分）木通（五分）牛子　連翹[illegible]桔梗　炒芩　炒連（四分）山査（八分）甘草（三分）人參（四分）生芪（八分）渴加[illegible]天花粉

又有痘色淡白泡不失圓根無紅暈而不起脹者乃元氣虛弱血寒而滯不能送毒外化以行漿也宜用參歸鹿茸湯或千金內托散

參歸鹿茸湯

人參（一錢）炙芪　當歸（各一錢五分）炙草（六分）鹿茸（三錢酒炙）

本方大補氣血托膿之劑其妙如此用牛蒡龍眼引

手足冷加木香（三分）丁香　肉桂（五分）寒戰咬牙加肉桂附子

泄瀉加白芍豆蔻柯子木香丁香肉桂少用參朮調脾散或豆蔻丸以止泄（二方俱見九卷）

千金內托散

人參　當歸　炙芪（各一錢五分）白芍（六分）肉桂（[illegible]）川芎（[illegible]）[illegible]山査（八分）白芷（七分）木香　防風　厚朴（各三分）

凡痘須看面部若面部起則頭與身雖陷亦氣血灌溉未至以藥力扶之自能徐徐而起也若面部之痘不起而手足之痘先脹者此陽氣不能上升而氣血[illegible]肢故為凶兆急用千金內托多用川芎加升麻以提氣上升必頭面起脹方保無虞　凡面部又以天庭為要緊天庭（[illegible]）諸陽之首此處不起則元陽已衰諸部安能進化急用升天散治之

升天散

人參（六分）黃芪（八分）當歸　川芎（各六分）陳皮（五分）浮萍（四分）炙草（三分）肉桂（五分）川甲（二分）木香（三分）加桔梗（四分）

凡痘方起脹而即帶黑點者此毒火熾甚欲以成疔僭據[illegible]痘不拘何處俱急刺破去其惡膿以拔疔散敷之不然能阻漿路令諸痘不能成漿又或間有紫泡黑泡血泡者俱是毒盛血滯為惡類之標若不速除能引諸痘皆成此泡亦宜刺出惡血仍以拔疔散敷之

一痘已半起忽然平塌者此是元氣本虛或為風寒所觸或為穢氣所沖或誤服寒涼所致必宜詳審其由為風邪觸者表

必惡風而皮毛慄起用生薑附子桂枝令出微汗而痘復起

誤服寒凉者其痘必白用內托散加丁香附子而補中氣則痘復起　爲穢氣所冲者其痘必痒用平和湯（方見五卷外）以沉檀束核熏之其痘即起

一痘初出紅活起脹時忽然而變紫黑者此必以前失于解毒而毒留滯于中至此將作內攻最爲危險速用入牙散或大成散

入牙散

人牙自落者火煅存性入韭菜汁淬之爲末　加麝香一分川甲二分用雞冠血灸白煎酒調服

一痘雖鮮紅充乾燥而不肥潤者此毒火盛而陰血不足也宜滋陰退火用

四物快癍湯

當歸　川芎　赤芍　生地　紫草　連翹　牛子　前胡
全地

一痘雖光肥而帶濕者乃脾中有風濕也不治則成潰爛宜用

四君子快斑湯

人參　黃芪　白朮　茯苓　炙草　肉桂　防風　陳皮
白芷　白芍

一痘雖紅活充滿而皮薄嬌紅擦之即破者此血有餘而氣不足也若不急治十日上必痒塌擦破而死須用保命丹治之

人參　黃芪（各一錢）當歸　生地（各八分）川芎　赤芍（各六分）牛子（七分）連翹（七分）防風（三分）肉桂（五分）白朮（八分）淮山（七分）加無價散（即人牙火煅存性爲末）

一痘內傷飲食腹中飽脹而腹痛者此中氣爲食積所滯不能宣暢其痘故不起也宜用

寬中快癍湯

陳皮　厚朴　山查　神麯　川芎　白芷　砂仁　木香
香附　炙草

一痘遍身俱起而手足不起者乃脾氣弱而不能灌溉四肢也

用補脾快癍湯

人參　黃芪　炙草　丁香　防風　防巳　薄桂

一遇天時暄熱又加包裹以致毒火過鬱而不起者宜用

白虎快癍湯

人參　石羔　甘草　麥冬　升麻　竹葉　小便赤而昏迷用定心散

一悞食生冷致脾虛不能起發者用

理中快癍湯

人參　白朮　黃芪　炙草　肉桂　木香　丁香　干薑
泄瀉加肉蔻　柯子

痘有四圍高起而中心落陷者有輕有重痘稀者輕痘密者重此皆中氣不足之故宜用內托散以托之而中亦自起矣若中心陷而黑者此毒留于裏中氣虛而不升也宜托中而兼化毒若不急治必成鉄甲空殼而死須用　人參　黃芪　當歸　白芍　川芎　牛子　連翹　人中黃　川甲　防風加無價散及雄黃　若黑硬乾枯而中陷者是痘疔也當宜刺破吮去惡血以拔疔毒敗之仍用前方與服不然但變黑陷而死矣

又有中心微起而含水意其四畔都乾枯者此毒入營衛津液將枯之兆必身熱煩燥若不急治則毒焦枯而死矣宜仍用前方加前胡麥冬以治之

凡痘出昏迷不省人事者用神砂一錢冰片腦一分人參三錢加豬尾血溫酒調勻與服自毒解神寧　此方真效

一見痘齊而熱不退昏沉失智不省人事諸藥不效余用六成散一服發出臭汗一身遂退熱人甦痘亦明朗

凡痘之不起總因毒重痘密而見點之際又或失于調治鬱蔽滯不發而氣血又難舒暢故痘不能起也

一見出痘形如蚕種狂言譫語者見鬼神余曰此惡候也其痘方出即用和中敗毒散一日連進四服其後心雖稍明而痘不分界地一片通紅乃用　紫草　生地　赤芍　丹皮

前胡　牛子　連翹　川芎　麥冬　黃芩　木通　甘草一日進三四服次日則界地已清形若荔枝又於前方去赤芍　麥冬　木通　加白芷　白芍　川甲外用水楊柳煎水頻頻拭之則痘色漸漸光亮見熱症稍平遂於前方加生芪以扶元氣至九日上乃用人參　炙芪　當歸　川芎　鹿茸　白芍　白芷　山查　川甲　肉桂　炙草　何首必進二三服然後升水灌漿至漿水既足復加淮山白朮其漿乃膿但痘總以氣血為主氣血若旺則可縱橫解毒發氣既滿則氣血不凝故能起脹發光于是用補以托其膿投劑可以立效故雖稠密如麻亦或可救然解毒之藥斷不可用

石羔知母黃栢黃枝大黃麻黃等藥恐傷脾胃虛脫表至起脹時有泄瀉下陷之虞皮薄漿清之患也必慎之于始方不悔之于終勿圖目前之效而不顧成功之難也　古方書所載水楊柳是木余所用水柳是草生于溪澗水邊其葉如柳其莖春時青至夏末秋初則赤矣條條直上不分枝椏至秋略含赤花凡痘焦紫乾枯者以此洗之立見光亮漿水即行其效如神已洗之後若往視之則已洗未洗之處其明潤僚暗形色判然取水行漿之效孰有速於此者但須用巾蘸其藥水頻頻與拭必水足而後已也若秋冬葉落取枝用之其性涼血解毒可治跌打損傷痘瘟瘴疫

一見痘出稠密悶亂不寧痘色慘暗紫將變黑而滿盡[illegible]方用盡總不見效時至八日症甚危急余思此毒氣深于血分當解血分之毒乃用紫草茸六分人中黃六分人參三分與服及過一時則痘之黑者已轉紫色又進一服則漸轉紅活略有光矣遂連進四五服痘盡起脹行漿益紫草茸涼血活血能解血分之毒人中黃是解痘毒之極品人參最補元氣藥不雜而效乃速也余因立其方名紫黃飲

## 五陷治法

痘出齊後當治不治則五陷之症作矣夫五陷者紫陷黑陷白陷灰陷與血陷也紫黑二陷其症屬熱白灰二陷其症屬虛惟

血陷乃是氣虛不能領血毒而外化故紫黑宜清白灰宜補血陷則專補氣此調治之大要又當詳分其目也

夫紫陷之症必毒盛血熱初見之時其色深紅而無潤其人煩燥口渴二便不利大熱不退此時失于解利則毒滯血燥凝滯于內不能上升而運化遂變紫色而陷伏紫陷失治必成黑陷至于黑陷則乾枯焦槁毒入內攻不可救矣蓋痘毒由于臟腑既出皮膚須在外面成漿結痂其毒乃化若不能運化成漿則必倒流入裏其痘形故陷也試看痘陷之症其孔深入寸許直透骨髓是可知毒由臟出而復陷入臟也善治痘者其毒一到皮膚即觀察形色急為救療如拯溺救焚若稍緩恐其毒陷而難救也方其痘色紅紫即用清毒涼血之藥一日連進數劑必痘轉紅活而有潤澤乃另設行漿之法此見機先達之良醫也若至于紫陷黑陷亦必以涼血解毒為主毒清血活其痘乃起切不可用補劑蓋補則毒愈甚而血愈涸也宜用

## 絲瓜化毒湯

絲瓜乾（取近蒂五寸以此為君）　赤芍　紅花　當歸　紫草　川芎
牛子　連翹　升麻　甘草　黑豆　赤小豆等分水煎服
犀角調服氣弱者加人參用此不起則用小靈丹

## 小靈丹

硃砂　雄黃（各一錢）　乳香　沒藥（各一錢五分）　大蟾酥（取心肝焙乾五錢）
麝香（一分）　人中黃（四錢）　共為末取豬心血雞冠血和勻為丸以紫草煎湯送下服此不效無生理矣　又或用無價散（以無病小兒之糞陰干然後用火煅存性為末）加冰片研入以紫草煎水調服弱者加人參

又或用紫黃飲（方見前）

又方用　桃花（二錢）　梅花（一兩）　絲瓜（五錢）　硃砂（二錢）　人中黃（二錢）　共為末以紫草人參煎水調服

又方　龍虎丹　天靈蓋（炙三錢）　川甲（四錢）　辰砂（六錢）　麝香（五分）　全蝎（二錢）　共為末以紫草麻黃升麻荊芥枳殼煎湯和蜜入末為丸酒下

以上數方皆起黑陷危亾之症須預備以救急危又用水柳草煎水外浴　治此之法至詳至悉如諸方不效是天命之當夭而毒已內傷其臟也

如白陷者痘白而陷也灰陷者痘色如灰而陷也此皆氣血兩虛之症慘白者血虧陷者氣弱至于灰陷則氣血俱憊將不保矣治此之法必大補血氣為主宜用參歸鹿茸湯或千金內托散二方有泄瀉加豆蔻柯子　有寒戰加附子泡薑丁香但陷伏之症其血衕已甚如巨寇入關非良將重兵不能與敵且非一戰而可成功故余遇此症藥必重劑人參鹿茸至少之劑必用一錢更不可一二服中而期其效必連進數

劑乃可見功昔余治一灰陷以千金散加鹿茸初服用人參一錢次二三服用參二錢是日連進五劑而痘不起諸人皆曰不可救矣或其藥宜更乎余曰不然此方對症故無變遷痘未起者藥力未到故也宜再服之至次日黎明依舊痘起而漿行矣余見世人概謂參茸價重不肯多用併服不過數分見一二劑藥未效則曰藥力無功是以一杯之水救車薪之火火之不息豈水之無能哉皆惜財而不惜命之咎也可不悲乎

還魂丹（治灰白二陷有起死回生之力七日至十二日俱可用）

天靈蓋（初生者佳用米泔水洗淨炙酥二兩入諸藥同煎）朱砂（二不[illegible]兩）人參（二兩）山查（二兩）黃芪（四兩）川芎（四兩）當歸（四兩）白朮（二兩）青皮（一兩）麥冬（一兩）紫草（二兩）枳殼陳皮（各二兩）附子（一兩）豆蔻（五錢）炙草（八錢）紅花（一兩）以上諸藥俱用好酒煮糯米（四兩用水煮）丁香（五錢米泔水煮）入乳（二碗）童便（二碗）二味入天靈蓋與朱砂煮干　官桂（一兩先用水浸一宿）

以上諸藥古方教人將靈蓋朱砂二味逐漸入諸藥同煮以乾為度棄諸藥查單取靈蓋朱砂研末為丸用兔血調勻作丸如菉豆大金箔為衣入磁罐內以黃泥封口埋土中一七然後取出用七日內用七丸八日則用八丸滴雞冠血調酒服之將被覆蓋取微汗為度少時痘自紅活　愚製此丹先將靈蓋朱砂入人乳慢火煮干炙酥再將童便入二藥煮干

炙酥研末然後將諸藥各味逐漸濃煎至水無少許乃去藥渣入二味藥末攪勻令受藥水或晒或焙再入別藥如前製受藥水惟人參臨時加入煎湯送下如此製法受諸藥性更透但難於時日也

回生丹（治黑陷灰白痒塌臟腑未壞俱可救）

天靈蓋（四兩）辰砂（二兩用袋盛之入藥煮）川芎（二兩）白附（一兩）黃芪（二兩）人參（二兩）牛子（炒二兩）丁香（五錢）陳皮（二兩）甘草（一兩）肉桂（五錢）前胡（二兩六錢）以上水煮白朮（二兩）肉蔻（五個去油）煨　俱用水煮　當歸（二兩）白芍　紅花（各一兩俱酒煮）柯肉（八錢水煮）蜜　起陽石（童便煮先要研碎）諸藥煮完取靈蓋辰砂研末再用陳皮　木香　紅麯（炒）　川甲（炒各四錢）射香（五分）研末共合靈蓋

神砂米粉勻兎血爲衣仝前服法　製法亦同前方

古有良方皆因人參假而醫者迷不肯備余故設權宜之法以人參臨時加入煎湯調服即諸藥雖製須預備靈蓋辰砂將乳汁蒸服製過爲末并後方諸藥之末備于囊中遇此危症臨時依方加諸藥煎湯調服亦未嘗不可何必膠柱鼓瑟固執而不通乎

靈蓋乃諸陽聚會之髓與諸草木不同升陽之性自爲極品但以人治人仁者固不忍用然取已朽之骸而救未死之命亦猶湯武之用征誅也然心在救危則可爲若以此圖利則爲神明之所殛也

補元散（治一切灰白不起）

黃芪（二兩）　人參（一兩）　炙草（五錢）　紫河車（一兩）　梅花（一兩五錢）　天靈蓋（一）　鹿茸（一兩）

共爲細末

血陷之症亦透頂通紅與紫陷相似須要詳辨紫陷屬血熱治宜涼血爲主血陷屬氣虛氣弱不能統血故血僭居氣位痘乃紅而陷也治此之法以補氣爲主須用保元湯　人參　黃芪　炙草　加肉桂　附子　川芎　有泄瀉加白朮　肉蔻斷不可投涼血之劑但辨症之訣紫陷屬熱必氣粗身熱口渴煩燥血陷屬虛必氣緩身涼不煩不渴

起脹難症

發熱　此症于起脹時熱甚則必灰熱必不起蓋內毒未解急宜解毒

口渴小便濇　無妨津液上升于痘故也

亂語　險是毒鬱于內也仍宜解毒兼定心散治之

泄瀉　凶瀉則痘必陷也急用調脾散豆蔻丸止之

乾嘔　凶毒鬱于中故也急宜解毒

腹脹痰喘　死毒陷內攻也

寒戰咬牙　凶是裏寒也急用桂附理中湯治之

煩悶　險毒鬱不出也宜解毒

大小便血　死毒在內攻臟腑受傷故也

咳嗽　至此宜減不宜加加則毒陷于肺也至應宜于化毒湯中加桔梗陳皮款冬花粉而兼治之

嗆水哇噎　無妨此皆咽中有痘故飲食難下也俟內痘愈而自平矣

失聲咽痛　無妨但肺管之痘起脹阻塞氣道故有啞聲喉咽中故食痛宜以甘草桔梗玄參牛子豆根黃芩煎水與噙

一婦人出痘遍身頭面稠密加麻解毒活血總不起脹但出齊之後熱退人安並無雜症其痘竟不升水亦不行漿期日後遂結小痂而愈矣此毒氣本輕但爲浮游之火引之散于皮膚故不待養漿而毒已化也

一見出痘痘色甚是慘暗其痘總不起脹隱于皮膚之間者
逆又得手至十日上遂結痂其後皮肉之痂落出甚厚

## 起脹逆症

大抵痘脹一分則毒出一分至八九日猶不起脹又不經治者
無生理矣

一頭面不起雖遍身皆起亦死蓋諸陽不升也

一痘不腫起而肉先浮腫者不治毒氣斂于肌肉而不達于痘
也不從痘出安能化乎

一痘一片紅鐵者須詳察之若皮肉痘形磊落而未起者此是
血熱宜涼血化毒痘自起矣若痘跡模糊摸不得手則毒氣

散漫不能成漿必不可治

又有腳地不紅而不起者亦要看皮下之痘粒顆粒分明摸之
礙手殆痘于中則是氣血兩虧用千金散托之自起若色黑
暗而形模糊摸之絕不得手則毒滯內留不得成漿定不可
治

又有痘未起脹而頭目先腫者名大頭瘟宜散陽分之邪急用
敗毒散（服此不脹者死）
羌活　防風　牛子　桔梗　荊芥　川芎　人中黃　連翹
芩　甘草

一痘發而目不閉者以痘未盡發不甚腫脹故不閉也急宜發
毒痘起則可救亦用千金內托散托而不起者死

又有先前目閉至九日十日忽然腫退目開者此毒氣倒流入
裏以爲內攻之禍急用內托散托出毒氣目復能閉可治不
閉則難救矣凡痘稠目閉者必十二日毒退目開乃正期也
以前開者俱是凶兆

凡痘紫黑不起干燥不潤慘暗不明者不治

凡痘黑而落陷者死在八九日內

凡痘遍身黑陷悶亂不寧神昏氣濁者不治

凡痘間有紫黑泡刺出黑血旋而處處有此泡者毒熾而血死
也不治

凡痘遍身紫點如蚊所咬者不治

凡痘灰白不起漸成塌陷慘淡不明膨脹不食氣促神昏者即
死

凡痘灰白頂陷內外俱有紋路而根窠血散不聚此氣不充而
血不附也更加泄瀉不思飲食則脾胃中虛其死必矣

凡痘灰白頂陷而腰腹大痛者腎氣已敗而毒入內攻也不治

一痘當起脹時啼哭不已日夜呻吟煩渴悶亂狂言妄語如見
鬼神者因此毒蔽鬱中而不能達也　余亦曾遇此症乃用
豬尾血水片（五釐）川甲（三分）硃砂（三分）三味爲末又以人參（三分）煎湯
共尾血調與服其心稍明其人略安而痘漸起後補劑中加

加牛子慈菇兼與解毒其人乃愈

一痘起脹時吐利不止乳食不化二便下血者此脾胃已敗也

一起脹時痘如烟霧難定者不治

一當起脹之時痘之四畔又旋出小痘攢簇本痘成叢以聚者不能養漿必至癢塌而死

一手足之痘見而復隱起而復塌或上身帶水下身枯者凶然八九日間氣未下行不可定論必面上灌膿而下乃行水也惟終是干枯故爲凶耳但古人斷凶余亦存之

一痘面部不起而手足先起發者凶

一起脹之時漿水未行而口唇即有黄漿者俗名羯口最惡候也急解脾胃之毒用調元化毒湯加石膏爲君又用石膏作子甘草煎水時時搽于口唇而且與嚥或可解也不然每屬齒落而死

一方起發時痘頂即含白漿者名爲痰利主十一日死

一起脹時面如錫滯者不治

一痘焦紫如漆點者不治　又或形同疥癩者不治

一痘紅艷如冬瓜者不治

一痘頂上有黑眼如猪鬃者毒入臟腑也急宜用内托散托起托而不起則難救矣

種痘新書卷之六終

---

# 種痘新書卷之七

寧邑張　琰遜玉氏編輯

受業曾衡波同參

## 灌漿辨症賦

九日十日順候漿行半足若或稍爲不順此時方作膿漿痘内之漿行否然觀便見分明毒重而壅遏者乾枯退縮氣盛而升發者光飽光榮頭面行漿四肢未起見之切莫慌張膿脆發泡而面頰焦枯見之且休歎息既已爛其殼咎且又慮其喘急飲食不多或致臟虚而内陷水漿頻進恐來泄瀉而復難調理矣若有或反掌熱盛煩渴到此休依實論吐兼清泄此時定作虚

看紫黑乾枯急攻發而或可生氣虚塌陷重溫補而亦能活發驗爛其失聲喘急恐其腹脹瘡或白而少神根雖紅而難治頂不起而軟弱脚雖赤亦難生淡白而潤塌此内必無漿汁皮薄而嬌紅有漿亦是清稀犯此數端八九日必然發痒若還壯熱燎人不痒定行乾燥紫黑乾枯不須著眼中凝血迹或可挽生漿既行而半足時則未宜收斂忽爾一時紫黑古名倒靨誤認莫謂結痂攻發若得其宜此症猶堪復活旁生血點再行漿苞症也當又治若見痰鳴而喘喘黄泉其邇矣聲而嗄嗄陽脫無幾論死生之決斷總看膿漿之有無有漿則生無漿則死將有然將猶可活三分漿汁亦歸陰内托補劑速宜救援延之一日

論起脹灌膿之期論痘所以必要成膿之故論毒不化之弊痘至此時生死定局

推不成膿之故論此時治法所設必宜用補之旨

極言行漿要藥[illegible]

眞可誰何醫若救焉豈可緩乎

## 灌漿三日調治法

凡痘至七日宜灌八日宜滿九日十日乃漿期也。初出是血。其後血化爲水。水化爲膿。至于成膿。其毒方化。然必漿滿。毒乃出盡。必須膿毒乃化盡。痘雖起脹。若不成膿。則毒雖出而不化。勢必擾攘于皮膚。倒流入裏。故在外則爲痒塌。在内則爲内攻。而痘瘡抓碎。滿面無皮。腹脹喘急。音啞痰鳴。不可救矣。是以人之生死。判于膿之有無。有膿則生。無膿則死。理必然也。此灌膿三日之中。乃生死存亡之界。此際可不愼乎。然膿之所以不成者。皆由五六日前。失于解毒。以致毒壅而熾。血燥而凝。氣滯而僵。故不能運化以成漿也。然至九日十日以來。内臟空虛。候當用補。且正氣與毒氣相持已久。至此元氣必衰。斷以扶元爲主。況痘爲臟中之毒。既斬關破壁。出于皮膚。臟腑必爲不固。若不内托以衛元神。則方出之寇。恐復乘虛而入。此倒陷倒靨之所自來也。至于倒陷倒靨。則毒返内攻。雖有良醫。莫能救矣。故時至九日。總宜温補。不敢清凉。固肌内托。是此時之要領。健脾補氣。爲此日之綱常。人參黄芪。乃助氣行漿之要藥。當歸善于補血。欲行氣。須用酒洗。恐滑泄。則土炒爲宜。鹿茸最善攻漿補血偏。又能助氣。酒酥元是良方。白芷排膿止痛。行漿劑中必用。川芎提氣行血。起脹方内宜加。欲斂血以成漿。功莫勝于白芍。欲滋

此言時之是要又藥点治法

能治雜症要訣

陰而活血。勢必用乎元枚。攻毒排膿在用甲。起漿灌汁窩涎者。丁香煖胃。又攻漿。肉桂扶陽而補氣。木香行氣。且行膿。山查健脾兼散積。白朮淮山。乃除泡實漿之聖藥。凡漿清皮薄者。非此不能解其厄。附子干薑。乃煖胃興陽之上品。凡咬牙寒戰者。非此孰可救其危。人牙雖然性烈。亦起痘之奇方。天蟲雖不忍用。是救危之至寶。泄瀉若來。則术苓柯蔻。力健脾而不畏。嘔吐或至。則參砂丁藿。宜温胃以爲良。至此虛症。若形任是空熱之劑。總投之而不惧。縱或稍形熱症。亦不敢純用清凉。石羔大黄。慮傷脾固不用。前通豬澤。恐利水而乾痘。漿雖熱毒未淸。祇用雄黄牛子。凡芩連枝梔。戒之切莫輕試。恐臟寒而痘變須臾。即或偶中風寒。用香附桂枝而發汗。凡羌獨柴荆升防蘇葛表散氣之藥。愼之切莫妄行。虛表虛而變症旋生。若咳嗽痰涎。麥冬白附桔梗陳皮可用。而川貝胆星淸痰之藥休行。忽然驚譫狂言。莫謂此爲實熱。妄作驚風施治。而用清解之劑。此是血耗神馳。只宜養心補血。歸脾湯而得其宜。又有足攣手戰。勿謂風生手足。而用驅風峻藥。此亦氣血有虧。而不能榮四體。必大補湯加續斷。以滋筋血之榮。腹痛多爲不吉。平胃散是良方。任他腫脹總無妨。只要痘疮肥壯。七孔流膿不怕。此是内中有痘于今潰出膿漿。大便或溏膿血。亦非腸胃有傷。皆因腹中有痘瘡潰。不要驚慌。調脾解毒[illegible]以[illegible]散加牛[illegible]。他如口渴身發

此言痘是

此下此言險症

作漿之本症偏宜用補切勿投涼號啼叫痛是行漿之吉兆最喜作痛切忌發癢痛則其漿必成癢則其毒不化頂尖腳聚是氣血之調和知其漿之必滿便不滑利是脾土之堅剛勿慮膿之不成試觀痘形外明內暗則其行漿已實粗肥堅硬者其中氣不虛由白而黃其漿已熟紅暈漸小其漿已行至腳不紅而痘蒼蠟此是成功之地見此喜出眉端其後總無變症面部漿充遍體之膿雖有三分未足吾知生氣已成頭面蒼黃四肢漿即清稀斷不至于死地若其痘也內外俱明其中必含清水起而不潤其內必是空殼腳漸澀而暈漸散此爲乎塌漸乎而中漸陷毒入內攻皮易破而痒愈甚豈能外化最忌灰白而伏

太賺柴燥爲殃疔生舌上最難當入在其魂已往抓破難無膿血十見九个必亡若還復推膿汁結緊循帶赤頭此症尚爲可救急用內托之方汁粘形如雞蘂色灰褐而不光抓破大凶之兆十三日見腳至九日十日頭忽退此兒端的赴泉鄉十一日間聲忽啞丹田氣絕必傾亡喘噓而兼腹脹咳甚而且痰鳴更或泄瀉不留停藥物直下死症甚門如同竹管將來定赴幽冥吐瀉蛔虫必死此其臟腑已傾遍身魚泡死期憐皆是勿療之症若見如此之候何須周用精神

凡治痘之法須宜預慮莫待變症而始惊惶故發熱之初當爲出痘之計見點之日宜思起脹之謀出齊起脹則要計行漿之地灌漿之不行多由毒之內滯毒之不滯必解于七日以前若以前失于解毒至九日以後不敢清涼明知毒入內攻而亦難于救藥故犯痘之家必于六日以前宜急請醫調治勿遲延以致自誤治痘之醫當于七日之內速爲力救危亡勿容忽以致誤人若至九日十日以往而始慌忙求治則倘苗已槁即有甘霖亦何益乎余所以痛心疾首而爲天下告戒也

## 灌漿順症

至九日十日爲灌漿之期其痘圓滿光澤而有膿窠者其毒漸化而漿行也色如綠水而漸變蒼蠟將乎孩之其皮堅硬身體溫和二便如常飲食能進並無雜症者順候也不必服藥但節

飲食謹風寒避穢氣慎起居而已

痘至九日面上即帶漿脈其漿漸升其暈漸小其初則外面微色其後則如黃蠟色而根腳漸收紅暈則漿熟痘頂則黃漿則漿滿氣充此順症也

痘至起脹腹中作飽不思飲食是毒猶滯于內也若知饑餓貪嘗飲食是毒不內留盡皆發出臟腑清快而又空虛乃吉兆也

一痘中雜症皆因內毒滯留而化未盡故或擾于肌膚或擾于臟腑而乃變亂不寧也若雜症全無則毒化已盡又何慮乎

## 灌漿險症

一痘起脹雖光潤可觀然以手摸之軟而皮皺者此陽氣不通

頂漿不實後必不能收靨　又或白欲成塌陷者宜用

人參　黃芪　白朮　鹿茸（各一錢）　川芎（五分）當歸（八分）肉桂（八分）

淫羊藿（一錢）山甲（八分）炙草（三分）木香（三分）加黃豆（引）

此痘未甚起脹而漿不滿者用七氣湯

淫羊藿（三錢）人參（三錢）川甲（二錢）黃芪（二錢）川芎　當歸（各一錢）木香（三分）

炙草（五分）加鹿茸（一錢）糯米黃豆（引）

此痘皮薄漿清宜補　脾爲主用回漿散（失治則發癢抓破而死）

### 回漿散

人參（一錢）黃芪（一錢）白朮（一錢）淮山（一錢）當歸（七分）川芎（四分）白芷（八分）

肉桂（七分）川甲（三分）山查（八分）陳皮（四分）鹿茸（一錢）

一痘頂陷無膿或服內托之藥而反不起者必氣足而血凝也

宜用當歸活血湯

當歸　川芎　赤芍　生地　紅花　紫草　加升麻（炒）

人參　白芷　牛子

一痘遍身起脹灌膿忽然變色者不可不察變白屬虛宜用千金散變紅變紫屬熱用當歸活血湯加人中黃人參

一痘起脹俱好至八九日大便忽秘痛欲便而不能便裏急而後重者宜破氣利滑用歸尾枳殼（各三錢）紫草生地（各二錢）與服即通此係熱下注大腸若不急治忽發熱而死即不然其後亦成痢疾

一痘破成坑者亦內陷也急服內托散花出毒氣外散

### 白龍散

即乾牛屎燒灰爲末也

一痘灌膿時外頭起脹其痘或軟其色乾枯內中無漿汁此爲空殼最危候也此血枯氣弱毒將內陷宜用　鹿茸（二錢）

人參（一錢）黃芪（二錢）當歸（三錢）淫羊藿（一錢）白芷（一錢）肉桂（一錢）川芎（六分）

川甲（四分）

一痘灌膿時頂平腳濶此塌陷之症若不急治必發癢抓破毒陷內攻而死此氣虛不能領血以致毒血漸散不能聚化成膿也宜補氣領血爲主急用　人參（二錢）黃芪（四錢）川芎（一錢）白芍（三錢）當歸（二錢）川甲（六分）肉桂（一錢）羊藿（一錢）蟲退（四分）

一元虛毒盛而虛火上炎咽痛鼻衄雖任漏補而又不得不補者須用　參麥清補湯

人參（八分）麥冬（去心一錢二分）花粉（酒蒸）黃芪（各一錢）前胡　牛子（各六分）炙

甘草（各三分）白芍（八分生半炒半）當歸（八分）紅花　川芎　生地（各三分）

桔梗（三分）山查（五分）

### 灌漿雜症

**發熱**　無妨痘出齊三日則宜退熱至作漿時身又宜熱身不熱則膿不成但發痘之熱熱從裏出以手按之愈按愈熱作漿之熱熱在肌膚故以手按之初按則猶熱久則不覺其熱也任其身熱不可視爲熱症偏宜用補不敢用涼

作渴　平常灌漿之時津液盡行于痘以爲漿汁安得不渴渴亦要進辛熱以爲作膿之計。

咳嗽　〔痘〕從前有嗽至此熱出皮膚其嗽已宜退矣若猶咳嗽是肺中尚有客熱也宜于內托劑中加麥冬陳皮桔梗倘嗽而愈甚而痰涎壅盛痘又無漿則毒火攻肺將變失聲其危甚矣不可視爲庸常也

痘痛　〔痘〕氣血盡升其瘡脹滿甚化成膿焉得不痛痛者漿也升此所以爲吉兆也有以白芍磨酒與服可以止痛者然亦不必施治。

作痒　〔因〕皆毒氣欲化不化以擾擾于皮膚故發痒也此際發

痒甚是不祥然所由來亦有數端不可一例施治。一有氣虛不能化毒而痒者其痘必白而頂陷皮薄而漿清精神困倦二便頻利此氣虛也宜用參芪內托散　人參　黃芪　當歸　赤芍　川芎　厚朴　防風　桔梗　白芷　官桂　紫草　木香　虫退　或四君子湯加　黃芪　豆蔻　肉桂　白芷　虫退以主之。有血熱而作痒者其痘紅紫作渴此毒盛血熱而痒也須用四物湯加　人參　白术　丹皮　連翹　虫退　白芷　紫草　紅花煎服外用。紫草　甘草　黃芩　紅花　生地　牛子煎湯與搽其痒自止所破者以敗草散敷之其方用久年蓋牆屋爛草洗淨曬乾爲末加蕎麥殼及草紙燒灰存性或加麥麩炒黃土爲末摻之。又或以蛋水調滑石潤之　又或用乳香敗荷葉茵陳燒烟薰之亦可止痒。又有泄瀉從正氣內虛邪氣外發而作痒者用調元托裏湯　人參　黃芪　桂肉　陳皮　防風　荊芥　赤芍　木香　薑棗引外用茵陳　白艾燒烟薰之。

又以荊芥穗燃火刺其痘頂以散火邪者。有因穢氣所觸而作痒者用內托散或平和湯主之　人參　黃芪　當歸　川芎　白术　木香　丁香　乳香　防風　炙草　與服外用檀香　紅棗核燒烟薰之則穢氣解毒氣升而痒止矣。一法用舊絹衣長袖者令兒穿之縫其袖口或取絹作

袋裹兒之手令不得抓痘瘡發痒最爲惡候故詳閱諸家之方以備參用如用諸法而痒止者吉如不止者必因痘瘡抓破則泄其氣不能成漿必破而旋出膿汁堆結成痂紅潤光亮者謂之補漿猶爲可治若破而乾燥無膿血或汁出堆結形如雞屎色灰而枯扭頭擦而其痒不止者必死。

吐瀉　〔痘〕瘡之成漿全賴脾胃堅固吐則胃弱瀉則脾虛方起脹時一經吐瀉痘即塌陷急宜健脾温胃爲主〔吐〕者用參砂和胃散瀉者用參术散或十味豆蔻丸

〔參砂和胃散〕

人參　砂仁　半夏（各四）　白术　茯苓（各五）　香　陳皮（各三）

炙草（二分）煨姜引

【參术散】

白术（一錢）人参　茯苓　砂仁　炙草　以仁　連子　神麯

山查（各五分）桔梗　柯子　陳皮（各四分）木香（三分）

【七味豆蔻丸】

肉蔻　柯子　砂仁　木香　龍骨（右方各五錢余用肉蔻一兩柯砂八錢木龍四錢）

赤石脂　枯礬（各錢）

一見當起脹灌漿時泄瀉不止。余用參术豆蔻二方俱不效甚至人參豆蔻每服一錢亦不效。余謂健脾之藥莫此為甚而不效者何也。乃往視其糞見糞色青綠。余始悟曰。肝屬木木

色青綠。必肝盛剋脾故也。治當削肝為主。乃用白芍（一錢）白术（八分）茯苓（八分）以仁（五分）山查　陳皮　炙草（各三分）一服立止

【腹痛】險　此時毒出皮膚不宜痛矣若痘陷漿清則毒入內攻最危候也若膿滿漿足則為風寒食積所致用平胃散治之（方見九散篇）或　向未大便為燥糞作痛者用膽導法（方見前秘結篇）令便通糞出其痛立止　一見痘已灌漿忽然腹痛又非秘結余用清平之劑不效及見其以火爐炊雞卵為誤服火氣所致乃用清解散一服立平

【腫脹】無妨灌漿之時痘毒盡攻于皮膚宜其腫也但要痘起壯而腫而痘不腫則危也

【消腫開目】痘腫而至于開目者必要到十二三日痘靨色轉痂已成乃開目消腫則為毒化腫消者吉若九日十日即開目消腫者則毒陷內攻必凶

【譫語】此是血虧神亂故有是症宜用歸皮湯以補血寧心為主切不可認為實熱妄用清心降火之藥也

【寒戰咬牙】此是內臟空虛脾肺兩寒也急用桂附理中湯治之

【便血】無妨此是腸胃有痘痘潰故下膿血勿作痢症施治宜用　白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　牛子　血茹　肉桂

血茹即髮灰

【諸竅出膿】無妨行漿之際有眼耳出膿鼻竅流膿口吐臭膿者皆其內中有痘不能結痂潰而出膿不必施治內痘成膿則毒已化自可無虞

【咽痛】險　外痘出齊則內痘起脹外痘灌漿內當收靨故七八日前痛者則內痘作痛無妨至此痛宜漸退若至十一二日而痛尤甚者則毒留于肺肺中火熾咽喉腐危候也用牛子桔梗豆根射干黃芩甘草煎水與嗽痘若下陷則必死矣凡挫喉嗆水俱如此論

【失聲】危　七八日前則是肺管有痘阻塞氣道十一二日失聲則是毒陷內攻肺氣將絕其危甚矣然痘未收靨急用內托

大補元氣氣旺痘開其聲必復

〔水泡〕〔險〕痘雖起脹而不成漿其內一包清水乃水泡也此是脾氣虛而肝木盛土不能制其水故水不能化膿宜以平肝健脾爲主用人參（五分）黃芪（一錢）白朮（二錢）淮山（二錢）茯苓（一錢）白芍（二錢）以仁（一錢）丁香（九粒）半夏（七分）白芷（一錢）肉桂（八分）鹿茸（一錢）當歸（一錢）見有泡大粒是清水者以針刺去其水跡百餘顆亦盡刺之外用除泡散敷之內服前方雖刺破者仍復灌膿要時時詳看有清者又刺去之若不刺去則遍身之痘皆成水泡即難治矣頭面身軀有漿惟膝下之泡則無妨有遍身如魚泡者則必死也除泡散　滑石（水飛二兩）白朮（五錢）白芷（五錢）

〔黑泡〕〔危〕此毒盛血熱而血不能化毒也見此急宜刺破令出血水以拔疔散敷之（方見散條）有刺去而旋生者旋復刺之要時時看視不然俱變此泡矣然此泡猶或可救黑泡則必死矣內服扶元活血湯　人參　黃芪　白芍　茯苓　紅花　元支　白芍　白芷　虫退　牛子　茲菰　川甲

〔流涎〕〔險〕口角流涎不止者乃胃弱也急用參砂和胃散治之不然恐胃弱不能行漿而變咬牙之症則難治矣

〔不食〕〔凶〕八九日前毒不出盡不思飲食故其宜也至此毒宜盡出內臟空虛當大進飲食矣而猶作飽脹者必毒留內滯脾胃已敗不亦危乎急用人參　黃芪　山楂　白朮　丁香　肉桂　煨蔻等藥大煖脾胃若痘起有膿飲食稍進可治不然脾爲穀粮之官週身血氣賴之以資其根既斷血氣何生雖或起脹亦虞其必倒陷倒靨而死也

〔手足牽引〕無妨痘若起灌此等或爲血虛或爲肝風蓋肝屬筋牽引有如鷹爪者必筋血不榮而肝動生風也當用祛風滋血湯　黃芪（八分）當歸（二錢）白芍（二錢）元支（頭大一錢六分）勾藤（一錢）殭虫（五條）白朮（二錢）川芎（四分）官桂（六分）

〔筋骨疼痛〕無妨痛而紅腫者是餘毒也痛而不腫者是風疾也且餘毒不發於灌漿之日必發於收結之時此時作痛而不紅腫者必爲風寒所襲而秋冬之時多有此症宜用蔥

灰麵以燒酒炒溫而熨敷之以散其風邪內服生芪　當歸　川芎　白芍　防風　勾藤　石南藤　白芷　碎補　續斷　薄桂　五加皮　殭蠶　蟬退　弱加人參煎酒與服服後遍擦痛處令藥性行于此地

〔中風〕可治痘當灌膿時其痘皆好忽一時禁口直視痘皆變爲灰霜色者是中風也不必驚慌急用生薑汁灌下仍用千薑　附子　官桂　喉中有痰則加半夏　温服令出微汗即愈

〔催漿〕

攻漿起陷之法莫詳於五陷之條但有方書未載而食物亦可攻漿者亦備言之　雞冠血　八年老雞及雞爪　人乳

羊肉　豬皮及蹄爪。　菉豆作湯　糯米作藥引

倒陷　凶危痘既圓暈起脹而復陷者名倒陷也倒陷之症表裏皆虛。有因泄瀉而倒陷者用　人參　黃芪　白朮　茯苓　柯子　豆蔻　肉桂　附子　木香　丁香。有因清解太過而倒陷者是氣血兩虛也用　人參　黃芪　歸　鹿茸　川芎　白芍　肉桂　淫羊藿　炙草。有因風寒所冲而復陷者則以散寒扶氣爲主宜用人參　羌活　川芎　桔梗　升麻　生芪　炙草　生薑引。有因穢氣所觸而倒陷者宜補氣解穢爲主宜用人參　炙芪　當歸　川芎　白芷　肉桂　乳香　丁香　藿香　木香　仍用棗核檀香燒烟薰之治倒靨之法亦如是

## 灌漿逆症

凡痘紫黑慘暗千枯塌陷者不治

一諸痘有漿而天庭不起千枯而陷者不治。

一天庭之痘如沸水澆皮漸延兩頰去水而干似靨非靨者死

一頭面甚腫瘡皆抓破臭不可聞者死

一面腫早退瘡陷無膿目無神光者死

一漿不充實不肯結痂而泄瀉寒戰者危用桂附理中湯（或可救）

一灌膿時身反大熱而煩渴者用參麥湯　人參、麥冬

一頭上稠密身上稀疎痘色淡白不能起灌者氣血兩虛也宜用千金散（見前）　加升麻　四肢不起加白朮桂枝

一滿身無皮流水不止者此爛痘也內服當歸散（加味方見前）外用敗草散除泡撲敷之或茶葉方　多取茶葉揉去粗梗入水一煎取茶葉鋪于床上用草紙隔一層令兒睡其上一夜膿水盡乾。

一痘灰白皮薄擦而即破者不治

一痘皮薄無膿純是清水形如水晶者不治

一痘二便秘結腹脹聲啞肌肉焦黑目閉無魂者[illegible]

一痘爛無膿吐瀉不止二便下血乳食不化者不治

一痘頂不起腳漸散闊平塌干燥此爲倒靨多不可救

一灌膿之際而面部諸處即有干枯黑靨者亦爲倒靨不治、

一抓破之痘復與內托亦不剤膿不補漿且閉癰潰是毒入內攻也必死

一痘頂有孔滿但膿水推縮乎枯而色灰白如天疱瘡及癩頭之形者名癩瘡也不治

一起灌之時忽舌上有黑點此疔生舌上也不治

種痘新書卷之七終

種痘新書卷之八

寧邑張　琰逖先氏編輯

受業曾衡波仝叅

## 結痂辨症賦

痘至十三四日漿行飽滿。已宜次第收功。若遇身發大熱停漿不易結痂。此則陽元陰虛。引以清涼收歛。漿足而或氣喘。此症恐爲痰壅。痂成而忽癰發擔。必因小便秘濇。若或虛氣而陷塌倒靨而黑焦。一則溫補而或與。一則攻發而或活。泄瀉安寧。太虛少毒。內潰則下。體結臟毒。必然便血。挫喉聲啞。漿行飽滿亦無妨。痒塌咬牙。便實聲清猶可活。倘發痂頭變症。終無死脫卸

然須慼餘毒蒸發。或致太過潰爛難爲收拾。身熱若致燥入泡發燥。漿可提空遺痘殼不成痂。只爲漿清熱重。腹脹喘急而塌靨。皆由毒入內攻。痘雖未見黃臘痂兆。却如血赤。若胃經毒十朱。此症斷知美極。胃氣絕則口唇硬腫。肝熱盛則目睛白暗急。發於瀉後。總是氣虛而斷。泄瀉繼以煩渴。皆爲實熱而然。泄瀉而煩渴不止。理必可以升提。好飲而發渴愈甚。勢必難以援救。氣虛寒戰。痘瘡無恙。即溫經漿足。難收便實熱蒸。須解利進寒涼以助結痂。此補法而防過益。此非灌膿之候。何須純用補劑。至此宜防餘毒。縱用清解何疑。餘熱倘或薰蒸。痂兆依然難結。小便必須滑利。緊汁而始易收。甚的自毒瘡。因時制宜方爲

## 收結三日調治法

痘至十一二日。其漿宜飽。宜濃。十二三日漿行至足。面上漸宜收靨。其膿已熟。則漿如黃蠟。而脚漸兩不紅。頂心稍塌。黃漿已具收結之勢。于是其膿漸乾。其痂漸結。總要痂厚赤黃。最忌兆薄灰白。既于面部先出。當于面上先收。準頭先靨。是脾胃氣充。日後總無變症。兩頰先收。是肺肝氣足。必能次第收功。諸部未靨。而地角先焦。此爲腎水早枯。見之且休歡喜。滿面方漿。而天庭先靨。此是元陽劇裂。此症甚是堪虞。蓋額頭是爲純陽之所。足膝乃爲純陽之地。面部中庭乃陰陽和會之區。從此先靨。則陰陽和暢。氣血調勻。下漸收至于足。上方靨至頭顱。此順候之

常數。如是乃可無虞。莫謂痘至此已成功。可以不必調治。蓋屬臟腑空虛。此際反多變症。陽氣不充則身體必冷。而痘汁何能乾結。脾胃不運則肌殼必空虛。擬漿倒入內攻。當此時而用藥。宜以健脾利水爲主。蓋脾胃強旺則肌燥。而膿易結。小便清利則濕去而汁易乾。又當扶陽固本。爲先益陽氣盛則毒在外收而痂厚。真元固則毒不倒靨以爲殃。是以人參黃芪爲收成之要藥。理中桂附乃結局之良方。此日半闕血熱之症。故紅花生地紫草丹皮。一切涼血之藥皆退處屏藩。非急用之上將。惟茯苓白术以佐淮山。一切助脾之品皆選之左右。爲應用之將選。澤瀉猪苓常用木通車前得宜。附子乾薑肯可使砂仁丁桂撤

身體微熱有何疑慮。時水火既濟名爲燒盤之症。熱乃煉就痂皮。膿乾身熱自退不須用藥維持收靨過半大熱則爲餘毒將興須用調元化毒熱退餘物乃消凡是核骨之處餘毒在此現形。或是爲疽爲癤此等安能償命故任地紅腫成膿潰毒出外攻入不妨若或陰囊腫脹腎毒外泄膀胱若至倒陷入裏此見項刻云亡。倘有痰涎咳嗽陳皮半夏相當若還聲啞最宜詳察看痘疹何條發現痂厚則無妨此是氣虛痰症上只用開痰補氣宜發散氣自揚若發清而痘爛成倒靨而搔痒此等若逢繁密不日即赴泉鄉手足時常牽引恐其筋肉生風蟲蛀白附等劑內補血祛風可用若是拘攣難轉動血不榮筋氣不送祇要行其氣血自可運用流通倘來泄瀉是何因虛實原分兩症白青滑溜是脾虛治此法當用補若還黃赤射濺行此爲除其下奔不必急爲止瀉毒因泄瀉外行咬牙寒戰無害理中桂附堪嘗誰知不須驚怪寧心補血爲宗便下血膿可治臟毒不致內攻吐瀉蛔虫必死臟敗此症難醫腹痛而兼膨脹此爲餘毒積陳且用消導解毒痛定而脹亦除只怕痘形倒靨毒陷入裏堪虞牙齒生瘡則毒留于胃腑將成走馬牙疳急清胃熱乃爲良此時若不急救數日之後爲殃則見齦腐齒落月餘齒盡淪亡頭目疼痛則熱犯于太陽吾知自病將作勿令珠突青盲急退上焦之火清肝解毒相當此時欲驗生死總看痂形何樣痘痂

必要成痂痂厚亦貴可愛知其十無一死遍身俱結厚痂斷其百有百生收結若至于膝此其大功已成足下雖或痂薄然亦不致傷生飲食多進二便如常精神清爽體安康更喜嬉人明明。雖症全無豈可貿請藥餌且收藏若或昏昏好睡此非目閉神亡血氣混之已極精神豈得如常只須調養溫補元神返自安康痂有膿漿爲主今觀痂兆爲憑有痂則生無痂則死痂厚則毒盡散痂薄尚有餘殃雖面部結痂而遍體惡如薄紙此症猶云難救上身痂結而腿膝下若竹衣此等必留餘毒况而自抓破遍體無痂其毒豈不內攻濕爛流膿其症必險連皮脫去此症定凶一日之間遍體一齊黑靨俗云鐵甲焦擔見此斷然不治靨後總無痂兆此是到靨無疑遇此何須施治至于飲食不進泄瀉無休喘急氣嘘瞳人已大自少神光足冷過膝肌盡焦黑唇不蓋齒舌縮痰鳴死期已至醫人若逢此候萬勿輕投藥餌恐致傍人之訕招其災殃之尤

### 結痂順症

痘至十三四日血盡毒解其膿漸乾色如蒼蠟或如葡萄色從口鼻兩旁人中上下左右二顴收靨起乃至地角頸項胸腹腰背逐漸收下然後上及額顱下至于足逐次收結痂厚疵圓或黃或赤雜症全無者吉

痘自人中先收者吉自元霽先靨者任凶不凶蓋人中爲陰陽

交會之所從此先收必陰陽和暢氣血均行元壽乃肺胃中土之區自此先靨則脾胃氣旺自能滋養乎百骸故二處收起必無凶兆若額顱地角及手足心先收則凶此邪火入于心腎故序未及而先萎也所以必凶

髮際以上陽中之陽謂之孤陽足膝以下陰中之陰謂之孤陰孤陰則氣難充獨陽則血難過痘至二處所以遲留而緩靨也必收至足下而後頭顱乃靨耳不必施治

痘漿已足色如蒼蠟而身發熱者此回水之候係陽運化所以身體溫熱漿痂燥乾其漿乃乾其痂乃結古謂燒盤之症不必施治俗愚用寒凉以退其熱則由極而變亦矣

一見痘已成漿但元虛體弱忽然發熱作渴其家用三黃湯進進三服即熱退身凉以為得計孰知內腑已虛痘成倒靨竟致莫救良可悲也

### 收結陰症

當收靨之時身體當溫乃能回水乾靨若身凉足冷而當收不收則陽虛不能收結宜用

### 和中溫表湯

炙芪二錢　人参　白术　茯苓　肉桂　川芎　當歸　以仁　乾薑各一錢　炙草　防風　白芷　丁香　附子（各五分）

又有發熱薰蒸而當靨不靨者毒未解也須退其熱則痘自收宜用

### 清表解毒湯

生地　麥冬　花粉（炒各八分）　黃芪一錢　當歸八分　牛子　連翹　赤苓　澤瀉　木通（各五分）　甘草三分　又方用百沸湯調沙糖與服名甘露回天飲亦能退熱收結　又膿漿足而當靨不靨者宜用

### 回漿散

黃芪一錢　白术二錢　茯苓一錢五分　何首烏一錢五分　白芍八分　人参　炙草四分

### 象牙散

前方加象牙散一錢

又有其漿雖充而濕潤難收者亦用回漿散加以仁豬苓澤瀉半夏

又有表過痘爛而水流不已者用人参黃芪白术白芷防風茯苓又用

### 除濕散

蒼术　防風　赤茯苓　豬苓　澤瀉　木通　白芷　白术　以仁　干姜　官桂　外用敗草散敷之（方見前）

痘靨至頸或至腰而下身〇收靨者此熱毒太盛故也當用五苓散加芩麥滑石木通若大便秘結用當歸解毒湯

當歸　生地　酒大黃　麻仁（炒研）　只壳（炒）　紫草　連喬

一痘當靨之時忽然灰白頂陷去瀉腹脹寒戰咬牙此脾肺兩虛若不急救則毒入內攻而死急用

內助散

黃芪　人參　白朮　茯苓　當歸　陳皮　半夏　肉桂
山查　附子　乾薑　痘有水泡則多用白朮茯苓

一痘當收不收身發大熱狂言譫語喘急氣喘二便秘結煩悶作渴者此熱毒乘間入于心肺二經也宜用

清金導赤飲

當歸　白芍　陳皮　石羔　茯苓　炙草　黃芩（炒）　黃連（炒）

杏仁（炒）　桑白皮（炒）　木通　只壳　滑石　車前　麥冬　人參
玄參

一痘未稠膿頂未滿足面而膿忽退自閉忽開發癢散潤皮破乾燥似靨非靨者此氣血兩虛津液枯竭毒氣不能外散而將流入內攻最危之候急用　黃芪（二錢）　人參（八分）　白朮（錢）
茯苓（一錢）　肉桂（六分）　牛子　麥冬　連喬　白芍　白芷（各八分）

此亦倒靨之候見此之症即急以治或十救二三若不急治則必死矣

一痘膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者亦倒靨也此是氣不足急用保元湯加　當歸　白朮　茯苓　牛子　連喬　官桂　木香治之必其破處復加腫灌手足遍身原無痘處復出一層謂之補空所破之處復有黃汁堆結成痂謂之補斑若有如此則可望生如其不然則必死矣

一痘後靨忽泄膿血痂皮者古謂倒靨然毒既下泄不留內攻俟其膿痂下盡自然而愈不必妄治若瀉而水穀不分者則用陳氏木香散

木香　大腹皮（洗淨黑豆汁）　人參　赤茯苓　前胡　桔梗　青皮
半夏　丁香　訶肉　炙草　桂心　共為末金豆湯化送下

有因暑熱痰氣所迫而不能靨者宜用

桂枝解毒湯　（此方徵參則不敢用）

桂枝　麻黃（炒）　赤芍　防風　炙草　桔梗　川芎　牛子
人參　生芪　有因夏月炎天暑氣蒸發不能靨者宜用

甘露解毒湯

白朮　茯苓　赤苓　澤瀉　木通　麥冬　生地　連喬
官桂　香薷

一痘乘熱太盛一向總不大便而痘不能靨者當微利之用

當歸解毒湯

生地　當歸　麻仁　牛子　紫草　只壳　酒大黃　如此之症當用膽導法更為穩先其法詳四卷利結條

一遍身俱收惟頭足不收者用　白朮　茯苓　當歸　川芎

升麻　[illegible]　牛蒡　白芍

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者用前回漿散加前胡

牛蒡　連翹　麥冬　車前　木通　外用輕粉黃連為末調油搽之。或以芒硝為末調豬膽汁敷之亦效

一痘收結時有腥臭之氣者是其毒氣洩外也痘多若無臭氣則毒氣猶未盡洩其後恐有餘毒然其臭如腐肉令人不可近者則毒化未清致有惡氣又急宜清毒活血不然變出非常。

一有痘破成坑不能合口者用生肌散。或綿繭散敷之。

生肌散

地骨皮　黃連　黃柏　甘草　梔子　枯礬　共為末

綿繭散

出蛾繭不拘多少每繭入白礬五分用火煅過其礬一兩則加陀参五錢　白芷二錢　為末以蜜調敷。

一痘損破灌膿作痛不乾膿水者名痘蝕瘡犯着出流血不止若因循失治。必致潰筋傷骨穿膜破肌以殃人之性命須用

大補湯　外敷綿繭散

黃芪　人参　當歸　官桂　牛子　連翹　甘草　茯苓

一痘頭面損破反復腫灌膿血浸淫者須防壞眼崩鼻破而缺唇宜用。

升麻解毒湯

升麻　白芷　炒芩　牛子　連翹　密蒙花　荊芥穗

防風　蒺藜　當歸　甘草節　木通節　加黃芪

一痘當收時身宜微熱熱不宜凉然或忽增大熱發渴煩燥則其毒未曾盡化至此毒火復炎若不解毒須防復陷宜用

調元解毒湯

黃芪　當歸　牛子　連翹　黃芩　花粉　金地　木通

前胡　人参　甘草。

一收結時身熱痘紫連結渣滓兩頰通紅者毒聚于肺其必將發肺癰也宜用

清金解毒湯

黃芩　黃連　牛子　前胡　丹皮　麥冬　知母　白合

炒梔　甘草　人参

一面上俱未收而耳上之痘先收者毒侵于腎也若不治之則諸痘難收恐成倒靨。耳冷者須用枸杞　故芷　知母

當歸　川芎　白芍　山查　陳皮　白术　甘草　耳熱者用　黃芩　黃連　川芎　白芍　厚朴　木通　甘草

一當靨之時身凉而汗不止者此表虛也宜固肌腠用

歸芪湯

黃芪（蜜炙）　當歸　棗仁（各一錢）　炙草（四分）　麥冬（去心）　白术　茯苓（八分）

一兒痘甚稠密而漿亦充未至地角遂不收靨而身熱咳嗽盜汗如雨面青唇白啼哭不寧醫者皆斷汗多亡陽況痘症乎用保元湯每服用人參一錢連進二劑不效諸醫束手延余往視余見漿濃痂厚知非氣虛乃過服熱藥所致余用黃芩黃連牛子連翹前胡桔梗陳皮生芪當歸炙草茯苓一服其汗即止其氣即平連投二三劑遂收靨無恙矣只有咳嗽未除乃用二陳湯加桑白皮馬兜鈴乃徐徐而愈

一兒痘當收靨身熱煩悶目睛上視狀同急驚余見痘痂堅厚而痂色又赤亦用 黃芪 當歸 白芍 柴胡 牛子 連翹 麥冬 花粉 木通 車前 茯神 生地 以解

其餘無諸症恐平

一凡斂然之時忽身發大熱必是餘毒蘊熾斷以解毒爲主但大病之後元氣虛耗解毒中亦要顧其元氣此大連翹飲之類亦不宜妄過服也切宜瀉之

一有收靨之時雖痂兆堅厚或有時作戰慄而妄語者乃正氣將復不能自持故也不必驚疑但補血寧神而自定矣

一又有痘膿已足忽變灰色及膿乾痂結變爲黑痂隨結隨落竟無恙者

一又有漿回之目痘與皮平全無痂狀稍待則皮漸捲起痂結甚薄隨結隨落亦無恙者

又有漿回全無痂形從亮殼其中却有結成之痂雖不甚厚亦無恙者

一痘至十二日開眼者乃正期也先期而開者毒入內攻也亦後期而開者毒從外化而未盡也亦必然痘之稀者則不可以常例論

## 結痂雜症

### 倒靨

多死凡痘出至六七日間脚漸潤頂愈陷其色純白形如豆殼者名倒靨也　又有其痘和皮連片脫去者亦倒靨也　又有先前起頂有清水一旦水收痘靨全無痘痂者亦倒靨也世人

誤認爲收靨豈知好痘收靨必有痂兆且緩緩而收若收速無痂皆倒靨也痘至倒靨則毒入內攻實難療矣如必不得已而治之宜用人參　黃芪　當歸　川芎（各一錢）　肉桂　山查　紅花　白术（各八分）　薑棗引

### 頭痛

此時而痛且身發熱者必是餘毒上攻于目而目疾將作也急宜用羌活　川芎　柴胡　黃芩　連翹　牛子　赤芍　防風　白芷　菊花　土康　山枝

### 咳嗽

痘若有痂則無妨須用桔梗　陳皮　半夏　茯苓　桑白皮

茯苓　炙草　痘靨無痂則凶

### 聲啞

痘靨無痂者必死其痘若好則或因氣弱而聲不亮宜用人參　黃芪　白朮　茯苓　柯子　五味　炙草　或因痰壅肺道而聲不出者宜用陳皮　桔梗　半夏　款冬　白附　砂參　茯苓　炙草　豁動其痰聲自開矣

### 手足牽引

或十指拳縮或牽肩搐足點額搖頭皆是肝經有風熱肝屬筋筋內有風故牽引搐縮也宜用黃芪　當歸　白芍（爲君）茯苓　勾藤　白姜蚕（糯米炒）天麻　炙草　搖頭點額加川芎　虫退（去土）全蝎（去首尾）硃砂

### 手足拘攣

曲而不伸或伸而難曲艱于轉動者此是氣血兩虛血不榮筋也宜用人參　黃芪　當歸　川芎　白芍　大生地　白朮　茯苓　丹皮　續斷　碎補　虎骨　勾藤　炙草　官桂（前切）服　若骨內痛而不腫者是風疾也于前方加防風　家皮　南藤　靈仙　少許乳香　沒藥　手用桂枝引　足用牛夕引　若手足紅腫而痛多在曲腕接骨之處此是餘毒發作治法詳于癰也

### 手足冰冷危

---

此陽氣將絕而不能行於四肢也若冷過膝死于目前

### 泄瀉（無妨）

此時泄瀉多是餘毒奔越不宜驟止但餘毒下泄者瀉必有聲其糞或黃或赤而臭或直漂射而出此皆熱注大腸餘毒因瀉而解也毒盡其瀉自止若瀉不止用五苓散加牛子　木通　車前　惟糞青白而瀉滑溜無聲者乃脾虛也用參朮調脾散與豆蔻丸治之　若瀉蛔虫或蛔虫從口鼻而出俱不治此胜敗而虫不能安也　若瀉膿血則內有蓄熱因瀉而解或因痘既潰故下膿血也必下盡自安不可止濇

### 飲食

能食則吉不食則凶

### 腹脹而痛

痘漿不滿而痂不厚者因此內留餘毒故脹痛也宜用　牛子　連翹　山查　神曲　厚朴　陳皮　香附　木香　白芷　炙草　炒芩　有熱加前胡　若漿濃痂厚則爲積滯脹痛宜以前方去連翹黃芩加蒼朮　砂仁　大腹皮

### 陰囊腫脹（無妨）

此腎毒外泄于膀胱也吉至痘收齊自退若猶不退則用蒼朮　茯苓　猪苓　澤瀉　木通　車前　滑石　牛子　銀花　瞿麥　以退膀胱之熱而自消矣

### 昏睡（無妨）

氣血虛造子外而元氣未復故昏昏而睡呼之不醒醒而復睡不必驚疑元神既復而自安寧

潮熱

熱而不甚者乃元陽運化以成結痂之功所謂燒盤之症也不必服藥　若痂落痂退而忽然大熱者餘毒將收欲發癰疽宜用和中敗毒或連翹飲弱者用前扶元解毒湯熱退則餘毒解矣

齒痒或出血

此餘毒留于胃經將成走馬牙疳也若不急治其後牙齦腐爛日落一齒而口落盡而死當發痒之時即宜用連翹　牛子

慈菰．石膏　生地　銀花　連翹　甘草　煎水與[illegible]服人參　石膏　牛子　慈菰　甘草　黃芩　不過數劑其痒與血俱止則無事矣

**咬牙寒戰**　仍用桂附理中湯

**譫語**　只用補血安神

**面唇紅紫**

宜內服扶元解毒湯（方見前）　外用紫草　生地　紅花　甘草　黃芩　黃柏（俱生用）牛子　共煎汁擦上自愈　或痂後生疥與痂成瘡俱可用　又方用細茶糯米雞窩將布裹住即于面上亦可

---

結痂逆症

一遍身未見黃漿而口唇上下先黃熟而忽焦者、皆見此逆宜剔破

一未靨將靨時口唇腐爛唇白至舌者不治毒攻于胃也

一未吃飲食口中常如食物而動不止者不治

一面部胸腹俱未收而脚先收者凶

一遍身臭爛如餅搭者急用內助散（方見前）或可救然終難治

一遍身發痒抓破不見膿水皮捲如豆殼者不治

一痘將靨寒戰咬牙手足搐動禁口不開者最危候也急用人參　黃芪　白朮　白茯苓　附子　炮薑　丁香　肉桂

一收靨時咳嗽喘急聲啞目閉者不治

一口閉腹脹足冷過膝者不治

一目無神光瞳子不明珠帶灰色者不治

一收靨至頸項或至胸而不靨下服藥無效者死

# 種痘新書卷之九

寧邑張　琰遜玉氏編輯
受業曾衡波仝叅

## 痘後餘症賦

痘結痂疤雖生意已成。其八九餘毒未消而變症。正慮其多端。昇以眼合腹脹猶為危候。虛熱不退。尚是內機。痂或成而反致大熱。前兆恐為黑陷。膿未消而眼已先開。眼開毒是內攻。陽氣極而狂叫喘呼。腸胃傷而咳嗽不寧。至于冷風入胃則利下膿粘。熱滲膀胱則小便溺血。熱毒逗留不化。痂結而壯熱增寒。經絡各道餘毒。日晡而潮熱在未。發在午前為實熱。煩渴腮紅叶時方作是陰虛。便調人靜他如撮唇弄舌。心經熱盛何疑。狀叶抬胸脇肩毒弗有。準身熱煩人而便秘。恐來暴發為風。依依潮熱兼泄瀉。久變慢脾風症。驗我目于眼合羞明。辨口瘡于唇焦齒黑。寒熱下注大腸。必有秘結之禍。虛寒穿留臟腑。乃成泄瀉之痢。喘渴須分虛實。驗症切勿差訛。欲觀痂落之餘。再辨瘢痕之色。桃紅潤澤。榮衛俱安。紫黑乾枯。尚留風熱。粉白為氣血之虛。週過也應深逝走。馬狀牙瘡之烈。月餘亦見長驅遍體亦瘢。乃是失於解利。渾身青紫。恐為風寒所吹。餘毒未消。不特為疽為癰。見風太早。恐其復發癢瘋。此是先賢之秘訣。余向後學以誑傳。

## 痘後調治法

痘至十五六日。靨齊其功已就。至是雖可無虞。第恐擦傷痂面。致留餘毒為殃。餘毒若在肌膚。是必為疽為癤。疽癤既形。則身不內攻。此見知其不爽。雖綿延亦可全生。若熱蘊肝經。則目紅頭痛而眼合羞明。肺留餘熱。則咳逆痰涎而發疥。外著熱下注大腸。則大便或來膿血。其毒遂後至致生痢疾之病。餘熱若滲膀胱。其必陰囊腫脹。以致小便赤痛。若夫目瘡腐爛。齒血牙疳。狐惑瘡生。皆是胃經有毒。至若驚搐狂言。昏沉朦朧。舌瘡唇裂。是心家之熱。經絡若留餘毒。是以變生黃疸。總隨症以調治。有熱則退其熱。有風則去其風。勿謂痘家之症。遂膠固而不通。但用藥不宜太猛。恐元氣難任寒涼。良以大病之後。氣血已耗。不惟病者必須慎其藥餌。即未病者亦宜謹其起居。洗浴太早。恐生浮腫。目犯風寒。致生潮熱。慢服食物。致腹脹痛。痘痕損破。乃病瘡痍。退以落痂之餘。最要避風寒。節飲食。其梳頭貴見洗浴。不可出外行動。不可忍飢過食熱物。慎勿多食生冷。切須禁忌。必待氣回血復。精神如故。臟腑安寧。然後可以無虞。

痘收結痂。厚遲之三日自落者吉。又痂色光潤。其瘢帶紅更妍。他症。飲食如常者吉。　自食痘痂雖有他症。任內不內。

## 痘後雜症

### 潮熱

痘後發熱症有數端。有氣血回元而熱者。則悠悠潮熱。不煩不渴。不一二日。氣還血復而熱自退矣。不必服藥。　又有痘後元虧。或久坐久視。勞動傷神而發熱者。只須安息調養。不必服藥。　又有感冒風寒而發熱者。必發頭痛惡寒惡風。宜用補中益氣湯。　人參　黃芪　白朮　茯苓　升麻　柴胡　炙草　熱甚。則以升柴爲君。加前胡。有咳嗽。加陳皮　桔梗　半夏　南星　炒芩。不過一二服。其熱自退。　又有餘毒攻作。將發癰疽而潮熱者。必痘漿清。痂薄。熱而煩渴。舌有黃苔。遍身俱熱。有一二處尤熱甚者。即癰之所在也。治此宜解餘毒。精神旺者。用　連翹飲　連翹　牛子　柴胡　前胡　當歸　赤芍　防風　荊芥

木通　車前　炒芩　炒連　蟬退　滑石　甘草　弱者加人參　黃芪　大便秘者。加酒大黃　或頭目大痛者。餘毒上攻目疾將作也。仍以連翹飲去木通、車前、滑石。加升麻　桔梗　川芎　薄荷　白芷　蒙花　菊花　目紅去當歸。加膽草　紅花　生地　俱必熱退痛止。藥方可止。然痘後元氣已虛。解毒之藥。必傷元氣。若毒清熱退。即宜滋補以顧元神。　又有氣血兩虛而熱者。其熱猶緩。頭熱而不甚熱。手足心熱。手足背不熱。精神怠倦。大小便利者。乃虛熱也。其熱多在午後。故曰發在午前爲實熱。申時方作是陰虛。治此宜用十全大補湯　又有餘毒不形瘦痂而搐。傳于肝臟而發熱者。晝夜不息。舌有黃苔。或十指捻縮。用生地　柴胡　白芍　炒芩　麥冬　勾藤　牛子　知母　丹皮　澤瀉　花粉　棗皮　甘草　此必血燥皮紅

### 痂落不落

痂黑唇紅而舌有苔。其身有熱者。此餘熱爲殃而不落也。宜用調元化毒湯與服。解其餘熱。外用細茶、豬膏共擂。以絹盛之。即于痂上揉。只解其熱。膏以潤其燥。其痂自落矣。　若痂薄唇白而舌無苔者。此元虛而血不潤。故不落也。宜用人參　黃芪　當歸　炙草　蟬退與服。外用雞膏與茶潤之。而自落也。　又有痘痂不落。虛弱之甚。昏沉不省人事者。用人參清神湯　人參　黃芪　當歸　白朮　茯神　棗仁　麥冬　陳皮　甘

草　又有痂乾陷入肌肉而不落者。用乳香二錢　輕粉一錢　共爲末。用豬膏調敷。　又或用鷹糞燒灰。馬齒莧汁和蜜調敷。又或過服辛熱而痂不落者。用升麻　乾葛　防風　連翹　蟬退以去肌熱而自落矣。

### 痘後發癢（抓破成瘡）

此皆血熱之症。宜用黃芩　黃栢　生紫草　甘草　生牛子　銀花　生地　紅花共煎油。搽之即愈。

### 痘爛復癢（致成瘡疥）

亦用前方與搽。或用黃豆燒灰。調油搽之亦可。

### 瘢白

此因漿清而血不足也宜用四物湯加白朮　陳皮　紅花

　脣不蓋齒

此氣血兩虛而毒留脾胃也失治將變走馬牙疳宜用人參　當歸　赤芍　元支　牛子　連翹　石羔　石斛　甘草　玄參

　坐立戰搖

此氣血虛也宜用八珍湯

　飲食倍進

若面赤喘急二便秘澀則內熱易于消爍也若不急治必生他症宜以四順飲主之　大黃（酒制）當歸　芍藥　甘草

## 痘後諸瘡

遍身枝節上生瘡者名為疳蝕此因風寒相搏而氣血滯凝于腠理而乃生是瘡也宜以前綿繭散敷之自愈　又有見風太早致成瘢瘡而出膿汁者燒乾牛糞敷之　又有痘風瘡者年年至春即發宜用防風　荊芥　牛子　甘草　苦參　當歸

　又或用　當歸　連翹　牛子　防風　荊芥　生地　赤芍　紫草　甘草　蒼朮　川芎　薄荷與服外用黃丹　黃柏　黃芩　大黃　輕粉共為末以豬油調敷　再于風池曲池三里諸穴以火灸之則永不發矣　又有皮膚之間隱隱而起者俗呼疙瘩此皆餘毒滯于皮膚而然也宜服解毒藥以漆根剖開取其腹內之水洗之或用蜆殼煎水亦可蜆形如蚌殼生魚池泥中凡割漆者必用此殼俗呼漆蜆其性涼而解毒

　又有用滑石一兩　甘草五錢　共為末調敷瘡上者名天水散

凡痘痂之後抓破出血遍身復灌膿漿成血風瘡每至春夏南風一起其瘡復發秋冬自愈但不纏染他人者俗呼痘風瘡也欲其不發須用火灸風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥　銅綠　白礬（生）大黃　樟腦　流黃　川椒　膽礬　棓子（炙）白芷　水銀　錫　右方各等分為末另將錫融化入水銀攪勻然後入諸藥末調豬油敷上

　苦參丸

苦參　炒枝　防風　只殼　玄參　獨活　黃連　黃芩　大黃　菊花（等分）共為細末蜜調作丸如梧桐子大每服五十丸　酒送下

花蛇酒　川白花蛇一條蒸米數升先放酒曲次將布袋盛蛇貯于酒曲之上然後將蒸米與酒藥和均傾于蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨每服酒時配蛇仝服再將酒糊調苦參末為丸服　愚謂只將蛇去其首擺酒瓶中入好酒封固其口護火煮熱俟數日取酒與蛇並服

## 瘢症

[illegible]身[illegible]者[illegible]既虛脈唇赤面倦燥氣邪散如疑也所生退朱一錢以生薄荷取汁調服令其發汗即愈

## 赤火流丹

一片通紅從頭起者。過心不治。從足起者。過腎即死。此惡毒蒸發乘血橫行也。宜內服　玄參　歸尾。紫草、紅花　石蒜　連翹　赤芍　骨皮。車前　木通　防風　荊芥　淡竹葉　外却用馬蝗蜞三五條置紅腫處吮去惡血以洩其毒乃不延去　又俗呼天虹腫余紅此症其小便赤澀乃用　玄參　紅花　紫草　生地　防風　牛子　連翹　木通　車前　淡瀉　朱苓　活石　甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之先用瓦鋒刺去毒血後用墨與三七塗之即愈

## 走馬牙疳

其先牙齦生痒、時時出血、繼而齦黑腐爛、其齒漸落、或有自落一齒、或一日旋落數齒、滿口齒俱落盡乃死、見齒生痒、即宜施治。此證胃經蓄熱所致、宜用人參石羔牛子甘草石斛與服、以解脾胃之熱、併用石羔牛子連翹黃芩生地紫草蛇床枯礬甘草煎水與啖、即愈、若牙齦腐爛、則用蚕退散敷之　枯礬三錢　人中白（即尿脚煅乾）二錢　五倍子二錢　蚕退（燒一錢）　蛇床子二錢　共為末　先用蠟糟豆煎米泔水洗淨次洗淨腐肉惡血然後以藥敷之　又搽苦散亦治牙疳、　人中白（煅）　青黛五分　冰片一分　白蠶虫（炒）一錢　寒水石　三錢　共為末敷之、　又用蠶虫。丹皮　甘草心　連翹心、生地、銀花、桑白皮、沙參、茯苓、炒梔等分煎服、虛弱者加人參。

## 唇口生瘡

上唇有瘡、虫食其臟、其名曰狐、下唇有瘡、虫食其肛、其名曰惑、皆由裏熱生虫、而食臟腑、以及于肛、而外于唇之上下、乃有瘡形也、必其人昏昏好睡、不思飲食、其聲必啞、而音不亮、所謂狐惑也、此狐惑之候、必致鼻崩齒落、失聲而死、宜用除慝丸治之　黃連二錢　蘆薈（一錢三分）　使君子肉三錢　白蕪荑（一錢五分）　乾蟾（燒灰三分）　川練子肉一錢　共為末用烏梅洗淨去核搗爛和末為丸米飲下

又有口舌生瘡赤者名赤口瘡、此心脾蓄熱也、白者名白口瘡、此心肺有熱也、赤者用陰陽散、白者用朱礬散、　又通用洗心散與服、　又通名鵝口瘡、以鵝涎洗淨、即鵝毛煎水洗之亦可、必洗淨乃可敷藥、亦有洗之即愈者、　又用百脚虫蘇米泔水洗之者

陰陽散　黃連三錢　乾薑一錢　共為末敷之

朱礬散、　硃砂二錢　白枯礬一錢　共為末敷之

洗心散、　黃連　歸尾　生地　木通　薄荷　牛子　連翹　桔梗　甘草等分煎服燈心湯引

綠袍散　黃芩　黃連（各一錢）　石羔　寒水石（各二錢半）　朋砂（一錢）　甘草（五分）　青黛（六分）　共爲末凡爛口瘡敷之立效

耳病

有痘後耳內腫痛流膿出血者俗名蚕耳須先用棉花攪淨洗乾然後用黑沙糖調水少許滴入耳內其痛立止而汁自乾戒勿抓把而自愈矣

腹痛

有口禁強直冷汗如雨遶臍而痛痛定汗止者防風痙入胃俗謂盤腸內鈎也用升消平胃散加勾藤木香一服立平（方見九散條）有痛而吐瀉交作者用正氣散　藿香　陳皮　半夏　紫蘇　大腹皮　厚朴　茯苓　木香　白芷　山查　神曲　炙草　白芍　有大便秘結而痛者用白芍（二錢）厚朴（一錢五分）陳皮（七分）甘草（三分）大黃（一錢）　有方靨之後忽然腹脹而痛煩悶不寧者必夾積滯餘毒入裏最爲危急不幾漸加喘急手足厥冷則不治矣速用　雄黃解毒丸　雄黃（一錢）　鬱金（三錢）　巴霜（三錢）共爲末米糊爲丸如米粒大好酒送下　有腹中飽脹不思飲食時時而作痛者此必悞服食物或過服熱藥而致餘熱滯積而作痛也其必腹有微熱治宜消導解毒爲主用蒼朮　厚朴　陳皮　半夏　木香　香附　砂仁　牛子　連翹　山查　神曲　川芎　前胡　炙草與服

不食

痘後臟腑空虛最要能食方可滋養百骸以復元氣若其不食不亦危乎然有脾胃虛寒而不欲食者必唇舌俱白而身復涼精神困倦懶向人言須用人參　黃芪　當歸　川芎　白朮　茯苓　丁香　肉桂　砂仁　乾姜　山查　麥芽　又有脾胃滯留餘熱而不欲食者必舌心有苔腹脹微熱仍用前消導解毒之方爲主　又有一向能食忽然聞食則嘔而不欲食者必爲傷食所致若不施治必成疳勞須用平胃散加三稜　莪朮　只實　良姜問其所食何物即將原物爲引

心痛

必鬱熱蓄于心胸故在臍以上痛須用鬱金　陳皮　半夏　桔梗　黃連　山枝（炒）　玉竹　木香　香附　厚朴　白芷　連翹心

虫痛

腹痛時時腹中滾起數團痛定而塊亦落者此是蛔虫過多所食又少穀氣不能養蛔或胃有滯積而蛔不安故蛔出在內攪亂滾起而作痛也宜用平胃散加使君子肉　苦楝皮　胡黃連服後瀉出蛔虫則永不痛矣

手足厥冷

有六脈沉細者元氣虛也宜以調元生脈湯主之

人參　炙草　炙芪　當歸　門冬　官桂　甚加附子

昏迷錯語

當毒氣已散元氣未復精神疲倦故昏昏喜睡即呼之不醒亦自無妨若連日不醒日中喃喃自言自語形如醉人妄多妄語者此邪熱乘于心胞也宜以導赤解毒湯或安神丸主之

導赤解毒湯

木通　車前　生地　門冬　甘草　茯神　石菖蒲　枝子　人參　燈心湯引

安神丸

牛黃五分　黃連五錢　當歸（二錢五分）炒枝仁二錢　共爲末入猪心血和

句爲丸硃砂爲衣燈心湯下即若無真牛黃則加川以朋星　琥珀

驚搐危

此必毒化未盡火毒攻心所致也此時血氣已衰正不勝邪故曰痘後發搐是凶機然搐而易退者正氣猶足敵邪尚可以治若連綿不已則必死矣宜用清神散火湯或粉紅丸治之

清神散火湯

木通　車前　麥冬　玄參　黃連　甘草　枝子　燈心湯引加神砂調服　大便秘者加酒大黃　弱者加人參

粉紅丸

膽星四錢　天竺黃　神砂　胭脂米各三錢　共爲末作先生薄荷湯下

咳嗽

此餘毒流入于肺肺熱生痰故咳嗽也只宜清金降火爲主但久而不止胸高肩息者則不治矣凡嗽用寧肺散　知母　牛子　桔梗　陳皮　馬兜鈴　杏仁　生地　川貝　桑皮　青紅　炒芩　甘草　又有元氣虛弱而風邪入肺而咳嗽者必作寒作熱宜用補中益氣湯加桔梗　陳皮　半夏　白附　杏仁　又有潮熱不息肝肺二經皆有風熱而咳嗽者宜用柴胡　赤芍　炒芩　炒枝　胡黃連　全蝎　勾藤　川貝

花粉　桔梗　陳皮

尿血

此熱滲於膀胱也其必小便短澀而痛宜用　牛子　銀花　木通　車前　瞿麥　滑石　赤苓　朱苓　澤瀉　又方用苦楝樹皮入猪尿胞內煮熟與服立效然必先服前方數劑後以此而收功也

秘結

痘之首尾俱要便調若便秘恐留餘毒如無他症則必悞服解熱以致陰血受虧不能滋潤宜用潤腸湯主之　歸梢　生地　麻仁　桃仁　甘草　有熱加知母　石羔

痘前要腠理開通而毒乃不閉故宜有汗痘後要腠理緊秘而風邪方不易侵故不宜過汗然動作用力或飲食溫充氣血動暢身軀溫煖而出汗者常也若身不與動而飲食未進其汗自流者謂之自汗寤寐之中汗濕衣席醒則自止者謂之盜汗盜汗自汗皆由表虛所致宜用人參　炙芪　炙草　當歸　炒連　桂枝與服其汗自止　又方用當歸　炙芪　炙草　生地　麥冬　炒連　麥麩　入猪心內煎熟與服

諸失血

鼻衄血者熱流于肺也目吐血者熱蘊于胃也小便血者熱注

于小腸大便血者熱滯于大腸皆由熱留于裏致血而妄行也急用凉血地黃湯主之治之而血止則生不止則死

凉血地黃湯

黃連　歸尾　生地　炒枝　玄參　甘草　犀角　衄血加黃芩茅花　吐血加知母　石羔　童便　香附　小便血加木通　活石　車前　大便血加蓁花　槐花　地榆　諸血不止槩加蒲黃　藕節　茅根

蛔

蛔出從口鼻而出者皆由裏熱蛔不能安故從口鼻而出也但熱毒上蒸則蛔從上出熱從下迫則蛔從下出其症皆凶[illegible]

黃連止蛔湯治之　黃連　黃栢炒烏梅　人參　白朮

引一痼痢

欲便難便裏急後重或赤或白謂之腹痛是痢痢也此皆熱毒鬱于腸胃是故有是症也但赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來赤者以活血爲主用四物湯加炒芩炒連木通甘草桃仁紅花久而不愈以去桃仁加阿膠砂炭姜白者以扶氣爲主用四君子湯加炒芩　炒連　木香　炒活石　陳皮　裏急後重加只殼　生白芍　腹痛則多放木香　肛門突出則加升麻以提氣上行久而不愈則加黃芪　乾姜　砂仁　若赤白並下則以四物四君子合飲而加芩連　若小便赤澀而煩

渴者加生地　木通　車前　麥冬

東垣曰痘症下痢須用升麻提起正氣使痘不致下陷可見痘中治痢須用保元湯加升麻爲主然後隨其赤白加減治之在痘中不致陷伏之虞痘後可絕喪元之禍也

便下膿血

古名腸澼但毒從便解不可妄治若驟止之則閉門閉盜其禍不挽迴而至矣若便不順利而後重者須用黃連解毒湯　黃連　黃芩俱炒只殼炒歸尾　紅花　酒大黃　甘草　又或用和中湯　人參　當歸　只殼　陳皮　木通　甘草　若素有積熱腸鳴復痛裏急後重者宜先用調胃承氣湯以微

甚熱久以芩連湯或香連丸治之

調胃承氣湯

芒硝　大黃（酒制九蒸）　枳梛節　甘草（當貝）

芩連湯

芩連（俱酒炒）　當歸　川芎　甘草　木香　赤芍　久下加升麻

香連丸

川連一兩（茱萸水制炒）　木香二錢半　共為末醋糊為丸如麻子大。米飲下

若久而不止與痘中下膿血者用韭菜白、豆豉　炒枳仁

久痢脾虛則用人參　白朮　茯苓　官桂　川芎　當歸

赤芍　升麻

痘後浮腫

痘後膿血去盡脾土已虧氣血俱衰邪易入而食易傷故或感風濕或傷飲食或滯餘毒皆發為浮腫然感冒風寒者多自面目先腫而身熱口渴宜用　升麻　柴胡　茯苓　木通　車前　防風　付皮　甘草　薑葱引令出微汗而腫自退矣

有感濕氣而腫者多在足下先腫其形光亮以手按之而即有窩其起亦緩且其人好飲而小便赤澀以水洗之而愈腫者屬水腫也用當健脾利水為主宜用　蒼朮　厚朴　木通　車前　活石　瞿麥　澤瀉　朱苓　茯苓皮　大付皮　使小便清利其腫自消外用蒼朮　檀香　燒烟熏之以被蒙蓋令出汗水其腫即退

又有食積而兼滯毒者多自腹先腫起必腹中隱隱作痛不思飲食且腹有微熱大便黃臭小便赤澀者滯積而腫也治當消導解毒為主宜用　蒼朮　厚朴　陳皮　付皮　香付　川芎　山查　神曲　牛旁　連喬　木通　車前　茯苓皮　陳皮　半夏　甘草

又有脾氣不行而浮腫者其皮如皺按之難下乃氣腫也治當理氣為主宜用　人參五皮散治之　人參　白朮　官桂　麥冬　大付皮　陳皮　桑皮　姜皮　茯苓皮　木香　澤瀉　車前　木香

又有血不行而腫者其皮肉之內隱隱若有血路是血腫也治當以活血為主用四物湯加人參　陳皮　香付　木通　茯苓治之使血行而腫自退矣

又曰面目四肢腫者屬肺因表虛為風寒所侵而腫宜發汗而腫自消用加味五皮散主之　羌活　防風　桂枝　防已　蒼朮　木通　五加皮　桑白皮　大付皮　茯苓皮　姜皮　朱苓　甘草

又曰腹脹加鼓服胞微腫者屬脾胃脾胃素虛土弱不能制水以致水蓄而不行故浮腫也　又或傷食滯積脾不能消以致濕熱內蓄而腫者俱以厚朴湯治之　蒼朮　厚朴　陳

皮　大伏皮　茯苓皮　赤苓　木香　水腫者其陰囊亦腫加　澤瀉　滑石　車前　水通　葶藶子治之　積滯脹者加　山查　神曲　三稜　莪朮　又萊菔子通治一切浮腫　萊菔子（炒五）錢　胡椒　厚朴（五錢）　白朮（二兩）　共爲末作丸以陳皮煎湯送下

又虛弱而氣不行者用肉桂磨酒服外用燒酒擦之即愈

### 餘毒症癧

凡痘發稠痂溏者必有餘毒收結之餘其毒多發于手足腕中擠骨之處紅腫潮熱爲疽爲癤但發于手足四肢者生若發於心胸腹上及顋門耳下者而餘症既現癤疽則不內攻者生理矣然此等之毒由于骨髓必綿延難愈若或失治則毒解腐骨致風癱拘攣以貽終身之疾是豈尋常疽癤而已哉方其始發必然潮熱宜速用連翹飲或仙方活命飲或十三味敗毒散以退其熱而解其毒

### 連翹飲

連翹　牛子　防風　荊芥　炒芩　炒梔　虫退　赤芍　當歸　柴胡　木通　車前　滑石　甘草　弱者加人參生芪

### 仙方活命湯

白芷　防風　乳香　沒藥　連翹　川甲　赤芍　當歸梢　貝母　花粉　金銀花　皂角刺　陳皮（癰形既現須用此）

右方排膿解毒止痛消癰無膿者可使成膿有膿者能令速膿消腫十三味散不過顛倒而異其名也

紅腫者用活血解毒湯防風荊芥生地赤芍當歸連翹牛子黃連紫草川芎木通甘草白芷　弱者加參芪

腫者用消毒湯防風荊芥牛子首烏甘草　痛加乳香沒藥白芷　腫毒在上用升麻毒在于下用牛夕引在手用桂枝引

凡痘後之人元氣必弱雖解餘毒亦當顧其元氣以上諸方但宜加參芪蓋痘發餘毒不致內攻未必殺人性命若欲求速效妄用消解之劑恐元氣一耗禍起蕭牆是不死之症而反立致其死也不堪悲乎余見世之庸醫遇痘後潮熱餘毒發

熱恆據蔡公之書輒投大連翹飲以致變生莫測令人不可救者不可屈指而數也故余治餘毒必先調元以顧其本而兼解毒以治其標標本兼治十無一危且須內外交攻毒始易去看其腫硬之最起者是潰膿之所也宜用瓷鋒刺去惡血然後用藥從四圍敷之留口莫敷令出毒氣將四圍之毒趕聚一團再用膏藥貼之拔盡膿汁而自愈矣若已成膿亦以針刺之令膿潰而痛立除亦以膏藥收功

敷藥方列後

一方三豆散　綠豆　赤小豆　黑豆　共爲末調醋敷之

一方用豆心渣敷之

一方鐵箍散。取樹上白屁虫。即新羌梧煅成灰爲末調油塗之任諸癰毒俱可內消　其虫腹下盡皆生足其背亮殼跳下地來即自尾攻合其形如環其大如指長二寸許。

一方失笑膏　共枝花或葉或皮或根俱可惟花更佳黃荊子各等分共搗爛用鷄蛋白調敷留頂真數塗敷二三次即消如烟起立時止痛其效如神。

一方必勝膏　馬齒莧（搗汁）　豬膏脂　石蜜　共熬膏敷之即消。

一方用紫花地丁搗酒與服搗爛外敷任無名腫毒無有不退。

一方用黃豆　薑　葱　共搗敷之亦消

一方如意散　生南星（八錢）　生半夏（一兩）　鬱金（五錢）　生大黃（一兩）　薑黃（五錢）　白芷（五錢）　蒼朮（五錢）　共爲末用醋調敷

一方沖和膏　紫荊皮（炒五兩）　獨活（炒三兩）　赤芍（炒二兩）　白芷（二兩）　石菖蒲（一兩五錢）　共爲末酒調敷。　內服六君子湯加芥子。

凡餘毒不甚起頂且不紅者多是元氣不能升毒必用內托散與服然後其腫乃聚其頂乃起頂起膿聚方可成膿而愈也

一毒瘡已潰不能收口者須用生肌散　黃連　黃柏　地骨皮　梧子　枯礬　甘草　共爲末以摻之

一膏藥方　防風　商陸　連翹　生栢　生芩　花粉　苦參　赤芍　羌活　獨活　川烏　床子　麻黃　首烏

皂刺　南星（生）　半夏（生）　白及　川甲　草烏　木鱉　紫草　紅花　蛇退（大者各一兩）　用桐油三斤將諸藥入油內先浸一宿然後熬煎見藥枯浮乃用棕作去其查再將　乳香　沒藥（去油）　石脂　銀硃（各三錢）　血竭　兒茶　輕粉（各三錢）　龍骨（炒）　水粉（各一兩）　黃丹（十二兩）　共爲細末看油滴水成珠漸漸入此藥末攪勻。

痘疔潰爛成坑或痘潰不能收結者宜服人參敗毒散加川山甲　血退　蘆薈　連翹與服　外用云母石煅一錢上盰二錢　輕粉一錢　陀僧二錢　黃丹（炒八分）　血竭（五錢）　黃栢（生一錢）　乳香　沒藥（五分）　杭粉一錢　血竭（一錢）　冰片一分　共爲末敷

之其口自合

兒痂落發熱手足腫脹者用大連翹飲與服外用二豆散敷之忽然變症狀同急驚延余往視余觀其左耳以及左頰俱紫黑其紅腫亦在左邊手足啼叫不寧但唇舌俱白余謂此兒元氣已斷不能勝其餘毒又復內外俱受清涼之藥餘毒將入臟腑毒盛生風而肝症居多肝以藏血肝經血少毒將乘之故左頰青紫肝動生風故狀同急驚也宜大補血氣兼驅風散毒爲主遂用人參　黃芪　當歸　白芍　鹿茸　天麻　白附　薑虫　牛子　防風　白芷　炙草一服而耳頰青紫之色已退乃去　天麻　白附　薑虫　續用

之劑而非解毒之藥乃漸漸潰腫起頭出膿而愈可見清涼解毒之藥痘後元虧莫輕試也

一兒痘後兩手腕間腫脹不能轉曲已經八月有餘延余往視余見其氣血已衰以瓷鋒刺之並無血出亦不知痛余謂宜活血解毒遂用黃芪　當歸　川芎　白芍　防風　白芷　肉桂　元枝　連翹　牛子　金銀花　皂刺　桂枝　碎補　勾藤　炙草　煎酒與服　外用生南星磨醋與敷過數日犯處生痒刺之有血矣後將前方為末一斤每日三服調酒與服其腫漸消而愈

## 鼻淵

痘後鼻中時時流涕臭不堪聞者名鼻淵也此熱毒乘于肺經而熱蒸肺竅而然也宜用　絲瓜近蒂五寸　加黃芩　枝仁　牛子　甘草　今煎服　外用絲瓜藤燒灰為末吹入鼻竅　多卽以絲瓜灰調酒服不過數日鼻氣自息而涕亦止

## 眼目

目爲五臟精華之聚最是輕清不容塵染毒氣稍侵多致瞽眼可不慎乎故痘發之時恐痘入眼先以油胭脂塗其眼眶或以牛蒡為末蜜調敷其四傍　或以白芥子為末水調敷其足心引熱下行俱防痘毒入眼之良方也然或將清痂盡餘毒上攻于目是故有紅腫而不能開者宜用

洗肝散　川芎　歸尾　羌活　防風　薄荷　枝子　赤芍　紅花　菊花　胆草　甘草　飯後服　眼痛加蔓荊子　木石羔　谷精草　菉豆　有翳膜加　虫退　白蒺藜　木賊　石决明　蒙花　大便熱結者加大黃　黃連　牛子　小便短赤者加車前　木通　滑石引火下瀉而上焦之火乃清　紅赤者血熱上犯于目也加生地　丹皮以涼其血　有翳膜者用撥雲散　防風　羌活　黃芩　黃連　白芷　甘菊　荊芥　龍胆草　石决明　草决明　石羔　七厘　又方除翳膜用蒙花散　蒙花　石决明　七厘　木賊　羌活為末清茶調服

羌菊散　治眼今羞明

羌活　菊花　胆草　谷精　京芥　薄荷　蔓京　枝子　連翹　赤芍　生地　黃芩　黃連　有翳加七厘　决明

胆草散　治羞明障翳

胆草　甘菊　七厘　白芷　防風　黃連　虫退　木賊　枝子

兎糞散　治痘毒入眼生翳

兎糞炒黃色為末　又用虫退　木通　甘草　煎水調服

兎糞丸　治痘毒入目生障翳

兎糞（炒四兩）　石决明（七孔者火煆）　草决明（各一兩）　白芍　一兩　當歸　防風

谷精　蒺藜（各五錢）　薄荷（四錢）　共爲丸如菉豆大每服數丸用荊芥煎湯送下

涼肝明目散治痘後羞明

當歸　膽草（酒洗）　蒙花　柴胡　川芎　防風　川連　和豬肝全煎服

望月散治痘後兩目難開

望月砂（即兎屎）一兩　蒙花　蟬退（去足）　谷精（各五錢）　共爲末用豬肝切開每肝一兩入末一錢包于肝內煮熟連肝及汁俱服

眼有白翳或赤者用藥點入諸方列後

一方用青核桃磨清水點入可除白翳

一方用小魚子將魚頭在翳上擦洗亦能洗去其膜

一方用黃蟮血磨牙箸點入亦可去翳

一方用桑樹內細嫩皮井水浸爛爲丸磨清水點入立效

一方用胭脂或胭脂米點入或紅或朦皆可以除此解毒涼血乃良方也

一方用水牛身上所生蝨子以其血滴入即效

一方用　輕粉　黃丹　雄黃　射香　共爲末左眼有翳吹入右耳右眼有翳吹入左耳其翳自除

一方用木鱉一个爲末取雞子開一小孔入末在內蒸熟與服亦能除其翳膜

一方取白雞拔其翅毛以肉中拔出之莖潤滑而軟向眼中翳上揩抹其翳可去

以上諸方俱各有效故悉錄之以備參用

天地陰陽之精則畢聚于日月人生五臟之英而悉萃于雙眸故瞳仁屬腎烏珠屬肝眼白屬肺眼角屬心上下眼胞則屬脾胃凡目無障翳而瞳子昏沉珠無精彩此其腎源將竭英華已衰宜以兎絲枸杞覆盆元支滋腎以養其元而清涼忌而不用其如上下胞腫則脾胃已敗其人必多泄瀉宜以白朮茯苓淮山丁蔻要在健脾爲主至若紅腫必是血熱羞明必是火炎血熱火炎之症須清上焦之熱而腫頭頂之風且涼諸經之血其

症乃可消除然火勢上炎必須下瀉故大黃梔子是抽薪之妙用車前木通爲止沸之良方要知目爲肝竅凡目疾之作總不外乎平肝而痘後之症斷是毒犯精華紅腫頭疼乃熱毒之攻擊急宜涼血清肝雖不紅腫而羞明亦是英華留蓄餘熱若無紅腫羞明之弊眼內忽生白翳則用前方點入翳膜亦可消除須戒服熱物恐助熱毒爲殃若或見風太早風侵淚下汪洋上下四弦紅赤眼目自覺生痒此是風痒之症年年復發爲殃余故屢臨此症因而制就其方

祛風明目散治痘後風眼凡弦紅作痒下淚者百無不效

防風　荊芥　川芎　薄荷　生地　紅花　連翹　白芍

菊花　蒙花　谷精　蟬蛻　蔓荊　川椒　生地[illegible]

服數劑可以除根

### 痘後逆症

一痂落而瘢雪白者。氣血盡虧也。急用十全大補湯以補其氣血。養其脾胃。不然必飲食漸減。肌膚消瘦而死

一痘後發搐連綿不已者。心氣已終。絕神無所依也。不治。

一面色青白。神氣昏暗。目無神光。瞳子不明。必腹疼痛者不治

一眼睛吊白。失錯亡魂。不省人事者。不治。

一寒戰咬牙。手搖足擲。禁口不開者。不治。

一目閉腹脹。足冷過膝者死

一牙齦腐黑臭不可聞者。其胃已爛也。不治。

一遍身腫脹者。毒歸入于脾。不能制水也。不治。

一抓破疹肌。遍身肉爛者。不治。

一口鼻出蛔。滾滾而上者。胃絕也。不治。

一遍身大熱。忽一日之內。其痂盡落。即發驚搐者。毒歸入攻心也不治。

一潮熱不退。肌膚盡落。其瘦如柴者。不治。

痘疹新書卷之九終

---

# 痘疹新書卷之十

寧邑張　琰　遜玉氏編輯
受業曾衡　波　全叅

## 女子出痘。

痘瘡以氣為主。以血為附。氣血充足。乃可灌汁成膿。女子若至十四天癸已動。倘遇出痘而經水忽行。則陰血已虧。將何以運毒而成漿乎。然發熱之初。經期適至。則毒隨血解。可以無虞。若至三日之後。而血猶不止者。則熱入血室。血至妄行。此乃動脈虛之症。治之不容緩也。否則血虛不能送毒。狂亂忽生。須臾而告變矣。故經行二日。急以四灰散調酒與服止之。若至五日血猶不止。急以涼血地黃湯治之

### 灰散

舊棕　老杉樹皮　胎髮　臍帶　俱燒灰存性。調酒服。

### 涼血地黃湯

當歸　川芎　白芍　生地　白朮　升麻　川連　甘草

人參　枝子　玄參　阿膠

右方加棗二枚。水煎服。以痘出血止為度。

一女子非經行之期。於發熱時而經水忽至者。乃火毒內熾。逼血妄行也。其毒必盛。其血必多。急用涼血解毒湯。倍加連翹牛蒡。或用柳花散治之。若因循隱忍。則血愈虛而毒愈熾

旋踵而伏陷內攻雖有良醫亦難治其後矣

涼血解毒湯

當歸二錢五分　白芷七分　升麻五分　紅花二錢　紫草一錢七分　芍一錢二分

桔梗八分　連翹　牛子各二錢　燈心五節

柳花散

柳花七錢　紫草一兩　升麻七錢　當歸八錢　赤芍六錢　共爲末

每服七錢當歸煎湯下

女子發痘又值行經經水方止身發壯熱狂言譫語如見鬼神尋衣摸床顚狂百出目上直視煩渴不寧此陰虛似實切不可以實熱治之蓋行經之後血室空虛心以生血血虛則

心神不寧肝以藏血亦且藏魂血盡肝虛而神魂自不能安此狂譫之所由來也痘未出宜以逍遙散加丹皮主之痘已出宜以加味歸脾湯主之　又有邪熱乘虛而入血室以發于狂譫者古人以瀉肝散治之愚謂仍以加味逍遙散加防風斯可矣

一女子正值崩漏適逢出痘則氣血俱虛必不能送毒出外急宜大補血氣否則痘不能出雖出亦易倒陷矣遇此之症速以十全大補湯或參歸鹿茸湯二之

一女子一向閉經血海已滿適逢出痘毒氣鬱於衝脈之間一時並發其勢必甚其症最危切莫用攻擊之藥使血妄行毒

養心補血調理脾胃爲主仍用歸脾湯加減或用逍遙散主之

瀉托散

羌活六分　當歸一錢　枝子　膽草酒洗各六分　川芎　防風各八分

炒芩六分　柴胡　木通各六分　淡竹葉引

歸脾湯

人參　黃芪　白朮　茯神各一錢二分　甘草三分　木香五分　遠志一錢

余地　棗仁各二錢　加柴胡　山枝名加味歸脾湯

逍遙散

白朮　茯苓　當歸　白芍　生地　甘草　柴胡

加枝仁丹皮名加味逍遙散

十全大補湯

人參　黃芪　白朮　茯苓　地黃　官桂　川芎　當歸

白芍　甘草

女子起脹灌漿

一女人出痘當起脹灌膿之時忽然行經恐血虧衷虛痘易倒陷急宜大補血氣用十全大補湯或參歸鹿茸湯主之

參歸鹿茸湯

鹿茸二錢　人參一錢二分　炙芪一錢五分　歸身二錢　炙草七分　薑一片　龍眼三個　入好酒一盃合煎

女子痘瘡起發之時其經忽來而不能言語者此乃血熱[illegible]甚而少陰之脈不能上榮于舌也宜以當歸養心湯主之[illegible]其能言復用十全大補湯主之

當歸養心湯

人參　麥冬　生地　炙草　加燈心引

一女子痘當灌漿之際經水大來血虛不能化毒以致其[illegible]起不起應灌不灌頂陷灰白皆由血去過多陰氣耗散故[illegible]急用調元內托散主之外用胡荽酒噴之使痘起發[illegible]空處又出一層則為吉也若服此不效寒戰咬牙喘渴[illegible]反增他症則內氣已脫必不治矣

調元內托散

人參　黃芪　肉桂　木香　當歸　川芎　白芍　附片

孕婦出痘

夫妊婦出痘痘家最忌蓋痘毒出於五臟痘毒發越則風火相搏必致動胎胎動則氣血耗散勢必不能送毒行漿況痘家用藥多主温補如黃芪肉桂之類皆為妊婦所忌而黃芩白朮諸品又非痘家所宜此妊婦出痘所以最難調治也遇此痘總以清熱安胎為主故初熱血動者以四物湯加芩連主之或用安胎散主之必使胎元莫動而後可無虞也

四物湯

當歸　川芎　熟地　白芍

安胎散

當歸　川芎　白芍　人參　白朮　茯苓　柴胡　甘草

條芩　防風　荊芥　白芷　乾葛　砂仁　紫蘇　阿膠

桔梗

一妊婦出痘身熱腹脹手足冷者用八物湯加木香主之

人參　黃芪　白朮　當歸　川芎　白芍　熟地　甘草

一妊婦出痘而胎將動者急用安胎散主之恐胎落則痘陷也

川芎　當歸　白芍　人參　白朮　茯苓　黃芩　甘草

砂仁　陳皮　阿膠　香附　艾葉　各等分

胎落而痘稠密者用　人參　黃芪　川芎　當歸　防風

白芷　白芍　桔梗　厚朴　木香　肉桂　紫草　牛子

一產後寒戰咬牙者裏虛甚也宜大補湯加桂附

一產後小腹急痛者瘀血未盡也宜用黑神散以通行之

黑神散

當歸　川芎　熟地　炮薑　桂心　蒲黃（炒）　木香　陳皮

黑豆（炒）　香附（炒）　水酒各半煎服

生產之後然後出痘者總宜大補血氣為主須照常一體用藥不必妄為多疑而反致損傷也

訣曰　妊婦出痘治應難　[illegible]　清熱安胎為

發法　胎元若動病終難

又曰　產後天行出痘瘡　此時平順不須惶　只將大補加

功效一護伺諸書更穩方

總ノ　妊婦出痘要以安胎為主若胎已落法以補血為先但收

歷時胎落者多無事發熱初出時胎落者猶或可救若當起

脹灌膿時胎落者多致不救治者須宜知之

種痘新書卷之十終

---

# 種痘新書卷之十一

寧邑張　琰遜玉氏編輯

受業曾衡澂仝參

## 麻原賦

麻雖胎毒都因疫時而發暄熱非令大與逆時傳染而行遍乎州里其罪於也與痘相反其變症也比痘非輕思夫視為泛常（論其原）頃刻殃人性命此其所以然者蓋毒起於脾熱流於肺心始終之惟皆無症故非髓內之殃而臟腑之傷肺則尤甚閉門閉途不若路中各徑揚湯止沸不如去火抽薪發試言其始末而與訣不詳遲初熱亦似傷寒自出淚而不止鼻流涕而不撒嗽

太甚煩燥難言以火照之隱隱在皮膚之下以手摸之磊磊於肌肉之間其形如芥其色如丹隨出隨沒乍隱乍現根窠若腫兮痲而兼癮皮膚如赤兮痲而火旋似錦而明兮十有九活如煤而黑兮百無一生症雖變異（論治法）治法不同微汗常出毒勢越而不留清便自調邪氣行而無壅腠理非開兮邪毒鬱而不泄（論治法）節當發表為貴腸胃秘結兮慮氣滯而不通急以疏利為先苟不慮終而慎始正恐變言以為凶其衄不必憂邪從衄解利不必止毒以利鬆所喜者身上清涼所畏者喉中腫痛飲水不休法在生津養血飲食若減方須救胃和中且出之太遲發為風疹所求法在急於發表出之太甚藏腑積熱恒多治之者宜解毒

疰醫只因時毋干天和宜視歲氣若乘風寒暑熱燥氣而不行火月炎炎邪氣乘而作瘧或施溫補勿助其邪若用清涼伏傷其胃制其過但取其平驅其邪勿傷其正或寒或熱（藥性）藥性之陰陽自異爲虛爲實人生之強弱不齊欲與溫涼必觀虛實人品因宜詳觀藥味亦當深究防風荊芥散腠理之留邪升麻葛根開肌衛之蘊熱疹子未現之初乃先行之要藥人參益氣地黃涼血氣虛血熱非此難安黃連入心而瀉火黃芩入肺以清金熱留心肺非此莫除玄參石膏治邪火之浮游梔子連翹開陽毒之鬱結此疹家之要藥脈毒方中必用瓜蔞潤肺止渴須麥門冬知母降火生津必同黃柏當煩渴狂所必加枳殼往乎腹

痛白朮止瀉脾泄小便澀兮木通咽喉痛兮甘桔心煩躁兮微以辰砂大便秘兮利以大黃牙齒生疳文蛤配乎瀏白咳嗽咽痛射干助以牛蒡五味杏仁治喘氣之喘嗄薄荷竹葉解膚熱之炸炸火燒人尿炙炒麻黃發痘毒之出現令邪氣之舒張只亮山查消脾積而化毒地骨解肺熱以回瘡痂疹既出調理甚難（調理）坐臥宜煖飲食宜淡風寒若受兮爲肺爲熱鹹酸不禁兮爲嗽爲喘穢若觸兮發癢嚴重搏兮消沒調理失宜輕而變重飲食不節安者反危以致變症多端餘熱兒潮瘦便多膿血兮腸胃火熱咳多痰涎兮肺蘊傷寒口爛唇瘡心脾之火未退毛焦髮稿榮衛之液將枯治此變症各有奇方身熱不降柴胡

---

乾葛四物曰猛若甚柑桔對平三黃消腫定喘兮葶藶有效化痰止咳兮順氣爲良氣血已虛八物增損而可用水穀不納一陳與酌以相當刺血兮香連丸去蔻而加地榆芩柏咳血兮五淘湯去麻而加茅根地黃此疹家之治法總痘科而再詳

麻疹西江月共十三首

胎毒現爲麻疹蓋因毒火熏蒸遍身點似硃砂形乃是心脾二症切忌瘡症後嚴亦似朱紋大都治法首清涼不可辛甘熱

疹子何因咳嗽只因肺與心連肺被毒火苦熬煎致生咳急氣喘治宜清金降火不可悞用辛熱若加梔子麥冬蘊只要氣

順火善

初熱狀似傷寒其症如何分辨症多咳嗽有紅斑暗淡眼中水現或見腹中疼痛或時吐瀉相兼疹家吐瀉不須驚毒因隨泄而解

疹與痘家異治二家不可同方痘宜溫補疹宜涼只要現形爲上風寒閉而不出其間凶險難當急宜發散保平康最怕神昏腹脹

凡遇疹子出現詳看時令如何假如日煖及風和散毒預防方可若是時行疫熱芩連消毒宜多用心調理救沉痾其效難天井坐

且說荊防敗毒此為發散仙方防風荊芥地黃湯炒製芩連要條桔梗玄參甘草連翹升麻牛蒡人參炒梔酒為良竹葉水煎停當。

又有芩連消毒散火散毒尤佳芩連枝子及升麻桔梗玄參多把石羔以及知母連翹牛子紅花引用淡竹要多加此個方兒無價

若是發散不出令人最倍憂疑麻黃酒蜜炒加味芩連梔栢當施更加大黃酒製連翹牛蒡相宜石羔與紫草紅花不效命難塵世

如見出時紫黑此症今古多凶急求人糞路歸東火煅存性取

用細研酒調吞下須臾黑色轉紅若還依舊黑暗痲管取黃粱一夢

疹子現形發熱化痲湯是真傳石羔甘草玄參桔梗連翹有膽若見毒多熱甚連翹消毒為先大便秘結大黃添務使微痢數遍。

疹子頻多咽痛火邪薰灼無他連翹甘桔要多加射干牛蒡前服外用十宣妙散吹喉休要吁嗟假如見效莫爭差消毒芩連無價

赤痢下時鮮血黃芩栢葉槐花只殼荊芥穗同加痢止血除方罷白痢茱萸滑石樗根只殼升麻烏梅取肉作丸作散亦[illegible]香

連可下

四疾更防死症臨時休得殘差毒多體熱疾如麻咳嗽而毒攀啞走馬牙疳痢疾噤口吁嗟此班即是死兆象不可駁牛問馬

## 痲症發論

夫痲症皆胎元之毒痘乃父精母血陰陽交媾慾火所蘊藏於命門是為陰毒（辨毒之原）痲乃受胎之後在母腹中飲食積垢色慾疑污蘊於六腑是為陽毒蓋毒藏陰分貴陽氣之壯旺而毒乃得上升而外化故治痘之方必用參芪尤桂以陽藥而化陰伏之邪（論治法有陰陽則化之妙）毒在陽分貴陰血之流動而疹乃不焦黑而內攻故治痲之法

多用四物地黃以滋陰而降燥烈之火此痲痘之藥所以異施況陰主閉藏故痘毒深而難解陽主發散故痲毒淺而易解且臟陰多虛寒故治痘之法雖解毒亦要溫中腑陽多實熱故治痲之道宜發表而倘清涼切痘毒必須外化化盡方可無虞是以遷延時日治始貴慮其終痲毒但要發出出盡則無後患是以時日無多治此只須解表然痲毒雖藏於腑而陽毒之激烈一發即蒸於肺肺主皮毛寔受其毒故發熱之初鼻流清涕咳嗽噴嚏音啞咽疼而肺經見症獨多而其所以異於傷寒者（論症之異於傷寒）祇有眼胞腫目內汪洋而腮憁赤是以知為痲症耳其初發也最忌風寒尤嫌穢觸宜置之潔淨之所處于溫暖之室[illegible]（論理法）

之物恐助其焰火萬勿與嘗生冷之菓慮冰毒氣切莫與食鷄魚宜有香薰而使穢不能觸用藥必須發散以開肌表之膚腠理開張而毒不內鬱發者時按而毒得外升此初熱之調理（論症極正）再觀症而發形若潮熱往來二便不秘飲食如常精神清爽身潤澤而有汗唇不紫而自榮舌無黃白之苔目無腥臭之氣此其內毒最輕知其症之必順不須用藥貫心勤自可安然平定若鼻衄吐血諸君不必驚慌毒從衄解有何妨此症從不危凶嘔吐毒攻胃管泄瀉莫作虛看腹痛多為內熱煩躁心熱火旺初以發散為貴再以清解為良發熱三日以後麻疹已現皮膚以燈照之如霞如錦以手摸之如粟如麻一日而出三遍三日

而出九回至于五六日間麻毒盡出其熱漸退熱退人安其症方平當其現形之際不畏瘡之稠密惟喜色之紅活故色之明潤雖一片成璽者亦知其堪救若瘡來紫黑雖稀疏亦爲害亦謂其難醫是以紅色者輕紫色者險青黑色者則爲不治之症炎蒸血以載毒血活則毒必清毒壅則血必熱紫而轉黑則毒凝而血已死矣其又安能活乎治此之法如黯來紫必以清毒爲主九以涼血爲先凡芩連枝栢蘆芍石羔玄參知母甘梢荊防一切清肺解毒之藥此時不容緩進至于紅花歸尾紫草地黃丹皮赤芍荊芥川芎一切滋陰活血之品當此急進其有雖人有強弱不可因體弱而妄進補劑以致助毒爲虐在此之見不過於解毒劑中用人參而畧扶元氣麻雖熱症亦不盡因症熱而過用寒涼以致耗其元氣當於清毒解之餘則宜調其脾胃而思固其本原若熱盛而藥微則杯水固難救車薪倘毒輕而藥重是驅命自傷其門壁均非所云善治也總之未出之先宜發散爲主發毒盡出自不內攻雖紅腫之甚然若疹瘡亦不足慮既出之日稍以解毒爲良毒清血活自能化於皮膚方免飲毒之禍調理得宜十有十全苟失其宜殺人亦如反掌治麻之與痘又安可不慎乎

## 概論治法

麻即疹也疹形如麻痘形如豆因象命名故呼麻症夫麻與痘皆

胎毒但痘出五臟屬陰而主血故痘有形而有汁其症有寒亦有熱麻出六腑屬陽而主氣故麻有形而無漿其症多實熱而無寒爲症既異則治法亦殊蓋痘宜內寔可用溫補麻忌內實只宜解散惟初熱之時畧相似耳若既出之後則痘宜補氣以生血麻要滋陰以制陽蓋陽毒燥熱在陰血受其殃熬勢必至于虛耗故必以滋陰降火爲主斷不可用燥焊之劑扶陽以助火邪也是以治麻之法宜清不宜補也

## 麻症與傷寒辨

發熱之初寒熱往來咳嗽噴嚏鼻塞聲重目流清涕其症與傷寒無異但麻症則眼胞腫目淚汪汪面浮腮赤惡心乾嘔此

爲異耳若見此症必是發疹須宜謹風寒節飲食避厭穢成毒洒忌辛熱用藥表散使肌膚通暢腠理開張或身有微汗則邪從汗解而毒則易出耳熱至三日麻當出矣一日出三遍三日出九遍至六日時當出盡矣及出至足頭面將收收曆之處其熱即退疹子漸次收下熱亦漸次而退至八九日麻始收齊而熱乃退盡也若發不出者固危出不盡者亦險出而旋收者更險治之其可緩乎

### 論麻症輕重

或熱或退而無他症者輕　頭面不出者輕

出透三日而後漸收者輕　紅活潤澤頭面均淨而多者輕

紅紫燥暗干焦不潤者重　移熱大腸變痢者重

黑暗乾枯一出即沒者死　鼻青糞黑者死

鼻扇口張目無神光者死　胸高氣喘心前扇動者死

又眼白赤色聲啞唇腫心煩目渴腰腹疼痛口鼻出血人事不清大小便秘狂亂不寧舌苔黃黑口氣腥臭此名閉症毒滯于中而不得出將作內攻最危候也急以清毒解表湯主之若疹能出可救發不能出則死

升麻　防風　荊芥　麻黃　連翹　牛子　桔梗　石膏
知母　黃芩　黃連　虫退　麥冬　甘草　加無價散

麻症鼻衄血者毒重口出血者毒尤重切起于是心火大熱

---

者毒亦重也初失于清解則熱蘊于胃口鼻腥臭必生牙疳毒入大腸則成痢痢發表太過元氣損傷則成疳積若或失治于前其必貽患于後雖明初發之重輕宜預後來之生死誰謂麻也祇醉于前而可不思其後乎

又有一種爲感風熱而出麻者俗謂飄麻此皮膚小恙不致傷人祇散風清熱而即愈矣

有小兒初生彌月之內而出麻者俗謂胎麻可不藥而愈

### ○麻家四忌

忌葷腥生冷風寒　六穀氣道內氣滯凡是葷腥俱能滯毒所以忌也葷生則難化物冷則能冰伏冰伏不化毒乃滯

留又當忌也若風寒閉塞毛竅不開則毒氣何由出乎此數端者是以俱莫犯也

一忌驟用寒涼　麻雖熱症固不宜用辛熱之劑然初熱之際虛實之症未形輕重之勢未見遂驟以苦寒之藥而峻攻之幾何不冰伏其毒而不得出甚反至于內攻乎故善治者惟達毒而不鬱毒祇解毒而不冰毒也

一忌誤用辛熱　麻本熱症若復投辛熱之藥是猶火上復加薪也斯以火助火其毒不愈橫乎然麻症初起之時亦有四肢厥冷者此熱極似寒之故切不可誤認虛寒而妄投以熱藥也即遇天時太寒亦宜謹煖室切不可[illegible]遂投以

辛熱之物以濟腹中之火也

一忌誤用補澁。毒火之發。最要疏通。尤嫌補澁。蓋疏通則毒得外洩而解。補澁則毒滯內留爲殃。但初發之時。症多吐瀉。愚夫愚婦急欲止之。若誤用參朮砂仁補澁之藥。則關門閉盜。毒滯于中。必作內攻之禍矣。

○孫氏治麻方（前後諸症並治）

石羔（煆二兩）　川貝（四錢）　紅花（三錢）　荊芥　骨皮　桔梗（各八錢）　乾葛一錢

歸尾（一錢）　甘草（四錢）　桑白皮（一錢）　赤芍　牛子　連翹　陳皮（各六錢）

只殼（六錢）　共爲末每服三錢白湯下

此方能發表透肌清毒活血理肺消痰消胃解結。不拘四時。

皆可以服誠治麻之良方也

○麻症初熱三日調治法

大痘爲陰毒其勢更緩或死或生俱判之于成漿之日。麻爲陽毒其熱甚烈若存若沒早定之于方出之時。故發熱三日麻當現於皮膚。若腠理緊秘。風寒嚴束。氣滯于中。毒凝于內。不能出現。則毒作內攻。須臾告變。故痘則慮難成漿。麻則惧其不出。此。麻前痘後最爲緊要。古今之通議也。當發熱三日之間急宜觀形察色審聲辨症。以爲調治之方。如發熱惡寒。川慄惡寒是、風寒所束宜用

加味升麻湯

升麻　乾葛　防風　荊芥　牛蒡　連翹　桔梗　木通

赤芍　甘草　柴胡　黃芩　陳皮　蟬退　玄參

右加葱白水煎熱服令取微汗。一二服間其麻即出

加大熱薰蒸。肌膚乾燥。目赤、唇紫、毛髮焦、豎。煩渴不寧。驚狂顛譫二便秘結而出不快者乃熱毒壅盛故也宜用

枝仁解毒湯

枝子　黃芩　黃連　石羔　知母　牛子　連翹　升麻

柴胡　防風　赤芍　甘草

大便秘加酒大黃　煩燥加麥冬　嗽甚加杏仁桔梗、

驚譫用鎮驚丸散（方見丸散條）　無汗腠理秘加大黃。　再用紫

水令熱氣薰之　或用酒遍身擦之然後以被蓋片時其

即出。治風寒閉者亦如是。若爲穢氣所觸。而出不快則用沉香檀香荊芥燒烟薰之

又有毒氣未盛元氣又虧而出不快者則用

人參白虎湯

人參一錢　石羔（四錢）　知母一錢（五分）　加升麻　防風　牛子　炒芩

治麻須明時令。蓋春夏秋冬之不同。陰陽寒暑之各異。時令既殊、治法亦異。

時令溫煖而出不快者、以辛涼之藥發之、宜用

防風解毒湯

防風　荊芥　薄荷　石羔　知母　桔梗　牛子　連翹

木通　只壳　升麻　甘草　加灯心水煎服

如時令腑熱而出不快者以辛寒之藥發之宜用

黃連解毒湯

防風　黃芩　黃連　荊芥　知母　石羔　黃柏　梔子

大青　玄參　桔梗　木通　甘草

如嚴冬大凍冷氣逼人則以辛熱之藥發之宜用

桂枝解毒湯

桂枝　麻黃（酒炒）　赤芍　防風　荊芥　羌活　桔梗

甘草　人參　川芎　牛子　生薑引乘熱服

如時寒時煖而出不快者則以辛平之藥發之宜用

升麻解毒湯

升麻　乾葛　甘草　柴胡　前胡　赤芍　牛子　桔梗

防風　羌活　連翹　甘草　人參　淡竹葉引

又不論四時寒暑而出不快初熱並用

宣毒發表湯

升麻　乾葛（各八分）　防風　桔梗（各五分）　荊芥　薄荷（各三分）　牛子

連翹　前胡　只壳　木通　赤芍（各六分）　甘草（三分）　火盛加

炒芩　大寒加麻黃（蜜炒）　暑用竹葉引　寒用生薑引

痲症最怕一時不得出所以必先明裁看時寒熱稍人强弱調理發散如前用藥發散痲即隨現而透出者其毒盡解而無害也若發不出宜用再加味麻黃湯發散之外用芫荽酒糟蒸熱擦之自頭上至足為齊若出現而頭面愈多者為佳若遲延日久而不能出腹脹氣喘昏迷不醒悶亂窒塞者則必死矣

加味麻黃湯

升麻　麻黃（酒洗炒）　人中黃　牛子　蟬退（去足翅）　等分生薑引

一發熱之時遍身自汗者此毒從汗散腠理開張其痲易出也又有鼻中出血者亦內症不閉毒從衄解也二者俱不可遽止但汗出太多則恐津液耗散表虛過甚致生他症宜用當

歸六黃湯加麥芩以止之　血出不止又恐陰血耗甚不能生津降火宜用茅花湯以止之若汗多衄甚置而不治則元氣斷而精神散則正氣弱而邪必橫將毒內攻倒戈反掌致成莫救良可嘆也

當歸六黃湯（治自汗盗汗）

當歸　黃芪　黃芩　黃柏　生地　熟地　加麥芩

敗棕扇燒灰調服

茅花湯（治衄血）

茅花　歸尾　丹皮　生地　甘草　加玄參百草霜同煎

犀角地黃湯（治失血）

犀角　芍藥　生地　丹皮　外用髮灰吹入鼻中其血即止

一初熱煩渴太甚者用人參白虎湯（方見前）壯旺寔熱者去人參。大熱不退而渴甚者加竹葉麥冬。

發熱之初或疹出之後一切咽喉腫痛不能飲食者乃毒火薰蒸上冲咽喉故也宜用甘桔湯主之更以十宣散或玉鎖匙吹之自愈切不可妄用瓷鋒刺其硬處令出血也刺破則必爛矣

甘桔湯（治喉痛）

桔梗　甘草　牛子　連翹　玄參　黄芩　山豆根

水煎頻噙

十宣散（吹喉口）

黄芩（炒）　炒柏（各二錢）　苦參（二錢）　硼砂（煅）　玄明粉（各七分）　乳香（三分）　兒茶（一錢）　雄黄（一錢）　氷片（一分）　共爲細末吹入喉口中（口疳亦可用之）

玉鎖匙（吹喉口）

硼砂　朴硝　殭蚕　氷片　共爲細末吹入

二聖散（治喉口）

苦參（三錢）　殭蚕（一錢）　共爲末吹入

發熱之時或吐或瀉皆毒氣内逼而欲奔越故吐瀉也吐者毒逆上行攻于胃管因吐而毒乃解瀉者毒趨下降注于大腸因瀉而毒乃洩故大吐大瀉俱能泄毒此爲順症不必施治倘疹出而吐瀉自止所可慮者欲吐不吐時時張口而作乾嘔此毒鬱于胃而不能出誠險症也宜用玄參解毒湯與灯心竹葉湯主之

玄參解毒湯

玄參　黄芩　炒梔　桔梗　甘草　生地　乾葛　荊芥

灯心竹葉湯（治乾嘔）

淡竹葉（三十片）　灯心（三十根）　合前方煎服　或加木通　車前滑石引熱下溜膀胱則不上逆于胃而嘔自止矣

又如泄瀉雖云順症然瀉若太甚又恐傷脾須用加味四苓散

主之　最可慮者欲泄不泄裏急後重時時欲去圊而不下此實熱滯于大腸將成痢疾之禍宜用黄芩芍藥湯主之又謂治白利者用升麻澤瀉湯　治嘔吐者用竹葉石膏湯。

加味四苓散（治水瀉）

白朮（一錢）　赤茯苓（一錢）　猪苓（八分）　澤瀉（八分）　木通（六分）　車前（六分）　牛子（七分）　黄芩（五分）

黄芩芍藥湯（治痳滯下裏急後重）

炒芩　赤芍　升麻（各八分）　甘草　生地　木通　只殼　歸梢（各一錢）　川連（八分）　人參（六分）　加酒大黄以利之

升麻澤瀉湯（治痳泄瀉）

猪苓　澤瀉　滑石　赤茯苓　甘草　川連炒　升麻

等分煎服

竹葉石膏湯（治麻嘔吐）

陳皮　半夏　石膏　茯苓　竹茹　甘草　水煎服

凡麻症初熱吐瀉切不可妄用燥胃補脾溫澀之藥恐滯毒于內而不得出以貽後悔也

一發熱之時未有不口渴者治渴之法但當以綠豆灯心炒米湯飲之以人參白虎湯佐之（方見前）使其生津解熱渴自止矣若恣飲冷水恐生水蓄之症蓋水入于肺爲喘爲咳宜用竹瀝以渡肺中之水　水入于脾爲腫脹爲自利　水入于胃

爲嘔爲噦須用猪苓澤瀉茯苓以渡脾胃之水　水入于心爲驚爲悸宜用赤茯苓木通以渡心下之水　水入于肝爲脇痛宜用芫花以渡肝胆之水　水入于腎與膀胱爲小便不利爲陰囊腫脹宜用車前木通以渡膀胱之水但隨症用藥以調治之不可執一而不通也

### 痳症既出調治法

夫痳既出則辨之重輕症之順逆觀形察色可以宜知不可不詳辨也庶使症之輕者不必過慮而妄治重者則不容忽而不治也

凡麻從耳項腰腿先見者吉蓋腠理既通筋骸不滯故洗發皆此碩卯其毒必能盡出也

凡麻頂身血不甚脹形小而均盡出者吉蓋氣盛于斑輕故圓小而一齊透于皮膚之外也

凡痳紅活潤澤鮮明光彩者吉蓋血活毒輕必能化毒也以于順症皆不必服藥但慎風寒節飲食善爲調護而已

如痳色白皆血不足也宜用

養榮湯（治痳色白）

當歸　川芎　紅花　赤芍　人參　甘草

如痳色紅赤如朱者乃血熱而兼火邪也宜用化斑湯主之人參白虎湯佐之失治若變紫色則險矣（人參白虎湯方見前）

化斑湯（治麻色紅赤）

人參　知母　石膏　牛子　連翹　升麻　地骨皮

淡竹葉　甘草　糯米　水煎以米熟爲度

如痳色焦紫乾紅慘暗不明者乃毒盛火熾五死一生之症急宜涼血解毒滋陰降陽用加味四物湯主之或辰砂益元散（方見九散條）或大青湯或玄參[illegible]選而用之

加味四物湯（治麻大紅）

當歸　川芎　生地　赤芍　丹皮　前胡　乾葛　連翹

牛子　紅花　甘草

大青湯（治麻紫黑乾燥）

玄參　大青　桔梗　荊芥　升麻　石羔　梔子　木通

人中黃　水煎入燒人糞汁調服

如麻色黑者則熱毒尤甚爲十死一生之症須用大青湯或用

紫草解毒湯

麻黃　紫草　紅花　川甲　人中黃　蒼朮　全虫

川連　燒人糞　虫退　牛子

一麻症發表之後疹子出于皮膚之間此時切宜謹慎風寒或犯生冷若爲風寒所束閉塞肌膚或爲生冷所冰毒不能出則遍身青紫毒入內攻雖有良醫莫能救矣

一麻已出而復沒者乃風寒所觸而毒氣退縮也若不急治則

必內攻而死矣宜速用消毒升麻湯乘熱服之則疹或可復出不然其必死也

消毒升麻湯

升麻　乾葛　荊芥　牛子　赤芍（各錢）　甘草　生薑引

一兒元虛毒盛麻出復沒目閉無魂口不能言請余往視余曰此毒隔內攻不能撩矣其父母哀告再三求賜一方余思非參連湯不可乃曰如必欲治須用人參五錢川連五錢若減分厘亦不見效其家果依余言用參連各五錢全煎一碗與服奈不能進藥以茶匙灌入口中即從口角溜出余曰雖須難進亦有十分之一點下宜略進之再緩緩灌下及至夜半其藥性已行乃能取藥及藥服完至次日天明其朋方開目方能言仍用前方與服竟愈蓋非連之多不能解其毒非參之重不可扶其元此重藥而祛重病之故也

一麻出之時咳嗽口渴而心煩悶者此毒在心肺二經而發天毒也宜用瀉心湯或黃連杏仁湯主之

瀉心湯（治麻咳嗽煩渴）

桑白皮（蜜炙）　地骨皮　甘草　淡竹葉　灯心　加花

連翹　玄參　川連　川貝　等分水煎服

黃連杏仁湯（治麻咳嗽煩悶）

川連（酒炒）　陳皮（去白）　杏仁（去皮尖）　麻黃（去節）　枳殼（炒）　乾葛　薑引

一麻出之時咳嗽氣喘唇紅舌乾熱伏于內煩燥不寧口鼻血者此實熱不宜也不拘前後宜用

化痰清火丸

犀角（一兩）　歸尾（八錢）　連翹（一兩）　赤芍（六錢）　牛子（五錢）　生地（二兩）　丹皮（一）

川連（四錢）　共作細末煉蜜爲丸如彈子大竹葉湯下

一麻出之時自利不止或瀉稀水頻數不休者最爲劣候宜看其疹如何以爲施治若疹稀色淡其毒本輕而作泄者乃脾氣本弱不能制水而又積垢于腸胃使陰陽不調水穀不分而泄也宜用和胃四苓散治之若麻稠密而紅紫之甚者蓋毒注大腸幸泄而解且用平胃散加乾葛連翹以解之疹一

疹依期而收自然瀉止若疹收而瀉猶未止仍是毒氣未盡必須仍用前方加連翹牛蒡木通車前澤瀉豬苓治之自愈若用訶蔻粟殼止澁之藥則熱毒壅于中重則腹脹痞滿喘急而死輕則必成痢疾以爲休息之症也

和胃四苓散

蒼朮　厚朴　赤茯苓　豬苓　澤瀉　神麯　山查

白芍　香附　陳皮　木通　炙草　或加肉桂

平胃散

蒼朮　厚朴　甘草　陳皮　豬苓　澤瀉　加乾葛

連翹　升麻　等分水煎服

一小兒體性怯弱氣血兩虛而出痲症痲色不紅者或病後之兒身體瘦弱而出痲者宜用

加味逍遙散（怯弱之兒而發痲症已出未出俱宜用之）

白朮　白芍　薄荷　茯苓　當歸　丹皮　陳皮　柴胡

甘草　麥冬　乾葛　等分水煎服

一痲已出稠密不拋紅腫太甚或一齊擁出者皆毒盛熱熾之故但已出于外未留于內必不至于傷生須清火解毒自獲平安不必過爲驚惶也此等只宜用

化毒清表湯（治痲紅腫太甚一齊湧出）

牛蒡子　連翹　花粉　地骨皮　川連　黃芩　山梔（[illegible]）

知母　乾葛　玄參（各八分）　桔梗　前胡　木通（各六分）　甘草

薄荷　防風（各三分）　如口渴加麥冬（二錢去心）　石羔（煆三錢）　大便秘結加酒大黃（一錢二分）

右方解毒鬆肌清痰降火除五內之鬱熱散肌表之六邪滌腸胃之滯垢痲毒甚者不拘前後俱宜用此

一疹子之出常以六時爲度如子後爲陽午後爲陰如陽候出者至陰分而收陰候出者至陽分而收此陽生陰成陰生陽成造化自然之妙故漸出而漸收者合乎陰陽消長之証其毒輕而症順也若痲出之後大熱不退連綿三四日而不收者此毒火太甚邪發未盡內留餘熱臟腑薰蒸所以外疹難

收也宜用化斑湯（方見前）　或用消毒飲主之　或用前化毒清表湯主之俱可（方見前）

消毒飲（治痲紅腫難收）

荊芥（二錢）　牛子（二錢）　連翹（二錢）　甘草（六分）　石羔　玄參（各二錢）　桔梗

前胡（各一錢）　黃芩　花粉　防風　木通（各八分）　水煎服

一疹子既出熱宜漸退若遍身俱出猶沸沸大熱煩渴不寧而頻頻惡心而作嘔吐者此毒發未盡尚留于肺胃之間宜用前化斑湯主之（方見前）　或孟氏治痲方主之（方見前）　如大便秘者俱加酒製大黃微利之如或失治必生他症矣

凡痲見形之後宜服清熱解毒之劑使毒能化而熱自退庶幾

後無變症也須用

解毒快斑湯

連翹　牛子　防風　荊芥（各六分）　虫退（五个）　山查（二錢）　歸尾（六分）

生地（二錢）　桔梗　炒芩（各八分）　川芎（五分）　乾葛　紫草（各八分）　甘草（五分）

右方用觀音柳少許，念前多則不可

凡痳既出，其形色紅活上升，有與影者，其毒盡化，最爲上也。收結之時，竟有如瘡如痂者，最爲吉也。出齊之後，其熱漸退，收盡熱亦盡除，則無餘毒爲殃矣。

痳症收後餘症治法

一疹子既收之後，其熱已宜盡退，而反渾身發熱，盡夜不退者，此毒未盡，邪火鬱于肌肉之間，故如是之復熱也。若不急解餘毒以退其火，久則毛髮焦枯，皮膚枯槁，爲骨蒸癆瘵之症矣。故當其始也，餘毒發熱，宜用解毒散；及其繼也，將成骨瘵，則用蘆薈肥兒丸或清熱除疳丸治之，遲則變爲肝之症，不可救也。

解毒散

連翹　牛子　知母　玄參　荊芥　前胡　地骨皮

黃芩　山梔　木通　甘草

蘆薈肥兒丸（治痳後發熱黃皮不退肌膚潤燥瘵癆之屏）

蘆薈　炒胆草（酒洗）　木香（磨）　訶皮　人參　使君子肉

檳榔　黃連（酒炒）　[illegible]　白蕪荑（各二錢）　胡黃連（五錢）　外加當歸　連翹（各三錢）　共爲末，用猪胆汁糊爲丸，如奈米大，每服五六十丸，米飲送下。若發而不治，至眼暗瞎目，口臭氣冷，手足厥逆，則必死矣。

清熱除疳丸（治仝前）

川連　當歸（各二錢）　龍胆草（一錢五分）　川芎（一錢）　青皮　陳皮　使君子肉（各一錢五分）　乾蟾頭（一个燒）　蘆薈（一錢五分）　胡黃連（二錢）　神麴（二錢）

共爲末，米糊爲丸，米泔水送下

一痳收之後，身雖不見熱，但時發壯熱煩渴不寧，驚搐頻譫，神昏智亂，如見鬼神者，此陰血衰耗，致毒歸入肝而傳于心

故也。治宜安榮養血，定志寧神，須用當歸養血湯，兼辰砂安神丸主之

當歸養血湯

當歸　川芎　生地　麥冬　木通　棗仁　甘草

淡竹葉　山梔仁　灯心湯引，大便秘加酒大黃

黃連安神丸

黃連　胆草　石菖蒲　茯神（各一錢）　當歸（一錢）　全蝎（七个去刺）

共爲末，湯浸蒸餅和猪心血爲丸，硃砂爲衣，灯心湯下

又痳後驚搐，余常用鎮驚丸亦效，方見丸散條

痳後面青唇淡，精神困倦，氣血兩衰者宜用

調元健脾湯（治痳後瘦弱成疳）

茯苓　人參　黃芪　丹皮　沙參　白芍（炒）甘草　當歸
百合　苡仁　麥冬。各等分　如有泄瀉白色者加木
香白朮　柯子少許。瀉黃色者加炒車前。

一痳後失調攝從氣虛或成疳積泄瀉等症宜用

健脾肥兒丸

人參（五錢）炙芪（一兩）神麯（炒二兩）查肉（二兩）炙草（六錢）白扁豆（炒一兩）川連（炒二錢）白芍（炒六錢）吉紅（五錢）當歸（八錢）陳皮（五錢）地骨皮（六錢）白茯苓（一兩）淮山（一兩）百合（八錢）白朮（炒一兩）

共為細末煉蜜為丸如彈子大空心白湯送下

一痳後毒流入胃致牙齦腐爛口臭牙疳常出血名為走馬牙疳及兩頰浮腫久而穿腮破腮缺唇崩齒追至齒落盡而後乃死此最危之症甚堪慮也其初牙痒血出或口臭時即宜以清胃化毒湯或噙且服甚則用文蛤散或雄黃散搽之又用人中白散或清胃敗毒散與服又外用救苦散以搽過處亦或有能愈者然牙疳既甚則不治者恒多也

清胃化毒湯

石羔（三錢）甘草　牛子　連翹　生地　炒芩　梔仁（炒各一錢）
使君子肉（六分）紫草（六分）金銀花　煎水時噙與服

人中白散（治牙疳）

人中白（煆）（[illegible]）雄黃　蘆薈　使君子肉　龍膽草　川連　胭
脂　等分為末蒸餅作丸服

清胃敗毒散（治牙疳）

黃連　丹皮　甘草心　連翹心　生地黃　金銀花
桑白皮　沙參　茯苓　黃梔（炒）等分服弱者加白朮

文蛤散（治牙疳）

雄黃（五錢）五棓子（一錢）枯礬（一錢）蚕退紙（一錢燒灰）
共為末先將清茶或米泔水洗淨然後以末藥敷之

雄黃散（治牙疳）

雄黃（一錢）黃柏（一錢）蛇床子（一錢）　共為末先以艾葉煎湯洗淨然

後用此末藥敷上　又有加黃柴燒灰者亦妙

救苦散（治牙疳）

人中白（三錢）青黛（五分）水片（一分）白[illegible]（一錢）黃柏（六分）兒茶（三錢）　加牛黃
更妙　共為末先以濃茶洗淨後將末藥敷上

一痳出之時曾作泄瀉未經清解以致熱毒逗留於腸胃及痳收之後變為休息痢者或赤或白或裏急後重晝夜無度頻數欲去終莫能止者此餘熱流滯于大腸也須辨其虛實而治之實熱者用三黃丸利之　虛者用香連丸解之　後用黃芩湯　或清熱導滯湯治之總以養血行氣為主　劉河澗曰養血而下痢自止行氣而後重自除誠治痢之要訣也

一第一〇一七冊　續修四庫全書　第 16 版反內

三黃丸（治痳後痘痢）

黃芩（酒蒸）川連（酒炒）大黃（酒製九次）三味等分共爲細末水糊作丸如梧桐子大每服二三十丸空心白水送下

香連丸（治一切痢病）

川連一（兩外用吳茱萸五兩浸水同炒去茱萸不用）木香（三兩）　共爲末以醋糊爲丸如梧桐子大米湯送下

清熱導滯湯

黃連　黃芩（炒）　白芍（炒）　枳殼（炒）　山楂（各一錢）　厚朴（薑汁炒）　青皮　檳榔（各六分）　當歸　甘草　牛子　連翹（各五分）　加紅花三分　地榆（五分）秘甚者加酒大黃（二錢）　生薑一片引

此方以芩連翹蒡甘草清熱解毒　查殼青朴檳榔消滯行氣　歸花芍榆活血行滯去舊生新誠治痳痢之良方也

此方去翹蒡加三稜莪朮可治痳熱成痢

一痳退之後時時咳嗽者此肺經尚有餘毒而未能盡解也宜用清肺飲與消毒飲主之若嗽太甚氣喘聲啞連聲不住甚至食穀則噦飲水則嗆咳嗽出血者名爲頓嗽此熱乘於肺而然也宜多服麥冬清肺湯加連翹主之若見胸高如龜肩聳而喘血從口鼻中出擺首搖頭面色青白或紅而慘暗者則毒留已甚肝肺受傷不可治矣然亦有肺氣虛弱而爲熱毒遏鬱肺氣不暢致咳逆喘急發嗽連聲而不已者但嗽無血出飲食不減耳凡如此者須用清肺飲加人參主之亦不可因其咳嗽拘于肺熱遂概以清涼之藥治之也

清肺飲（治痳肺熱咳嗽）

麥冬　桔梗（各錢）　知母　桑白皮（蜜水炒）　地骨皮　天花粉　甘草（各錢）　牛子　防風　荊芥（各一錢）　加淡竹葉同煎（弱者加人參）

麥冬清肺飲（治痳後咳嗽出血）

知母　川貝母　天冬　麥冬　桔梗　陳皮　杏仁　牛子　馬兜鈴　石羔　桑白皮　用糯米一撮同煎

一痳後咳嗽內熱不清心神慌亂夜臥不安且脾虛或生瘡疥者宜用

天真膏

生地（四兩）　麥冬（去心四兩）　玄參　知母　生黃芪（各四兩）　白茯苓　骨皮（炒各一兩）　沙參　桑白皮　生苡仁　白朮（炒各四兩）　丹皮　茯神　紫菀　當歸　橘紅（各二兩）　以上諸藥各依分兩取長流水浸諸藥乃入沙鍋內以桑柴燒火用文武火緩緩煎熬令藥水成膏再加白蜜八兩熬後取起盛淨器中去其火氣每服三五茶匙以白湯調下

一痳退之後咳嗽聲啞潮熱不退日久延綿而不能愈者此毒火未除肺金受尅故如是也宜用

清金降火湯（治痳後身熱不退咳嗽聲啞）

當歸（酒洗）　白芍（炒）　陳皮　甘草　川貝母　瓜蔞仁　白茯苓

玄參　炒芩　山梔（炒）　天冬　麥冬　桑白皮　杏仁

石羔（炒）　紫蘇　桔梗　黄連（炒）　各等分生薑引

一麻退之後或有餘毒而發癰毒肢節疼痛者宜用

羌活散（治麻後癰毒）

羌活（一兩）　川甲（一兩）　大黄　全蝎（各五錢）　一葉金（三條去頭足）　白芷稍（五錢）

甘草節（一錢）　乳香　沒藥（各一錢）　或加皂角刺一錢

右共爲末好酒調服令服行爲度

一麻退之後餘毒未盡而熱之甚者致口鼻出血須用犀角地黄湯合解毒湯主之或用四物湯加茵陳木通之類以利小便使熱氣下瀉于膀胱而自愈也

犀角解毒湯

犀角　生地　赤芍　丹皮　黄芩　黄連　梔子　等分

右方以諸藥共煎另將犀角磨汁調服

加味四物湯

當歸尾　生地　赤芍　川芎　茵陳　梔子　木通　車前

牛子　連翹　知母　滑石　甘草

等分煎服此滋陰降火令火下行之義也

一麻退之後餘熱未盡熱乘于心日夜煩燥狂言妄語人事不清治此法宜退心經火邪但心與小腸相通欲退心火　須

利小便。宜用辰砂益元散主之　或用辰砂五苓散[illegible]治之　初起煩躁者則用升麻葛根湯調辰砂益元散主之

辰砂益元散

滑石（飛過六兩）　甘草（一兩）　辰砂（五錢）　木通（五錢）　車前（五錢）　黄連（二錢）

另將辰砂乳成灰塵再與諸藥末合研勻　燈心湯下

辰砂五苓散

辰砂（另乳）　白朮　茯苓　猪苓　澤瀉　肉桂　炒芩　炒連

共爲細末燈心湯引

升麻葛根湯

升麻　乾葛　赤芍　甘草　麥冬　共煎調益元散服

麻退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如雨者此元氣虚弱失於調理。外雖無病裏實空虚偶然中惡。朝發夕死。然痛之不甚或因感風寒而痛者須用升消平胃散（方見九散條）　加木香治之

又有麻後身熱不退飲食不進常常腹痛者此餘毒內留而作痛也須用大黄化毒湯令其下泄則毒退熱除而痛定矣

大黄化毒湯

白芍（二錢）　厚朴（一錢五分）　陳皮（七分）　甘草（三分）　大黄（一錢）　只殼（一錢）

一兒麻後身熱痰涎壅盛咳嗽喘急胸高心懸口啞痰鳴請余往視余先用通關散少許吹入鼻中須臾噴嚏流涕出用

涎再用鎮驚丸（方見丸散頭）其心漸安痰乃不鳴其後用
黃芪　當歸　白芍　前胡　連翹　牛子　桔梗　陳皮
黃芩　花粉　川貝　馬兜鈴　荊芥　知母　甘草
生地　等藥爲末與服乃愈

一麻後聲啞者用雪梨水與服能開聲音或用乾梨子煎水與服亦可　或用百合花亦可　或用薄荷煎水亦可

一麻發癢用酒遍身擦之其癢即止

一麻後須慎風寒水濕蓋疹出之後腠理疏通皮膚必嫩且薄從腠出以達筋骸是以筋骨空虛肌膚不密若受風寒水濕之侵而爲終身之患可不愼乎

一麻後須節飲食蓋疹出之後乃脾胃空虛臟腑爲之一變若恣服煎炒致熱留腸胃而成痢症以及心腹疼痛之病按服生冷恐脾虛不能運化致成瘧塊之疾且食肉太早則有疹後出疹之月多致下痢膿血喫食鷄魚則終身皮膚粟起猶如鷄皮之狀但遇時行疹疫又復重出喫食醋酸致令咳嗽喫食五辛則生驚熱種種餘症不能盡述必待四十九日或百日之後方無禁忌欲免後患須宜節之

## 孕婦出麻

凡孕婦出麻必要安胎胎動則內臟空虛不能送毒必致內攻而死治此之法須用四物湯加白朮砂仁條芩艾葉以安胎清熱爲主胎氣不動則疹亦易出也　如胎氣上沖急用苧麻根艾葉煎湯磨檳榔調服

一熱毒蒸胎胎多受傷然胎落而母自安蓋疹與痘不同痘要內實故胎落而母亡疹要內虛故胎去而母存前以安胎爲訓者欲其母子俱存爲仁人之善術也

種痘新書卷之十一終

# 種痘新書卷之十二

曲邑張　琰逖生氏編輯

受業曾衡波仝參

## 彙集麻痘諸方

### 稀痘諸方

神功消毒保嬰丹（每歲春分秋分日服藥一丸能清痘毒若三年連服六次毒盡可減痘必無虞）

纏豆藤（一兩五錢其藤七八月間附毛豆梗上纏紅絲者是採取陰乾以此藥爲主）山查肉一兩

新升麻（七錢五分）生地（一錢）川獨活（二錢）牛蒡（兩）甘草（五錢）黑豆（三十粒）

赤豆（七十粒）當歸（酒洗五錢）連翹（七錢）桔梗（五錢）硃砂（少五錢爲衣）川連（酒炒五錢）

防風　荊芥（各五錢）苦絲瓜（二个取隔年經霜者佳燒灰存性）

右共爲細末和砂糖爲丸如李核大每服一丸甘草湯化下　諸藥預先精製遇春分秋分或上元中元日修合忌婦人雞犬見之合時向太陽祝曰　神仙妙藥體合自然嬰孩吞服天地齊年吾奉太上老君急急如律令勅一口氣念七遍

### 代天宣化丸

人中黃（屬土甲己年爲君）黃芩（屬金乙庚年爲君）黃栢（屬水丙辛年爲君）黃連（屬火戊癸年爲君）梔子（屬木丁壬年爲君）苦參（佐）荊芥（佐）防風（佐）連翹（佐）山豆根

牛蒡　紫蘇（俱佐）

右方先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣爲君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三於冬至日修合爲末取雪水煎升麻和竹瀝調和麵爲丸外以辰砂雄黃爲衣每用竹葉煎湯下

### 龍鳳膏稀痘

蚯蚓（一條白頸者佳）烏雞蛋一個

以雞蛋開一小孔入蚯蚓在內用皮紙糊其孔飯上蒸熟去蚯蚓取蛋食之每歲立春日食一个終身不出痘疹或春分日食亦可

### 稀痘仙方

牛黃（一錢）蟾酥（三分）硃砂（七分）絲瓜（取近蒂五寸燒存性五錢）共爲末一歲兒

服一分用沙糖調服

### 兔紅丸

硃砂　甘草　六安茶

等分共爲末候臘八日午時取生兔血將前三味和合成丸如梧桐子大逢三六九日與兒食之可免痘瘡

### 鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸垢用鹽醋煮熟與兒食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對人言但自設法取用不可與人取討只用砂鍋白水煎不用椒茴蒜韮之類

### 鯽魚方

鯽魚不拘大小去鱗腸不可用水洗將芫荽切片和鹽入魚腹中以草紙包裹煨熟令去火氣與兒食之可解痘毒但食後凡鱗腸骨刺俱宜埋之。

### 蝦蟇方

七八月間取大蝦蟆。去頭皮用淨肉點花香油鍋內煠。燒盡骨與食頻頻多服可免痘疹

### 四脫丹

蟬退　蛇退　鳳凰衣（即雞蛋殼）神仙脫（即父母指甲）

各等分為末煉蜜作丸如菉豆大每年除夕夜服一錢為度連服三年永不出痘

### 雞蛋方

留發黃雞（雌雞）一隻不可與雄雞一處及大生蛋七個。照次圈起不可寫字好生收藏。切忌蚊虫買小簍盛七個盛之再用繩照數紮小竹棍為記置于無女人到處取廁中浸十二月初一日將初生一個浸初二日將第二個浸初三至初七將那五個蛋照依次序每日浸一個至初八日查看竹棍記號先取初浸之蛋再鑵煮熟空心與食其後每日照數取出蛋食之食完可免痘疹且無患病

### 玄兔丸

玄參（五兩搥碎晒乾作末）兔絲（十兩酒洗為末）

俱不可犯鐵器用沙糖為丸如彈子大每日與兒三丸以沙糖湯送下。

### 葫蘆花湯

八月取葫蘆花不拘多少陰乾俟除夕夜。煎湯浴兒可免痘疹。

### 苦楝子湯

取苦楝子不拘多少煎湯浴兒可免痘疹即出亦稀

### 烏魚湯

除夕日將七星大烏魚一尾小者一二尾俟黃昏時煮湯將兒遍身洗浴耳鼻口孔俱要水到不可因魚腥而再用清水洗之時人不信或留一手一足不洗遇行痘症其未洗者偏多洗處則稀此明驗也　洗法或云臘月無拘

### 三豆湯

黑豆（解腎經毒）赤小豆（解心經毒）菉豆（解肝經毒）

將三豆各一碗用甘草一兩浸水全煎。去甘草取豆與汁。令兒常食可稀痘疹

### 麻油擦法（將發痘時行之）

每夜臨臥時用三指醮麻油擦兒頭額項背腰間兩手足腕然後令睡此亦暢達流通之義故可令其症之輕也

### 稀痘保嬰丹

纏豆藤（四兩）紫草茸（四兩酒洗忌鐵器）防風（二兩去蘆）荊芥（一兩）升麻（二兩蜜水炒）
牛蒡（二兩炒）甘草稍（二兩去皮）硃砂（三錢）天竺黃（一錢二分）牛黃（一錢二分）
蟾酥（一錢二分）黑豆　菉豆　赤小豆（各四十九粒）
共爲細末。外用紫草三兩。水煎熬膏。入砂糖半盞和勻爲丸。如赤豆大。用硃砂爲衣。未痘之時。用甘草煎湯磨丸八服。已發熱時。以蔥湯磨服。服後以被蒙頭。令出微汗。則毒重者可減。半毒輕者則甚稀。痘若已見點。用甘草磨服。亦可使輕。且保無虞。但不可多服。

三花丹（將出痘時用之可稀痘）
梅花　桃花　梨花

三花各等分。通取已開未開者陰乾爲末。用兎腦爲丸。雄黃爲末。以赤黑菉三豆煎湯調服。

六味稀痘飲（將發痘時預服）
山查　紫草　牛蒡（各一錢）防風　荊芥（各一錢二分）甘草（五分）
生薑引。水煎服。

輕斑散（未見點時服）
絲瓜（近蒂三寸燒灰存性爲末）硃砂（五分水飛爲末）
二味以絲瓜灰爲君。共爲末。用沙糖調服。痘出必稀。

硃砂丹（將出時服可以稀痘）
硃砂爲末。用磁石同炒三次。炒至硃砂黑色。去磁石。用硃砂

---

末些。少蜜水調服。

三酥餅（初熱時用解毒稀痘）
蟾酥（端午日捉蟾以蛤蜊眉上揑取每用少許）辰砂（將絹袋盛之用升麻麻黃紫草荔枝殼全煮一日一夜將前藥湯飛過）紫草（爲末）麻黃（去節湯泡過曬乾爲末三味俱用蟾酥另捻作餅）
又加麝香少許。另捻作餅。各用磁器盛之。聽用。遇痘症于發熱之初。將三餅各取一分或五厘。量兒大小加減。熱酒化下。被蓋片時。令出微汗。或將消毒飲化下尤佳。若痘已出稠密紅紫者。用紫草紅花湯或化毒湯。將辰砂紫草二餅調下少許解之。自可無虞。又小兒初生。用蜜調辰砂餅一分。痘出必稀。惟麻黃餅痘出後忌用。

硃砂解毒丹（解毒稀痘）
用上好硃砂一錢爲末。以猪糞浸水調服。解一切痘毒。但嬰子將發之時方可服之。

稀痘如神散
絲瓜　升麻　赤芍　甘草　查肉　黑豆　赤豆　犀角
各等分爲末。每服二錢。不拘時服。

預服萬靈丹（初熱一服即輕百發百中）
升麻（二錢）葛根（三錢）甘草（五分）紫草茸（一兩）虫退（三錢）蚕虫（糯米全炒三錢）
山豆根（五錢）全蝎（十个去刺）白附（三錢）連翹（三錢）雄黃（一錢五分）麝香（二）
蟾酥（一錢酒煮如蜜）

右共爲末用臘酥酒和丸如皂角子大每服一丸甘草湯

下

**稀痘兔肉丹**（此能解毒可化凶爲吉）

取活兔一隻去皮用頭肉將鹽醃肉晒乾加茵陳連翹各三

錢同煮取汁與服

**白牛毛散**

取純白牛之毛五錢用銀碗煅成灰　硃砂（二錢研爲末）　絲瓜（近蒂五寸

焙乾爲末三錢）

以三味和勻爲末空心白湯下或蔥湯調服自出痘稀少

若純白牛毛無有不效

**預防湯**（痘未出時服之可稀重者輕輕者或無）

黃連（一錢二分）密蒙花（八分）升麻（一錢）紅花子（十粒研）生犀　苦參

牛蒡（研）山豆根（各一錢）　咬咀白水煎服

**甘草散**（預服解毒使痘出稀）

炙甘草爲末研飯後調服五分

**消痘散**（發痘時服多者可少）

當歸　川芎（各五分）白芍（六分）甘草　升麻　花粉　荊芥（各三分）

紅花子（二錢）防風（四分）木通（去皮六分）陳皮（五分）青皮（三分）黃連（薑汁炒一錢）

枸杞（五分）桔梗（井水炒五分）生薑引空心服間三日再服

**稀痘丹**（痘未出時服之可以解毒稀痘）

雄黃　硃砂（各二錢）冰片（二分）麝香（一分）

共研勻取蟾酥爲丸如菉豆大每七歲五丸納生葱管內

濕紙包煨候紙乾取出用升麻紫草防風荊芥蟬退白芷

牛蒡紫蘇葛根木通甘草加燈心三十根葱白五莖水煎

乘熱調前藥末服被蓋出汗則毒自解

○**初熱發表解毒諸方**（共計十五方）

**陞葛散**（治初發身熱[illegible]等症）

升麻（六分）乾葛（五分）川芎　羌活　防風　荊芥（各四分）前胡（八分）

薄荷　桔梗　只殼（各五分）牛蒡（八分）蟲退（三分）山查（六分）甘草（三分）

地骨皮（七分）　又方減乾葛加紫草

葱白引水煎熱服　熱甚者加柴胡　木通　連翹

夏加香薷　冬加麻黃　濕加豬苓　澤瀉

**蘇解散**（治初熱頭疼腰痛及一切熱毒甚者）

紫蘇　乾葛（各五分）防風　荊芥　白芷（各四分）蟲退（三分）紫草（六分）

升麻（五分）牛子（八分）木通（六分）甘草（三分）

加燈心葱白引水煎熱服

**參蘇飲**（治壯熱風痰身痛咳嗽）

陳皮　茯苓　半夏　桔梗　紫蘇　乾葛（各四分）前胡（八分）

甘草（三分）人參（四分）山查（五分）

生薑葱白引水煎熱服

麻黃湯（爲風寒閉塞之甚者不得已或用之萬勿可輕試也）

麻黃（三錢）　杏仁　桂枝（各一錢）　甘草（五分）

薑葱引水煎熱服

升麻葛根湯（初熱發表）

升麻　乾葛　白芍（各一錢）　甘草（四分）　加山查　牛子（各一錢）

以葱尖同煎熱服，或冬加麻黃

和解湯

升麻　乾葛　白芍（各一錢）　川芎　防風　人參（各七分）　甘草（二分）

生薑引熱服

人參羌活湯（治痘色淡白大熱驚搐）

人參　羌活（各五分）　柴胡　前胡（各八分）　防風　荊芥　川芎（各四分）　黃芪（炒）　只殼　桔梗（各五分）　茯苓　紫草（各六分）　甘草（三分）　地骨皮（八分）　牛子（炒一錢）　蟬退（三分）　天麻（五分）　加猪苓　澤瀉（各六分）

水煎熱服如熱不減進服數劑無妨

解毒快斑湯（治痘服解熱表藥已出解毒快斑又治紅紫黑熱）

防風　荊芥　羌活　柴胡　川芎　白芷　當歸　連翹

牛旁　黃芩　黃連　紫草　蟬退　薑葱引

加味葛根湯（治痘未表發熱驚搐）

升麻　乾葛　赤芍　甘草　桔梗　柴胡　防風　荊芥

連翹　地丁　木通　麥冬

生薑引水煎服

防風解毒湯（治麻初熱時令疫役而出不快）

防風　薄荷　荊芥　石羔　知母　桔梗　牛子　連翹

木通　只殼　甘草　淡竹葉　加灯心引

黃連解毒湯（治麻初熱時令疏熱而出不快）

黃連　黃芩　黃柏　梔子　牛旁　甘草　防風　荊芥

知母　石羔　桔梗　玄參　木通　生薑引

桂枝解毒湯（治麻初熱時令大寒而出不快）

桂枝　麻黃　赤芍　防風　荊芥　羌活　甘草　桔梗

人參　川芎　牛子　生薑引

升麻解毒湯（治麻初熱時寒時暖而出不快）

升麻　乾葛　羌活　人參　柴胡　前胡　甘草　桔梗

防風　荊芥　牛子　赤芍　連翹　淡竹葉

加味麻黃湯（治發麻不出）

升麻（酒洗）　麻黃（酒炒）　人中黃　牛旁　蟬退

水煎乘熱服令出微汗即出矣。

紅綿散（治痘感寒發熱驚搐）

全蝎（炒）　天麻　蟬退　薄荷　甘草　紫草　防風　荊芥

羌活　薑蟲　共爲末葱白湯調服

○發表解方　共計十方

神砂益元散（治痘壯熱發驚搐狂言譫語等症）

滑石（飛過六兩）　甘草（一兩爲末）　神砂（五錢）　木通（五錢）　車前（五錢）　牛子（五錢）

共研爲末，將神砂另乳成灰塵，然後與諸藥末和勻同研，以灯心湯調服。

迎火回生丹（治痘大熱煩渴紅紫乾枯驚搐狂譫等症）

滑石（一錢）　硃砂（二分）　冰片（三釐）　人中黃（五分）

右共爲末，灯心湯調服，睡少時，神安氣寧，痘即轉紅活。體弱者加人參三分同煎。

烏金膏（治痘驚搐）

殭蠶（炒）　全蝎（去尾酒洗）　甘草　紫草　白附　麻黃（各五錢）　川甲（一錢）

虫退（二錢）　硃砂（三錢）

共爲末，另將紅花、紫草各一兩，用好酒一碗，熬至小碗，去查，再加蜜五兩，緩火同熬，以滴水成球爲度，作丸如龍眼核大，每服一丸，灯心湯下。

消風散（治痘痰盛驚搐譫語强急張口直視）

羌活　獨活　殭蠶　荊芥　只殼　防風　天麻　虫退　地骨皮（以上各八分）　前胡（一錢五分）　柴胡　黃芩　花粉　桔梗（各二錢）　茯苓　紫草　牛子（各一錢）　人參　川芎（各七分）　甘草（四分）　生薑引

瓜蔞散（治痘熱極生風狂譫驚搐）

瓜蔞（二錢）　毛虫（一錢）　二味慢火全炒，色至焦黃爲度

共爲末，薄荷湯下。

抱龍丸（治痘一切驚風發搐）

膽南星（取南星入烏牛膽內吊于風處陰乾又然一牛膽連換七膽陰乾不可晒五錢）　天竺黃（熟內有佰者五錢）　雄黃（明紅者三錢）　硃砂（大者四錢）　青礞石（用硝和勻入銀鍋煅過出盡金色白大服可用研作灰塵六錢）　天麻（四錢）　天花粉（五錢）　殭虫（三錢）　防風（四錢）　甘草（二錢）　琥珀（三錢有此固佳無此亦可）

右共爲末，米糊作丸如龍眼核大，用灯心湯磨銀器化下，一切驚風百發百中。

蟾酥丸（治痘驚風并一切不起之症）

蟾酥（二分）　牛黃（三分）　人牙（一箇）　雄黃（三分）　珍珠（三分）　硃砂（五分）　全蝎（五分）　殭虫（五分）

共爲細末，米糊爲丸，人參湯

粉紅丸（治痘發癲等症）

硃砂　膽星　天竺黃　胭脂米（各一錢）　冰片（二分）

煎牛夕汁爲丸如龍眼核大，砂糖水下。

保命丹（治一切驚風發搐）

天麻　鬱金　全蝎（各五錢）　防風　甘草　白附（炒）　殭虫（炒五錢）　青黛（三錢）　薄荷（五錢）　膽星（五錢）　半夏（滚水泡晒乾又用姜汁浸晒于兩炒五錢）　硃砂（一錢爲衣）　麝香（少許）　加牛黃（三錢）　茯神（四錢）　虫退（三錢）　桔梗（四錢）　鈎藤（五錢）

共爲細末，米糊爲丸，灯心薄荷湯下。

清神退火湯（治驚狂發搐收心）

麥（去心）玄參　川連　木通　車前　甘草　梔子

用灯心湯引加砂研末共調服　大便秘加大黃

怯弱自利者加人參

○治腹痛諸方共計十方

**五積散**（治嘔吐腹痛傷寒）

川芎　當歸　赤芍　人參　茯苓　陳皮　蒼朮　厚朴

炙草　法夏　白芷　桔梗　枳殼　乾薑　肉桂　麻黃（冬月）

各等分薑蔥引

**丁附治中湯**（治傷食腹痛嘔吐不止）

人參（五分）白朮　乾薑　陳皮　青皮　厚朴　白芍（各一錢）

丁香（五分）炙草（三分）附片（二分）

此虛寒之甚嘔吐腹痛者宜用之

**芍藥散**（治傷寒腹痛或冷氣痛）

神曲（一錢）山查（一錢）香付（一錢）良薑　當歸　甘草（各五分）

手足厥冷加附片三分

**桂枝芍藥湯**（治腹痛）

桂枝（一錢）芍藥（二錢）甘草（五分）加薑棗引

**黃連湯**（治熱氣在胃作腹痛）

黃連　炙草　乾薑　桂枝（各二錢）半夏（八分）人參（三分）

**[illegible]附散**（治傷食作痛亦忌飲冷）

[illegible]　厚朴　陳皮　香付　半夏　白芍　[illegible]

川芎　木香　山查　神曲　砂仁　炙草

共爲末感寒生薑引

**[illegible]防風湯**（治痘出不快腹痛煩燥）

白芍　陳皮　升麻　防風　桔梗　川芎　[illegible]　厚朴

甘草　白芷　香付

大便秘加酒大黃　感寒加蘇葉生薑引

**大黃化滯湯**（治大便秘結作腹痛）

白芍（一錢）厚朴（五分）陳皮（七分）甘草（五分）大黃（一錢）　水煎服

**鈎藤湯**（治痘後口噤搐直視痛攣臍）

鈎藤（取勾）紅花　木香　川芎　當歸　白芍　甘草

白朮　青皮　黃連　官桂　生薑引

等分水煎服

**蟬退散**（治痘出不快毒氣在內而作腹痛）

以蟬退爲末用升麻　厚朴煎水調服待痘一出其痛即止

○治大便秘結諸方共計十九方

**前胡枳殼湯**（治痘欲出不出身熱煩燥大便秘結）

前胡　枳殼　甘草　酒大黃　赤茯苓　水煎服

**枳殼散**（治痘伏熱甚煩燥便閉）

枳殼（三錢）生地（七分）柴胡　甘草（各一錢）酒大黃（二錢）　水煎服

四順飲（治大便秘結）　大黃　當歸　芍藥　甘草　等分煎服

通幽散（治大便秘結）　當歸　紅花　生地　熟地　桃仁　升麻　麻子　甘草

各等分水煎服

通腸散（治大便秘結）　只殼（二錢）　芝麻（三錢）　當歸（二錢）　大黃（二錢）　或加牛三分

大柴胡湯（治身熱大便秘）　柴胡　赤芍　只殼　黃芩　大黃

承氣湯（治大便秘）

大黃　只實　芒硝（各三錢）　厚朴（二錢）　不可輕用

宣風散（治腹脹便秘）　檳榔　陳皮（各二錢）　甘草　牽牛（各錢）

共為末蜜水調服

紫霜丸（治便秘腹脹）　杏仁（去皮尖五十粒）　赤石脂（二兩）　巴豆（三十粒去殼）　赭石（煅醋淬一兩）

共為細末作丸如黍米大三歲以下二三丸八歲已上

敷丸米飲下

蜜導法（治便秘）

用蜜二三合於銅器中微熬、不住手攪、勿令焦、候滴冷水中成珠不粘手為度、傾在冷石上。以牙皂末拌勻將蜜作條長寸許仍置冷水中令蜜條堅硬然後將蜜條插入穀道中俟蜜融其便自通

桃仁承氣湯（治大便秘結）　桃仁（去皮尖）　肉桂　大黃　芒硝　甘草

等分煎服

妙應丸（治脾胃實熱）　檳榔（二兩酒）　大黃（三兩）　黃芩　滑石（各二兩）　黑牽牛（二兩五錢）

共為末米糊為丸如梧桐子大

保和丸（治同前）

山查　神麴　半夏　蘿蔔子　白茯苓（各一兩）　連翹　陳皮（各五錢）　共為末米糊為丸如梧桐子大滚白湯下

潤腸湯（治虛秘）　歸梢　甘草　生地　火麻仁　桃仁

等分水煎服

加味四聖散（治大便秘）　紫草（二錢）　木通（去皮節一錢）　川芎（四分）　甘草（三分）　白术（三分）　茯神（三分）　糯米（一撮）　木香（另磨）

水煎服

三一承氣（治痘黑陷二便秘結熱甚譫語）

大黃（錢七）芒硝（二錢五分）厚朴（一錢二）只實（錢）炙甘草（一錢）

此方不可輕用須量虛實而投、

寬中湯（治誤服溫燥陽盛陰虛、津液耗散大便秘結、）

只殼、當歸、赤茯苓　生地　赤芍　生甘草

麥冬湯（治便質燥津液下耗血枯不榮）

麥冬、生地　當歸　赤芍　生甘草

當歸解毒湯（治痘大便秘）

當歸　生地　大黃　麻仁（研）　只殼、紫草　連翹

等分水煎服

○利小便諸方（共計五方）

導赤散（治小便赤澁煩渴發熱）

生地　木通　甘草　人參　麥冬（去心）　加車前　滑石

柴胡　等分煎服

八正散（治小便不利）

赤茯苓、川貝母　木通　車前　滑石　扁蓄　梔子

甘草　加瞿麥　膀胱火盛加牛子　炒芩

等分水煎服

滑利散（治小便不通）

木通（六分）赤茯苓（一錢）澤瀉（一錢）　加車前（一錢）

以灯心二十節水煎服。

清金導赤飲（治熱乘于肺小便不利咳急煩燥）

當歸　白芍（炒）　陳皮　川貝（去心）　石羔　茯苓　甘草　炒芩

炒連　杏仁（去皮尖）　木通　車前　桑白皮（炒蜜）　只殼（麩炒）　滑石

麥冬、人參　玄參　各等分水煎服

柴苓木通散（治身熱小便短赤）

柴胡　木通（去節）　黃連（去皮酒炒）　牛旁（炒）　車前　甘草　黃芩

加前胡　等分煎服

○嘔吐諸方（共計十一方）

理中湯（治虛寒嘔吐泄瀉清水）

人參　白朮　炙草　乾薑　等分煎服

桂附理中湯（治虛寒肚瀉手足厥冷咬牙寒戰等症）

即前方加附子　肉桂

和中湯（治虛寒嘔吐）

人參（五分）白朮（七分）茯苓（五分）炙草（五分）陳皮（一錢）法夏（八分）藿香（一錢）

砂仁（一錢）　煨薑引

蘇發散（治傷寒傷食嘔吐）

蘇葉　陳皮　半夏　蒼朮　厚朴（薑汁炒）　炙草　茯苓

羌活　桔梗　神曲　山楂　小便不利加木通　車前

各等分為末生薑同煎服

藿香正氣散（治一切風寒暑氣鬱脾胃中嘔吐腹痛）

藿香　紫蘇　大腹皮（洗淨方無毒）陳皮　桔梗　甘草　茯苓

半夏（法製）厚朴　白芷

感寒生薑引　感暑香薷引　感濕加蒼朮

### 參砂和胃散（治胃寒嘔吐）

人參（五分）白朮（七分）茯苓　炙草（各五分）陳皮（一錢）半夏（八分）砂仁

藿香（各錢）　感風寒生薑引　吐清水煨薑引

### 和味平胃散（治虛寒嘔吐）

陳皮　蒼朮　厚朴　炙草　藿香　砂仁　或加小茴（炒）

右煨薑同煎服

### 藿香安胃散（治胃弱不食嘔吐惡心）

藿香（一錢五分）人參（一錢）陳皮（一錢五分）丁香（五分）　加薑引水煎服

### 益黃散（治胃冷嘔吐）

陳皮　青皮（各一錢）丁香（五分）木香（三分）柯子肉（七分）

一方減木香加豆蔻（二錢）

共為末以煨薑煎湯調服立效

### 黃芩半夏湯（治乾嘔而利）

黃芩（炒二錢）半夏　甘草（各一錢）芍藥（二錢）

用薑二片棗三枚水煎服

### 灯心竹葉湯（治乾嘔）

竹葉（三十片）灯心（三十根）　水煎服

### 竹葉石膏湯（治麻痘作吐）

陳皮　半夏　石羔　茯苓　竹茹　甘草　木通

各等分水煎服

## ○泄瀉諸方（共計七方）

### 治中散（治虛寒泄瀉）

炙芪　人參　白朮　茯苓　川芎　當歸（各五錢）肉桂（五錢）

豆蔻霜（麪裹煨熟搥去油須令油去淨五錢）丁香（一錢五分）木香（三錢）

共為細末用溫酒調服服後衣被蓋暖少頃痘即紅活起

頂泄瀉自

### 堅腸散（治痘泄瀉不止）

黃芪　白朮（各一錢）山查（七分）川芎　陳皮（各五分）升麻（三分）

肉豆蔻霜（煨去油淨者一錢）加茯苓（七分）白芍（六分）　用棗三枚同煎服

### 七味豆蔻丸（治虛寒泄瀉）

木香（三錢）砂仁（五錢）龍骨（三錢煨用）柯子肉（煨去核五錢）　枯礬（三錢）赤石脂（三錢）

豆蔻霜（煨去油八錢）　加白朮（五錢）茯苓（五錢）

共為細末水糊為丸米飲送下

### 四苓散（治熱瀉黃赤臭者用之）

白朮　赤茯苓　猪苓　澤瀉　加木通　車前　川連

活石　出腸頭者加升麻

### 五苓散（熱瀉而氣虛者用此方）

肉桂　白术　猪苓　茯苓　澤瀉

辰砂五苓散（治熱渴煩躁）

即前方加辰砂　滑石　木通　灯心湯引

右方分陰陽利水道凡熱渴者無有不效

參术調脾散（治虛泄）

人參（七分）白术（一錢）茯苓（一錢）訶子肉（八分）砂仁（七分）白芍（八分）炙草（四分）

山查（一錢）神麯（八分）豆蔻霜（一錢）苡仁（七分）白扁豆（八分）家蓮子一錢

右共爲末米飲調下

○治噎方

半夏湯（治噎氣）

半夏（湯泡）　生薑　等分煎服

○治胃弱不食諸方（共計三方）

人參養胃湯（補脾進食）

人參（一錢）白术　陳皮　神麯（各一錢）（麥五分）茯苓（八分）炙草（四分）

加砂仁（八分）煨薑引

七珍散（調胃進食）

人參　炙芪　茯苓　山藥　扁豆（各一錢）白术（二錢）炙草（五分）

加粟米一撮薑三片棗三枚仝煎服

白术調元散（治胃虛不食兼吐瀉）

人參　白术　茯苓　炙草　白扁豆（炒）蓮子肉（去心）淮山（炒）

---

（五分）桔梗　杏仁（各五分）砂仁（五分）共爲末薑蜜調服

○治喘急痰鳴咳嗽失聲諸方（共計十五方）

二陳湯（治痰涎咳嗽）

陳皮　茯苓　法夏　甘草　炒芩

等分煎服　感風寒生薑引

葛根黃芩湯（治喘而有汗）

乾葛　黃芩（各二錢）黃連　赤芍　石膏（各一錢）甘草（五分）北五味（三分）

七分　水煎服

五味子湯（治喘促而厥）

五味子（一錢五分）人參（一錢）麥冬　杏仁（各二錢）　加薑棗引水煎服

[illegible]治消痰飲

陳皮（四分）桔梗（七分）川貝母（五分）甘草（三分）白芍（六分）苡仁（四分）石菖蒲（五分）

玄參（三分）　水煎服

清肺飲（治喘嗽咽乾）

[illegible]（一錢五分）麥冬（二錢）知母　花粉　桑皮（各一錢）柯子（八分）石菖蒲（[illegible]分）

桔梗（二錢）玄參（八分）　加竹瀝薑汁

天花散（治喘後失音）

天花粉　桔梗　茯苓　柯子　菖蒲　甘草

各等分用竹葉七片[illegible]一寸水煎服

補肺[illegible]（治[illegible]末出聲啞）

阿膠（蛤粉炒成珠一錢五分）　牛子（炒三分）　杏仁（泡去皮尖三粒）　甘草（三分）　馬兜鈴

黃芪（各五分）　糯米（炒一錢）　用水煎頻頻服之其聲自出

黃連杏仁湯（治邪內熱外感及瘡症咳嗽煩悶咽疼舌瘡等症）

黃連（炒）　陳皮　杏仁　麻黃（去節）　只殼（炒）　葛根

生薑引　麻症作泄加厚朴甘草、

瀉肺散（治痘實熱咳嗽喘急痘色紅紫）

桑白皮（蜜炒去皮）地骨皮、甘草　炒黃芩

加淡竹葉、灯心同煎服、

加減瀉肺飲（治同前）

麥冬　桔梗（各一錢）　陳皮　知母（各一錢）　荊芥（六分）　花粉（一錢）　柯子（八分）

黃芩（六分）　杏仁（八分）　甘草（三分）

雙解散（治痘爲風邪所閉痘不起發咳嗽惡風自汗戰慄）

防風　羌活　白芷　桔梗　陳皮　獨活　柴胡　甘草

香附　川芎　花粉　風邪太甚加麻黃

各等分生薑引

加味清肺飲（治痘症紅紫咳逆）

人參　柴胡　杏仁　桔梗　赤芍　五味　甘草　黃芩

旋覆花　款冬花　地骨皮　法夏　阿膠　知母　烏梅

桑白皮　各等分葱白引

瀉白散（治麻症咳嗽）

---

桑白皮（蜜炙）地骨皮（去梗）甘草　淡竹葉（二十片）灯心（三十根）馬兜鈴

等分爲末

麥冬清肺飲（治麻咳嗽出血或喘飲食）

牛子（炒）　石羔　馬兜鈴

等分煎服加糯米爲引、　出血加枝仁

清金降火湯（治麻後乘熱于肺聲啞咳嗽等症）

當歸（酒洗）白芍（酒炒）生地（酒洗）陳皮（去白）川貝母（去心）瓜蔞仁　甘草

白茯苓（去皮）枯芩（酒炒）山梔（炒黑）玄參　天冬　麥冬　桑白皮

杏仁　石羔　枳殼　紫蘇梗　川連　桔梗

右方等分加薑一片、水煎服、

○治口乾咽痛諸方共計十三方

甘桔湯（治痘咽喉疼痛）

甘草　桔梗　玄參　炒芩　水煎頻頻嚥之。

利咽解毒湯（治咽喉疼痛）

山豆根　麥門冬（各二錢）　牛子（炒七分）　玄參　桔梗（各七分）　防風（五分）

甘草（二分）。　加綠豆四十九粒

共水煎頻頻與嚥。初嚥一二口。宜吐去。

三黃熟艾湯（治痘後咽喉痛）

黃連　黃芩　黃柏　艾葉　等分。水煎溫服。

甘露飲（治牙齦腫痛熱爛口臭牙宣吐血咳舌生瘡）

玄參　人參　生地　熟地　黃芩　只殼　石斛　[illegible]
枇杷葉（炙去毛）　甘草　加石羔
各等分水煎頻頻嚥

五鎖匙（治口瘡喉舌痛）
硼砂　朴硝　薑蚕　冰片　共為細末以竹管吹之。

吹口丹（治口疳喉痛）
黃連　青黛　兒茶　冰片
共為細末先將清茶洗淨毒涎然後用管吹入。

赴筵散（治口瘡神效）
薄荷　黃栢　黃連　三味等分或加青黛

共為細末咽痛則吹入口瘡則敷之

射干牛旁湯（治咽痛音啞）
射干　山豆根（各一錢五分）　牛旁　紫草　紫菀（各一錢）　桔梗
石羔（各八分）　木通（八分）　升麻　玄參　蟬退（各六分）　甘草（五分）
加灯心同煎服

一聖散（治咽喉疼痛）
苦參為末吹之即愈

神功散（治痘咽乾作渴）
人參　黃芪　甘草　牛旁　紅花　生地　前胡　紫草
白芍　麥冬　等分煎服

---

紅花湯（治痘熱作渴）
紅花或子隨意煎湯與服其渴立止雖口內如烟似之即解
再加牛旁尤妙。

加味鼠粘子湯（治咽中有瘡作嗄）
桔梗　射干　山豆根　防風　乾葛　陳皮　荊芥
牛旁　連翹　甘草　黃芩（炒）　加灯心
等分水煎頻頻嚥呷自愈

控涎散（治咽瘡）
神砂（三分）　雄黃（二分）　兒茶（五分）　黃栢（五分）　硼砂（四分）
共為細末吹入少許

十金散（治喉咽喉腫痛）
黃芩　黃連（去皮各二錢）　黃栢（去粗皮酒炒一錢五分）　苦參（一錢）　[illegible]
硼砂（三分）　乳香（製三分）　兒茶　雄黃（各五分）
共為細末吹入少許

○治口瘡鼻貝牙疳諸方（共計十五方）

牙疳方（治痘牙疳）
人中白（三錢）　枯礬（二錢）　鹽梅（七個燒存性）　射香（二分）　白蟺子（即螢上虫炮焙一錢）
釘虫（即糞虫洗淨焙乾二錢）
右共為細末先將茶葉及茹根煎水洗去腐肉令見鮮血然後用此藥末敷之　須內服甘露飲外用此末切忌雜

防風 [illegible]

擦牙散（治痘後牙疳一日爛一分急用此方擦之）

銅綠 雄黃 五棓子 枯礬 白褐（煅） 烏梅（煅） 細辛

胡黃連 蕎麥梗（燒灰） 石羔（煅）

共爲細末清茶洗淨然後敷之

清金湯（治口臭咳嗽）

知母 黃芩 石羔 桔梗 甘草 天冬 麥冬 木通

馬兜鈴 枝子 花粉 牛子 等分水煎服

蚕退散（治牙疳）

枯礬二錢 人中白二錢 五棓子二錢 蚕退一錢（燒存性）

共爲細末先以米泔水用蛴螬虫煎水洗淨令去腐肉出血然後將此藥敷上

陰陽散（治赤口瘡）

黃連二錢 乾薑一錢

共爲細末用地蝍虫搗水洗淨乃敷此藥

朱礬散（治白口瘡 又名鵝口瘡）

硃砂二錢 枯礬一錢 加朋砂一錢

共爲細末先用鵝涎洗之即鵝糞泡水洗亦可次敷此藥

洗心散（通治赤白二口瘡）

黃連 歸尾 生地（酒洗） 大黃 麻黃 木通（去粗皮節） 甘草

---

薄荷葉 桔梗 [illegible] 牛蒡 加燈心

各等分水煎服

文蛤散（治麻毒入胃牙斷黑腐出血走馬牙疳）

雄黃五錢 五棓子二錢 枯礬八分 蚕退紙一錢（燒灰）

共爲細末先以米泔水洗淨然後用此末藥敷上

雄黃散（治牙疳）

雄黃二錢 黃柏二錢（去粗皮） 射香五厘

和勻爲末以艾葉煎水洗淨然後用此敷上

凉膈散（治上膈積熱口舌生瘡）

連翹 薄荷 黃芩 枝子 甘草 大黃 朴硝

等分水煎服 咳嗽加桔梗淡竹葉蜜一匙

清胃散（治一切口瘡）

石羔（煅）一兩 寒水石（煅）一兩 再用黃芩 黃柏 枝子 砂仁

知母 花粉 甘草 等分煎水甚濃去查將二石煅後入藥水內碎取起晒乾又入藥水內浸數次然後用二石研末

加入硼砂四錢凡口瘡敷之即愈

綠袍散（治口瘡）

黃芩 黃連 黃柏 甘草 青黛 硼砂

共爲細末以敷口瘡無有不效

凉胃解毒湯（治痘後口臭牙齦潰爛出血）

石羔（[illegible]錢）[illegible]（[illegible]分）[illegible]（[illegible]錢）[illegible]（[illegible]分）[illegible]草（[illegible]分）牛子（一錢）連翹（[illegible]）
金銀花（八分）甘草（六分）石斛（一錢）木通（六分）
共水煎與噙頻頻漸漱不過二劑不痒不臭其熱既解而即愈矣若舍此失治則成走馬牙疳嗟何及乎余嘗經歷此症治之于先則易治之于後則難

**牙痛方**

石羔（二錢）甘草（一錢）防風（七分）黃芩（七分）白芷（六分）　共水煎與噙漱服

○**治諸失血症**（附伏火）共計七方

**三黃解毒湯**（治伏火積熱）

黃連　黃芩　黃栢　梔子　等分水煎服

**犀角地黃湯**（治諸失血）

犀角　赤芍　生地　丹皮（無犀角以升麻代）
以三味等分水煎另將犀角磨汁調服

**二寶散**（治痘色紅紫衄血吐血小便出血）

犀角　玳瑁　二味磨水與服即愈

**斬關散**（治痘紅紫熱鼻血不）

生地　丹皮　黃芩（各五分）升麻（三分）茅花（四分）藕節（一錢）黃豆（四十九粒）
共水煎服

**茅花湯**（治麻症衄血）

茅花　歸尾　丹皮　生地　甘草　血餘

---

加百草霜調服　諸藥水煎

**涼血飲**（治鼻衄血）

花粉（酒炒）麥冬（去心）天冬（去心酒蒸）甘草　桔梗（酒洗）當歸（各五分）白芍（酒炒）
黃芩（酒炒）丹皮（酒炒）知母（各四分）
右生薑一片同煎加髮灰一錢調服一二服立效

**髮灰散**（治衄血）

用少壯無病之人頭髮不拘男婦俱好以皂角煎水洗淨油垢又換滾水洗淨皂角之氣或晒乾焙乾再用新瓦罐一個將髮置罐內以淨瓦片蓋口鹽泥封固然後用炭火圍煆一炷香久取出候冷其灰成塊將灰研末每用二錢以童便七

分酒三分和勻調服其衄立止痘瘡諸失血之症無有不效
又以髮灰吹入鼻中亦可立止

○**治頭痛身痛腰痛痘痛諸方**（共計八方）

**葱白湯**（治頭痛）

葱白及鬚　生薑不拘多少水煎温服

**芎防散**（治頭痛）

川芎　薄荷　防風　白芷　羌活　藁本　法夏　甘草
等分水煎服

**黃芪湯**（治身痛）

黃芪（生）白芍（各二錢）桂枝（一錢）甘草（五分）加防風（五分）

黃芩為引水煎服

羌活當歸湯（治初熱腰背痛）

羌活　當歸　獨活　防風　黃柏（各一錢）　柴胡（一錢五分）　川芎

桃仁　紅花（八分）　用酒煎服

腰痛加防己　蒼朮　續斷　故芷

如神散（治腰痛）

當歸　桂枝　玄胡索　等分為末酒調服

涼血芍藥湯（治痘痛）

芍藥（酒炒）　當歸（酒洗）　紅花　地骨皮　等分煎服

芍藥湯（治頭痛）

川芎　白芍　磨酒服

犀角消毒飲（治痘痛）

犀角　牛旁　荊芥　甘草　黃芩　等分煎服

○治痘出不快（附治痘毒）　共計七分

解毒飲（治痘毒）

金銀花（五兩）　甘草（一兩）　木通　防風　荊芥　連翹　牛子（各一錢）

痘未出而先發腫塊者為痘毒十發九死切不可以痛疹藥敷之若氷伏毒氣其死必矣須用此方酒水各半煎服以解其毒　如泄瀉加訶子　豆蔻　紅赤加炒芩

桔梗　瘡癢加當歸　生地　何首烏　[illegible]通加赤芍　白芷

---

或有寒熱頭疼後未出痘而發腫塊者乃風感膚表濕氣內結毒氣出時而遂發出亦不可視為痘毒妄以草藥敷之須用生韭滴酒磨地坭敷之自愈感濕加蒼朮共磨

紫金散（治痘出不快及痘倒靨遠年惡瘡並治）

紫草　蛇退（炒焦）　牛旁（炒各一兩五錢）　連翹（錢）

共為細末痘出不快用升麻　虫退　笋尖煎湯調服

倒靨用虫退煎水調服

芫荽酒（治麻痘出不快）

用芫荽細切以好酒煎之令勿泄氣候溫將藥從項至足遍身噴之惟頭面莫噴使香氣疏達痘自出矣

連翹升麻湯（治痘熱盛而出不快）

連翹（一錢）　升麻（八分）　黃芩　乾葛（各七分）　防風　荊芥（各六分）　牛旁

麥冬　前胡（各一錢）　共水煎服輕表而涼內也

紫草透肌湯（治痘熱紅紫而出不快及頂陷者）

紫草（一錢）　升麻　防風　荊芥（各五分）　牛子　黃芪（各八分）　木香

甘草　虫退（各三分）　以笋尖同煎服　腹痛加虫退一錢

快斑湯（治痘出不快）

人參　白芍　紫草　虫退　木香（減半）　甘草（減半）

熱甚便秘者去人參加酒炒大黃微利之

防風升麻湯（治痘瘡[illegible]）

防風（去蘆五錢）升麻（去毛一錢）半夏（湯泡七次）蒼朮（泔水浸一宿炒各七錢）石膏（煆）黃芩（酒炒各一兩）白芍　甘草（各二錢）枳殼（麩炒五錢）

右共為末用薄荷生薑煎水調服

**玄參升麻湯**（治熱毒發斑）

玄參　升麻　甘草　水煎服

**陽毒升麻湯**（治熱甚發斑任言癲狂腰背疼痛咽喉燥痛）

升麻（五分）犀角　射干　黃芩　人參　甘草（各二分）

共水煎服惟犀角磨汁調服

**陰毒升麻湯**（治陰毒發斑其斑色淡白）

川椒　升麻　當歸　鱉甲　雄黃　甘草

共為末每服三錢

○治痘實熱稠密紫黑乾枯煩渴譫語一切熱症（共計三十二方）

**大靈丹**（治痘實熱驚譫紅紫焦乾一切惡症）

滑石（飛過三兩）雄黃（飛過三錢）硃砂（飛過五錢）牛黃　冰片（各一錢）犀角（三錢）射香（三分）

共研為細末　又另將升麻　甘草　防風　薄荷　灯草　牛旁　紫草　紅花　黃連　黃芩　赤芍各三錢同煎水二碗煎至半碗擄過去查再加蜜四兩同熬以滴水成珠為度和前藥末作丸如龍眼核大以硃砂金箔為衣每服一丸灯心湯下暑月冷水化下

---

**清地退火湯**（治痘已退熱名曰火裏苗急用此方以退其熱庶免青黑之患）

地骨皮（一錢）地膚子（九分）牛旁（炒八分）柴胡（一錢五分）乾葛（七分）紫草（九分）連翹（七分）當歸（五分）木通（四分）虫退（二分）

用生薑燈心湯引如熱不退再服一劑

**化毒湯**（治痘出而熱不退）

紫草（一錢）升麻（六分）甘草（四分）虫退（二分）地骨皮（一錢）炒芩（五分）木通（六分）牛子（八分）前胡（一錢）

右方治毒涼血毒去熱甚急宜服之方免紫黑之虞

**透肌解毒湯**（治痘毒盛初熱之時寒戰咬牙）

紫草　甘草　當歸　防風　陳皮　赤芍　等分煎服

**消毒飲**（治痘已出上焦蘊熱胸膈不快）

荊芥（二錢）牛子（二錢）甘草（八分）連翹（二錢）木通（一錢）桔梗（二分）枳殼（八分）

**加聖湯**（治痘已出身熱如火）

紫草（一錢）升麻（六分）乾葛（五分）赤芍（八分）甘草（三分）木通（六分）牛子（一錢）前胡（一錢）　加薑葱引　煩燥加麥冬炒芩　體弱加人參

**四聖散**（治痘紫黑不起）

紫草（三錢）黃芪（一錢）甘草（六分）木通（一錢）加炒芩（六分）炒連（六分）紅花（八分）

大便秘加酒大黃　枳殼

**加味四聖散**（治痘出不快身熱不退而色紅紫）

紫草（一錢）黃芪（一錢）人參（八分）川芎（五分）甘草（四分）虫退（三分）木通（六分）

木香（六分）　大便秘加只壳

鼠粘子湯（治痘稠密身熱不退）

牛子（一錢）　當歸（七分）　甘草（四分）　前胡（一錢）　連翹（一錢）　炒芩（六分）　黃芪（八分）

地骨皮（一錢）

涼血化毒湯（治痘紅紫稠密界地不清大熱不退將成焦黑）

紫草（一錢）　生地（八分）　赤芍（六分）　紅花（五分）　蘇木（三分）　防風（三分）　荊芥（三分）　黃連（六分）　牛子（八分）　天麻（三分）　前胡（一錢）　木通（四分）　丹皮（七分）　甘草（二分）

右方活血解毒清熱潤地凡乾紅稠密界地不分者非此不能救其危誠痘家之良方也　但體性弱者宜加人參

炒糯米同煎服

惺惺散（治痘壯熱喘急稠密者甚）

人參　白朮　茯苓　甘草　桔梗　細辛　川芎（各五分）

薄荷　加花粉　前胡（各八分）　水煎服

加味犀角湯（治痘出未盡壯熱心煩口渴舌瘡）

犀角　牛旁（一錢）　荊芥（六分）　甘草（三分）　防風（六分）　升麻（三分）　桔梗（四分）

麥冬（八分）　共煎惟犀角磨汁調服

梔仁湯（治痘煩燥譫語治麻出不快）

山梔仁（炒二錢）　炒芩　石膏（煅各二錢）　知母　杏仁（各一錢五分）　大青

柴胡　豆豉（各一錢）　升麻（八分）　赤芍（一錢）　甘草（五分）

右方非實熱之甚故不輕用惟麻出不快乃謂斑也

人參白虎湯（治痘煩渴身熱）　去人參即白虎湯

人參（三分）　石膏（四錢）　知母（一錢五分）　甘草（三分）

竹葉石膏湯（治痘煩渴）

石膏（二錢）　知母（一錢）　甘草（四分）　麥冬（一錢）　淡竹葉（三十片）

此二方辛甘寒涼之藥痘家切不可用惟麻症宜用之

但體性弱者亦宜加人參方妥

麥門冬湯（治痘疹煩渴吐瀉及痘癰後餘熱）

麥冬　人參　乾葛　赤芍　赤茯苓　升麻（各一錢）　甘草（五分）

石膏（三錢）　水煎服

柴胡麥冬湯（治痘大熱不退）

柴胡　麥冬　甘草　人參　玄參　膽草　水煎服

此方退熱清火熱退即宜止也

小柴胡湯（退潮熱）

人參　柴胡　黃芩　半夏　甘草　加薑棗同煎

柴苓湯（治潮熱泄瀉）

人參　柴胡　黃芩　半夏　甘草　白朮　茯苓　豬苓

澤瀉

解毒防風湯（治痘出齊熱甚）

防風　黃芪　枳殼　荊芥　白芍　地骨皮　牛子

荊防敗毒散（治痘熱[illegible]）

升麻、白芍　甘草　葛根　肉桂　黃芩　川芎　白芷

冬加麻黃、等分煎服

涼血化毒飲（治痘頂焦黑）

歸尾（八分）赤芍（一錢）生地（二錢）木通（六分）連翹（一錢）牛子（一錢）紅花（六分）

紫草（一錢五分）桔梗（五分）山豆根（五分）

毒甚者加燒人糞末一錢調服

解毒化裏湯（治痘稠密紅紫）

桔梗（六分）牛子（一錢）人中黃（六分）防風　荊芥（各四分）紅花（五分）歸尾（七分）

出退（三分）升麻（四分）乾葛（四分）赤芍（二錢）連翹（八分）

加燒人糞末一錢調服　弱者加人參（六分）

四物快癍湯（治痘乾紫焦枯）

當歸（八分）川芎（五分）赤芍（一錢）生地（一錢）荊芥（五分）牛子（一錢炒）升麻（四分）

乾葛（三分）連翹（八分）紫草（一錢二分）地骨皮（一錢）　加燒人糞末調服

化癍湯（治麻痘焦紫）

人參　知母　石羔　淡竹葉　牛子　連翹（去心）升麻

地骨皮　甘草　糯米

大青湯（治麻色乾紫慘暗不明）

玄參　大青、桔梗　人中黃　知母　升麻　石羔

木通　梔子　加燒人糞、大便秘、加酒大黃

玄參解毒湯（治麻焦紫）

玄參（一錢）黃芩（八分炒）梔仁（八分）桔梗（六分）甘草（四分）生地（一錢）乾葛（五分）

荊芥（四分）赤芍（八分）　水煎服

十神散（善解毒熱盛之症）

歸尾　生地　紅花　丹皮　赤芍　桔梗　木通　連翹

大腹皮　川芎　加牛子　前胡　甘草

凡已出未出三日已前痘點乾紅煩燥口渴睡臥不寧一切實熱之症俱可並用盖痘毒之盛必致血熱此方涼血解毒使內外分消表裏並解毒雖盛者亦可平安

羌活散鬱湯（治毒壅熱鬱大熱煩燥腹脹喘急脹目欲怒利嘔不寧）

防風　羌活　白芷　荊芥　桔梗　地骨皮　川芎

連翹　牛子　甘草　紫草　大腹皮

為風寒遏鬱毒氣則以葱為引　餘則用灯心為引

益元透肌湯（治痘壅熱）

桔梗　出退　紫草　川芎　牛子　山查　木通　甘草

人參　糯米（五十粒）灯心（十根）棗（二枚）合煎服　既服前方而痘不肥大須用此方能行氣解毒透肌達表領出元陽

清上散（治熱毒內壅痘色紅紫口舌生瘡）

薄荷　防風（各四分）牛子　連翹　麥冬（各八分）桔梗（五分）甘草（三分）

炒芩　川連（各炒六分）

清解散（治熱毒壅盛稠密紅紫焦枯[illegible]）

防風　荊芥　蟬退　桔梗　川芎（各四分）前胡（八分）乾葛（五分）
升麻（五分）黃芩　黃連（各六分）紫草　木通　牛子　連翹（各八分）
甘草（三分）山查（八分）

○起紫黑二陷諸方（共計二十二方）

無比散（起痘紫黑陷及火裏黑點子）
硃砂（一錢）片腦　麝香　牛黃（各五分如無牛黃用七製膽星）胭脂（共一錢）蟾酥（一分錢）共為細末以猪尾血和水調服

小無比散（治痘大熱不退煩渴不安焦紫黑陷）
滑石（飛過六兩）石膏（煅飛過一兩）甘草（五錢）寒水石（煅五錢）川鬱金（甘草水煮乾五錢）
共為細末用犀角磨水調服。紫陷加川甲末一分麝香五厘以紫草煎湯調服即起

無比六一散（治痘紅紫黑陷狂譫煩渴）
滑石（飛過六兩）甘草（一兩）辰砂（二錢）牛黃（一錢）硃砂（二錢）
共為末初熱用敗毒散煎湯調下既出後用紫草煎湯調服　譫語用灯心湯調下

龍腦膏（治痘出未透心狂見鬼陷伏等症）
梅花不拘多少曬乾為末　加冰片少許。共研為末。以猪心血和勻為丸　狂譫者用灯心湯引　紫陷者以紫草煎湯調之加酒數匙化下。

威靈仙龍腦散（起痘黑陷）
威靈仙（炒一錢）冰片（五分）共為細末

無價散（起痘紫黑陷）
以狂病小兒糞陰乾于臘八日用鑵盛之鹽泥封口將炭火圍煨為末加片少許

紫草膏（起痘紫黑陷）
蘄虫（酒洗三錢）全蝎（去首尾酒洗一兩）麻黃（去節一兩）白附（五錢）紫草（一兩）川甲（三錢）蟬退（三錢）蟾酥（一錢）人中黃（五錢如無無價散五錢）
右共為末另將紫草二兩煎去渣熬成膏再加蜜二兩入好酒半盞煉過與紫草膏和勻調前藥末為丸初熱用敗毒散煎湯化下初熱發驚以薄荷灯心芍白湯化下　痘紫黑陷以紫草煎湯化下　痘色淡白伏陷以人參煎湯入酒數匙化下即起

紫草飲（治痘紅紫不起）
以紫草五錢醇酒一盞濃煎與服能使黑點轉紅蓋紫草能解血分之毒故也

紫黃飲（治痘紫黑陷）
紫草茸（二錢）人中黃（二錢）人參（二錢）　一二服開盤轉紅活。

麻黃飲（治痘乾枯倒靨黑陷）
用麻黃去節五錢蜜炒良久然後用水濃煎乘熱服之以被蓋覆令出見汗其痘即起

白花蛇散（起黑陷）

白花蛇（炙黃二兩）母丁香（三十粒）　共爲末熱酒調服其效如神

絲瓜化毒湯（治痘乳紫黑陷）

絲瓜（乾取近蒂五寸）　白芍　升麻　甘草　黑豆　赤小豆

犀角屑　以絲瓜乾爲君餘藥爲佐使水煎入好酒數匙與

服立效

麻黃解毒湯（起痘紫黑）

麻黃（去節）升麻　防風　黃芩（炒）黃栢（炒）玄參　牛子　人參

甘草　石膏（煅）木通（去皮節）連翹

小靈丹（治紅紫黑陷一切惡症）

硃砂（焙乾五錢）　雄黃（各一錢）乳香　沒藥（各一錢）麝香（三分）大蜘蛛（四[illegible]）

共爲細末取猪心血雞冠血和勻爲丸身無熱者用

酒化下熱者用灯心紫草湯下即時紅活而起如服此不

效決無生理

百祥丸（治黑陷）

紅芽大戟（煮軟晒乾去骨復入漿汁中焙乾爲末作丸如粟米大每服二三十丸用赤芝麻煎湯送下）

（一名必勝膏）

牛李膏（治黑陷）

牛李子（一名鼠李子又名鼠諸子又名猪李子烏留子各隨地而呼名也李子不拘多少將杵爛取汁于瓦銚內熬成膏又用其穗亦可爲末作丸杏仁煎湯下牛李子生道旁至秋結實黑而圓者是）

大造保童丸（治黑陷）

三字金丹（治黑陷）

一孿子（人胎骨炙）二狗子（狗胎骨炙）三猫子（猫胎骨炙）麝香　共爲末

至寶丹（治紫黑陷）

紫花地丁　山慈菰　河車（金線重）

成腹根　麝香（將大米置淨室與大食飽取其糞洗淨炙乾研末加入射香三分）

一粒金丹（治黑陷）

膃肭臍（五分）臍帶（燒灰）鴉片（二分）冰片（二分）麝香（二分）蚕蛾（燒灰存性四分）

共爲細末酒調服。

奪命丹（治黑陷）

蟾酥　牛黃（各五分）硃砂（一錢）雄黃（一錢）冰片（三分）

共爲細末以猪尾血和勻爲丸如麻子大將薄荷煎湯送

下其痘立即轉色

談笑博金丹（治紫黑陷）

用虎　猪　犬　羊　四獸天靈蓋骨以酒洗淨、炙酥細研

再加麝香少許共爲末又將紫草茸煎酒調服其痘即起

以上六方俱有起死回生之妙

○起灰白二陷虛寒等症（共計三十二方）

內托散（治痘根窠不紅灰白陷伏虛寒等症）

人參　炙芪　炙草　川芎　當歸　防風　白芷　桔梗

白芍　厚朴　木香　肉桂

用黃芪原家薑棗同前服　一色紅紫者去肉桂木香加紫草虫退發不灌者用酒水各半煎加糯米（不食）加人乳下香

千金內托散（治痘色淡白不起）

人參八分　炙黃芪一錢　炙草四分　川芎四分　當歸八分　白芍　白芷各六分　桔梗四分　厚朴四分　牛子六分　地骨子五分　木香三分　山查六分　肉桂五分　川甲三分　加糯米一撮同煎服

四君子湯（養胃補氣）

人參　白朮　茯苓　炙草　薑棗引

加味四君子湯（和胃助氣　即小異攻散）

人參　白朮　茯苓　炙草　陳皮　木香

保元湯（善養元氣）

炙芪三錢　人參一錢　炙草五分　或加肉桂

大保元湯（治痘頂陷皮薄而軟）

炙芪三錢　人參一錢五分　炙草七分　川芎一錢　肉桂一錢　白朮一錢

加薑棗同煎　氣不行加木香

補中益氣湯（治虛弱與身熱痘）

炙芪　人參　炙草　當歸　白朮　陳皮　升麻　柴胡

參歸鹿茸湯（善于托膿）

人參　炙芪　當歸　鹿茸　川芎　炙草

---

者方氣血兼補托漿起頂其妙如此

人參歸芪湯（治痘頂不起血不紅活雖或行漿而皮軟薄氣血兩虛）

炙芪　人參　當歸　川芎各錢　炙草　紅花各六分　肉桂

山查　白朮各八分　糯米一撮同煎

痘色白者去紅花加鹿茸一錢

生脉健脾湯（治痘軟皮薄剝色淡白）

炙芪一錢五分　人參一錢　炙草五分　當歸　川芎各八分　白朮（糯米酒洗）八分　肉桂五分　茯苓七分　紫草（酒洗）三分　薑棗糯米同煎

益氣不足補氣血不足補脾脾旺則血生也

通人散（治痘出不快或出而不紅活者）

人參　陳皮　薄桂各八分　川芎　大生地　白芍各一錢

當歸一錢五分　紫草　紅花各四分　木香　甘草各三分

加荔枝殼十箇　雞汁一鍾　棗三枚　糯米一撮同煎　初服至項　再服至臍　三服到脚　痘方出時加知母

升天散（治痘灰白陷伏或清水不成漿）

人參　炙芪各一錢　白芍　當歸各七分　川芎　陳皮各四分　炙草　桑蠶各三分　川甲五分　肉桂五分　木香三分　山查八分　棗子生薑引

嘔吐煨薑引　腹痛加神曲　煩燥加麥門冬　渴加麥冬　五味　吐瀉加藿香豆蔻

化毒湯（治痘灰白不起漿清皮薄）

屋韮霍（七分）則中獠人参（六分）川甲（一分炒三）炙芪（一錢五分）川芎（五分酒洗）當歸（酒洗一錢）甘草（二分）木香（二分）　又方加枸杞（一錢）黃豆（九粒）痘色白加鹿茸（一錢酥）

浮萍補漿湯（治痘灰白不起漿清皮薄）

浮萍藿（三分）人参（八分）川甲（三分）川芎（四分）當歸（一錢）炙芷（三分）炙芪（一錢六分）白术（七分）山查（八分）陳皮（五分）官桂（四分）木香（二分）黃豆（廿粒）笋尖（三個）或加防風（三分）白芷（六分）　糯米一撮龍眼三个同煎人好（酒数沖服）

保生散（治氣血兩虛灰白不起）

紫河車（取少壯無病婦人初生二胎胞衣酒洗去紅光蒸焙乾爲末）瓶析（一斤酥炙）鹿茸（酒酥炙五錢）　共爲末每服一錢川保元湯煎水調服

異攻散（治痘灰白不起泄瀉腹脹非虛寒莫輕用）

人参　白术　茯苓　當歸　陳皮　半夏　丁香　厚朴　木香　豆蔻　附子　肉桂　此方調順陰陽善救表裡

內助散（治灰白不起）

炙芪　人参　白术　茯苓　當歸　陳皮　川芎　半夏　厚朴　肉桂　山查　加薑棗糯米同煎　不食加人乳丁香藿香　癢及塌陷加防風附子　（渴）加麥冬　（瀉）加猪苓澤瀉瀉不止加訶子豆蔻

回生起死丹（治痘灰白不食嘔吐腹脹及瀉清水手足厥冷）

丁香（九粒）乾薑（一錢）　二味用水煎服被蓋片時令脾胃溫煖陰

---

退陽回痘自紅活

參苓白术散（治痘當靨不靨身熱口渴）

人参　白术　茯苓　炙草　乾葛　木香　藿香　麥冬　炙芪　等分煎服

秘傳返魂丹（治痘灰白不起七日至十二日皆可服神妙無比）

天靈盖（取狗生者用長流水洗之陰乾二兩以淨水洗淨再懸乾研末用以此二味爲主再用）上好硃砂二兩同灵盖共盛絹袋中人参（二兩）山查肉（二兩）黃芪（四兩）白术（二兩）川芎（二兩）（以上各味各用醇酒灵薔酥沙）當歸（四兩）青皮（一兩）麥冬（二兩去心）紫草（一斤二兩先浸）人藥（緩火）枝殼（二兩）陳皮（二兩）附子（一兩）肉果（八錢包煨）糯米（四兩同煎長乾）（水煎紅花一兩酒水各半煮乾）甘草（一錢炙八）丁香（五錢）俱老米湯煮乾乳汁二碗各煮乾用

童便（男女各二碗煮乾）官桂（一兩水浸一宿取起待諸藥煮完用杜水浸又用一兩浸）

各依分兩須一日煮一味藥每煮一藥將灵盖硃砂入內同煮煮乾取起焙乾復入第二味藥同煮俟諸藥煮完方取出絹袋內二物陰乾研爲細末用兎血爲丸如黃豆大金薄爲衣入瓷罐盛之黃泥封口埋土中一七然後取用每用一丸加雞冠血或酒或乳磨服服後以被蓋片時令取微汗爲度少時痘自紅活起頂其效如神但人参價重人或見方不用愚謂須用諸藥同製且缺人参俟服丸時

用人參湯化下

胎元散（若起灰白陷伏）

五月臍胎是胎元　焙乾爲末不輕傳　氣血兩虛當用此
酒調和服自安然

大補湯（治痘氣血兩虛）

人參　白朮　當歸　川芎　炙草　白芍　炙芪　官桂去皮　大生地（酒洗）　白茯苓　等分煎服

溫膽湯（治痘內虛外感鼻流清涕欬嗽惡風自汗煩燥痘淡白）

茯苓　陳皮　半夏（湯泡七次）　甘草　枳殼　竹茹（一團）

各等分薑棗同煎服

中和湯（治同上）

人參　黃芪　厚朴（薑汁炒）　白芷　川芎　當歸　甘草
桔梗　肉桂　防風　藿香　水酒各半煎服

寒戰加附子

陳氏木香散（治痘灰白不起吐瀉腹痛）

木香　大腹皮（黑豆汁洗淨）　人參（各二錢）　赤茯苓　前胡　青皮
半夏　丁香　柯子肉（煨去核）　炙草（各一錢）　桂心（二錢五分）

共爲細末每用薑棗煎水調服

參苓和脾散（治脾胃兩虛泄瀉腹痛痘不起發）

人參　白朮　茯苓　淮山　連子　桔梗　以仁　藿香

---

砂仁　炙草　虛甚加乾薑

固陽散火湯（治痘初出皮白色淡）

人參　黃芪　甘草　當歸　升麻　葛根　荊芥　防風
生地　木通

四君子快斑湯（治痘氣虛泄瀉）

人參　黃芪　白朮　茯苓　甘草　官桂　白芷　荊芥
防風　陳皮　白芍　等分煎服

大補保命丹（治痘皮薄易破）

人參　黃芪　當歸　大生地　川芎　赤芍　牛蒡
連翹　防風　荊芥　官桂　甘草　入燒人糞同服

十全大補湯（治痘頂不肥潤漿不滿足）

當歸　川芎　大生地　白芍　人參　白朮　茯苓
炙草　肉桂　乾薑　加鹿茸

溫中益氣湯（治痘氣血兩虛透發不出及灰白不起）

人參　白朮（各六分）　木香（二分）　黃芪（錢二）　當歸　茯苓（各八分）　川芎
炙草（各四分）　白芷　防風（各三分）　山查（六分）

生薑一片棗二枚同煎服

保嬰百補湯

當歸　白芍　大生地　白朮　茯苓　人參　黃芪
炙草　加棗子二枚糯米一撮同煎服

## 〇通治五陷諸方 共計廿二方

**猪尾膏**（起陷發痘寧心）

用猪尾刺令滴血。加氷片一分　人參三分、前湯調勻服

凡痘倒靨心神不寧者用片腦五分辰砂五錢爲末以猪尾血研勻成膏以木香煎湯化下。

痘不作漿者用片腦一分猪尾血二錢同研白湯化下。

**獨聖散**（治痘頂不起能起一切陷伏）

川山甲（炒取尾及前足者佳）一錢麝香（五分）共爲末　用木香煎湯調服

痘紫黑者以紫草煎湯調服。

**大聖散**（治痘出不快一切陷伏不起之症）

川甲（酒炒一兩）甘草（三錢）雄黃（二錢）硃砂（二錢）紫草茸（三錢）射香（二分）

共爲細末用酒調服　痘紫黑者以紫草煎湯加小無比散共調服。虛弱者用人參煎湯調服　此方最能攻毒最神效而且穩也

**人牙散**（治一切陷伏之症）

人牙（白者酒火煅存性入紫草汁淬三次爲末）

用雞冠血調成膏將人乳好酒各半入葱白一撮同煎化下。凡服此散不可過多恐以三分爲度多則陽氣盡洩於表必主痘瘡潰爛。

**無價散**（治痘危險黑陷咬牙此救急之良方也）

人牙散一錢[illegible]黃（五分）硃砂（五分）牛黃（五分）

共爲細末以荔枝煎湯調服

**回生丹**（治紫黑灰白陷伏諸證一切危證）

天靈蓋（四兩[illegible]）辰砂（二兩如前共裝袋中同諸藥逐次同煎）川芎（二兩水洗焙乾）白附（一兩酒煮乾）黃芪（三兩）人參（二兩）牛子（一兩炒）丁香（五錢）陳皮（一兩）甘草（一兩）官桂（五錢）前胡（五錢）白朮（一兩）肉豆蔻（五個麵裹火煨）[illegible]當歸（二兩酒洗焙乾）白芍（一兩）紅花（一兩酒煮乾）各一兩栀子（二十個水煮乾）[illegible]

諸藥俱入靈蓋辰砂全煮候斷火取出取出靈蓋辰砂將陳酒淘淨陰乾細研爲末。加木香（一錢）紅麯（四錢）紅參（炒）川甲（一錢）麝香（五分）合靈蓋辰砂共爲細末用兎血和勻爲丸芥豆大

**龍虎丹**（治一切陷伏）

天靈蓋（三錢酥炙）川山甲（炒四錢）辰砂（六錢）射香（五分）全蝎（二錢）

右共爲末又以麻黃紫草升麻荔枝殼四味熬膏爲丸如菉豆大每酒服　此方最妙。

**二花散**（能起五陷）

[illegible]梅花（陰乾不見火制多少）麝香（去毛殼研細聽用）桃花（陰乾）山查（去核炒爲末聽用）小絲瓜（陰乾爲末）陳皮（去白爲末）人參（爲末）黃芪（炙爲末）硃砂（研末）紫河車（酒洗去筋蒸爲末）鹿茸（酒炙）川山甲（取前足者炒四兩）仙蟾皮（去四肢刺）酒洗焙乾人牙（火煅猪汁淬七次）天靈蓋（洗淨炙酥）

以上諸藥各預備法製爲末聽用

一痘已出未出不起不發隱在皮膚之間并癍不出者用

梅花一（兩）桃花（二錢）絲瓜（五錢）朱砂（二錢）石砂（一錢）炙草一（錢）

共爲末每服三五分參蘇湯調服

一痘不問前後凡與防寒戰者用

桃花（五錢）川山甲（一兩）仙靈脾（五錢）麝香（五分）

共爲末內托散送下

一痘氣血兩虛灰白水泡痒塌等症俱用後方

黃芪（二兩）人參（一兩）甘草（五錢）紫河車（一兩）梅花（一兩）鹿茸（一兩）天靈蓋（一箇）

共爲末每服八九分用內托散煎湯送下氣實者加山查

陳皮各五錢

水楊柳湯（治痘紅紫乾燥不起水）

水楊柳　古方所載是木細葉紅梗枝上有圓草葉有白鬚散出此等俗呼爲水楊梅以其葉似楊梅也余未試用余常用者乃是草生水邊其葉如柳葉其梗至秋則紅亦無菓結此草之性涼血解毒善解痧疹惡毒冬用枝梗及根春夏秋用枝葉凡痘紅紫乾枯不起水者內服活血解毒之劑外用水楊柳草煎水洗之其法將水蘸藥水拭印頭面遍拭數次立見光潤即具行漿之勢所未洗者其色不變此立效也

○治痘四時不起諸方（共計四方）

平胃快斑湯（治痘傷食不起發）

蒼朮（去梗皮炒）厚朴（薑汁炒）炙草　陳皮　防風　羌活　猪苓

茯苓　等分煎服

寬中快斑湯（治痘傷食不起）

陳皮　半夏　白朮　青皮　枳殼　山查　神曲　砂仁

黃連　甘草　厚朴　連翹　木香　等分煎服

托裏快斑湯（治痘毒壅不起）

羌活　防風　荊芥　升麻　桔梗　牛子　連翹　乾葛

甘草　虫退　笋尖湯引

補脾快斑湯（治痘手足不起）

人參　黃芪　川芎　甘草　防風　防已　官桂

等分水煎服

○養血活血諸方（共計七方）

四物湯（養血）

川芎　當歸　地黃　白芍

補元湯（治痘氣充而血不足頂雖充而色不紅腳不聚）

川芎（六分）當歸　白芍　大生地（各一錢）紫草（七分）紅花（五分）陳皮（三分）

白朮（一錢）甘草（三分）　用水酒各半糯米三十粒棗一枚同煎服

此方養血活血

當歸活血湯（治痘色紅紫滯血不活者）

當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 紫草 等分煎服

**活血散**（治痘焦紫）

當歸 赤芍。紫草 川芎 紅花（各五錢） 血竭（一錢）。木香（二錢）

共爲末每服一二錢。用好酒調服。熱甚痘焦紫者。酒煎紫草調服

**芎歸均氣飲**（治痘出如豆殼蛇皮。氣至而血不隨者）

當歸 川芎 赤芍 麥冬 人參 防風 荊芥 青皮
木香 官桂 等分煎服

**四物快斑湯**（治痘血熱。乾燥焦枯）

當歸 川芎 赤芍 生地 荊芥 牛子 連翹 升麻
葛根 紫草 地骨皮 甘草

加無價散一錢調服。前藥等分水煎服

**養榮湯**（治麻痘色白）

人參 當歸 紅花（俱酒洗） 赤芍（炒 桂水） 甘草

○治癢塌諸方（共計七方）

**助陽丹**（治痘痒塌。不起根窠不紅）

炙芪（一錢） 炙草（三分） 川芎 人參（各一錢 酒炒） 當歸（酒洗一錢） 白芍（酒炒二錢）
紅花（五分） 陳皮（八分） 官桂（三分）

加薑棗煎服。不食加山査厚朴各五分

**獨參湯**（治痘痒塌）

白花蛇（酒炙爲末）。人參煎湯調服。可以止癢

**蟬退散**（治痘發癢）

虫退（一兩） 地骨皮（一兩） 白芷（五錢） 共爲末酒調服

**參芪內托散**（治痘氣虛癢塌及泄）

人參 炙芪 當歸 川芎 防風 厚朴 桔梗 白芷
官桂 紫草 木香 加糯米等分煎服

**加味四聖散**（治痘痒。便秘）

紫草 木通（去節） 枳殼（炒） 黃芪 桂枝 大黃（酒蒸） 等分煎服

**調元托裏湯**（治痘痒。塌泄瀉）

人參 炙芪 當歸 訶子肉 陳皮 桂枝（去皮） 羌活
防風 荊芥 赤芍 木香 紅花 等分煎服

**消風解毒湯**（治痘發癢）

防風 荊芥 升麻 白芍 桂枝（去皮） 牛子 乾葛 虫退
各等分煎服

凡痘癢多屬氣虛或血熱。治法總以補氣活血爲主。而或外用生地紫草紅花涼血之藥搽之。亦可止痒

○治痘爛損破諸方（共計九方）

**敗毒散**（治痘潰爛。流水不止）

取多年蓋牆屋之爛草。或稻草。此久經風霜雨露之滋。而感天地陰陽之氣。善解瘡毒而收濕氣也。取來洗淨[illegible]晒[illegible]

窠末摻于爛瘡之上其效如神

〔灰草散〕（治痘潰爛）

荔枝殼（微炒存性）　草紙（燒灰存性）　多年陳茅草（晒乾）

三味共爲細末摻于爛處卽收水結痂

〔豆灰散〕治痘潰爛

黃豆燒灰爲末摻之如痘風癬以黃豆殼煎水洗卽愈

〔生肌散〕（治瘡痘不收瘡痂爛不斂）

地骨皮　黃連（生用）　黃柏（生用）　五倍子　甘草（生用各等）

共爲細末摻之卽愈

〔綿繭散〕（治痘瘡潰破膿水不止）

取出蛾繭不拘多少將生明礬爲末塡入繭內燒成灰爲末

摻之其水自乾而愈

茶葉方（治痘潰爛遍身無皮膿水流出不能乾者）

多取茶葉揀去粗梗入水一煮卽取起將茶葉鋪于床上用草

紙隔一層令兒睡上只睡一宿膿水盡乾

〔乳香韶粉散〕（治痘遍身膿水不絕如瘡痂不落）

乳香（二錢）　韶粉（一兩）　輕粉（二錢）　共爲細末以猪油調勻敷之卽愈

〔白龍散〕（治痘潰爛）

用陳久乾牛糞燒過取中間白者研末敷之

〔當歸涼血湯〕（治痘出血）

---

當歸　生地（紅花俱酒洗）　地骨皮　牛蒡　連翹　甘草

人參　黃柏　等分煎服

○治痘後灌漿結痂諸方（共計五方）

〔回漿散〕（治痘不收漿結痂）

何首烏　白芍　炙芪　炙草　人參　白朮　茯苓

淮山　以仁　或以蒼朮易白朮　等分煎服

〔象牙散〕（治痘難收漿）

人參　炙芪　白朮（各一錢）　炙草（六分）　茯苓（一錢五分）　何首烏（一個）

加糯米一撮棗二枚同煎又加象牙末一錢調勻服

〔防濕湯〕（治痘濕新收）

羌活　蒼朮（炒）　防風　赤茯苓　猪苓　澤瀉　木通（去節）

白朮　官桂　等分煎服

〔桂枝解毒湯〕（治痘天寒氣鬱過而難收靨）

猪苓　澤瀉　麥冬　地骨皮　木通　黃芩　甘草

連翹　薄桂　等分煎服

〔八物湯〕（治痘瘡復灌漿膿如瘡疥）

人參　黃芪　甘草　白朮　當歸　川芎　白芍　地黃

等分加蓮米同煎服

○治痘痂難落諸方（共計五方）

〔人參固肌湯〕（治痘發表太過肌肉不密而痂難落）

第一〇一一冊　續修四庫全書

人參　黃芪　甘草　當歸　蟬退　加糯米一撮
等分水煎服

**白鷹糞散**（治痘痂不成以成痂疕）
白鷹糞（取白色者燒灰）　馬齒莧（曬乾燒灰）
二味和勻用蜜調敷自愈

**馬齒莧散**（治同前）
用馬齒莧搗汁與豬膏石蜜熬成膏敷上

**猴猻散**（治同上）
白猴猻（炒）去皮　防風　羌活　甘草
各等分為末用水調敷其上

**羊胴骨散**（治痂不落）
羊胴骨髓（一兩）　輕粉（一錢）
先將羊胴骨研末再入輕粉共研成膏敷上自愈。

○痘疔諸方（共計五方）

**四聖膏**（治痘疔）
珍珠（七粒）　豌豆（四十九粒炒）　髮灰　胭脂水
共研為末先將銀針刺破痘疔去其惡血復將此藥水填
入自愈

**二聖散**（治痘疔）
雄黃（二錢）　紫草（三錢）　共為末用油胭脂調勻搽之

**會氏敷藥方**（治痘靨後疔潰成坑發見筋骨用此敷之）
赤石脂（二錢）　伏龍肝（一錢）　陀僧（二錢水飛過）　輕粉（一錢）　髮灰（五分）　黃丹（八分水飛過）
生黃柏心（為末一錢）　乳香（三分）　沒藥（三分）　杭粉（煅一錢）　冰片（五厘）
有臭氣加阿魏三分　共為細末敷之外用膏藥貼上
內服人參敗毒散　加川甲　蟲退　黃芪　連翹

**拔毒膏**（治痘疔）
雄黃　輕粉　共為末用胭脂水調敷立效

**張氏拔疔散**（治痘疔神效）
明雄黃（二錢）　胭脂水（五錢）　共為細末凡遇痘疔賊痘刺去黑血以末敷之無有不效蓋雄黃能拔毒胭脂活血血活毒解自無慮

也　又手足諸處有疔在肉內而疼痛者以手摸之則內有核止用艾火灸之自愈

○治痘後餘毒諸方（共計二十方）

**人參敗毒散**（治餘毒發癰）
人參　赤茯苓　羌活　獨活　前胡　柴胡　薄荷
枳殼　川芎　桔梗（各等分）　甘草　牛蒡　防風　荊芥（各等分減半）
連翹　金銀花（各等分）　白芷（各等分）　乳香　沒藥（減半）　餘毒在頭加
升麻　毒在上身倍加桔梗　毒在手上加桂枝　毒在腰
間加杜仲續斷　毒在腿腳加牛膝木瓜　共水煎服

**消毒飲**（治痘後餘毒癰腫）

第一〇一九冊　續修四庫全書　8

防風　荊芥　甘草　牛蒡　連翹　金銀花　水煎服

活血解毒湯（治餘毒）

防風　荊芥　生地　赤芍　當歸　連翹　牛子　黃連

柴胡　甘草　茶　薄荷　川芎　木通　等分煎服、

大連翹飲（治痘後餘毒發熱赤腫）

連翹　防風　牛子　荊芥　當歸　川芎　柴胡

梔子　蟲退　赤芍　木通　車前　滑石　甘草

等分水煎服

解毒牛黃丸（治痘後餘毒痰壅驚搐）

鬱金（一錢）　牛黃（一錢）　杏仁（十四個）　巴（去油五分）

共為末米糊為丸薄荷湯下

金華散（治痘後諸瘡）

黃丹　黃芩　黃柏　黃連　大黃（俱生用）　輕粉（各等分）　麝香（少許）

共為細末瘡濕爛則摻之瘡乾則用豬油調敷

必勝膏（治餘毒紅腫）

用馬齒莧（搗汁）　豬膏　石蜜　共熬膏敷腫處即消

三豆散（治同上）

黑豆　菉豆　赤小豆　共為末敷之

八參清神湯

人參　黃芪　甘草　當歸　白朮　茯神　麥冬　陳皮

棗仁　黃連　各等分加棗子糯米煎服

玄參化毒湯（治痘後赤火丹癖）

玄參　歸尾　紅花　連翹　石羔　赤芍　地骨皮

防風　荊芥　木通　等分加淡竹葉煎服

蜞蝛法（治症同上）

用泥漿於腫處圍住內注冷水取馬蝗蜞三五條放於洗腫圍內令蜞吮去惡血則毒從而解或謂用瓦鋒刺之亦可然終不若蝗蜞吮動血路而毒洩乃盡也

黃連除䘌湯（治狐惑瘡）

黃連（二錢）　蘆薈（一錢）　使君子肉（二錢五分）　蕪荑（一錢五分）　虫退（燒存性二分）

川楝子（去核一錢）

共為細末以烏梅洗淨去核搗膏和勻為丸米飲下

防風葛根湯（治痘後發瘕）

防風　乾葛　升麻　赤芍　甘草　水煎服

蜆子湯（治同上）

取蜆子以水養五七日取其水洗之或用蜆衣煎湯洗之亦可蜆生魚池坭中形如蚌蛤用之取漈俗呼漈蜆

十三味敗毒散（治痘後餘毒發症）

當歸　白芷　川甲　金銀花　防風　乳香（製）　甘草

陳皮　赤芍　皂角刺　川貝母　天花粉　沒藥

等分酒水各半煎服

加味升麻湯（治痘後身熱經月不除）

連翹　升麻（俱酒洗）葛根　梔子（酒炒）黄芩（酒炒）桔梗（米泔水炒）麥冬（去）

木香（酒洗磨汁）滑石　牛蒡（酒）　加淡竹葉　各等分水煎服

仙方活命飲（治痘後癰痘腫毒）

白芷　防風　乳香　没藥　甘草　連翹　川甲　赤芍

歸梢　天花粉　薄荷　白芨　貝母（各一錢）金銀花　陳皮

各一錢五分　用酒水各半煎服　體弱各入參

隔蒜灸法（治痘疔及一切痘癰方起之時最効）

用大蒜瓣切三分厚安放疔癰頂上再將艾葉為丸安放蒜

上灸之初灸一壯若痛必灸至不痛方住初灸一壯若不痛必灸至痛甚方止其所灸之處至三五壯必有汁水流出其毒從此洩矣只用膏藥貼之　又方用蚯蚓泥以小便調勾作餅様於痘頂而灸者更妙蓋燕涎能化痰解毒比之蒜法尤良也余每用之悉效

羌活散（治痲後攤毒股節疼痛）

羌活（一兩）川甲（一兩）大黄（五錢）全蝎（五十个）一葉金（三條去頭足）白芷梢（五錢）

甘草節（一錢）乳香（二錢）牙皂（一錢）

共為末每服一錢好酒送下以發汗為度

秦艽（治熱不退）

---

蔡光（洗）潮煎服尤效前也

○治手足牽強麻木諸方（共計三方）

參附湯（治痘後手足麻木無汗）

人參　附子　防風　羌活　麻黄　加葱白同煎服

芪附湯（治痘後發熱手足搐動常出汗）

黄芪　附子　當歸　防風　全蝎　加若藤　續斷

桂枝　五加皮　石南藤　酒煎服

當歸桂枝湯（治痘後手足不能伸屈）

當歸　川芎　白芍　黄芪（生用）甘草　薄桂　黄柏（去粗皮）

蒼朮　加大生地　勾藤　氣虛加川烏以行經　或加人

參　加減風寒而骨節痛者加羌活防風以散之　又有血氣兩虧而手足拘攣者用十全大補湯加續斷骨碎補煎酒與服即愈

治痘後痢痢及下膿血諸方（共計九方）

韭白湯（治下利膿血身熱）

韭白　豆豉　梔子　同煎服

胃風湯（治下膿血）

人參　白朮　茯苓　官桂　川芎　當歸　赤芍

加粟米同煎

河間駐車丸（治痘後下利膿血腸垢）

當歸（一兩）川連（二兩）乾薑（炮一兩五錢）三味共爲末又用阿膠一兩炒成珠再用醋煮膠和末爲丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

黃連阿膠丸（治熱甚下痢不止）

川連（炒一兩）阿膠（炒一兩）茯苓（一兩）以黃連茯苓爲末用水調阿膠末共和爲丸如梧桐子大服

升麻滲濕湯（治麻痢滯下）

猪苓　澤瀉　滑石　赤茯苓　甘草　川連（酒炒）升麻

黃芩芍藥湯（治麻滯下）

黃芩（炒）白芍　升麻（各一錢）甘草（一錢）煎服

三黃丸（治麻後赤白下痢裏急後重）

黃芩　川連（炒）大黃（俱酒蒸過）各等分爲末米糊作丸如梧桐子大白湯送下

香連丸（專治痘痢）

川連（二兩用吳茱萸四兩煎水浸連炒乾去茱萸）木香（二兩忌火）共爲末以醋糊作丸如梧桐子大老米湯

黃芩湯（治赤白痢）

黃芩　黃連（俱炒）當歸（酒洗）川芎　人參　木香（磨）青皮　只殼　檳榔　甘草　各等分水煎加益元散調服

○治痘後浮腫諸方（共三方）

四苓五皮飲（治痘後浮腫）

人參　白朮　茯苓　甘草　麥冬　黃芩　大腹皮（洗淨）桑白皮　生薑皮　茯苓皮　陳皮　猪苓　澤瀉　木通　滑石　木香　水煎服

加味五皮飲（治傷風濕浮腫）

羌活　五加皮　蒼朮　桂皮　木通　防己　防風　甘草　桑白皮　薑皮　猪苓　澤瀉　水煎服

張氏退腫湯（治浮腫）

蒼朮　厚朴　陳皮　香附　木香　赤茯苓皮　大腹皮　澤瀉　猪苓　木通　車前　薑皮　山查　神曲　牛子

○治盜汗自汗二方

當歸六黃湯（治自汗盜汗）

當歸　黃芪　黃芩　黃連　黃栢（俱炒）熟地黃　生地黃　各等分煎服

當歸湯（治盜汗）

當歸　黃芪　生地　麥冬　甘草　黃連　白芍　浮麥　用猪心以竹刀剖開煮湯然後用猪心湯煎藥服立效

○避穢諸方（三方）

避穢丹

蒼朮　甘松　細辛　乳香　芫荽　共爲末燒烟熏之

古聖散（治痘瘡為邪穢所觸而不起者）

人參　黄芪　當歸（各二錢）　官桂　甘草（各五分）　川芎　防風

桔梗　木香　白芷　厚朴　紫草（各一錢）

各依分兩水煎溫服　外用沉檀荊芥燒烟薰之

和平湯（治痘瘡為穢所觸）

人參　黄芪　當歸　川芎　炙草　防風　白芍　白芷

肉桂　木香　乳香　藿香　丁香　檀香　厚朴　陳皮

此方調和氣血解穢除氛用水煎服立效

治眼目諸方（共十二方）

洗肝散（治痘毒攻眼紅腫遮睛）

川芎　歸尾　防風　羌活　薄荷　梔子　甘草　膽草

白芍　各等分水煎飯後服　睛痛倍膽加石燕谷精草蒙

豆皮　有翳膜加蟬退白蒺藜木賊　熱甚便秘而赤痛

畏火者加炒芩炒連大黄酒煎

地黄散（治痘毒入眼紅赤腫痛白膜遮睛）

生地　當歸（酒焙乾）　防風　蟬退（洗去七）　羌活　白蒺藜（炒去刺）

谷精草　木賊（各二錢）　玄參（五分）　苑蒺藜（炒去）　犀角末（各一錢）　黄連

大黄　甘草　木通（各一錢五分）

共為細末用羊肝煎湯調服

發雲散（治痘後眼生瞖翳）

防風　甘草　羌活　黄芩　黄連　菊花　白芷　荊芥

龍膽草　石膏　川芎　大黄　石決明　草決明　蒺藜

木賊　等分為末蜜水調服

密蒙花散（治瞖膜遮睛）

密蒙花　石決明　白蒺藜　甘菊花　木賊　羌活

等分為末清茶調服

羌活菊花散（治眼羞明怕日或有翳障）

羌活　菊花　膽草　谷精　荊芥　防風　黄芩　黄連

薄荷　川芎　木通　牛子　連翹　赤芍　生地　蔓荊

加灯心水煎飯後服　白翳加石決明草決明白蒺藜

一方用青欖核磨井水點入能除翳障

又方用桑樹內細嫩皮井水浸爛搗膏爲九遇熱毒攻眼點之

即效

又方用胭脂水點入可除痘毒退白翳

又方用白雞翅毛扳出取其內內軟漿向翳上搽待其翳自除

龍膽草散（治痘毒入眼生翳障）

龍膽草（五分）　菊花　蒺藜（炒去刺）　白芷（各三分）　防風（一分）　黄連（二分）

蟬退（去泥）　木賊（去節）　梔子（各一分）　共水煎服

兔糞散（治痘入眼）

炒兔糞（炒為末）用蟬退　木通　甘草煎湯調服

望月丸（治痘生翳障）

兎糞（焙四兩）石决明（七孔者佳火煅一兩）草决明（一兩）木賊（去節一兩）白芍（一兩）

當歸（酒洗五錢）防風（一兩）谷精草（二錢）

共爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服數十丸荆芥湯下

吹耳丹（治眼中翳障）

輕粉　黄丹　加雄黄　麝香少許　共爲末吹入左眼有

翳吹入右耳右亦如之　又用石燕檳榔磨水常服

木鱉膏（治眼翳障）

木鱉一个爲末將雞蛋一个開一小孔入藥在内仍上蒸熟

與服連服數次即退

凉肝明目散（治痘後羞明）

當歸　胆草（俱酒洗）　蒙花　柴胡　防風　黄連　加大黄

車前各等分爲末用豬肝煮湯調服

望月砂散（治痘後兩目羞明眼至不能開）

谷精草（五錢）蜜蒙花（酒洗五錢）蝉退（去翅足五錢）望月砂（即兎糞一兩）

右共爲末取豬肝以竹刀披開將藥在内依原合着飯上

蒸熟取肝并汁服之立效

○安胎諸方（共計五方）

罩胎散（治妊婦出痘）

川芎　當歸　白芍　人參　白术　茯苓　甘草　柴胡

條芩　防風　荆芥　白芷　乾葛　砂仁　紫草　桔梗

阿膠　陳皮　艾葉　熱加糯米同煎服

安胎散

川芎　當歸　白芍　人參　白术　茯苓　甘草　黄芩

陳皮　紫蘇　砂仁　阿膠　香付　艾葉　紫草

各等分加益母草生薑同煎服

安胎飲

大腹皮（酒洗）人參　陳皮　茯苓　白芍　紫蘇　砂仁

香付　甘草　川芎　當歸　條芩　加灯心糯米煎服

如胎漏加阿膠　百草霜

獨聖安胎散（治胎動服後胎熱則安矣）

砂仁（連殼炒去殼爲末熱酒調服）　又用苧蔴根搗爛敷臍

又用伏龍肝水調敷臍　又用韭菜搗爛敷臍亦好

加聖散（治妊婦出痘）

白术　黄芩　當歸　只殼　黑豆　大腹皮　砂仁

甘草　桑樹上半見藤（又名薜荔）　各等分水煎服

○通行經諸方（共五方）

柳花散（治女子出痘行經）

柳花（曬乾六錢）紫草（一兩）升麻　當歸（各八錢）

共爲末每服六七錢以葡萄煎水調服

凉血地黃湯（治女子出痘行經不止熱入血室）

當歸　川芎　白芍　生地　白朮　升麻　黃連　甘草

人參　山梔　玄參　水煎服

凉血解毒湯（治女子出痘非經期而血忽至）

當歸（一錢）白芷（五分）升麻（四分）紫草（一錢五分）紅花（一錢）赤芍（一錢）桔梗（八分）

連翹（一錢）阿膠（六分）加灯心同煎服

當歸養心湯（治女人出痘忽遇行經而口不能言或狂譫者）

人參　當歸　麥冬　甘草　升麻　生地　加灯心同煎服

解肝散（治女人出痘經水不止發熱昏沉狂言妄語）

羌活（六分）當歸（一錢）山梔仁　龍胆草（各五分）川芎　防風（各六分）

柴胡（七分）黃芩（四分）共水煎服

○調經二方

歸脾湯（治女人閉經血海乾涸適逢出痘以此調之使血不妄行）

人參　白朮　茯神　黃芪　地骨皮（各一錢二分）甘草（三分）

木香（五分）遠志（去心）棗仁（各一錢）薑棗合煎服

右方加柴胡山梔名加味歸脾湯

逍遙散（調經行血）

白朮　茯苓　當歸　白芍　甘草　柴胡　大棗（各等分）

又方加梔仁　丹皮名加味逍遙散

○治瘀血作痛方

黑神散（治瘀血作痛）

當歸　川芎　熟地　乾薑（炒黑）肉桂（去心）蒲黃（炒）香附（童便炒）

木香　鬱金　青皮　黑豆

蘆薈肥兒丸（治痘後肌瘦骨蒸不退）

蘆薈　胆草（酒洗）木香（蟾炙時）訶皮　人參　使君子肉（去殼）

麥芽（炒各二錢）檳榔　黃連（炒）白蕪荑（各三錢）胡黃連（酒製五錢）

右共爲末用豬胆汁爲丸加黍米大米飲下

荊芥解毒湯（治痘夾疹）

防風　荊芥　炒芩　炒梔　玄參　升麻　牛蒡

麥冬清補湯（治疹火上炎）

人參（八分）麥冬（酒蒸一錢二分）花粉（酒蒸一錢）黃芪（各一錢）前胡　牛蒡（炒）山查

（各五分）炙草　生草　紅花（酒洗）川芎　生地（各四分）白芍（炒）

生白芍（各四分）當歸（八分）桔梗（三分）加生薑龍眼煎服

種痘新書卷之十二終

## 原序

昔范文正公云不能為良相即當為良醫蓋良相者裁成輔相立政治以免人之飢寒良醫者辨症立方用藥物以救人之夭札其事不同其活人均也然而蘇東坡有云藥雖進於醫手方多傳於古人若已經驗於世間不必皆由於己出士君子身居草莽而存活人之心其可弗博考方書而師心自用哉顧醫家之所難治者二而小兒更甚於婦人小兒之所難治者亦有二而痳疹更甚於痘症非敢輕痘重痳而謬衒己見蓋緣痳小症大險甚於痘況自古治痘之書不下百家且有專科治痳之書竟不多見故無名師然痘有傳苗之法可以調治於未然而痳則盡由天命未由預防於先事醫家臨症往往束手大方脈以其為嬰孩也而委之兒科兒科又以其類痘瘄也而委之痘師世俗不察遂謂痘痳相通治痘之醫即可以治痳雖痘痳均屬胎毒而不知痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有痳發於六腑腑屬陽陽主氣故痳有形而不漿其症多實熱而無寒痘以稀疎為貴痳以透密為佳痘以氣尊血附為美痳以血凉肌鮮為妙痘忌汗瀉以洩氣痳喜吐衄而分消二者相去逕庭其不同若水火然今責治痘者以治痳是猶責夫禹而使掌火伯益而使治水也其能有濟也與而要非盡醫家之過也醫家非甚無良誰不存活人之心誰甘受殺人之名活人而反以殺人是誠何故乎良以痳症之方書甚少後學無所取法即間有傳本亦往往語焉而不詳擇焉而不精而求其如痘書之明晰者從未之見亦何怪乎束手無策坐視而莫救也耶余素不通醫因見夫殤於痳者不禁勃然興活人之念故凡醫集中載有痳疹症治者必貨置案頭朝夕探索深究其奧頗有心會甲寅夏於友人處得靜遠主人痳疹辨症一帖繼又得痳科秘本二卷余細玩二書之論症立方較之寄齋全書張氏醫通朱氏定論頗更精詳猶病其缺畧而不全也因更將聯杏心法景岳痳詮經驗治法等書各家痳疹之論與治痳之方悉為錄出移此所有補彼所缺以彼所詳益此所畧其有用

藥適忌措方背理者謬扞狂瞽之見及余已試而有效者為之訂正自初潮至已出已收收後論症著明治方全備俾後之學者開卷了然有所宗式而不致束手其間雖有冗複之處皆因理所宜用故不忌重立以便名公博覽採擇而不致有缺畧之歎良工得此神而明之固可收活人之效庸工得此墨而守之亦可免殺人之慘自甲寅迄今十五年中五經試驗今春痳症震作變症非常殤殘頗衆凡經余調治者萬獲萬全思欲以一得之愚公諸同志爰編訂成册分為四卷顏之曰痳科活人全書良不誣也原擬付之剞劂氏以求教於當世名師奈逕來兒女婚嫁費繁兼之食指日增囊無餘蓄有活人之心而無活人之

力非余本願也所望好善君子梓而布之此書得以廣傳海内使海内小兒不復為痳症所夭札則活人之功與范文正公並傳而余彙輯編訂微勞又不足言也是為序

旹

乾隆拾叁年著雍執徐歲壯月　　穀旦

安成赤溪璞齋謝玉瓊崑秀　撰

## 原序

赤溪謝玉瓊先生與余同鄉相隔數里素聞先生有濟人利物之事而於男婦痳疹之書可徵焉蓋痳疹原與痘瘡並重而治痘者有專家著書孔多獨於痳疹視為泛常書後畧載數方致治痳疹者不審痳症之輕重寒熱不辨藥性之補與涼依方直餌傷生極多先生不忍積數十年之精力博採古仙之著作而研究之辨其藥性别其症候彙成方書分為一百零八條余鄉間得其書而鈔謄者甚多其中每有大同小異之處余竊疑焉詳究先生於是書歷經四攺而始成故鄉間所傳寫本因先生先後攺正而有大同小異之説余近年與先生之令姪孫茂齋相好托伊轉求先生之令孫瑞源出先生晚年親筆所訂之全本名之曰痳科活人全書其所謂活人者原欲活天下之人非僅活一鄉一邑之人也余體其志不惜斧資付之剞劂公諸天下俾治痳疹者有專科而種痳症者隨症用方依方治症則獲福無涯矣是為序

旹

乾隆五十七年壬子孟春月　　穀旦

安成阜山劉齊珍撰

## 原序

治痘之書最多而痳書僅附於痘後則是痘有專科痳無專科也顧臟陰腑陽痘發於臟痳發於腑痳之症治不易於痘而世人輒易視之者豈以痘可兼痳乎無惑乎誤人多也安成璞齋謝玉瓊先生深究其理而覼陳縷析言之著為痳科活人全書誠為濟世利人苦海之慈航也阜山劉君齊珍始將是稿付諸剞劂梓而行之吾郡分邑張君紉香亦就其板而印送之領是書者不啻獲拱璧然固已屢試屢驗萬無一失矣然予於此喜之甚慮其板僅藏於一處不能遠佈又日就汗漫點畫模糊不能又刷他方他時種痳者未必普濟也因取其原本捐其工貲而再開雕之不增一字不減一詞一一悉如其全書以廣行於世雖山陬海澨而遐窮年累世之後未必盡獲披覽然藉是以補阜山所未逮益廣璞齋濟世利人之心安知遠方後世之同志者不又無補余所未逮哉是為序

皆

道光三年歲次癸未　穀旦

宜春怡菴氏彭肇　撰

---

## 痳科活人全書目録

卷之一

痳疹骨髓賦（補訂）
靜遠主人痳疹西江月（删訂）
痳症條目法旨用藥要訣（删訂）
增訂治痳問答提要
痳疹形式要旨括
痳症治法大畧括（删訂）
寄齊治法大畧括（删訂）
驗痳色吉凶
痳疹輕症
痳疹重症
痳疹不治症
痳疹死症括
宜用藥性
痳後宜用藥性

卷之二

四方痳名第一
歲氣第二
預解宣毒第三

諸潮亦能發痲第四
初潮認症第五
初熱未明是否勿峻發表第六
避風寒第七
忌恣食生冷物驟用寒涼藥第八
忌食辛辣熱物誤用辛熱藥餌第九
忌食諸肉雞魚鹽醋五辛等物第十
忌兼用補澁第十一
升發清涼解毒當分先後第十二
會痲當分天時第十三

補中第十四
正痲奶痲風瘾不同第十五
溫痲第十六
痘夾痲出第十七
蓋痘解毒痲第十八
痘後出痲第十九
閉症第二十
首尾調和第二十一
熱有遠近而出第二十二
不熱第二十三
微熱第二十四
乍熱第二十五
壯熱第二十六
潮熱第二十七
渴熱第二十八
口渴恣飲致成水蓄第二十九
復熱第三十
始終潮熱不退第三十一
煩燥第三十二
出不快發不出第三十三

過期不出第三十四
已出熱甚不減第三十五
已出紅腫大甚第三十六
不透表第三十七
盡透表第三十八
一齊湧出第三十九
痲色分治第四十
陰陽兩部多少第四十一
紅潤不起已出不紅第四十二
鮮紅色淡紅色第四十三

粒紅膚白痳如肌白第四十四
紫黯色第四十五
粒頭焦第四十六
雲頭片第四十七
發斑似發斑屑已出夾斑第四十八
易收早收難收第四十九

卷之三

咳嗽第五十
氣促發喘鼻扇胸高第五十一
齁鮯第五十二

瘖啞聲音不清第五十三
呃逆第五十四
噴嚏第五十五
鼻涸多涕鼻乾無涕第五十六
微汗自汗大汗無汗第五十七
衄血諸失血第五十八
嘔吐第五十九
吐痰痳後有痰胸口痰甚第六十
吐蚘虫第六十一
吐沫口中流涎不止第六十二

泄瀉第六十三
糞溏水瀉第六十四
瀉清第六十五
瀉而腹痛脹滿第六十六
咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第六十七
大便閉第六十八
小便赤濇第六十九
大小便不通第七十
吐利並作下滯裏急後重脫肛第七十一
痢症第七十二

下蚘虫第七十三

卷之四

眼光如木眼眶紅爛羞明赤腫眼淚生翳第七十四
眼閉第七十五
眼多眵淚第七十六
白珠紅赤第七十七
雀盲第七十八
口氣臭第七十九
口瘡第八十
舌生白珠第八十一

牙疳第八十二
狐惑第八十三
咬牙第八十四
舌胎第八十五
唇燥第八十六
唇舌破裂第八十七
咽喉痛第八十八
頭疼背強頭項腫遍身痛第八十九
腹痛第九十
腰痛第九十一

氣痛第九十二
頭温足冷下體冷過膝四肢身體冷如冰第九十三
瘧疾第九十四
沉睡昏矇似寐非寐煩燥不眠第九十五
中惡第九十六
發搐第九十七
譫語第九十八
虛羸第九十九
妊娠出痲第一百
婦人出痲適値經行及經水非正期而來第一百零一

產後出痲出痲胎墜第一百零二
產婦痲後無乳第一百零三
痲後遍身腫第一百零四
餘邪為殃第一百零五
不食吃食大早貪食不厭第一百零六
痲後生瘡痲後遍身瘙痒第一百零七
見毒醫毒勿泥痲法第一百零八
附錄進賢舒馳遠先生痲疹論一篇
并案五條

附錄胥山王琦先生醫林指月書內論瘄一篇
附證一則

# 痲科活人全書卷之壹

安成　瑣齋謝玉瓊纂輯
阜山劉齊珍原刊
怡菴彭　肇續刊

## 痲疹骨髓賦　增補

痲雖胎毒。多帶時行。氣候暄熱。非令。男女傳染而成。其發也。與痘相似。其變也。比痘匪輕。愚夫愚婦。每視為泛常。若死若生。總歸於天命。不知先起於陽。後歸於陰。毒興於脾。熱流於心。臟腑之傷。肺則尤甚。始終之變。腎則無症。若得治法。方稱醫聖。閉門問途。不如途中尋徑。揚湯止沸。莫若釜底抽薪。

初則發熱。有類傷寒。眼胞腫而淚不止。鼻噴嚏而涕無乾。咳嗽少食。作渴發煩。以火照之。隱隱於皮膚之內。以手摸之。磊磊乎肌肉之間。其形似疥。其色若丹。出現三日。漸收為安。隨出隨收。喘急相干。無咳無汗。隱伏之端。根窠若腫兮。麻而兼癮。皮膚如赤兮。疹尤夾斑。似錦而明兮。不藥而愈。如煤之黑兮。百無一痊。此痲疹之順逆。須臨症以詳觀。

痲毒最重。治法不同。微汗常出。熱勢越而不留。二便清調。邪氣行而無壅。腠理拂鬱兮。即當發散。臟腑秘結兮。急與疎通。雖衄不必憂。邪從衄解。自利勿遽止。毒以利鬆。痲後變痢兮。熱毒移於大腸。咳嗽咽痛兮。痰氣滯乎心胸。口渴心煩。法在生津養血。飲食減少。治須調胃和中。餘症無常。臨期變通。

且如出之太遲。發表為貴。出之太甚。解毒最宜。毋伐天和。必先歲氣。寒風凜凜。毒氣鬱而不行。赤日炎炎。邪氣乖而作癘。或施溫補。勿助其邪。若用寒涼。休犯其胃。制其過但取其平。誅其暴必欲其正。遠寒遠熱。陰陽之勝負不齊。貴實貴虛。人品之强弱或異。此乃痲之大旨。醫家須當熟記。

至於藥性。更宜洞悉。防風荊芥。散腠理之寒邪。紫蘇葛根。解營衛之蘊熱。蘇子擅下氣之能。前胡有疎表之力。款冬消痰止嗽。紫苑通肺開結。石斛行血中之滯氣而用。樗根治痲後之白痢而設。葱白上升。而發散肺胃。萊菔治氣。可推牆倒壁。竹茹可止嘔吐。柿蒂專療呃逆。芥子降氣。生地涼血。黄連入心而瀉火。黄

芩入肺定喘急。元參石膏治邪火之浮遊。枝子連翹。開惡毒之拂鬱。括蔞潤肺止渴。須合麥冬。知母降火生津。必同黄柏。蘇仁性能滋潤。花粉用以解渴。芍藥住腹痛。勿施於未收之前。白朮止脾泄。只用在收盡之日。欲行滯兮。須青皮只殼而同檳榔。要分利兮。用赤苓前子而共滑石。尿若澁兮。利以朱苓木通。咽常痛兮。治以大青惡實。元胡活血止痛。蒲黄逐瘀生血。丹皮破積生新。而引血歸經。紫草利腸涼血。而癈疹紫黑。茅根止吐衄降除伏火。紅花解痲毒而散腫赤。咽喉若閉兮。射干助以豆根。牙齒生瘡兮。蚊蛤配乎溺白。心神驚恐兮。鎮以辰砂。臟腑閉結兮。利以大黄。苧麻杏仁。治喘氣之吩吩。薄荷竹葉。解膚熱之烊烊。

火燒人屎。窑炒蘇黃。發癍毒之出現。令邪氣之舒張。只實山查。助脾胃而化毒。兜鈴骨皮。清肺熱以回瘡。

既識藥性。用亦有時。未透表。則前胡葛根荊芥防風必用。而已透當除。若已出。則黃芩黃連枝仁黃柏宜使。而初潮勿施。便閉以丑牛易大黃。免寒胃府。喘急用葶歷莫升麻。怕增乳衄。麻色焦枯。生地歸尾為要味。疹達紫黑。紅花紫草正相資。此用藥之元機。則當擴而充之。

用藥知時。治有成方。初熱欲出未出際。宜用宣毒發表湯（見第五條除升麻吉梗甘艸）劑。已出紅腫太甚者。當施化毒清表湯。（見十六條除吉梗甘艸）症輕者。用瀉白散（見五十條除甘艸）合平消毒飲（見二十二條除甘艸）子。毒重者。古方黃連解毒湯（見三十五條）大青湯（古方見三十五條除甘艸）與吸嘗。若有泄瀉。用導赤散（見二十六條除甘艸）以分利。如遇嘔吐。命竹茹湯（見五十九條除山查肉）而相將庸工渾使苦寒辛熱之品。名師不溢誅伐無過之殃。遵此秘旨。無偏涼誤熱之咎。守而勿失。至起死回生之祥。特舉一隅。約法三章。

麻疹既出。調理甚難。坐臥欲煖。飲食宜淡。風寒若受兮。為腫為熱。酸鹹不禁兮。為咳為喘。異氣縱感。變症宜參。便多膿血兮。倉廩夾熱。咳多痰沫兮。華蓋傷寒。口爛唇裂。心脾之邪火未退。毛焦髮枯。營衛之津液將乾。苟不明乎是症。何以見其折肱治此變症。各有奇方。身熱不除。生地骨皮（湯見三十條除甘艸）合四物。（湯見二十

---

五條）口瘡若甚。秘本洗心散（見八十條除麻黃）對三黃。（丸見四十八條）消壁定喘兮葶歷（丸見五十條除丑牛）取效。化痰行氣兮。加味二陳（湯見六十條除半夏甘艸）為良。咳嗽氣急。除熱清肺湯（見五十條除赤芍甘草）解除肺熱而有驗。喉痛唇爛敗毒散（除柴胡白芍甘草吉梗）。清胃利咽而消殃氣血已虛八珍（湯見九十九條）增減而可。飲水數不納。石斛清胃散（見五十九條除赤芍甘草）以堪嘗。利血兮清熱導滯、湯（見七十二條除白芍查肉厚朴甘草）加桃仁而增紅花咳血兮元參解毒、散（去甘草吉更粉葛加桑皮貝母黃連）加茅根而倍地黃。此治麻之大略。繼各條而再詳、大抵麻屬心火。必須解毒清涼。

敗毒散　治麻後口瘡唇爛咽喉疼痛

射干　天花粉　連翹　牛蒡子　石膏　生地黃　黃芩
黃柏　元參　淡竹葉　犀角汁（磨）　金銀花　丹皮　薄荷
柴胡　白芍　甘草　吉梗　灯芯引水煎服

元參解毒散　治衄血失血

元參　黃芩　枝仁（炒）　生地黃　荊芥　粉葛　吉梗
甘草　水煎加茅根汁京墨水對服

靜遠主人麻疹西江月刪訂

痧疹俗呼麻子。蓋因火熱薰蒸。遍身紅點硃砂形。發自心脾二經。最忌黑斑死症。極宜赤似硃紋。大抵治法喜涼清。不可辛甘犯禁。

麻子如何辨認。分明症似傷寒。此多咳嗽有紅斑。噴嚏眼中水現。或見腹中疼痛。或是吐瀉相兼。疹家吐瀉不須安。正要毒除熱散。

麻與痘瘡異治。二家不可同方。痘宜溫解疹清涼。又要現形為上。若受風寒不出。其間凶險難當。急宜發散保平康。切忌神昏腹脹。

麻症因何咳嗽。只因肺與心通。肺金被火苦熬煎。以致咳嗽氣喘。治當清金降火。不宜誤用辛甘。譬如包子蒸籠然。只要氣鬆火爆。

凡遇麻子出現。詳看天令如何。假如日煖又風和。荊防敗毒堪可。若是時行疫癘。芩連消毒宜多。用心調理救沉疴。莫學觀天井坐。

且說荊防敗毒。散此為發散仙方。防風荊芥生地黃。酒炒黃芩黃連二樣。赤芩乾葛灯草。連翹只殼牛蒡。子元參杏仁實為良。淡竹葉水煎停當。

又有芩連消毒。飲清金散火尤佳。黃芩黃連防風及枝仁黃柏。只殼骨皮共把。石膏乾葛知母。連翹牛蒡子天花粉引用淡竹葉要多加。此個方兒高價。

若是發散不出。令人真個憂疑。麻黃酒蜜炒如煤枝仁黃柏黃芩黃連一例。更加大黃酒炒連翹牛蒡子相隨。石膏蟬蛻紅花子不效命離塵世。

如見出時紫黑。此般症候多凶。急求人糞路歸東。火煅存性取用細研酒調吞服。須臾紫黑變紅。若還依舊黑朦朧。管取黃梁一夢。

麻子現形發熱。尋常只用化斑。湯石膏枝仁及元參只殼連翹牛蒡子靈驗。若是毒多熱甚。芩連消毒為先。大便秘結丑牛添務使微溏數遍。

麻症頻多咽痛。火邪薰灼無他。連翹豆根要多加。射干牛蒡子煎罷外用十宣妙散。（見八十八條）吹喉休要呼嗟。假如見效莫爭差芩連消毒飲堪誇。

咳嗽聲已氣促。只消降火清金。黃芩枝子赤茯苓。葶藶石膏一定。知母貝母元參地骨。皮括蔞仁麥冬杏仁。連翹牛蒡子炒如神。淡竹葉將來作引。（一書有黃連）

麻症若兼瀉利。預先用藥調醫。瀉時須用三芩散（見三十七條）宜。加上車前子滑石如見痢兼赤白。加減黃芩湯（見七十二條）相隨。大都痢止便為奇不效令人疑忌。

麻後須防四症。不治常致誤人。遍身餘熱欠清寧。（一症）咳欬連聲牽引。（二症）牙齒疳生走馬。（三症）痢下赤白難禁。（四症）各求方法細論評。總是麻科醫聖

問甚身間壯熱。只因餘毒留連。金華丸子是靈丹。枝仁黃芩黃連。龍胆。草欝金雄黃解毒。燈芯地骨皮湯吞。若還脾弱熱綿延。集聖丸胃苓湯任選。

集聖丸當歸川芎。蘆薈五靈脂夜明沙。砂仁青皮莪朮加。黃連酒炙蝦蟆。（即蚵蚾）猪胆粟米粉糊丸。清晨米飲吞下。治疳肥兒功最大此個丸兒堪誇。

平胃散五苓散相合。方兒名曰胃苓。湯蒼朮茯苓肉桂與猪苓陳皮厚朴澤瀉分明。白朮須宜生用。去肉桂甘草煎成浮腫泄瀉食積停入口效應如神。

咳嗽頻々不止。為因不禁酸鹹又加火毒肺家炎。尤恐胸高氣喘體實却用葶藶。丸神虛清肺神丹。如斯調理保平安。莫向風波弄險。

葶藶丸除肺熱。杏仁葶藶防己。牽牛萊菔子相隨。紅棗肉搗成為劑清肺神丹降氣。鹽水煮焙陳皮。黃芩黃連枝仁黃柏杏仁泥蒸子稀糊丸易。

口齒生瘡臭爛。此名走馬牙疳。金華丸子內求安。外用除疳妙散。先取桶中尿白。火煅白色如鹽。五棓子銅綠退殼蚕。（即蚕退帋）再加硼砂冰片。

赤痢下成鮮血。黃連柏葉槐花。只殼荊芥穗同加。痢止血除繞罷。白痢茱萸滑石。樗根只殼升麻。烏梅取肉作丸佳。赤白香連丸可下。

香連丸又名香橘。五錢木香陳皮。石蓮子取肉半數宜。（等分用上一半）一兩黃連另製。外將茱萸五錢。同黃連炒而用之。炒後去茱萸勿同施。神麯糊丸吞餌。

痘後麻疹即現。治法從未講究。專用清肺是妙手。發散與補俱謬。藥用黃芩桑白皮貝母牛蒡子同儔。更宜倍入西河柳特為後學指授。

麻後如變瘧疾。清涼健脾為佳。麥冬薏苡仁粉乾葛。白茯苓陳皮鱉甲。柴胡白芍淡竹葉。知母貝母山查。渴甚再把石膏加不渴知母並罷。

更防四種死症。臨時休得殊差。毒多體熱瘦如麻。（一症）咳嗽面青聲啞。（二症）走馬（牙疳）唇齒肉落。（三症）痢疾禁口吁嗟。（四症）此般即是死冤家。不可騎牛覓馬。

婦人出麻時候。天癸正當臨期。血走氣虛難支持。伏陷恐成在斯。藥忌辛酸升發。養陰（湯見三十二條）加減最宜。用心調理莫待遲。臨危法無可施。

婦人麻初發熱。經行非期何因。毒火內迫血離經。元參地黃湯

進。或將解毒湯四物。湯二方合用調停。服後天癸依然行。定變伏陷逆症。

元參地黃湯神方。丹皮生地元參。炒黑蒲黃枝仁添水煎。入口靈驗。四物湯除去川芎白芍。解毒湯枝仁黃柏黃芩黃連。服後經止立便痊。不應中虛症變。

妊娠如逢出疹熱蒸胎必墜傷。熱甚兒墜母安康。輕或兩全無恙。初潮宜用參蘇飲減去半夏木香。或已現麻須更方。安胎引用停當。

初潮宜用參蘇。飲加減全憑神醫。只壳前胡與蘇葉。除去甘草吉梗陳皮。葛根白茯苓同煎。人參半夏木香須忌。加入連翹牛蒡子貝母宜。勿學庸工執泥。

出現宜用安胎。飲川芎白芍當歸身。蘇葉甘草條子芩。大腹皮烏豆水浸陳皮。姜湯泡去白。姜汁炒連壳砂仁。人參白朮用時須當斟。粘米一撮為引。（白芍出現時須當並除）

（附秘本妊娠出麻括）孕婦如逢出疹。須防熱甚胎傷。川芎當歸白芍生地黃是主方。蘄艾條子芩多放。砂仁連壳姜汁炒。安胎清熱最良用心調理莫倉皇。務保子母無恙。

產後如逢出麻。用藥休使寒凉。四君子湯（見七十二條）四物湯（見二十五條）十全大補湯。補養氣血為上。綿芪肉桂因人施用。全在良師審詳。若泥寒凉生氣傷。好似雪上加霜。

---

且說十全大補。湯八珍湯加味成方。川芎當歸身生地黃。人參白苓白朮甘草相將。肉桂白芍俱用酒炒。黃芪蜜拌炙為良。水煎濃汁與之嘗。加減聽憑酌量。

### 痳症條目法旨用藥要訣刪訂

初起已出及已收。症立條目治立方。不敢峻熱與用霸。隨時解毒萬無妨。

初潮症治

初起潮熱者。用宣毒發表湯。（見第五條）除升麻吉梗甘草加紫蘇葉葱白。

已出潮熱者。用葛根疎邪湯。（見三十三條）加黃芩。或清熱透肌湯。（見二十五條）去甘草。加黃芩骨皮。寒熱似瘧者。用防風敗毒散。（見第五條）除吉梗甘草。加前胡赤茯苓。

已收潮熱者。用生地骨皮湯。（見三十條）去甘草。加黃連只壳。或古方黃連解毒湯。（見三十五條）加地骨皮。連翹。牛蒡子。當歸。

煩熱症治

初潮煩熱。未出時煩燥者。用防風敗毒散。（見第五條）去吉梗甘草。加麥冬黃芩葛根。

已出煩燥者。用白虎解毒湯。（見二十六條）加骨皮黃柏連翹。

已收煩燥者。用白虎解毒湯。（見二十六條）加骨皮。黃柏。牛蒡子。只壳。木通。

譫語症治

初潮譫語者。用宣毒發表湯。（見第五條）去升麻吉梗甘草。加桂府滑石辰砂末

已出譫語者。用加味導赤散。（見四十九條）調辰砂滑石末。或古方黃連解毒湯。（見三十五條）調辰砂滑石末。

已收收後譫語者。實爲凶兆。用古方黃連解毒湯。（見三十五條）合加味導赤散。（見四十九條）調辰砂滑石末。

咳嗽症治

初潮咳嗽乃屬美候。用宣毒發表湯。（見第五條）除升麻吉梗甘草加桑白皮。如潮熱輕者並除淡竹葉。

已出咳嗽亦屬美候。用聶氏清肺飲。（見五十條）除陳皮柴胡吉梗甘草貝母。加只壳連翹牛蒡子。或除熱清肺湯。（見五十條）除甘草赤芍。加只壳連翹牛蒡子。或加味瀉白散（見五十一條）除甘草人參。加只壳連翹牛蒡子。

已收收後咳嗽者。用秘本門冬清肺湯。（見五十條）除甘草吉梗粳米不作口渴者。並除石膏。

泄瀉症治

初潮泄瀉乃屬美候。用宣毒發表湯。（見第五條）除只壳薄荷葉淡竹葉升麻吉梗甘草加赤茯苓車前子。

已出泄瀉者用猪苓湯。（見六十三條）除甘草。有用古方黃連解毒湯（見三十五條）合三苓散（見三十七條）者。

收後潮熱泄瀉者。用加味導赤散（見四十九條）

### 嘔吐症治

初潮嘔吐者。用竹茹湯。（見五十九條）除山查加荆芥防風前胡葛根連翹牛蒡子枇杷葉。

已出嘔吐者。用竹茹湯。（見五十九條）除山查加連翹牛蒡子。

收後嘔吐者。用石斛清胃散。（見五十九條）除丹皮赤芍甘草。加竹茹枇杷葉柿蒂。

### 大便不通症治

初潮大便閉者。用前胡只壳散。（見五十一條）除大黄甘草。加丑牛連翹牛蒡子防風葛根。

已出大便閉者。用當歸潤腸湯。（見六十八條通幽湯方尾）除升麻生熟甘草熟地黄加連翹牛蒡子。

收後大便閉者。用河間凉膈散。（見二十六條）除甘草。

### 小便不通症治

初潮小便閉者。用三苓散。（見三十七條）加防風葛根連翹牛蒡子木通車前子只壳。

已出小便閉者用導赤散。（見二十六條）除甘艸

收後小便閉者用通關散。（見七十條）除人參甘草大黄。

### 大便出血症治

初潮大便出血者用宣毒發表湯。（見第五條）去淡竹葉升麻甘草吉梗。加生地黄丹皮。甚者更加犀角。有用犀角地黄

湯（見五十八條）除白芍。加荆芥防風牛蒡子連翹葛根者。

已出大便出血者。用凉血地黄湯。（見四十五條）除甘草。加連翹牛蒡子犀角。有用犀角解毒湯（見五十八條）除赤芍。加元參者。

已收大便出血者。用犀角解毒湯。（見五十八條）除赤芍。加連翹牛蒡子炒蒲黄。有更加桃仁者。（蓋欲去其積血也。愚謂用生熟蒲黄。以去汙生新。更爲妥當。）

### 小便赤濇症治

初潮小便赤者。用宣毒發表湯。（見第五條）除升麻吉梗甘草。加澤瀉。

已出小便赤者。用加味導赤散。（見四十九條）有用古方黄連解毒湯。（見三十五條）加木通者。

收後小便赤如泔濁者。用加味三苓散。（見十一條）

### 口鼻出血症治

初潮口鼻出血者。用宣毒發表湯。（見第五條）除升麻吉梗甘草加炒枝仁茅根生地黄。

已出口鼻出血者。用加减犀角地黄茅花湯。（見五十八條）除甘草有用古方黄連解毒湯。（見三十五條）加童便炒枝仁者。

收後口鼻出血者用犀角解毒湯（見五十八條）除赤芍。加茅根當歸尾百草霜。

咽喉痛症治

初熱咽痛者。用敗毒散。（見骨髓賦內）除柴胡赤芍吉梗甘草。加射干麥冬山豆根防風。

已出咽痛者用敗毒散。（見骨髓賦內）除柴胡赤芍吉梗甘草。加射干枝仁山豆根。

收後咽痛者。用敗毒散。（見骨髓賦內）除柴胡赤芍甘草吉梗。加射干枝仁山豆根黃連。

腹痛症治

初潮腹痛者。用宣毒發表湯。（見第五條）除升麻吉梗甘草。

已出腹痛者。用清熱透肌湯。（見十六條）除甘草。加只殼。

收後腹痛者。用古方黃連解毒湯。（見三十五條）加只殼山查肉元參。

聲音瘖啞症治

凡聲音啞瘖者用清金降大湯。（見五十三條）除白芍陳皮甘草吉梗。加石菖蒲。有用訶子肉磨水服者。

夾丹症治

夾丹者。用古方黃連解毒湯。（見三十五條）加連翹牛蒡子當歸尾生地黃丹皮元參。有用河間涼膈散。（見二十六條）去芒硝甘草。加生地黃當歸。

夾斑症治

夾斑者。用犀角紅花飲。（見四十八條）加黃連紫草大青。

夾痢症治

初潮夾痢者。用葛根解肌湯。（見第五條）除赤芍藥甘草蟬蛻。加防風只殼。

已出夾痢者。用清熱導滯湯（見七十二條）除白芍查肉厚朴甘草。

收後成痢者。用清熱導滯湯。（見七十二條）除白芍甘草。

有前後俱用古方黃連解毒湯（見三十五條）加只殼白芍或三苓散（見三十七條）加酒炒黃連黃芩木通白芍者。在初潮不宜用大涼之劑。收後三苓散分利似乎無濟且白芍

始終俱宜酌用此法不大妥當。

牙疳症治

凡遇牙疳症。用加味清胃散。（見六十二條）

痲瘋瘡症治

用解毒湯。（見一百十七條）有用大連翹飲（見十八條）加金銀花者。

## 增訂治麻問答提要

一問曰麻之初出。何以明知發於肺胃二經。答曰肺主一身之皮毛。胃乃主納五穀。若皮膚堅厚腠理閉密。而麻難現毛孔閉錮毒從裏出。而麻易透胃火壅滯。故不能食火邪清消而口能食是以知也。所以治麻之法。初時專以發散解表清胃火為主。宜用加減參蘇飲。去吉梗甘草。加連翹牛蒡子荊芥防風石膏治之。又問曰假如用加減參蘇飲。發散不出。何以治之。答曰以麻黃散發之。或以三仙散發之即出。

加減參蘇飲

紫蘇葉　前胡　粉葛　茯苓　只殼　吉梗　甘草

生姜葱白引水煎熱服

麻黃散

麻黃（蜜用酒炒黑）　只殼　赤茯苓　木通　蘇葉　前胡

葛根　連翹　牛蒡子　蟬蛻　紅花　葱白引水煎熱服

三仙散

紅花　牛蒡子（炒）　川山甲（炒成珠）　水煎熱服

二問曰麻症忌用人參半夏升麻。而瘟疫又用升麻代犀角以補其氣。何以辨。答曰麻乃肺胃蘊積熱毒而發。不宜內實。又不宜溫補。而最喜清涼。夫麻出於六腑。所以先動陽氣。陰血多虧。陽者氣也。故不燥。升麻能升動陽氣上冲。是以麻症最忌瘟出於五臟。宜內實最喜溫補而助臟。其以升麻代犀角者。乃生犀地（見八十一條）中用升麻以引生地黃而入足陽明胃經耳

三問曰麻疹初出咳嗽。何以治之。答曰麻初出咳嗽。宜用加減瀉白散。去人參甘草粳米。合三味消毒散。去甘草或用白虎湯去甘草粳米。合三味消毒散。或以三拗湯治之。如或不效用加味五仙散。去吉梗芽茶。加牛蒡子麥冬主之。

加減瀉白散　治肺炎喘欬

桑白皮（蜜炒）　地骨皮　炒甘草　人參　白茯苓　肥知母

枯黃芩　粳米一撮引

三味消毒散

牛蒡子（炒二兩）　荊芥（二錢五分）　甘艸（五錢）　每用三錢水煎服

白虎湯　清肺金瀉胃火

石膏　知母　炙甘草　粳米一撮引

三拗湯　治風寒傷肺而咳誤行斂肺而壅咳嗽喘急

麻黃（不去節三錢）　杏仁（連皮尖用二十粒）　生甘草（一錢）　水煎服

加味五仙散　治咳嗽不止

知母　貝母（各二錢）　桑白皮（七錢）　款冬花（四錢）　吉梗（七錢）

芽茶（五錢）　為末每用一錢杏仁煎湯下

四問曰麻症發熱五六日。欲出不出。或作驚候。吐瀉交攻。何以

治之。答曰發熱而痲欲出不出。乃淫火之毒內相攻搏。以致胃家受火邪之毒。而作吐瀉、急宜分利。而兼清胃瀉火。以加味導赤散主之。兼驚者加辰砂滑石末調服。萬無一失。或以麻黃散去升麻濟生散等劑治之。

加味導赤散　清心胃利小便止驚泄

薄荷葉（四錢）　生地黃（酒洗）　不通　元參　車前子　連翹

淡竹葉（各七錢）　黃連（三錢）　灯心石羔引

麻黃散

麻黃（去根節水煮打去綠汁盡用酒蜜拌炒如煤用）　升麻（酒炒）　人中黃（瓦藏火煅研）

牛蒡子（炒）　蟬蛻（去頭足）　水煎服

濟生散　治痲欲出不出而生雜症入口即效

紫草茸　梅蕋　鳳尾草　鬱金（各一錢）　牛黃（一分）

川山甲（五分）　蟬退（去頭足一錢）　為末麥冬煎湯下一錢

五問曰、痲出一日而又收。腹中作脹。喘急者何也。答曰出而又收。乃為風寒所觸。腹中作脹、乃是麻毒內攻喘急者乃是麻毒攻胃、急宜早治。若遲則傳三經而難治矣。當以葛根疎邪湯、加括蔞仁石膏只實主之。或以回生消毒散治之。使痲毒內解。則無後患矣。

葛根疎邪湯

葛根　防風　荊芥　蘇葉　蒡子　連翹　地骨皮

前胡　赤茯苓　只殼　木通　水煎服

回生消毒散　治痲出而又收腹脹喘急

牛蒡子　地龍（即蚯蚓晒乾去土各二錢）　殭蚕　貝母　防風

荊芥（各一錢）　蟾酥（二錢）　為末以淡竹葉煎湯下一錢

六問曰、痲症服發散解毒之劑。痲不出而發斑。何以治之。答曰、痲症服發散解毒藥。痲不出而發斑。乃心經君火盛。而毒內攻也。當用通利之劑。名為釜底抽薪。使內熱一解。則痲易出。縱不出亦不為害。以化斑解毒湯去升麻主之。或以清寧散加減治之亦可。

化斑解毒湯

元參　知母　石膏　牛蒡子　連翹　人中黃（火煅另研用）

大黃（酒蒸）　淡竹葉　升麻　水煎調人中黃服

清寧散　主瀉心肝。即瀉青丸以寧合丸淡竹葉煎湯下治同

大黃（酒蒸一兩）　羌活　枝仁（炒[illegible]）　川芎　龍胆草　防風

當歸（酒洗各五錢）　為末蜜水調下

七問曰痲後作吐瀉。不食發熱。多有難救者何也。答曰痲收後吐瀉不食。乃脾胃二經之症。脾虛則瀉。胃虛則吐。治法當以理脾安胃為主。不可遽用人參白朮。只宜用六仙散治之。若熱不退。則以四物湯（見二十五條）調六仙散治之。倘用人參白朮。則助虛氣作喘而死。

六仙散　治麻後吐瀉不食發熱

馬蟻花（煅灰二錢）　藕節（一兩）　蓮肉　薏苡仁（各二錢）　釵石斛

陳早米（炒各五錢）　為末米湯送下三錢

八問曰、麻後鼻乾黑燥。昏沈不睡。又有喘急咳嗽。多有用白虎湯而死者何也。答曰、麻後鼻乾黑燥。乃火邪刑金。作喘急。乃胃氣虛也。初出而見此候。乃肺胃火邪盛。用白虎湯（見二十六條）以清肺經之金。而瀉胃火。實為得宜。麻症日久胃虛。收發而見此症。用白虎湯。則更有傷胃氣。不死何為。只宜以消毒清肺飲。去吉梗甘草。加括蔞仁葶藶主之。可保無虞。倘服消毒清肺飲而不應。可用復元散。除鸎粟殼吉梗。加括蔞仁葶藶。

一二服則安。或用補肺阿膠散更妙。

消毒清肺飲　治麻後喘嗽鼻如烟煤

防風　荊芥　牛蒡子　連翹　桑白皮　知母　貝母

陳皮　赤茯苓　百合　吉梗　甘草　水煎服

復元散　治麻後喘急鼻孔乾黑如煤

貝母　百合　阿膠（炒）　枇杷葉（蜜炙去毛）　吉梗

鸎粟殼（炒各一錢）　為末用桑白皮煎湯下一錢

補肺阿膠散　治法加減詳五十二條

阿膠（蛤粉炒）　馬兜鈴　牛蒡子（炒香）　粘米　炙甘草（各一兩）

杏仁（去皮尖七粒）　水煎服

九問曰、麻後牙疳。多致不治者何也。答曰麻後牙疳。乃失血症。是熱留足陽明胃經。餘毒上攻所致。而有五不治之候。須要看症明白。自外延入內者不治。無膿血者不治。通齦白色者不治。牙齒落者不治。口臭者不治。除此五症。內服犀角消毒飲。或加味清胃散。外用藥方搽之。毒消自愈。

犀角消毒飲

牛蒡子（炒研一錢五分）　荊芥　黃芩　防風　犀角　甘草（各錢）

水煎日二服

加味清胃散　治口舌生瘡牙齦腐爛

生地黃　升麻　丹皮　當歸　黃連　犀角　連翹

生甘草　水煎服

搽牙藥方　治麻後走馬牙疳

人中白（煅）　雞肫皮（各一錢）　乳香（製）　沒藥（製）　兒茶

硃砂（各五分）　白蝎　五棓子（各三分）　赤石脂（煅）　海漂硝

明礬（煅各七分）　麝香　冰片（各二分）

為末用粟殼煎湯洗淨搽之。要速效。須加牛黃（二分）珍珠末（二分）和勻搽之。

又搽牙藥方

紅褐子（燒灰）　人中白（煅各二錢）　白梅（燒灰五分）　麝香（二分）　冰片（一分）

五谷虫（炒一下）　為末先以韭菜煎湯洗患處搽之。

十問曰。麻症又有發斑紅。而麻反不紅者。何也。答曰。麻出於胃。斑亦發於胃。斑是火大盛。而痳縱不紅。亦無大害。只宜以清熱消毒治之。用犀角消毒飲（見第九問）可也。或以犀角一味磨汁與服亦可。若發紫斑。則為胃爛不治。

十一問曰。麻初出四肢浮腫。何以治之。答曰。四肢浮腫。乃是溼熱流於四肢也。以五皮散加葶藶治之。如不應。用木通散與之一二服即愈。

五皮飲

大腹皮　茯苓皮　陳皮　五加皮　薑皮　水煎服

木通散

地龍（晒乾燒灰一錢）　通草（焙焦）　木通（焙乾各五錢）

為末用米湯調下一錢

## 麻疹形式要旨症治秘訣

麻初呵欠噴嚏嗽。睿睿無縫痱蚤形。下出上收煩燥渴。毒從腸腑發皮生。

麻疹之症面必紅。咳嗽噴嚏鼻流膿。兩淚汪汪如哭狀。莫作傷寒一樣攻。

麻疹症治大略括

麻疹若不出。宣毒發表（湯見第五條）先。咳嗽宜清肺（湯見十五條）。熱多用化斑。（湯見五十七條）靜遠主人方

寄齊治法大略括　刪訂

麻疹未出用荊防。敗毒前胡葛根炒牛蒡。子赤苓只殼同連翹。薄荷葉石膏多用良。

麻疹出甚用黃芩黃連。知母石膏加元參麥冬生地黃牛蒡子。竹葉骨皮名化斑湯

麻後咳嗽仍不退。清肺散子同竹瀝。黃芩貝母括蔞仁牛蒡子。麥冬防風桑白皮與地骨。

潮熱元參麥門冬。木通知母貝母桑白皮入。生地黃黃芩與地骨皮。解熱清心清肺葉。

泄瀉三苓（散見三十七條）或導赤。（散見二十六條）更將六一散（見六十七條）子對若

變痢症問香薷（又名香連丸見六十三條）走馬牙疳清胃（散見七十九條）最。

### 驗痲色吉凶

痲疹色紅者吉

痲疹色赤者重

痲疹色黄者危

痲疹色黑者死

### 痲疹輕症

或熱或退五六日而後出者輕

身有微汗滋滋潤潤氣不甚粗身不焦熱痲出必輕

淡紅滋潤頭面勻靜而多者輕

透發三日而漸收者輕

痲已出明白後而身上皮膚或青色或紅紫色者俱無妨

上身熱下身凉此乃膈熱下凉不妨

---

### 痲疹重症

鼻出血者、毒重。

口出血者、毒尤重。

二便出血者、毒更重且危。

初起手足心如火熱者、重。

初起脚冷如冰者、重。

氣喘鼻乾更又鼻掀作嘔吐。驚搐狂燥無汗者最重。

頭面不出者、重。

紅紫黯燥者、重。

咽喉痛不食者、重。

冒風收早者、重。

移熱大腸變痢者、重。

夾斑夾癮夾丹者、重。

舌出血者、重。

### 痳疹不治症

黑黯乾枯。一出即收者、不治。

氣喘心前吸者、不治。

身上一逼紅。與肌膚平者。必當發表。如發表。後仍復如故。不治。

鼻扇口張。兩目無神者。不治。

鼻清糞黑者、不治。

當面牙齒黑者、不治。

走馬牙疳不治。

舌長過寸者、不治。

胃爛者不治。

痳後泄瀉不止者、不治。

### 痳疹死症括

已收渾身熱不涼。昏沈恍惚語無章。飲食不進舌胎白失智尋
衣與摸床。元氣精神混惝散。一魂尚爾未飄揚。逢斯強藥求全
毀。任是高明莫主張。

### 宜用藥性

**防風**　入小腸大腸胆心胞絡膀胱

治風去溼之仙藥。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。其性上行。故治上盛風邪。瀉肺實喘滿。周身痺痛。四肢攣急。目盲無光。風眼冷淚。一身盡痛。脊痛項強。不能回顧。腰似折。項似拔。瘡在胸膈以上。俱宜用。為其散結。去上風熱也（肺虛有汗喘乏氣升作嘔火升發嗽。陰虛盜汗陽虛自汗瀉後脾虛發搐產後血虛發痙忌用）

**荊芥**　入肝肺氣分、

祛經絡中之風熱。能清頭目去瘀血。破積氣消瘡毒。（表虛自汗陰虛面赤者忌用。）

**薄荷**　入肝肺

消風散熱。治咳逆失音。頭痛頭風。眼目口齒諸病。利咽喉。去舌胎。除小兒驚熱。癮疹瘡疥之要藥。又能開鬱散氣。

**蘇葉**　入氣血兩分

解表利咽。開胃通腸。下氣除寒。升中有降。（久服泄人真氣脾胃虛寒人過服多致滑泄。）

**前胡**　入肺脾胃大腸胆三焦

其功長於下氣。氣下則火降。痰亦降矣。故能治痰熱喘嗽痞膈諸疾。為痰氣之要藥。其性治氣實風痰。（凡陰虛火動之痰及不因外感而有痰者。禁用。）

**葛根**　入大腸胃

能鼓胃中清陽之氣。主消渴身熱嘔吐。使胃氣敷布能啟陽氣解諸毒。使胃氣升發邪毒自散而不畱。乃大腸胃經之專藥。治頭額痛。眉稜骨痛。天行熱氣嘔逆。發散解肌。開胃止渴。宣發痘疹。　**葛花**　能解酒毒。

**葱白**　入肺胃

專主發散。以通上下陽氣。能出汗。

**胡荽**　通心脾達四肢

能辟一切不正之氣。痘疹不出者搗湲衣被發之。春夏陽氣發熱之時。用之反助熱毒。恐變黑色。不可不慎。

**連翹**　大腸心胞絡氣分藥

瀉心經客熱。破血結。散氣取。消腫毒。利小便。瀉心火。故諸痛痒瘡皆治。又能清胆經鬱熱。

**牛蒡子**（又名大力子　又名惡實）　肺經藥

治風溼瘾疹。咽喉風熱。散諸腫瘡瘍之毒。為痘疹之仙藥。又能去皮膚風。消瘢毒。

**犀角**　入胃

涼血散血蓄血。解瘢痘瘢疹毒。治驚狂。解蠱毒。又治吐血衄血。便血尿血。痘痳血熱。毒甚者尤為必需。

豆

解丹毒煩熱。治風疹。及藥石發動。並解熱氣。治奔豘。

**山荳根**

治咽喉諸疾。及喉痺。解痘疹熱毒。止痛。消瘡腫毒。治發熱咳嗽。善治人馬急黃。殺小虫。腹脹喘滿。卒患熱厥心痛。俱宜。（脾胃虛寒作瀉者忌用）

**人中黃**

解天行狂熱。溫毒發斑。一切諸毒惡瘡。

**人中白**

治口瘡舌諸瘡最效。為降火之妙味。

**蚯蚓**（又名地龍。白頸者良。解熱毒。入鹽化為水。通經絡。炙乾用）

專殺蛇蠱三虫伏尸諸毒。解溼熱。利小便。通經絡。治痘瘡。脾胃虛熱。婦紅五六日。漸變乾黑伏陷者。又治溫病大熱狂妄。天行大熱。小便暴閉不通。

**西河柳**　入胃大腸

其功專發痳疹。兼解酒毒。去風以之。煎水洗風疹身痒最效。

**雄黃**　入胃

破陰邪。殺百虫。辟百邪。治寒熱鼠瘻。惡瘡痘痔死肌。

**蟬蛻**

治皮膚瘡瘍風熱。破傷風。痘疹發痒。痘後目翳。小兒夜啼驚癇

**黃連**　入心肝

瀉實火。去熱。治目痛眥傷泣出。明目。治腹痛下痢。止消渴。鎮驚厚腸。治口瘡。

**枯黃芩**　入肺

瀉肺火。清肌表之熱。○條芩瀉肝胆大腸火。除胃中熱

子芩治血熱妄行。

**黃柏**　入腎經血分

治肺脾大腸胃心胞絡肝。經。溼熱之專藥。又治腎水膀胱不足諸痿厥無力。

**枝仁**

除心肺客熱。兼治五內邪熱。胃中熱氣。炒黑用。專瀉三焦之火。及痞塊中火。最清胃脘之血。屈曲下行。能降火從小便泄去。

**石膏**　入肺胃

治熱病暍病。口乾舌焦。大渴引飲。自汗頭痛。溺濇便閉。齒浮面腫。腹中堅痛諸熱症。

**大青**（即蓼藍）　入肝

性稟至陰。其味苦寒。專於清解溫熱諸邪。陽毒發斑。咽痛必用之藥。天行熱狂疔腫風疹並治。俱用其葉。莖蕓瀉肝胆之實火正以祛心胃之邪熱。所以小兒疳熱丹毒必用之

莖之性味。亦治溫熱毒盛發斑等候。

**青黛**（乃藍澱浮沫攪沈掠出陰乾用）　瀉肝胆

散鬱火。治瘟毒發斑。及產後熱利下重。天行寒熱頭痛。與藍性同。而止血拔毒之功。殺虫之力。似勝於藍。又治噎膈之疾。

和尿白筆冰片吹口瘡最效。

**元參**　入腎

主腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。亢而僭逆。咽喉腫痛之專藥。能清上焦氤氳之氣。無根之火。又治目赤腫痛（脾虛泄瀉者忌用）

**淡竹葉**

性專淡滲下降。故能去煩熱。清心利小便。○根能墮胎催生。

**大黃**　脾胃大腸三焦血分藥

凡病在五經血分者宜之。能行瘀血。導血閉。通積滯。破癥瘕。瀉痞滿。潤燥結。散腫毒。瀉腸胃燥熱。

**丑牛**

專一行水。峻下之藥。白者利肺。治上焦痰飲。除壅滯氣逆。通大腸風秘。除氣分溼熱。黑者瀉堅。兼瀉脾胃之溼。消腫治脚氣。利大小便閉。（凡病在血分病人稍弱而痞滿者不可用。）

**只實**　入脾肝血分

消食瀉痰。滑竅破氣。治宿食不消。心下痞悶。

**只殼**

泄肺。走大腸。破氣化痰。除寒熱結。

**芒硝**（即朴硝出齊衡者上。生鋒芒。謂之芒硝。）

治五臟積熱。胃脹閉濇。蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。治小兒赤遊風。以硝傾湯中取布蘸溼拭之。（熱結不至堅者不可輕用。）

**火麻仁**　入大腸脾經

其性滋潤。初服能令作瀉、久服能令人肥健。有補中益氣之功。臟腑結燥者宜之。又治胃熱便難。止消渴。通乳汁。催生難產。及老人血虛便閉。婦人產後便閉最宜。

**猪苓**　入膀胱腎經血分

性善疎利經府。能利水而瀉脾胃水蓄之症。又治瘧癘虫疰。

**澤瀉**　入膀胱

治渾身熱汗出。利膀胱溼熱。逐心痰氣。治水蓄煩渴。其功長於行水。素多溼熱之人甚宜。然亦不可過用。多服病人眼。

**赤茯苓**　入心

但主導利而已。能瀉心經水蓄之症。

**川木通**　入心心胞絡小腸膀胱

脾胃不和。水道不利。致鬱為寒熱。為腫脹。為淋秘。為痺癉。俱宜用此淡滲之。分利陰陽。則水行火降。脾胃和而心腎平矣。其性除脾胃寒熱。利九竅血脉關節。上通心清肺。達九竅。下瀉溼祛熱。能瀉心經水蓄之症。

**京花通**　入肺胃

入肺引熱下降。而利小便。入胃通氣上達而下乳汁。治五淋癃閉。（妊娠忌用）

**車前子**　入膀胱腎經

利小便而不走氣。治氣癃止痛。通腎氣以利小便。則溼去而癃閉除。清熱利竅。專通化行水道。疎通膀胱溼熱。不致擾動真火。能瀉腎與膀胱水蓄之症。

**滑石**

上能散表。下能利小便。為蕩熱散溼。通利六腑九竅之專品。清肺胃之氣。下達膀胱。蕩胃中積聚寒熱。

**燈芯艸**

瀉肺利水。治急喉痺。燒灰吹喉。燒灰塗乳上與兒食。止小兒夜啼。

**瞿麥**

利小便。主關格諸癃結。出竹木刺。決癰腫。明目去翳。破胎墮子下閉血。

**萹蓄**

利水散溼熱。治黃癉霍亂。療小兒魅病。女子陰蝕及浸淫瘡疥疽痔。殺三虫。

**山茵陳**　入膀胱

又名角蒿生子如鈴味辛苦。有小毒專於殺虫。治口齒瘡絕妙有逐溼化熱之功。

**綿茵陳**　入膀胱

葉細如青蒿。專於利水。為溼熱黃癉要藥。治風溼寒熱熱結黃癉。溼伏手陽明大腸。足陽明胃所主之病。

**白茯苓**　入脾胃心肺腎膀胱

開胃化痰利水定悸。止嘔逆瀉泄除溼氣。散虛熱治胸脇氣逆上通心氣。治憂恚驚悸心下結痛。導熱滋乾流通津液。治煩滿寒熱。口焦舌乾利小便。

**杏仁**　入肺

散邪除氣。定喘瀉滯散結潤燥。除肺中風熱咳嗽。不去油用亦能潤滑大腸。

**貝母**　肺經氣分藥（反烏頭一名莔）

兼入心經。善解心胸鬱結之氣。肺受心胞火。乘因而生痰。或為邪熱所干。喘嗽煩悶。非此莫治。實為肺家燥痰開鬱散結化痰解毒之專品。

**乾柿白霜**　專清肺胃之熱

在元氣未漓。可勝寒潤者則宜。若虛勞煩嗽喘乏者用。則鬱閉虛陽。病根日固。與埋薪灰燼中無異。

**柿蒂**

味濇無毒。取其濇以斂內蘊之熱。故專治呃逆。麻雖忌濇而柿蒂之濇。非若五味之酸收閉濇比也。故疹家呃逆。及心中作逆者。公然用之而不忌。

**枇杷葉**　入肺胃

治夏月傷暑氣逆最良。能和胃下氣。蓋氣下則火降。痰消胃和則呃定嗽止。故為治心逆呃噦。及痰嗽之上品。（胃寒嘔吐風寒咳嗽者忌用）

**桑根白皮**

瀉肺氣之有餘。止嗽而能利水。肺中有水氣及肺火有餘者宜之。又治唾血熱渴。水腫腹滿臚脹。利水道。去寸白虫可以

續金瘡。縫後用熱雞血塗之。（肺虛無火因風寒而嗽者服之風邪反閉固不散而成久嗽）

**馬兜鈴**　入肺

散氣肺熱痰喘。聲音不清者宜之。能清熱降氣。麻疹內陷喘滿聲瘖啞者。宜多用之。（肺冷金寒喘嗽失音者忌用）

**款冬花**（蜜水拌炒）

性溫而不燥血。為溫肺治嗽之要藥。潤肺消痰。止嗽定喘。喉痺喉瘖。肺痿肺癰咸宜。治麻亦宜慎用。但非若吉梗為害之大耳。

**金沸艸**（即旋覆花）　肺經大腸要藥

能開結下氣。行水消痰。治驚悸祛痞堅。除寒熱。散風溼開胃

氣止嘔吐。除噫氣。故肺中伏飲寒嗽者宜之。（但性專溫散陰虛勞嗽風熱燥咳不可誤用。用之嗽愈甚）

**括蔞仁**（去殼打去油）

潤燥。為治嗽消痰止渴之要藥。能洗滌胸膈垢膩鬱熱。並治喉痺痛引心胷。咳唾喘息。及結胸滿痛。能降上焦之火。使痰氣下降。痲疹氣喘鼻扇者必用。（脾胃虛嘔吐自利者忌用）

**天花粉**

降上膈痰熱。潤心中煩渴。除時病狂熱。袪酒癉溼黃。治癰瘍解毒排膿。清胃袪熱生津。（凡痰飲色白清稀者忌用）

**甜葶藶**（隔紙炒香研宜用絹濾過服）　入大腸膀胱

專泄肺中之氣。主癥瘕積聚。破堅逐邪。通利水道。亦能滑大便。為能引領肺氣下走大腸也。又治肺癰喘逆。痰氣積聚。通身水氣。肺中之水氣膹滿者。非此不能除。故能瀉肺經水蓄之症。又能消痲疹頭面手足遍身浮腫。（脾胃虛者忌用）

**北芥子**　入肺

散表利氣。豁痰散腫。消腫辟惡。痰在脇下。及皮裏膜外者。非此不達。（泄瀉傷精肺經有熱虛火亢炎者忌用。）

**家蘇子**

諸香皆燥。惟此獨潤。虛勞咳嗽必用之藥。性能下氣。胸膈不利者宜之。與橘紅同為除喘定嗽消痰順氣之品。（但性主疎泄氣虛久

嗽陰虛喘逆脾虛便滑者皆忌用。）

**萊菔子**（即蘿蔔子）

治痰有推墻倒壁之功。長於利氣。生者升。炒熟者降。升則吐風痰。降則定痰嗽。

**竹瀝**

善透經絡。治筋脈拘攣。痰在皮裏膜外。筋絡四肢者。非此不能化之。（胃虛腸滑及氣粗便閉者酙用每至呃逆不食脫泄不止而死。）

**紫菀茸**　肺經血分之藥

止咳逆上氣。胸中寒熱結氣。能疎利肺經血氣。去蠱毒痿躄。能散結降氣。專通肺氣。使熱從尿出而去。療咳唾膿血。消痰

止渴。又治下痢肺痛。善調五勞體虛。止咳定喘。療驚悸吐衄諸血。（陰虛肺熱乾咳者忌用。）

**麥冬**　入心肺胃腎

定心熱驚煩。療肺痿吐膿。專泄而不專收。能清燥而滋水源。（寒多人忌服。）

**肥知母**　入胆胃脾肺

能瀉有餘相火。理消渴煩蒸。下潤腎燥而滋陰。上清肺熱而除煩。（表症未除瀉痢有燥渴脾胃虛人忌用）

**天冬**　肺經氣分藥

兼通腎氣。咳逆喘促。肺痿肺癰吐衄乾咳痰結胷滋肺。肺燥

者宜之。能保肺不受火擾。清金降火。益水之上源。故能下通
腎氣。

**藕汁**

性專散血。止血。除痛。

**梨汁**

消痰降火。止心煩。

**地骨皮**　三焦氣分藥

下焦肝腎虛熱。骨蒸自汗者宜之。有益精氣退邪火之妙。

**家生地黃**　入心腎心胞絡肝經

兼行脾與小腸。為散血之專藥。主傷中。逐血痺。填骨髓。長肌

肉。作湯除寒熱積聚。瘀折跌傷筋。久服身輕不老。又治心熱五心熱。益腎水。涼心血。脈洪實者更宜。戴元禮曰。陰微陽盛相火熾強。來乘陰位。日漸熬煎。陰虛火旺之症。總宜用家園生地黃。以滋陰退陽。故痲宜始終用之。

**乾生地黃**　入脾腎

涼血滋陰。潤皮膚。虛而有熱者宜。故痲不宜用之。

**紫草**　入心胞絡及肝經血分

專於涼血活血。利大小腸血。痘疹未出。熱毒甚。大便閉澁。而毒不得發越者。及已出紫黑便閉者俱宜。痘疹色紅或白。二便利者忌用。

**紫草茸**（痲疹不用）

乃麒麟竭樹上。蟻壞聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出真蠟國者為上。波斯國者次之。古方用以治五臟邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。今人專用之治痘瘡。為其有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草茸呼之。實非紫草同類也。其性甘鹹平。有小毒。（近時人多不知此品。故附入於此。）

**紅花**（又名紅藍花）

能行男子血脈。通婦人經水。活血。解痘痲毒。散赤腫。治產後血暈及胎死腹中。少則養血。多則行血。過用使人血不止。且性兼上行。不可不知。亦主蠱毒下血。

**白茅根**

降除伏熱。利小便。止渴。治吐衄。便尿諸血。

**靜白茅花**　入肺

性上升。散熱止衄。

**鮮射干**

治咳逆上氣。喉痺咽痛。不得消息。散結氣。除腹中邪熱。食飲大熱等候

**竹茹**

專清胃府之熱。為虛煩煩渴。胃虛嘔逆要藥。咳逆唾血。產後虛煩。無不宜之。性雖寒而滑。能利竅。可無鬱過客邪之慮

**漢防己**

去身半已下溼熱。善走下行。長於除溼。主下焦血分之病。除邪。利大小便。去風寒溫瘧熱氣諸病。療水腫膀胱熱。通腠理。利九竅。大抵二便不利。下焦溼熱者可用。（凡上焦溼熱忌用）其苗名木防已。

**當歸**　入心脾肝

凡血受病。及諸病夜甚者。必須用之。專破惡血。養心血。潤腸胃。榮筋骨皮膚。理癰疽。排膿止痛。和營血。散內寒。身能養血。尾能行血。乃血中氣藥。故咳逆上氣。陰虛陽無所附者。用之補陰則血和氣降矣。

**牡丹皮**　入心腎心胞絡肝經

治血中伏火。故相火勝腎。無汗骨蒸。為專藥。其味辛氣寒。能開發陷伏之邪外散。故主治寒熱中風瘈瘲驚癇等症。癥堅瘀血留舍腸胃五臟。及陰虛吐血衂血必用之藥。有行瘀血生好血。破積生新。引血歸經之功。（能走泄精液。汗多自汗者忌用。然性專散血。痘瘡初）起用之。恐致根腳散闊。及婦人血崩。與經行過期不淨屬虛寒者俱禁用。

**銀杏**（又名白菓）

能定喘。生嚼止白濁。降痰。消毒殺虫。塗鼻面手足。去皻皰䵟。生搗能浣油膩。同汞搗。將衣被殺虫虱。去痰垢之功。可例推矣。熟則壅過閉氣。多食令人臚脹昏悶。凡食此過多脹悶欲死者。急以鵞翎醮香油於喉中攪之。得吐則生。或以糞清灌之亦可。

**元胡索**　入脾胃

能活血止痛。治小便尿血。炮炙論曰。心痛欲死。急覔元胡。以其能散胃脘氣血滯痛也。善行血中氣滯。氣中血滯。性走而不守。惟有瘀滯者宜之。痳症腰疼。在未收之前生用。已收之後醋炒用。

**金釵石斛**　入脾胃

甘可悅脾。故厚腸胃而治傷中。鹹能益腎。故益精氣而補虛羸。為治胃中虛熱之專藥。又能堅筋骨。强腰膝。骨痿脾弱囊溼精少。小便餘瀝者宜之。痳後不食。多用與服即能食。

**蒲黃**　入心胞絡肝經

治血治痛。生則行血。炒則止血。生炒並用。則能逐瘀生新。主心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。凡婦人痳症正產墮胎天癸正臨。及妄行等候。必需之藥。

**牡礪**

治傷寒亡陽汗脫。

**敗蒲扇**　敗蒲蓆

汗積日久。鹹寒相濟。故用以燒灰撲身止汗。其用蒲扇者。乃取扇動招風止汗之義也。非謂蒲能禁汗耳。

**紫芫花**（陳者良。水浸一宿。曬乾。醋炒以去其毒。反甘草。）

消痰飲水腫。治咳逆咽痛痃瘕癧毒。逐水瀉溼能直達水飲窠囊隱僻處取效甚捷。不可過劑泄人元氣。又能瀉肝經水蓄之症。勿因其為攻水之品。於痲疹水蓄之候置而不用

百部根（肥白者良抽去心用不去心用則生煩悶但其氣溫。）

為殺虫要藥。故肺熱癆瘵喘嗽有寸匀匕者宜之。蟯（音饒）虫痢及傳尸骨蒸多用之。凡肺胃寒者宜之。痲症有生肺癧者權用又以水濃煎。洗牛馬虱。樹木虫蛀用填孔中。更削杉木塞之其虫即死。殺虫之功。於此可知。

陳皮　入脾肺氣分

治胸中痰熱逆氣。為消痰運食之要藥。留白則補脾胃。去白則理肺氣。能瀉肺損脾理氣燥溼為痲疹之禁藥無咳者。用留白陳皮以甚之。

樗根白皮

苦溫有毒。入氣分暴痢滯者宜之

槐花　入大腸胃心胞絡肝經

治大小便血。目赤腫痛、腸風下血。痔血脉毒。

辰砂

主身體五臟百病。養精神。安魂魄、益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神不老能化為汞。

龍胆草

性沈降。治肝經邪熱。下焦溼熱。目赤腫瘀肉。小兒肝氣。去腸中小虫驚癇。與溼熱邪氣之在中下二焦者。非此不除。以其專伐肝胆之邪也。

桃仁　入心胞絡肝經

為血瘀血閉之專藥。雖苦能泄血滯。甘可生新血。必竟破血之功居多。治熱入血室。瘀積癖瘕。經閉瘧毋等候。而痲症心腹痛大腸閉結。亦有權用者。

百合

補土。消痰止嗽。利小便。散積蓄之邪。主邪氣腹心痛。然性專降瀉中氣。故痲症亦間有用者。（虛寒二便清泄者忌用。）

側柏葉

性寒而燥。大能伐胃。雖有止血之功。而無陽生（陽生）陰長之力。（亡血虛家。不宜擅用。）

麻黃（去根節。湯泡去沫量用。痲症用酒同蜜炒須去根若連根用令人汗不絕、）入膀胱

乃肺經之專藥。故治肺病多用之。去皮毛氣分寒邪。以泄寒實。蓋皮毛外閉。邪熱內攻。肺氣怫鬱。乃衛實之候。宜用之以發汗。若過發則汗多亡陽。（飲食勞倦、及雜病自汗表虛之症用之則脫人元氣禍患莫測）故痲症不輕用。麻黃根。專能止汗。但不宜連根而用。

## 痲後宜用藥性

**川蚊蛤**　入腎

為潤下之味。止渴利小便。治咳逆胸痺。腰痛脇急。鼠瘻崩中等症。

**蚕脫**（又名馬鳴脫。微炒用。即老蚕眠起所脫之皮。今以出過蚕之紙為馬鳴退非也。）

治目中翳障。較之蟬脫更捷。惜乎一時難覔。

**蜜蒙花**　入肝經血分

潤肝燥。為搜風散結目疾專藥。治青盲昏翳。赤腫多眵淚。消目中赤脉。及小兒痘疹餘毒疳氣攻眼。

**川木賊**

能發散解肌。升散火鬱風溼。專主眼目風熱暴翳。止淚。取其能發散肝肺風邪。多用令人目腫。（久翳及血虛者。傷暑與暴怒赤腫者忌用。）

**白蒺藜**（酒浸炒焦去刺）　入肝腎

治痰消癧腫。搜腎臟風氣。為治風明目要藥。風入心腎心胞絡者。此為嚮導。目疾為風木之邪。風盛則目疾。風去則目明。矣。其性苦能泄。溫能宣。辛能潤。故專治惡血。破癥結積聚。治喉痺乳難。

**草決明**（又名決明子炒研）

能清熱明目。治青盲目淫眼赤淚出。不宜久服。久服令人患風。相感志云。園中種決明。蛇不敢入。

**石決明**（九孔者佳。麪包煨熟研。水飛過用。反雲母石。）　入肝腎

為磨翳消障之專藥。又治風熱入肝。煩擾不寐。遊魂無定。不宜久服。恐消乏過當。令人寒中。

**金銀花**　入脾通肺

主下痢膿血。為內外癰腫之要藥。解毒祛膿。瀉中有補。癰疽潰後之聖藥。能消腫。又能利風虛。（氣虛膿清。食少便瀉者忌用。）

**紫背浮萍**（又名水萍）　入肺

其性輕浮。入肺經。達皮膚。故能發揚邪汗。為祛風專藥。發汗勝於麻黃。下水捷於通草。惡疾癘風遍身者。濃煎浴半日。多效。本經主暴熱身痒者。以其專疏肌表之風熱也。下水氣者。以其兼通胃大腸肉理也。勝酒者。謂胃與大腸通達。而能去酒毒也。長鬚髮者。謂毛竅利而血脉榮也。止消渴者。謂經氣和而津液復也。去風丹治大麻風癩風。一切有餘風溼脚氣。及三十六種風皆驗。（元氣本虛人服之。未有不轉增劇者。至於表虛自汗者。尤為戈戟。用者須慎。）

附治風丹方　紅萍為末。蜜丸彈子大。以豆淋酒下一丸。

並附豆淋酒法　黑豆半升。炒令烟出。以酒三升浸之。去豆以酒聽用。

**苦參**　直入腎經

凡內有實熱者。足以當之。若溼熱既去。而更用之。必致苦寒傷腎。定生腰重脚弱之疾。

威靈仙

性善下走。通十二經、故能宣通五臟、治胃脘積痛。腳脛痺溼痛風之要藥。消水破堅積、朝服暮效。痘疹毒壅於上、不能下達。腰下脛膝。起遲遲者。用為引下、立效。其性利下、病人壯實者。誠有殊功。但能耗血走氣。氣虛者服之。必虛瀉而成痼疾。（血虛不因風溼者、忌用。）

白菊花

去風熱之要藥。治諸風頭眩腫痛、目欲脫淚出。又治皮膚死肌、惡風溼痺、久服利氣血。

石菖蒲　入心胞絡腎經

心氣不足者宜之。主風寒溼痺。咳逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出聲音。主耳聾癰瘡。溫腸胃。止小便利。久服不忘不惑。

胡黃連

大伐臟腑骨髓邪熱。小兒腎氣實。猶可當之。腎臟不足者用之奪人天元。性能直達下焦、善搜淫火之毒。（忌猪肉。犯之漏精。）

川鬱金　入心及心胞絡

治吐血衄血。唾血血腥、破惡血血淋尿血。婦人經脈逆行產後敗血沖心、及宿血心痛、

川姜黄　入脾（有二種、蜀川生者色黄質嫩有鬚、折之中空有眼、切之分為兩片者。為片子姜黄江廣生者質

粗形扁、如乾姜僅可染色、不入湯藥。今藥肆混市誤人、徒有耗氣之患、而無治療之功也。）治血中之氣。又治風寒溼氣手臂痛。又治癥瘕癰疽、通經消腫毒。

殭蠶

祛風化痰。治驚癇夜啼。去三虫。滅黑䵟。男子陰瘍。又治咽喉腫痛、喉痺立愈。又治風痰結核、頭風皮膚風癮、丹毒作痒。疳蝕金瘡。疔腫風疾。皆取其散結化痰之義也。

天麻　肝經氣分藥

肝虛不足、用以補之、諸風掉眩。眼黑頭旋、風虛內作者、非此不治。小兒驚痰風熱、服之即消、凡久服、則遍身發出紅斑、是其定風之驗也。（血虛無風、火炎頭痛、口乾便閉者。不可妄投。）

遠志　入腎

非心藥也。能強志益精。

酸棗仁　入肝胆

熟入脾經、酸棗本酸性收、其仁則甘潤而性溫、故能散肝胆二經之滯。炒熟用。則收斂津液。故療膽虛不得眠。及煩渴虛汗之症、生用。則導虛熱。故療膽熱好眠、神昏倦怠之症。又治心腹寒熱、邪氣結聚、酸痛血痺等症、皆生用以疎利肝脾之血脈。肝虛煩心不能藏魂、及傷寒虛煩多汗與虛人盜汗者、皆炒熟用。以收斂肝脾之津液、

**青皮**　入肝脾

破滯氣。削堅積。及小腹疝疼。凡久患瘧而熱甚者。必結瘧塊。宜多服。能踈利肝邪。但伐肝太甚。中虛者忌用。恐傷生發之氣。又最能發汗。汗多者忌用。

**山茱萸**

止小便利。秘精氣。治腦骨痛。療耳鳴。補腎氣。興陽道。堅陰莖。添精髓。止老人尿不節。治面上瘡。能歛汗。（命門火旺。赤濁淋痛。及小便不利者忌用。）

**柴胡**　入胆經

本手少陽三焦。足少陽胆經藥。若病手大陽小腸。足大陽膀胱。用此味大早則引寇入門。痲症所以始終忌此。其性升發虛而氣升者。嘔吐及陰火炎上者。忌用。若陰虛骨蒸服之。助其虛陽上逆。勢必耗盡真陰而後已。痲症血多虛耗。故切為戒忌。操司命之權者。不可不察。

**銀柴胡**　入腎胃

性味與石斛不甚相遠。不獨清熱。兼能涼血。虛勞宜用。且能推陳致新。明目益精。痲後身熱不除。日久尫羸者甚宜。

**九肋鼈甲**

治痎瘧瘧母。虛勞寒熱。癥瘕痞疾。經水陰瘡。骨蒸勞熱。自汗等症。

**阿井膠**　益肺補腎

治心腹内崩。勞極洒洒如瘧狀。腰痛四肢酸疼。女子下血安胎。為諸失血要藥。勞症咳嗽喘急。肺痿肺癰。潤燥滋大腸。治下痢便膿血。所謂陰不足者。補之以味也。久服輕身益氣。

附辨真偽法

以頂上有鬃文。極圓整者為真。折之沈亮。不作屑。不作皮臭。

以蛤粉炒成珠。經月不軟者為佳。東阿產者。雖假猶無妨害。

其水膠入木煤。贋造有傷脾氣。慎不可用。

**五穀虫**（又名天蠍子）

治小兒諸疳積滯。腹大脚弱。翳膜遮睛

**穀麥芽**

消穀食。

**芡實米**

益脾利溼遺精濁滯。小便不禁者宜之。

**白扁豆**

助脾胃。和中下氣。治霍亂。

**薏苡仁**

升少降多。能清脾様肺熱。及久虛勞嗽。肺痿肺癰。虛火上乘。皆宜用為下引。又能利筋去溼。治久風溼痺。拘急不能伸屈之病。其功專於利水溼。治虛人小便不禁。如治水溼。則生用

（津枯便秘。陰寒筋。及妊娠禁用。以其性專下泄也。）

**六神麯**（入胃）

其功專於消化穀麥酒積。（脾陰虛胃火盛者忌用。）

**山查肉**（入肝脾胃）

大能尅化飲食。其功長於消肉積。行滯血。痢疾初起。多積垢。用姜汁炒。

**生薑**（入脾肺）

散風寒。止嘔吐。化痰涎。消脹滿。去臭氣。通神明。治傷寒頭痛鼻塞。咳逆上氣。嘔吐等症。煨熟用。則降而不升。止腹痛泄瀉。扶脾氣。散鬱結。

**紅棗**（脾經血分藥）

和榮衛。滋脾土。平腎氣。（中滿者忌用）

**吉梗**

清肺氣。利咽喉。為肺部引經藥。又能開提腠理。與甘草同為舟楫之劑。諸藥有此一味。不能下沈。但其性升。痲症最忌升發之味。甚不宜用。即痘瘡下部不能起發。亦為之忌。蓋其能阻藥力於上。不能下達也。

**甘草**（反海藻大戟芫花甘遂）

主五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。解金瘡腫毒。生用瀉火解毒。炙用補中散表。雖能和藥性。為常用之品。然

---

能調補中氣。故痲症切為禁忌。

**白芍藥**（反藜蘆）

用入脾藥。以酒炒。入止血藥。以醋炒。入和營藥。及下痢後重。血熱瘡毒。俱以酒洗生用。性酸斂。膀胱得收斂愈閉。故小便不通者忌用。痲症最忌收斂之味。最宜利小便之品。是以痲症切忌。

**赤芍藥**

性專下氣止痛。而痲症亦忌。

**檳榔**

泄胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石之沈重。能墜諸藥至於下極。逆氣理急。諸氣壅腹脹後重。胸腹蟲。食積滯作痛。下氣消脹。逐水除痰。殺虫。治痢攻食。破積止瘧。療疝。脚氣。痺癰。等候並治。

**大腹茸**

散無形之滯。治痞滿膨脹。水氣浮腫。脚氣壅逆。

**厚樸**

能破血中氣滯。治中風傷寒。頭痛寒熱。驚悸逆氣。血痺死肌。去三虫。

**蕪荑**

辛散能袪五內皮膚。骨節溼熱之病。去疳殺虫。及腸風痔瘻。

惡瘡疥癬

## 五靈脂

氣腥味苦酸大傷胃氣雖有治目翳療中脘疼痛之功藜藿之人稍可以用膏粱之士大為不宜麻症亦僅於香薷湯中用之

## 香附米　三焦肝經氣分藥

開鬱消痰食止諸痛散風寒行血氣月候不調胎產崩漏多怒多憂者之要藥治兩脇氣妨心忪少氣生用則上行胸膈外達皮毛故能散風寒熟用則下走肝腎外徹腰足故能調氣血

## 烏藥

散諸氣治中風中氣諸症能理七情鬱結上氣喘急能治氣血凝滯霍亂吐瀉痰食稽留但膏粱之輩血虛內熱者忌用

## 吳茱萸　入肝行脾

散邪温中下氣止痛咳逆寒熱除溼血痺逐風邪開腠理定吐止瀉理關格中滿脚氣疝瘕制肝燥脾風厥氣上逆陰寒膈寒氣不得上下腹脹下痢又治氣逆裏急等症

## 藿香葉　入脾肺

助脾醒胃故能止嘔逆開胃進食温中快氣去瘴氣止霍亂治心腹痛凡時行疫癘山嵐瘴瘧用此醒脾健胃則邪氣無

可容而舒（陰虛火旺胃虛作嘔內無留滯者忌用恐傷正氣引邪入內）

## 川芎　入肝

血中理氣藥搜肝氣補肝血潤肝燥又治一切風氣血氣及面上遊風目疾多淚俱宜且上行頭目下行血海為三焦胆心胞絡肝頭痛及血虛頭痛之聖藥助清陽之氣去溼氣在頭頭痛必用之藥麻症若未收之前用之反致頭疼故麻症忌用血痢已通而痛不止用之以行氣又治婦人血閉無子凡骨蒸盜汗陰虛火炎咳嗽吐逆及氣弱之人不可服為其性辛散令真氣走泄而陰愈虛也

## 縮砂仁　脾胃肺腎大腸小腸膀胱七經之氣藥

能引諸藥歸丹田治脾虛泄瀉宿食不消瀉痢白沫腹中虛痛寒飲脹痞噎膈嘔吐和中行氣止痛安胎用之悉效又治血痢（火炎咳嗽忌用）

## 半夏　入胆

兼入胃脾虛而有痰氣者宜加用之胃冷嘔噦最要之味治心下堅胸脹咳逆頭眩咽喉腫痛又能利水開痰故能治腸鳴下氣止汗但其性悍燥辛温有毒能去溼豁痰健脾麻症故切禁之

## 南星（又名虎掌）

為開滌風痰之專藥能下氣利膈破堅積除麻痺散血墮胎治風勝溼除痰攻積拔腫又治口喎舌糜諸風口禁但其味

辛而麻。氣温而燥。性緊而毒。故痲症禁用。

**人參**

補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。補元氣。止渴生津。和營養衛。久服輕身延年。

**沙參**

專瀉肺氣之熱。喘嗽氣壅。小便赤濇不利。金受火尅。陰虛失血。或喘嗽寒熱。及肺痿等候宜之。

**升麻** 胃經本藥

性升上行。治中惡腹痛。用以開發胃氣。治喉痺口瘡。用以升散大腸胃三焦胆之大熱。以其氣發動熱毒於上。爲害莫測。

故痲疹尤爲切禁。誤用喘滿立至。惟痲後口瘡牙疳及脫肛等候。方可略施。張璐先生曰。按古方痲疹升發藥中。多用升麻。曷知升麻性升。能升動陽氣。每致邪熱上浮。而作喘逆。常以紫蘇葱白代之。非但升麻當慎。即吉梗初起之時。亦須酌用。恐其載引濁氣於上也。

**白朮**（又名山薑） 入脾胃

生用除溼溢燥。消痰利水。治風寒溼痺。死肌。痙疸。散腰臍間血。及衝脉爲病。逆氣裡急等候。製熟用和中補氣。止渴生津。止汗除熱。進飲食。安胎等候。又主大風在身面。風眩頭痛。目淚出。逐皮膚間風水結腫。除心下急滿。及霍亂吐下不止。益津暖胃。消穀嗜食。但其純陽之土氣。而無益陰之能。故痲症禁用。

**附製法**

入諸補氣藥中。飯上蒸數次用。

入肺胃久嗽藥中。用蜜汁拌蒸。

入脾胃痰溼藥中。用姜汁拌晒用。

入健脾藥中。用土炒用。

入瀉利虛脫藥中。炒存性用。

入風痺痰溼藥中。利水破血藥中。俱生用。

**蒼朮**

可升可降。能徑入諸經。踈泄大腸與胃之溼。而安脾肺。辟時行惡氣。因用米泔水浸炒。故能除上溼發汗。能發汗。故能去風寒溼氣。祛溼而去死肌痙疸。下氣而消痰食飲癖。又能總解諸鬱。性雖開腠理。而辛熱温燥。故痲症禁用。

麻科活人全書卷之二

安成　璞齋謝玉瓊纂輯　　怡菴彭　肇頥刊

阜山劉齊珍原刊

## 四方麻名第一

糈糠疹瘖膚溫痧。其實一麻也。雖各方稱原來各有別。治同一例應如神。

麻疹之名各方不同。在京師呼為溫疹。河南呼為糈瘡。山西陝西呼為糠瘡。山東福建廣東廣西雲南貴州四川俱呼為疹子。江南呼為痧疹。浙江呼為瘄子。湖廣江西俱呼為麻疹。又呼為艄子。閩人氏呼膚疹。雖四方之命名有別。其實皆一麻也。調治之法原無異耳。

## 歲氣第二

麻疹須明歲氣。先勿輕汗下作傷寒。察人虛實施良劑。無伐天和損壽元。

麻疹之症。其初發熱與傷寒相似。但麻則面頰紅。咳嗽噴嚏。鼻流清涕。目中淚出。呵欠喜睡。或吐或瀉。或手掐眉目鼻面之為異耳。不可誤作傷寒施治。而妄用汗下也。妄汗則增其熱。而為衄。為咳嗽。為口瘡。咽痛。為目赤痛。為煩燥。為大小便不通。妄下則虛其裏。為滑泄。為滯下。經曰必先歲氣。毋伐天和。言不可妄汗下也。是以治麻者。務須先明歲氣。如時令溫煖。以辛寒之藥發之。用防風敗毒散。（見第）如時令喧熱。以辛涼之藥發之。用白虎解毒湯。（見二十六條）或黃連解毒湯。如時令大寒。以辛熱之藥發之。用桂枝解毒湯或葛根桂枝湯。如時令時寒時煖。以辛平之藥發之。用荊防敗毒散。或葛根解毒湯。倘兼疫癘之氣。則以人參敗毒散主之。又要看人之虛實。如吐瀉不止。以人參之類補之。如便秘煩燥。以酒蒸大黃微利之。經曰無實實。無虛虛。倘損不足而補有餘。夭人性命。非關天數。醫殺之也。能知損有餘而補不足者。方為良工。

黃連解毒湯。

黃連　黃柏　黃芩　枝仁　荊芥　知母　石膏　大青

元參　木通　防風　吉梗　甘艸　水煎服

桂枝解毒湯

荆芥　防風　牛蒡子　麻黄　吉梗　人参　川芎

赤芍　羌活　甘草　桂枝　生姜引

葛根桂枝湯

葛根　防風　甘草　桂枝　赤芍　升麻

姜三片引淡豆豉一錢引

荆防敗毒散

荆芥　防風　茯苓　只壳　前胡　柴胡　吉梗　川芎

羌活　獨活　甘草　薄荷五葉引（除荆防加人参名人参敗毒散）

葛根解毒湯

葛根　荆芥　前胡　牛蒡子　防風　連翹　淡竹葉

人参　柴胡　吉更　赤芍藥　羌活　升麻　甘草

水煎服

---

預解宣毒第三

凡遇冬温大不祥。民多疫癘發瘡瘍。如逢麻疹相傳染。可用湯丸預解良。

麻毒從來解在、初出盡毒解憂可無、腹中脹痛邪猶伏、喘促昏沉命必殂

春温夏暑。秋清冬凉。此四時之正氣也。若冬應寒而反温。乃陽氣暴洩、火令早行。人感之者。至於來春。必發瘟疫。未出痘疹者。必感之而出。然疹雖胎毒、未有不由天行時令而發者。故一時傳染相似、遠近大小皆發、為父兄者、但見境里痘麻正行、宜先以消毒保嬰丹、代天宣化丸以預解之。可使毒微

而不為已甚。此雖先賢活人之婆心。而要知麻疹之症。只怕一時不能得出。若得出盡。則毒便解。到底治麻者。於初熱未出之時。宜以宣毒發表湯。去升麻吉更甘草。或葛根解肌湯。（二方俱見第五條）去赤芍甘草。葛根疏邪湯。（見三十三條）去骨皮。防風敗毒散（見第五條）去石膏知母淡竹葉吉更甘草。加前胡葛根等方隨用而發之。但得麻出。則毒解而始終無虞矣。如用一劑而麻仍不出、又再進一服、外以酒煎胡荽噴被蓋之。切要空露頭面。或以苧蔴醮胡荽酒遍身戛之。令其毛孔疏開、麻方得出也。切勿用歲氣內熱時令寒暄而用辛熱寒凉之劑、助其炎威、阻其發機、而成壞症、如三四次發之不出、又用臭椿樹

根皮煎湯薰洗尚仍不出如之腹作脹滿氣上喘促昏悶亂煩躁不寧譫語妄言者。必死無疑矣。有云用當歸紫草茸紅花牛蒡子之類。服之即現斷不濟事。

消毒保嬰丹

醒豆藤（不拘黃荳菉荳根上纏遶細紅絲藤於八月內生冬之日採取陰乾听用）（一兩五錢）

大黑荳（三十粒） 赤小荳（七十粒） 牛蒡子（炒） 辰砂（水飛過）

生地黃 山查肉（各一兩） 荊芥穗 防風 獨活 當歸

黃連 吉梗 生甘草（各五錢） 老絲瓜（隔年經霜者二個要連藤蒂帶五寸燒灰）

升麻 赤芍（各七錢五分）

爲細末以沙糖合丸如李核大濃煎甘草湯化下

凡修合此丸。須宜春分秋分或正月十五。七月十五十月十五等日。洒掃淨室焚香至誠修合。勿令僧尼道士婦女有孝服人及六畜見之。合畢於日出時。焚香叩齒東向吸氣一口吹於丸藥之上。向大陽覺呪曰。

神仙真藥 體合自然 嬰兒吞服 天地齊年吾今奉太上老君急急如律令一口氣默唸七遍

代天宣化丸即韓氏医通所載五瘟丹

甘草（甲己年化土以此味爲君）

黃芩（乙庚年化金以此味爲君）

黃柏（丙辛年化水以此味爲君）

枝仁（丁壬年化木以此味爲君）

黃連（戊癸年化火以此味爲君）

連翹（爲佐） 山豆根（爲佐） 牛蒡子（爲佐）

如逢甲子己巳年。則以甘草爲君。黃芩黃柏枝仁黃連爲臣。連翹豆根牛蒡爲佐。乙庚等年。俱倣此君藥一兩臣藥用五錢佐藥用二錢五分。

爲細末。於冬至日以雪水煮升麻汁。拌麵粉攪糊合丸用辰砂爲衣。以淡竹葉煎湯化下。

## 諸潮亦能發麻第四

傷寒傷風與傷食。驚風等候諸潮熱。久而不去亦非宜。痘疹因而乘間出。

手足稍微冷。惡寒無汗。面色青慘而不舒。左額有青紋者。傷寒之熱也。手足稍微溫發熱有汗。面赤而光者。傷風之熱也。並宜用惺惺散。除人參白朮發散之。目胞腫而右頰有青筋。發熱而頭額肚腹之處最甚。或兼嘔吐腹疼者傷食之熱也。以備急丸下之。面色青紅額上中心有紋。手掌心有汗。時作驚惕。手絡脉微動而發熱者。此驚熱也。以瀉青丸牛黃清心丸主之。身熱而倍能食。唇紅頰赤大小便閉脇下有汗者此

風熱也。以宣風散主之。已上諸熱。久而不去。內外感發。則所蘊痘痳之毒。亦能乘間而出矣。

惺惺散　治風熱咽喉不利。脾不和。三焦胆經渴。小便不利。

人參　吉更　白苓　白朮　瓜蔞根　甘草各一錢

細辛（三分）　薄荷葉（五片）　防風　川芎（各一錢）　水煎溫服

備急丸

木香（二錢五分）　大黃　牽牛（各五分）

為末。神麯麪糊合丸。綠豆大。食前用查肉煎湯下五七丸

瀉青丸

羌合　大黃（炒）　川芎　當歸　防風　梔仁　龍胆草

為末。蜜丸雞頭子大。淡竹葉煎湯加沙糖調下一丸。

牛黃清心丸　治發熱甚。心煩不寧

生黃連（五錢）　黃芩　梔仁（各三錢）　川鬱金（二錢）　牛黃（二錢五分）

辰砂（一錢五分）

為末。用冬雪水調麪粉糊丸。黍米大。燈心湯下七丸。

宣風散　大熱利其小便而不愈者以此下之

檳榔（二個）　陳皮　甘草各五錢　生丑牛（二兩）　炒丑牛二兩

為末。二三歲孩兒。用五分。四歲孩子。用一錢。食前蜜湯調下。

易老加防風。本方有青皮。

---

初潮認症若何

痳為胎毒發於心。肺與相連熱毒侵。咳嗽鼻中清涕出。更兼兩目淚溫溫。

痳疹之症面必紅。呵欠咳嗽鼻流濃。汪汪眼淚頻頻嚏。休作傷寒別症攻。

痳疹初潮未現標時。必身熱憎寒。頭疼咳嗽。或吐或乾嘔。或瀉或腹痛。或鼻塞。或鼻流清涕。噴嚏呵欠。眼胞浮腫。目淚汪汪。腮赤體疼。煩燥不寧。夫痳乃胎毒所發。毒者火也。痳疹小而色紅。碎密。其行於皮膚之間者。屬手少陰心經君火也。五臟心肺相連。肺位乎上。心經火旺。則肺受之。故痳之發。惟肺受

毒最重。其咳嗽者。肺因心火炎上。而肺葉焦舉也。鼻流清涕者。鼻為肺之竅。以火爍金而液自流也。目中淚出者。肺熱則移於肝。肝之竅在目也。肝屬木。木能生風。故有呵欠也。吐與乾嘔者。心火流入於胃也。肺與大腸為表裏。肺熱流於大腸。故眼胞浮腫。腹痛而泄瀉也。腮赤煩燥。心火旺也。噴嚏肺經火邪也。或手掐眉目唇鼻及面者。肺熱症也。然痳雖胎毒。未有不因時氣冒感而發者。故其症與傷寒相似。而身熱憎寒。頭疼體痛也。但治痳者。莫作傷寒施治。當先以肺為主。總宜瀉火清金。而瀉火當用黃連黃栢梔仁大青元參連翹之類。清金當用黃芩知母貝母麥冬石膏天花粉牛蒡子地骨皮

桑白皮杏仁之類、夫痲初起。既與傷寒相似。而認痲須細看兩耳根下。頸項連耳之間。以及背脊之下。至於腰間。必有三五紅點。此即痲之報標。如無紅點以爲証佐。則當以別症施治。此屢試屢驗者也。若果有紅點。及現有前症相符。則是痲候。宜用宣毒發表湯。去升麻吉梗甘草。或少加蘇葉。或少加胡荽。或并去淡竹葉主之。或用葛根解肌湯。去赤芍甘草加防風。或更加蘇葉只壳主之。或用防風敗毒散。去吉梗甘草石膏知母。或并去淡竹葉。加前胡葛根主之。俱以燈芯爲引。與服。以疎風解肌托之出外。可以坐享平安。雖有吐瀉。亦不必拘泥。痲出而吐瀉自止。蓋痲屬熱候。熱冲胃則吐。熱冲大腸則瀉。此痲之常候。痲出熱能吐瀉之症。不治自止。不必更憂吐瀉之不止而妄治也。

宣毒發表湯　治痲發熱。欲出未出時。各症並宜。　凡地方痲疹發作之時。初潮之際。未明是否。痲症。當以此方主之。縱非痲候。即是冒感傷寒。用之無碍。　并附加減法於方尾。

薄荷葉（八分）　葛根　防風　荊芥穗　連翹　牛蒡子（炒）

木通　只壳　淡竹葉（各一錢）　升麻　吉梗　甘草

燈芯引（勿用生薑姜皮）　冬天寒月。可加蘇葉八分。又加葱白爲引。

暑月炎天。可加生黄芩（一錢）　總除升麻吉更甘草不用。

初潮無咳　留白陳皮。以其其咳有咳切不宜加。

初起往來潮熱者。除淡竹葉。免解肌熱。致痲難透表。在寒月仍宜加蘇葉葱白以疎表之。

初潮潮熱太甚者。加赤茯苓生地黄。并可加生黄芩。不必拘痲初用寒凉冰伏。痲不得出之說。正當用之。以保肺受火尅之虞。但春冬寒月。黄芩等分宜畧少耳。

初潮無汗。加葱白以發之。更畧加衣被穿蓋。以取其汗。使毒透。切不可遽用胡荽酒噴之法。免助邪火內攻。肺金重受其尅。藥中畧加胡荽作引稍可。

初潮不食。不必治之。蓋熱毒內蘊。自必不食。熱毒一解。自然能食。切勿加進食開胃之藥。

初潮即見喘促。加黄芩葶藶瓜蔞仁以清肺開胸。或更加姜汁炒北芥子。家蘇子萊菔子以降之。

初潮嘔吐。加竹茹柿霜。如無柿霜用柿蒂亦可。

初潮呃逆。枇杷葉竹茹。

初潮鼻衄。加鮮茅根。

初潮即現咽喉痛者。加射干。倍用牛蒡子。

初潮即現唇乾齒燥。舌胎枯黄口渴等候加麥冬花粉黄芩。甚則加黄連黄栢枝仁等味以預解之。

初潮熱甚。大便堅實者。加火蔴仁二三錢以潤之。用只實以導之。免致閉塞而熱毒不得發越。致變紫黑。如便閉不通

者加生黑白丑牛末以利之如利之不通者必生氣喘扇逆症即用黃連解毒湯加大黃牛蒡子連翹地骨皮桑白皮以通之如兼口渴者並加麥冬天花粉

初潮大便溏者方內之只殼等分減用以為開洩之路庶可免便閉之患

初潮溏泄而有微汗除薄荷竹葉不可兼用止汗止泄之品以堵其發越之門

初潮泄瀉者除只殼

初潮洞泄者除只殼加猪苓澤瀉以分利之不可止泄以塞其舒暢之機

初潮小便赤者除薄荷葉加赤茯苓或更加車前子以利之

初潮小便不通者合導赤散（家生地黃二錢木通甘草各一錢車前子）淡竹葉除甘艸加車前子以通之

初潮溺血者如生地黃黃連黃柏黃芩桃仁俱可隨意加入更加牡丹皮以去其滯血免使留而為殃

冬月寒天無汗不咳者量加蜜汁和酒炒麻黃二三分

其餘諸症不能備悉宜因所見之症加減而用至於等分之輕重須量人之大小若月內半週嬰兒只宜以盃許與服當令乳母代服使藥性流入乳中兒食母乳如同服藥

葛根解肌湯　治麻初起發熱咳嗽或乍涼乍熱已現麻路並宜初潮未明是否麻症加減同宣毒發表湯　並附已現麻路加減於尾總除赤芍甘草不用

葛根　前胡　荆芥穗　牛蒡子　連翹（去）　蟬蛻各八分
木通汁　赤芍　甘草　燈芯引　桑白皮（蜜蒸）　貝母（去心姜汁）
藥隨意加入後藥

已現潮熱大甚者加生地黃地骨皮茯苓更可加黃芩

已現口渴者加麥冬天花粉

已現無咳者不妨少加留白陳皮

已現無汗者加葱白

已現氣喘加葶藶栝蔞霜　喘甚者加北杏蘇子蘿苜子（俱[illegible]）

已現嘔吐者加柿霜竹茹

已現鼻衄者加茅根衄甚者更加黃芩黃連（俱生用）

已現大便堅者加只實大麻仁　已現大便閉者加丑牛

已現大便閉用丑牛仍不通者加生大黃黃連黃芩

已現大便溏者加赤苓澤瀉　洞泄者亦如之

已現小便赤濇者加赤苓澤瀉

已現小便閉塞不通者加車前子并加只殼

防風敗毒散　加減照前二方酌用總除甘吉二味不用

防風　荆芥穗　連翹　牛蒡子　石膏　知母　木通
薄荷　只殼　淡竹葉　吉更　甘草　燈芯引

## 初熱未明是否勿峻發表第六

初熱之時症未明。醫家診視生疑心。此時且勿峻發表。畧施清解得安寧。

初熱之時。不見麻路。未明是否。不可發表。畧宜清解。用利咽散主之。如見麻路。則當以葛根解肌湯。（見第五條）去赤芍甘草加防風只殼葱白主之。更加蘇葉亦可。或以蘇葛湯去赤芍柴胡甘草加只殼葱主之。如麻不出。則用蘇葛湯去柴胡赤芍甘草加蜜酒炒麻黄以發之。或以宣毒發表湯。（見第五條）去升麻淡竹葉吉梗甘草加蘇葉葱白。或加蜜酒炒麻黄。開提腠理。自然出現。或用厚衣綿絮蓋之。得汗自頭至脚。漸減衣被。使

皮膚通暢腠理開豁。而麻易出。縱不出不可再汗。恐致亡陽之變。只宜頻以葱白湯與服。使毛竅中微汗潤澤。其麻自出。庶無熱閉發搐之患。既出之後。可用防風敗毒散（見第五條）去淡竹葉石膏知母吉更甘草主之。不可無表。防其内伏。既出而潮熱甚。或兼口渴者。則石膏知母竹葉並宜用之。且更可加地骨皮生地黄麥冬之類。以清其熱。而凉其血。以生其津也。更可加枯黄芩以清肺。生黄連以瀉心。而諸候不生矣。

利咽散　治咽喉腫痛

牛蒡子（炒）　元參　防風　水煎服

蘇葛湯（聯杏心法方）　治麻初熱未明症候

蘇葉　粉葛　木通　元參　黄連（微炒）　連翹　防風

黄芩　柴胡　赤芍　甘草　無汗加蜜酒炒麻黄

發熱太甚者。加牛蒡子。（炒五分）

發熱太甚不止。加鮮骨皮生地黄。

如熱不大甚者。黄連黄芩俱去之。加只殼荊芥穗。

葱三根引。水煎熱服。

## 避風寒第七

麻症須當避風寒。不避風寒膚燥乾。腠理閉密毒難出。後生危症有千般。

風寒本自外來。麻症終始最宜速避。如或不謹。失於避忌。一受風寒。則令肌膚乾燥。腠理閉密。遂至麻毒不得發越而難出矣。初潮之時。若能避忌。麻則易出。毒則易解。自無後患。正出之際。不知避忌。麻為風寒所觸。出必復收。致毒積於内。而不得解。變症生焉。已收之後。切宜避忌。若不避忌。留毒難盡。變症無窮。輕者症延日久。咳嗽與痰疾。終身不愈。重者必變危症而難救也。是以麻收之後。必待二七之後。熱退身凉。無痰不咳。飲食如常。精神復舊。方可不避。慎之慎之。

### 忌食生冷物驟用寒凉藥第八

痳屬火候多煩渴。病者時喜食凉物。初熱未出也須禁。縱之恣食毛孔密。

痳用寒凉本所宜。也須審時而察機。大寒遽用痳難出。伏毒內攻咎在醫。

痳本火候。自發熱至出透之日。未免有口渴煩燥。故多喜食冷物。蓋痳症屬火。食冷雖曰無妨。然生冷等物。痳症始終當忌。何則。夫痳最要透表。只宜温煖飲食。以候其透表。若於初潮未出之際。而食生冷。冰伏火邪。則毛孔閉密。而毒火難出矣。即透表之後。亦忌食生冷。但柿餅秋梨白蓮藕等齊可以

畧用。桃李梅子柑橘石榴菱角等物。又在所必忌。然非但患痳者生冷等物忌食。即醫家治痳寒凉之藥。亦不可驟用。夫痳初發熱之時。而最忌寒凉之品者。蓋恐冰伏痳毒。使毒氣鬱遏而不得出。而成內攻之患也。古人謂天氣暄熱。宜用辛凉之味。如黃連解毒湯之類。不知天時之暄熱。熱氣豈寒凉之藥所能解也。今若驟用寒凉。恐不足以解外熱。而適足以阻內熱。使之不得出也。曾見有一歲孩子出痳。發熱未見點時。而發驚搐。醫家認作急驚。用寒凉之藥攻治。致痳毒隱隱在皮膚之內。不得出表。後一醫以滋陰爲主。用四物等劑亦不能救。煩悶聲啞。數日而死。此可以知驟用寒凉冰伏痳毒

之爲害也。今因天時暄熱。而執泥歲氣之說。而驟用寒凉。豈理也哉。故治痳者。凡於痳初出之時。雖有身熱煩渴等症。宜以宣毒發表湯（見前方）去甘草吉更升麻。少加酒炒黃芩三五分以清之。切不可遽投黃連黃栢枝仁等味。恐冰痳毒而內伏。致痳不得外出。後雖設法宣表。而痳終不得出矣。可不畏哉。

## 忌食辛辣熱物誤用辛熱藥餌第九

辛辣香甜與熱湯嬰兒乳母俱忌嘗。果能禁謹不違法。管教始終保安康。

麻喜清涼最忌溫。燥熱藥餌勿沾唇。誤用能助其邪火。壅蔽內攻救無門。

辛辣之味。與熱湯水。患麻之人。多酷好之。何則。蓋麻屬火候。火蘊於內。得辛辣熱物。而痰火暫快。故多喜食。凡患麻者。須宜禁戒。庶無後患。如或因其酷飲。遂以胡椒茱萸作湯。或淳酒薑蒜韭薤之類。與食而順其欲。暫雖快暢。久則痰火益甚。致麻紫黑。或二便閉結。或成血痢。腸頭露出。或生牙疳。或唇舌破裂。或喉中痰響齁鮯。或五竅出血。或大熱不止。致胃火益甚。而飲食即吐不能下者。種種惡候。因而生焉。若食乳孩子。乳母亦當禁忌。倘不禁忌。而食辛辣等物。兒食其乳。必致變症不測。可不慎乎。夫患麻之人。辛辣之物。既當忌食。而治麻醫家。用藥立方。辛熱燥悍之品。慎勿妄施。如桂枝麻黃羌活獨活白芷川芎蒼朮香付蓽仁白朮丁香木香砂仁肉豆蔻肉桂之類。不可輕使。若於麻初熱之時。而誤用之。反助其毒。使毒氣壅蔽。而不得出。致有內攻之患。即有痲疹初起而見四肢逆冷者。乃火極似水之故。不可妄投熱藥。麻見自然溫和。昔人謂天氣大寒。宜用辛熱以桂枝湯之類發[illegible]不

知天氣大寒。只宜置之煖室。謹避風寒可也。且天氣縱極嚴寒。而人身中之熱毒。未必因天寒而減。而因天寒遂用辛熱以治痲症。豈理也哉。庸工執泥歲氣時令大寒。宜用辛熱之藥發之之說。譬諸痲疹初出而有嘔吐。醫不知此為常候。而用蒼朮以平胃。丁香砂仁以煖胃。譬有頭疼。而用川芎白芷羌活獨活以治頭疼。譬有手足稍冷者。遂即用桂枝肉桂以溫其手足。殊不知痲症之作嘔吐者。乃火熱蒸於胃也。頭疼者。乃火毒上攻也。今反以辛溫之藥攻之。是猶抱薪救火也。至於手足稍冷者。乃熱極似寒之象。俟痲出透。而手足自溫。醫家不明。而謂桂枝可[illegible]於四肢之末。肉桂可以溫經回陽而遂用之。是誤之又誤。陷人性命。良可歎也。執天寒而用辛熱之說者。何殊乎是。倘有誤服辛熱之藥。助其邪火。煩渴便閉。致痲不出。危篤之極者。以清陽湯去升麻吉梗甘草主之。愚按邪火內攻。渴煩致痲不出。而兼有便閉者。加黑白丑牛以下之。是亦釜底抽薪之義也。

### 清陽湯

荊芥穗　防風　前胡　連翹　元參（各四分）　薄荷葉

牛蒡子　只殼　黃芩　木通　麥冬　淡竹葉（各三分）

吉梗（四分）　升麻（三分）　甘草（二分）　姜燈芯引姜开宜表

## 忌食諸肉雞魚鹽醋五辛等物第十

疹家禁忌法須防葷醎辛酸不可啻。欲不從心方是福。物若爽口定爲殃。

痳疹禁忌肉魚雞。欲食須過七七期鹽醋五辛通是禁。務宜食淡免禍機。

痳疹禁忌。比痘尤甚。蓋痘初起。則宜慎口。至起水之時。雞肉食之。正可助漿。若痳症馬牛猪羊鵝鴨魚腥等味。鹽醋甘甜麪食五辛滯氣煎煿等物。必痳收後四十九日之外。方可食用。惟宜食淡。庶無後患。若七七之前。不知禁忌。則終身但遇天行痳必復出。即不復出。亦有後患。食鹽太早。令人咳嗽。食五辛太早。能生驚熱。食葷腥太早。必生奇症。是以自痳收後宜慎口四十九日。但猪肉一味猶可先食。亦必俟身凉不咳並無胎及他症者。方可先食。其餘必須遵期謹戒。非但出痳之人當慎。即乳兒乳母亦必禁忌。蓋痳之爲病。有類傷寒。葷腥不謹。禍生不測。嘗見痳案有云。賀少君患痳。家人不知以肉飯與食。適繆仲淳至。見而驚曰。爾至出痳。此痳症之極重者。何可食葷。急命兹虎湯三劑與服。而痳盡現。遍體皆赤。又以原方進二劑。痳雖盡出。而煩燥不寧。勢尚不可保。乃以三黄石膏加檉葉湯一大劑。濃煎與服。煩燥定而痊。口腹之爲害匪輕。可不慎乎。

兹虎湯

西河柳　麥冬（各兩許）知母（五錢）淡竹葉（七十片）　无參
貝母（又名貢去心姜汁蒸各三錢）　石膏（一兩五錢）　水煎服

三黄石膏加檉葉湯（檉葉即西河柳）

黄連　黄栢　黄芩（各五錢）　石膏　麥冬（去心各三錢）　西河柳
知母酪一　淡竹葉（二百片）　水煎

## 忌兼用補澁第十一

麻疹症治法最廣。當補當瀉須究詳。清解補澁誤兼施。殺人性命如反掌。

麻初出時。多有泄瀉不止者。其毒火因瀉而減。此殊無妨。若麻出盡之後。而瀉紅黃色糞者。乃內有伏熱也。與泄瀉過甚者。俱宜以加味三苓散與之。一服即愈。切不可用參朮訶蔻補澁之劑。以圖速止。醫家若不識禁忌。未經講究。一見有瀉。遂用補澁。乃曰吾於清解藥中。兼用參朮訶蔻等分。又輕何碍於事。一服不見功效。不知改方施治。又曰參朮訶蔻等分輕少。故不應耳。於是多加參朮訶蔻分兩。而再與服。致麻變症。重則腹脹喘滿。而不可救。輕則變為休息痢。而纏綿不已。然非僅麻出齊之後。瀉紅黃色者。不宜兼用補澁。即麻已收之後。而泄瀉黃紅色。亦不宜兼用補澁。仍宜以加味三苓散治之。此兼用補澁。況且不可。若專用補澁者。則殺人且不待反掌之久矣。業斯道者。可不慎歟。

加味三苓散

豬苓　木通　車前子　赤茯苓（各七分）　澤瀉八分　黃芩（酒炒）

牛蒡子（炒研各五分）　黃連（酒炒二分）　燈芯五十寸引水煎食後服

## 升發清涼解毒當分先後第十二

升發清涼與解毒。此乃治麻之大法。用之須當分先後。次第由來渾不得。

治麻用升發清涼解毒法。所宜然。然當分先後而施。不可渾用。何也。麻初發熱。恐難透表。故當用升發疎表解肌之劑。使血之易出。見標之後。與正出未透之間。宜發表而兼清涼。使血涼肌解。麻易出透。至麻到遍身上下俱紅。總成一片。纍纍如珠。手足之末。上下相同。無有空處。此為出透。斯時則當用清涼解毒之劑。不必兼用發表之藥。一解即愈。若於初熱正出之際。而即用寒涼解毒之劑。則氣滯血凝。肌膚閉密不得開通。致麻不出。多生危候。是以於初熱未出之時。及正出之際。只宜辛散。如荊芥葛根薄荷前胡牛蒡子防風蘇葉淡竹葉石膏之類。可以施用。即麻黃亦當因症而施。使之易透。正收及收後。宜用寒涼解毒之劑。如元參青黛麥冬黃柏栝蔞根黃連黃芩連翹貝母知母枝仁山豆根淡竹葉等藥。俱可施用。使毒火易得消散。方無後慮。

罨痳當分天時第十三

罨痳之法大非宜。強用須當分天時。春冬寒月猶似可。夏秋炎日切莫施。

古有罨痳之說。雖近有理。然亦當分天時。如春冬嚴寒。痳為風寒所遏。閉而不出。罨之以取汗。使腠理開豁。猶曰可也。若夏秋炎熱之時。只宜令之於無風之處坐卧。以單被蓋之。勿令其冒風冒暑耳。豈可罨助。倘炎熱而用罨法。則火熱愈甚。痳必焦紫。致變壞症。而不救二多矣。

補中第十四

痳症從來喜清涼。首尾不用補中方。緣何痳後議補中。為救過涼脾胃傷。

痳症屬火。肺胃實熱者多。虛寒者少。千人之中。虛寒者偶有其一。故治痳俱宜先用疏散寒涼之藥者。此之謂也。而古人又有議補中之說者。何哉。蓋指痳收之後而言。非指初熱正出正收時之謂也。緣由痳症先用寒涼之藥過多。而脾胃受傷敗壞。以致痳收之後。多得嘔吐泄瀉。青色唇白。身冷。當審其輕重而用補中之法。所以人參白术白苓砂仁霍香陳皮薏苡仁蓮肉等味。在此不忌。但當佐以清涼之藥。加川黃連枯黃芩。俱微妙而用之。夫既補中。而又加清涼之品者。其義蓋恐中氣實而邪火復作。故兼用之耳。至於白术。嘔泄大甚者。用之始宜。如吐瀉輕者。則又不宜輕用。若其人素稟虛弱。當出痳之際。過於發散。出透之後。又過用寒涼解毒。以致虛弱之極。骨瘦神疲。面無紅色。且又不能多食。々多即吐者。即急以香砂六君子湯。去半夏。加麥芽釵石斛以補之。

香砂六君子湯

人參　白术（炒）　白茯苓　炙甘草　陳皮　半夏　木香

砂仁　水煎空心服

## 正痳奶痳風癮不同第十五

痘後出痳爲正疹。此由胎毒發於心。一次出現不再出。正痳名兒始爲眞。
嬰兒初離母胎中。遍身斑駁似硃紅。亦由胎毒生斯候。莫作時行痳疹醫。
嬰兒當值炎熱天。遍身忽似出痳然。此名風癮非胎毒。不須用藥也會痊。

正痳之出。由於胎毒。其出也必在出痘之後。或隔兩三月。或隔半年。一年之久。甚至八九年之遠。感正痳之氣而出一次。後再不復出矣。奶痳者。小兒初生未滿月時。遍身紅點。斑駁如硃。皆由兒在母胎中。受有熱毒所致。故生下發見於皮膚。不可認作時行痳疹。妄用湯劑。蓋嬰兒臟腑嬌脆。氣血怯弱。不能勝受湯丸。宜以溯源解毒湯與乳母服之可耳。若風癮者。亦有似於痳子。乃發在幼孩甫生一月半週一歲之間。時值天氣炎熱。感風熱而作。此不由於胎毒。乃皮膚小疾。感風熱客於脾肺二家所致。不在正痳之列。常見出一次。又出一次。亦有連出不已者。無關大利害。不必用藥而自散。倘身熱不退。只宜微用疎風清熱之劑。一服即愈。以荊防發表湯除紅花主之。如身不熱者。不必用藥。免致誅伐無過。然亦當慎風寒。戒葷腥生冷辛辣等物。勿以其無關利害而忽諸。恐觸動風熱而生他病。　論云風癮身熱不退。宜疎風清熱。以荊防發表湯主之。細按方內。止有荊芥防風疎風之品。并無清熱之藥。且川芎上行頭目。當歸血中氣藥。查肉長於消肉積。甘草雖能和藥解毒。其實有調中益氣之功。吉梗性上升。能阻各藥不得下達。并非清熱之品。且云除紅花。反不若紅花之能散赤腫。解疹毒之猶爲可用也。愚意莫若用防風敗毒散（見第五條）去甘草吉梗杏仁。加元參黃芩地骨皮。以疎風清熱退潮之爲妥當耳。

溯源解毒湯（又名解毒湯）　解胎毒良方

當歸身　川芎　生地黃　白芍藥　人參　連翹　黃連
陳皮　木通　生甘草　淡竹葉引

荊防發表湯　此方大能疎風清熱。能散風熱客於手足太陰致發風癮及痳疹。連熱三四日而始見標。而不甚煩燥。

荊芥穗　防風　吉梗　只殼（麩炒）　蘇葉　川芎　當歸（各五分）
乾葛（八分）　紅花（二分）　杏仁（去皮尖炒）　牛蒡子（炒研各七分）　查肉（去核一錢）
生甘草（去皮三分）　連翹（五分）　水煎服
夏天炎熱。加酒炒黃芩（五分）。
冬月嚴寒。加麻黃（三分）或加羌活（五分）
小便赤濇黃。加木通（去皮七分）

## 溫痳第十六

胎毒風熱兩相搏又值時令癘氣傳人。如感之出溫疹。調治乖張變多端。

溫痳者。由於胎毒感於風熱又值時令疫癘之氣流行。城市鄉村傳染。迅速異常。調治若不得法。立刻變症。治法於初熱時。及欲出未出之際。宜以宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉梗甘草主之。已出紅腫太甚者。用化毒清表湯去吉更甘草主之。出透流毒成痢者。用清熱導滯湯（見第二十條）主之。此三方以之加減變化。無論正痳溫痳。毋用定獲奇効。然凡出正痳之後。則不再發溫痳。

化毒清表湯　治痳已出紅腫太甚。并為痳疹已現主方。并附加減法於方尾。總除甘吉二味不用

前胡　乾葛　知母　連翹　吉梗（各七分）　牛蒡子（炒七分）

木通（六分）　元參（一錢）　黃連（酒炒）　防風　杏仁（炒黑各三分）　薄荷

黃芩（酒炒各五分）　天花粉　地骨皮（各八分）　淡竹葉（一錢）

生甘草（三分去皮）　燈芯五十寸引　加生犀角（三分）更好

潮熱輕者。除淡竹葉杏仁黃連薄荷。

潮熱重者。加生地黃地骨皮赤苓只殼黃連黃芩生用。

口渴加麥冬熱石膏如不作口渴。除知母花粉。

大便濇。加炒火麻仁只殼。

大便閉加火麻炒白黑丑牛。如二三日不通者加大黃。

小便赤濇加木通澤瀉等分

小便不通者。加車前子。

無咳。加留白陳皮。

無汗。加葱白。

紫色。加紫草茸紅花。

赤色。加牡丹皮當歸尾。

夾紅紫斑。加紫草茸牡丹皮。

熱甚不減。去防風薄荷加生地黃川貝母。

咽痛。加射干山豆根麥冬。

譫語加生地黃木通。

齁鮯。加栝蔞霜葶藶。除天花粉淡竹葉薄荷。

氣促。加蘇子萊菔子。去天花粉淡竹葉薄荷。

飽逆加竹茹柿霜枇杷葉嘔吐亦宜。

第一〇一七冊　續修四庫　醫　第21　版反外

### 痘夾痲出第十七

痘出之際熱烘々。紛紛痲點遍身紅。脾肺凝火夾痘出。托出痲疹痘成功。

初現痘點數十粒。遍身紅點細密々。此是大痘夾疹子。由於脾肺風熱出。

痲疹有於出痘之時。相夾而出者。當出痘之際。發熱蒸々。纔現痘苗數十顆。遍身通紅。碎碎密密。形如出痲。似非出痘。其實大痘夾痲而出。是痘為正出。而痲不過脾肺兩家之風熱遊火隨痘而出現也。不甚關利害。遇此等症。不必驚慌。以元參升麻湯。除升麻。與甘草。加黃芩連翹一二劑與服。宣托痲疹。盡出而消散。正痘自然依期起灌。而慶成功。此等夾痲之痘。而痘出必多疎稀。

元參升麻湯　治痘夾痲夾斑夾丹等症

元參（一錢）　升麻（五分）　防風　荊芥　牛蒡子（炒研各七分）

生甘草（去皮三分）　水煎溫服

### 蓋痘解毒痲第十八

痘回水時將結痂。身復發熱驚醫家倏爾遍身上下紅現出蓋痘解毒痲。

痘至回水結痂之際。復又發熱。遍身上下通紅。細看痘粒膿漿充足。此乃蓋痘解毒之痲出也。其名云何。蓋痘者。痘之上蓋一層痲也。解毒者。此痲一出。可以解痘毒也。宜以大連翹飲去赤芍柴胡甘草。加熟石膏天花粉淡竹葉地骨皮各一錢。以清解其餘熱。此等症候。蓋因痘起灌之時。痘必稠密。醫家極力催漿。過用補劑。以致熱滯脾肺而作也。

大連翹飲　治濕毒利小便

連翹（去子一錢）　牛蒡子　防風　荊芥　黃芩　赤芍（各七分）

枝仁（酒炒）　滑石（研各五分）　車前子（炒）　穀瞿麥　木通

柴胡（去蘆）　當歸（各八分）　蟬退（去頭足洗去土十二隻）　生甘草（去皮三分）

熱甚大便閉。加酒炒大黃一錢　生姜一片引

前方去枝仁。加紫草。名連翹防風湯。治痘痲熱毒壅閉小便不通。

## 痘後出痲第十九

大痘秀實痘已平。倏爾痲疹又來侵。此時胎毒曾經解。惟宜用藥養肺金。

出痘已經收靨落痂。痘症已平。此時胎毒已經清解。適值天行痲疹發現。旋即出痲。惟宜清金養肺為主。以參貝散主之。愚按痘後即出痲。雖曰胎毒。曾經清解。然痘當起灌之時。豈有不施補劑催漿灌膿之理。其間定有餘熱留毒。今痘後相繼出痲。未必絕無毒火。全因天行而發者。雖宜清金養肺。而方中之吉梗甘草。仍須停用。即沙參亦當以元參易之。更宜加枯黃芩瀉肺。以清肌表。連翹牛蒡子以解心肺之留毒。赤苓只殼利二便而洩心與大腸之火。則肺金清而毒盡解。尤爲妥當。

參貝散

沙參　貝母　吉梗（各一錢）　西河柳（二錢）　甘草（五分）

水煎服

## 閉症第二十

痲見閉症。眼腫赤。聲啞。鼻乾。發喘。渴。腰腹脹痛。人昏沉。昏拔煩燥。二便血。

痲初出時。眼胞腫。白夾赤色。聲啞昏腫拔番。鼻乾鼻搧氣喘。煩燥口渴。腰痛腹脹。人事昏沉。口鼻出血。煩亂狂叫。二便出血。此乃毒火鬱遏於內。名曰閉症。最為難治。宜用宣毒發表湯去升麻甘草吉梗。（見第五條）加酒炒黃芩七分。酒蜜炒麻黃五分。或更加元參山豆根治之。若能托出痲標外現。漸次發出者。可以望生。如仍閉而不出。則無望矣。

## 首尾調和第二十一

麻喜清凉痘喜溫痘麻治法不同倘麻苗痘實無人解。首尾調和法宜遵。

痘麻兩症。皆係胎毒。均屬心火。而麻則喜清涼之藥。如古方化斑湯。以元參易人參。去升麻甘草早米。萬氏化斑湯。去白吉梗甘草是也。痘喜溫補之劑。如保元湯是也。故麻喜清涼。痘宜溫補。人皆知之。而首尾調和之道。人多不曉。何也。夫麻只要發出得盡。則毒便解。若於初熱將出時。而一味寒涼氷伏其毒。麻必難以透表。而毒不得解。所以初出至正收。宜安處煖室。勿用峻寒之劑。使之易透。是麻亦喜和暖也。痘則必待苗而秀。々而實。膿成而後毒解。若於痘成實之時。用大溫熱之藥。則又潰爛不收。是痘後亦喜清涼也。業斯道者。須知治麻貴乎審首。治痘貴乎審尾。無過寒妄熱。使溫涼適宜。而陰陽自和矣。

古方化斑湯

人參　石膏　知母　牛蒡子　連翹　地骨皮　淡竹葉

升麻　甘草　早米一撮引

萬氏化斑湯

元參　知母　石膏　牛蒡子　麥冬　淡竹葉　吉梗

甘草　水煎服

## 熱有遠近而出二十二

麻熱遠近難定期半月七八日有之發熱四日疹始現。輕平清安順症時。

痲疹發熱。有近則五六日而出。遠則八九日。或十日半月乃出。總以發熱四日內現標者。其麻多輕。然必須解毒。若初熱之時。既表之後。紅影見於肌膚。切宜戒口避風。如或不禁。則皮毛閉密。毒氣難洩。或變紫黑。或生痰涎。致變驚搐而不治。若遇此候。宜以消毒飲。去甘草加犀角汁主之。如極渴欲飲水者。只宜少與葱白湯。以滋其渴。又有作寒作熱。至於終日不退者。然始熱之際。必見面赤眼腫。多涕多淚。咳嗽連聲等外症。宜詳察之。慎勿臨症恍惚。夫麻之出。其狀如粟。紅壘而起。間有不出。或只頭面有。四肢無者。此則天行時氣。濕熱在脾。以致昏睡發熱。麻不出現者。當以消風散去人參川芎厚樸。加連翹牛蒡子粉葛荊芥只殼薄荷羌活。只用三分治之。如或不應。以小柴胡湯去半夏人參。加牛蒡子當歸身熟石膏治之。倘風熱不散。久必咳嗽不已。　忠按消風散小柴胡湯二方內之人參川芎羌活厚樸殭蚕柴胡半夏甘草及陳皮等藥。俱係麻方禁用之藥。依法刪去之。合二方僅得赤茯苓黃芩蟬蛻三味耳。而用以治濕熱在脾。昏睡發熱。致麻不出現等候。其有濟耶。此的係坊間悞入。斷不宜用。忠意莫若

以宣毒發表湯（見五條）去升麻吉梗甘草。加猪苓澤瀉。以泄脾濕。以解其肌之爲當也。

消毒飲　治痲出一日。風寒所冲而收。痲毒內攻。急用此方。免致胃爛不救。

牛蒡子（四錢）　荊芥（二錢）　防風（五分）　生甘草（一錢）

加烏犀角屑更妙。水煎服

消風散子和方

人參　川芎　羌活　姜蠶　厚朴　陳皮　蟬蛻　茯苓

爲末白湯下

小柴胡湯　半表半裏和解之劑

人參　黃芩　柴胡　半夏　甘草　姜三片紅棗三枚引

---

## 不熱第二十三

痲疹出現全惡熱。身不熱。今痲不出。潮熱和平方爲福。症逢不熱大非吉。

不熱者。謂身溫涼而無熱也。初起不宜大熱。及至正出之時。不宜無熱。如不熱者。即係逆候。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻甘草吉梗淡竹葉。或葛根解肌湯（見第五條）除甘草淡竹葉赤芍以疎托之。亦有用越脾湯者。不可以此爲法。出盡及收後而不熱者。是毒盡也。不須用藥。

越脾湯　治風水惡寒。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱者。越脾者。發越濕土之邪氣也。水濕之氣。因風中外流播。兩相激搏。勢難分解。不得不藉麻黃以祛之。從表而越。以石膏清之。從裏而化也。

麻黃（去節五錢）　石膏（八錢）　炙甘草一錢

生姜三片紅棗五枚引水煎分作二次服

## 微熱第二十四

油麻不怕火燒天、若逢微熱休安然、初起之際猶無忌。正出之時郤又嫌。

微熱者、言熱輕而不壯也。初起之時。則宜正出之時熱不宜微。〻〻熱則麻出而不能透矣、宜用疎托之劑、以葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草淡竹葉主之。未收及收後微熱者、此毒輕而盡也。不必用藥。

## 乍熱第二十五

發熱數日熱便退、再隔數日熱又來。時熱時凉為乍熱。用心調理免受灾。熱而又退〻又熱。初潮正出此為逆。收盡乍熱毒未盡。病後治本免疎失。

乍熱有二。一則熱數日熱止。過數日熱又作者。一則一日之間、有早發熱而午凉。午發熱而夜止者。此二者、皆謂之乍熱也。若未出之間。見乍熱。名曰毒未得透、藥宜疎散。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉梗甘草、或葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草。加赤茯苓主之。正出之際。甚不宜見乍熱。見之、則為逆候、此因毒出而邪熱未能復有內攻之意。必須疎托。以化毒清表湯（見十六條）去天花粉吉梗甘草。或清熱透肌湯。去甘草。加生地黃地骨皮主之。又有因大病之後、中氣虛甚而然者。以治本為要。藥宜溫補。以四物湯加連翹元參、臨症斟酌而用之。若收後及未收之間、見乍熱者、皆為毒氣未盡、急宜涼解分利。如清熱透肌湯、去甘草、加黃連黃芩生地黃地骨皮。宣毒發表湯（見第五條）去升麻甘草吉梗、加黃連黃芩生地黃地骨皮。俱可施治。

清熱透肌湯　治麻未透、熱甚而咳。

元參　石膏　牛蒡子　荊芥　防風　前胡　葛根

杏仁（各八分）　生甘草　水煎熱服

四物湯　治一切血虛凡血症通宜

當歸（酒洗）　生地黃（酒洗各三錢）　白芍藥（酒炒二錢）　川芎（酒炒一錢五分）

凉心血加酒炒黃連

凉肝血加條黃芩（酒炒）

凉肺血加酒炒枯黃芩

凉大腸血加酒炒子實黃芩

凉腎膀胱血加黃栢

凉脾血多用酒洗生地黃

凉胃血加酒蒸大黃

凉三焦血加酒洗鮮地骨皮

凉心胞絡血加酒蒸牡丹皮

凉小腸血加炒枝仁川木通

凉心與胞結氣加麥冬

清肺氣加炒只殼

清肝氣加酒炒柴胡　醋炒青皮

清脾加酒炒白芍

清胃加乾葛　石膏

清小腸加赤茯苓

清大腸氣三焦氣加連翹

---

清膀胱加滑石　琥珀

血虛加龜版

血燥加乳汁

瘀血加桃仁　紅花　韮菜汁　童便行之

暴血加薄荷葉　酒洗元參散之

血不止加炒蒲黃　京墨

血久不止加升麻引血歸經

加黃柏　知母　元參名滋陰降火湯（治陰虛有火）

加酒炒黃連並酒炒胡連名二連四物湯治虛勞血虛五心煩熱々入血室夜分發熱

加黃栢　黃芩　甘葛名三黃四物湯治陰虛潮熱

加桃仁　紅花名元戎四物湯治臟結便閉撲損瘀血

加羌活　防風（一方用北秦艽）名治風六合湯治風虛眩運血秘便難用蜜糖合作丸子又名補肝丸

加木香　檳榔名治風六合湯治血虛氣滯或血氣上冲

本方去白芍藥　加防風名防風當歸散（治發汗過多而成痙症）宜去風養血

## 壯熱第二十六

大熱經日不退休。將出匕盡實可憂。正出之時逢壯熱。此爲順候不須愁。

麻本火候。非熱不出。故最喜有熱。如熱勢甚者。以白虎湯。去炙甘草粳米。加西河柳連翹牛蒡子木通只殼葛根主之。然治麻大法。總以解毒爲主。若麻初熱時。有毒火不退而熱甚者。宜以解毒湯。去吉梗主之。若發大熱而經日不退。是爲壯熱。初起發熱間。即發壯熱。直至出時而不歇者。其症必重。以清熱透肌湯（見二十五條）去甘草。加地骨皮生地黃匕連黃芩主之。有咳甚者。加貝母。大便結滯。加火麻仁只殼。小便赤澀。加赤茯苓木通治之。或用宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉梗甘草。加枯黃芩生地黃地骨皮黃連枝仁治之。若先熱輕。正出現之時。其熱方甚者。此爲順候。出盡而壯熱不退者。又不宜也。急宜用涼解踈托之劑。以化毒清表湯（見十六條）去吉梗甘草。加麥冬熟石膏治之。大便閉者。加丑牛以通之。小便赤澀者。合導赤散。去甘草加車前子以利之。或以竹葉石膏湯。去人參半夏炙甘草粳米。加[illegible]地骨皮治之亦可。收後而壯熱不退者。更不宜也。急宜涼解爲上。以化毒清表湯（見十六條）去甘草吉梗。加生地黃山豆根治之。或以河間涼膈散。去炙甘草芒硝治之。收後而壯熱兼大渴者。以白虎解毒湯。加元參[illegible]治之。

白虎湯　清肺金泄胃火實熱。小便赤者宜之。小便白者慎用

石膏（八錢）　知母（三錢）　炙甘草（二錢）　粳米（[illegible]）　水煎服

解毒湯　治麻熱甚。火毒不退。初出亦宜。

黃連　黃芩　枝仁　木通　吉梗　水煎服

一方有貝母無吉梗。

導赤散　治心熱發搐。及小腸實熱。小便赤澀。

生地黃（五錢）　川木通　生甘草稍（各一錢）　淡竹葉（一握）

燈芯引　一方有車前子。溺血者加辰砂（五分）

竹葉石羔湯　治大病後煩熱作渴。傷寒解後嘔渴少氣。

生石膏（一兩）　淡竹葉　麥冬　人參　半夏　炙甘草　粳米

有渴者去半夏。姜引水煎服

河間涼膈散　治瘟疫時行表裏實熱。及心火亢盛。目赤便閉。胃熱發斑

大黃（酒浸二兩）　芒硝　連翹　黃芩（各一兩）　枝仁（八錢）　卜荷（七錢）

炙甘草（六錢）　淡竹葉十五片。生蜜五匙引。水煎日三服。夜二服。得下熱退爲度。　一書姜三片棗三枚葱白一根引。

易老去大黃芒硝。加淡竹葉吉梗。治胸膈與六經之熱。以手少陽三焦足少陽胆腑。俱下胸膈同相火遊行一身之表。乃至高之分。故用吉梗舟楫之藥浮而上之。以去胸膈六經之

熱也症重者用河間方輕者用此方、

白虎解毒湯

石膏（四錢） 知母 天花粉 黃連 黃芩 枝仁各一錢

麥冬 生地黃（各二錢） 淡竹葉十片

水二鍾。煎至一鍾。去滓。入犀角汁於藥內。俟病人要湯水吃時。以此藥與之代茶服。

## 潮熱第二十七

熱如潮水來及時。初出見之並無疵。出盡若還遇潮熱。退陽益陰妙方施

潮熱雖然無重輕。初出見之不須驚。出盡收後如潮熱。急以四物益其陰。

潮熱者一日至晚一度。如潮水之及時而來。不失其信也。麻疹初出。多見此候。若出盡及收後見之。此因氣血虛弱而然。宜退陽益陰為主。以四物湯（見二十五條）加人參治之、

## 渴熱第二十八

斑發於心肺受熱火甚津枯生口乾渴心清肺多奇效治不違時病早安

渴屬肺胃熱盛候。唇口如丹發渴時。清金瀉火生津液。治分虛實兩般兒

麻症如焚飲水饒。炎邪未許一杯澆。咽喉乾燥心家熱。津液乾枯胃脘焦、

渴乃肺胃兩經熱盛之候。唇口火紅。若唇口如丹。是麻發渴之候也。此因內熱所致。火甚津枯。故作口乾。治當瀉火清金生津。然當審察虛實而治之。若二便結濇。則為熱甚。宜用清

熱涼利之劑。以門冬甘露飲去甘草主之。若二便清利。唇口淡而不紅。而但渴者。此必過用寒涼之藥。損傷中氣。與氣血所致。脾虛不生津液而渴也。以七味白朮散。去木香。以山藥易白朮。加粳米主之。初熱作渴者。以白虎湯（見二十六條）去甘草粳米。加麥冬天花粉牛蒡子連翹治之。或以葛根麥門冬散。去人參升麻赤芍甘草。加天花粉連翹牛蒡子治之。渴甚者。以黃連解毒湯（見第二條）去甘草吉更主之。出現之時渴者。以白虎湯（見二十六條）去甘草粳米。加麥冬天花粉牛蒡子連翹治之。出現之時渴甚者。以白虎解毒湯（見二十六條）治之。渴而煩燥者。以白虎解毒湯（見二十六條）加黃柏治之。正收之時而渴飲以前

葉石膏湯（見二十六條）去人參半夏炙甘草粳米加元參牛蒡子黄芩黄連生地黄地骨皮治之。

門冬甘露飲　治痲熱甚而渴

麥冬（二錢去心）　元參　黄芩　括蔞根　連翹（各一錢）　生甘草（五分）　燈芯三十根。淡竹葉二十片引。

七味白术散　治胃虛津氣不行而渴

人參　白术（土炒）　白茯苓　木香（各一錢）　藿香葉　葛根（各八分）　炙甘草（六分）　水煎服

葛根麥門冬散　治熱毒斑頭疼壯熱心神煩悶。

葛根　麥冬（去心各一錢）　石膏　升麻　赤芍　人參　甘草

白茯苓（各五分）　淡竹葉（七片）　水煎服

### 口渴恣飲致成水蓄第二十九

熱甚作渴饒飲水。解毒生津功莫比。若還縱飲不知休。水蓄於中災異起。

痲症原是火邪。心火內亢。肺焦胃枯津液乾涸。發熱之時未有不渴。不可以冷水與飲。又宜以菉豆或芝麻或陳炒米煎湯飲之。治法宜生津解毒。以加味人參白虎湯。去人參甘草粳米。加連翹牛蒡子元參主之。若任其恣飲冷水必生水蓄之病。如水入肺則為喘為咳。宜用葶藶以瀉肺中之水。如水入脾則為腫為脹為自利。水入胃則為嘔為噦。宜用豬苓白澤瀉以瀉脾胃之水。如水入心。則為驚為悸。宜用木通赤苓

以瀉心中之水。如水入肝則為脇痛。宜用陳芫花以瀉肝中之水。如水入腎與膀胱。則小便不利。宜用車前子木通。以瀉腎與膀胱之水。渴如腹脹不食者。乃本虛實喘為敗症而難治也。

加味人參白虎湯

人參　知母　熟石膏　葛根　天花粉　麥冬　淡竹葉　甘草　粳米一撮為引。水煎以米熟為度。

## 復熱第三十

麻疹收後喜無熱。若還復熱甚未息。治宜和解與清涼。兼而收盡送輕忽。

復熱者。謂熱已退而復作也。此候先無。必待麻收復熱。退身涼。越六七日而又復熱。此症非因復感風邪而熱。必因餘熱未清。餘毒復還所致。治宜清涼和解為妙。以柴胡麥門冬散去人參甘草。或以生地骨皮湯。去甘草主之。然麻初起喜熱。惟忌麻愈之後復熱何也。蓋麻發熱。多至十一二日。少亦不下七八日。熱久元氣虛衰。加之出麻之後。飲食不進。今復重熱。陰陽虛耗。不死何待。急須調治。故再熱者。必大補氣血可也。以柴胡四物湯主之。

柴胡麥門冬散　治收後餘熱

柴胡（酒炒）　人參　元參（各一錢）　龍胆草（三分）　麥冬（去心八分）

甘草　水煎服

生地骨皮湯

地骨皮　生地黃　元參　麥冬　龍胆草　牛蒡子

連翹　黃芩（酒炒）　枳仁（炒）　赤茯苓　木通　甘草梢

燈芯引

舌有白胎。加荊芥　防風。

舌有黃胎。加連翹（酒炒）

---

便閉加只殼　火麻仁。閉甚再加丑牛。

柴胡四物湯　治麻後餘熱

柴胡　黃芩　人參　生地黃　當归身　川芎　白芍藥

知母　麥冬　淡竹葉　地骨皮　水煎服

## 始終潮熱第三十一

始終潮熱總不休。飲食不進亦堪憂。咳嗽口渴與痰候。養陰退陽妙方投。

麻症初起。最喜潮熱。正收與收後。又喜無熱。若自初起至收後。而始終潮不退者。或飲食不進。或咳嗽。或口渴。或見痰症。俱屬血虛血熱。夫麻症屬陽。血多虛耗。滋陰補血。其熱自除。此養陰退陽之義也。宜用四物湯（見二十五條）。按症加減主之。如口渴。加麥冬天花粉。或犀角汁。如咳。加括蔞霜杏仁霜。如有痰。加貝母陳皮。如有喘。加芥子葶藶。總宜加元參骨皮黃芩黃柏之類以治之。切忌用人參半夏白朮之類。

## 煩燥第三十二

心火內熾煩燥干。急宜瀉火清心添。若因久病元氣虛。法用養陰病即痊。

麻本火候。火者手少陰心經主之。心火內熾。故煩燥不寧。若麻症火邪大甚。煩渴便閉。致麻不出。危篤之極。宜清心瀉火清金以清陽湯（見第九條）除升麻吉梗甘草生姜。倍用麥冬黃芩元參以三劑與服。而麻即出。或以加味人參白虎湯（見二十九條）去人參甘草粳米。加黃芩元參主之。若係久病之人。元氣虛弱。或變煩燥口渴。麻竟不收。凝滯在皮膚間者。此血虛故也則不宜用前二方。當以養陰湯主之。此乃養陰配陽之義也。

### 養陰湯

熟地黃　牛蒡子（炒研八分）　當歸　白芍藥　麥冬（各八分）
荊芥（三分）　川芎　薄荷（各二分）　元參　連翹（各五分）
二劑水煎服　後劑加黃連二分五厘

## 出不快發不出第三十三

欲出不出亡立待。一出即收死反掌。毒歸五臟生四症。只因邪留正氣傷。寒鬱熱邪不得出。隱而不現非早收。宜用湯丸急早治。發而不出一命休。

麻症初起。必發熱咳嗽。渾身腹痛有似傷寒之候。惟乾咳連聲。目赤多淚。嘔惡便溏。確為麻症之驗。然發熱之時既明麻症。而麻於耳後項上腰腿上先現。然後遍及手足底為齊。總以頭面更多者為佳。麻頂尖長形小而勻者吉也。若麻疹將發之際或為風寒暴襲。或因肢體坦露。寒鬱熱邪不能外出

此全盛之勢未萌。與麻出早收不同。其有初熱吐瀉交作者是為順候。乾嘔霍症悶亂者則為逆症。欲出不出者。危亡可立而待也一出即收者。死在反掌間矣。何也夫麻以出盡則毒解邪氣鬱遏。則毒留而不去。正氣損傷。則人困而不伸毒歸五臟而四症生焉。毒歸於脾。則泄瀉不止。毒歸於肝心則煩熱不退而生驚搐。毒歸於肺則咳嗽血出。毒歸於腎則牙齦腐爛。而成疳蝕。凡有不出快者。內宜用解毒之劑如消毒飲（見二十二條）去甘草。宣毒發表湯（見第五條）去升麻甘草桔梗淡竹葉或葛根解肌湯。（見第五條）去赤芍甘草。加只殼或防風敗毒散（見第五條）去甘草桔梗。或用葛根疏邪湯等劑以發之。若無汗而

出不徹者。外用胡荽同葱根搗爛。和酒揩蒸熱。以絹包裹自頭而及手足逐一揩之。勿令見風。衣被溫厚。自然出快。如有氣粗喘促。腹中脹痛。煩燥不寧。致麻不出者。急以麻杏甘石湯合三味消毒飲。俱去甘草以治之。輕則仍以宣毒發表湯。見（石條）去升麻桔梗甘草主之。若因觸犯風寒。霧露隱現不能發出者。以新猪糞沖湯隔蓆蒸之。冷則更添滚者。并取猪糞燒灰。以葱白湯調下二三錢。此乃痘科治痘黑陷。用燒人糞之變方。即用燒人糞與服亦可。若發之而仍不出者。則不治矣。

葛根疏邪湯

葛根　防風　荆芥　蘋葉　牛蒡子　連翹　地骨皮

前胡　赤伏苓　只殼　木通　燈心引

麻杏甘石湯　治發汗後汗出而喘無大熱者

麻黄（去節三錢）　杏仁（去皮尖研二十粒）　石膏（五錢）　炙甘草（一錢）

水煎服　此乃麻黄湯去桂枝。而兼越脾湯也。專祛上焦濕熱痰氣。

三味消毒飲

荆芥　牛蒡子（各一錢五分）　甘草（一錢）　水煎服

---

過期不出第三十四

過期不出毒猶藏。孔閉膚乾熱可怪。刻限必求麻疹現。麻黄散子是仙方。

過期不出勢淹延。毒閉身中難出現。急用透肌休怠玩。豈堪肺腑受熬煎。

發熱六七日已後。明是疹毒延不出。此腠理厚密毛孔（閉塞）皮膚乾燥堅厚。毒氣抑或又為風寒襲之。曾有吐利。乃伏而過期不出也。急用大之劑。以麻黄散去升麻加胡荽子以發之。或用獨聖散加胡荽子牛蒡子連翹。春冬寒月。再加蜜酒炒麻黄以發之。又有治麻欲出不出者以消毒散加麻黄穿山甲以治之。似乎大猛。曷不若以消毒散去殭蚕蟾酥加胡荽葱白葛根蟬蛻。春冬寒月。更加蜜酒炒麻黄以發之。或外用胡荽酒以苧麻蘸戛為當。若當出不出而無他症者。以葛根疏邪湯（見三十條）主之。如不出。急取向東狗糞燒灰存性。水調服之即現。若當出而參差不齊者。以黑芝麻用冷水擂服。若當出而過期不出。反見煩燥悶亂。腹脹氣喘。手足冷者不治。倘一向未更衣者。此毒盛於裏。伏而不出。用河間涼膈散（見二十條）去甘草加牛蒡子主之。或從權施治。以七物升麻丸解之發之。解之不出者死症也。

麻黄散（秘本方）

麻黄（去根節水煮打去黑沫盡瀝乾拌炒）　人中黄（火煆忌鐵）　牛蒡子炒

蟬蛻（去頭足）　升麻（酒炒）　水煎服

獨聖散（又名檉葉散）

西河柳（一名觀音柳。一名也絲柳。又名檉柳。外路弱枝葉細細如絲。花穗長三四寸。水紅色。如蓼花之狀。花遇雨即開。）為末。以茅根煎湯下三四錢。白水下亦可。

消毒散

牛蒡子　地龍（即蚯蚓曬乾研末各二錢）　姜蠶（姜汁）　貝母（去心姜汁蒸）

防風　荊芥（錢各一）　蟬酥（二錢）　為末淡竹葉煎湯下一錢

七物升麻丸　凡覺四肢大熱。大便艱難。或二三日不更衣。服之取微利。不利再服。（更衣即大便也）

升麻　犀角　黄芩　朴硝　大黄（兩各二）　淡豆豉（微炒二升）

枝仁（二兩）　為末蜜丸黍米大白湯下五六分

### 已出熱甚不減第三十五

痲出渾身似火燒。毒邪壅甚急難消。解肌只許皮膚煖。救裏宜令便溺調。

痲本火候。非熱則不得出。麻疹欲出。則遍身發熱。或煩燥。或頭疼。或身拘急。及既出。則身便涼。清此一層痲隨收矣。若痲既出。而熱甚不減。此毒邪壅遏。宜以古方大青湯去甘草。解其表。如便澁者。以古方黃連解毒湯加牛蒡子連翹川木通只允石膏知母。或以大連翹湯以地骨皮易柴胡去赤芍治之。若大便不通者。以河間涼膈散（見二十六條）去甘草加牛蒡子以解其裏。既出發熱不退。飲食少進者。此毒逼胃。宜以加味地骨皮散去赤芍甘草。加酒蒸石斛治之。

古方大青湯　治斑疹解毒良方

大青　元參　知母　石膏　木通　生地黃　荊芥穗

鮮地谷皮　甘草　淡竹葉十二片引

古方黃連解毒湯　治火表痘痲通用

黃連　黃柏　黃芩　枝仁　水煎服

加大黃名全華丸潤腸瀉熱

大連翹湯　解裏熱良方

連翹　防風　瞿參　荊芥穗　木通　車前子　當歸

蟬蛻　黃芩　滑石　枝仁　柴胡　赤芍藥（各等分）

加紫草茸（五分）　水（煎食前[illegible]）

加味地骨皮散

地骨皮（三錢）　桑白皮　麥冬（各錢）　葛根　柴胡

赤芍藥（各一錢）　生犀角屑　甘草（各五分）　水煎服

### 已出紅腫大甚第三十六

痲喜如珠紅潤澤。紅腫太甚又非吉。毒火壅遏勢堪憂。急治免教變紫黑。

痲出連串如珠顆粒分明。紅活光潤方為美候。若痲出而紅腫大甚者。此毒大壅遏所致。倘不急治。必變紫黑乾枯。隱伏惡症。宜以化毒清表湯（見十六條）去桔梗甘草。或清熱透肌湯（見二十五條）去甘草。加黃連黃芩只殼木通山豆根葶藶以治之。

### 不透表第三十七

隱隱藏於皮膚中。欲出不透後多凶。疏托消毒與分利。須詳三因始為工

痲疹不能透表者。謂渾身痲疹。藏於皮膚之中。欲出而不能透也。古云隱暗之痲。後多凶為難治。然此不透之症。有三因治者當詳審而施治。一者因風寒鬱遏。未能疏托。以致皮膚乾燥毛竅竦立而然。此宜以疏托為主。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉梗甘草。合越脾湯（見二十三條）去炙甘草生姜紅棗。加葱白胡荽以發之。或用葛根疏邪湯。（見三十三條）加胡荽葱白發之亦可。如表虛不勝疏托者。當以葱白一味。煎濃湯時時與服。但得微汗。風寒即解而痲自透。一者因火毒內熾。熱極不能透表者。此症痲疹根地頭粒。渾成一塊。而色紅紫。急宜消毒清熱。以白虎解毒湯。（見二十六條）加荊芥元參連翹牛蒡子治之。一者因中氣本虛。而不能透表者。此症皮膚不燥。口淡白。二便如常。雖有蘊熱。不可輕用寒涼。即用峻劑升發。亦終不得出透。但當分利。使之內化可也。宜以消毒飲。（見二十二條）去甘草。合三苓散。加連翹只殼以分利之。假使虛熱內熾。脣口雖紅。其色亦淡。此等症候。雖欲透而不能透也。只宜消毒以消毒飲（見二十二條）去甘草加山荳根連翹主之。又有一等惟胸腹腰背煖處。止有一二處現有痲疹。粒頭赤紅。頭面手足之

間作見乍無。此症必纏綿難已。既有收後五七日復發而三次而愈者。此乃氣候之異。非不透之症也。只宜辛涼表。以清熱透肌湯（見二十五條）去甘草治之。漸次求安。毋冀速効。轉增危殆。

三苓散

茯苓　猪苓（各二）　澤瀉（三錢）

水煎服。傷暑者用硃砂燈心引

## 盡透表第三十八

粒頭尖小收根者。此為盡透表症也。扁潤痒亦不離肉。熱邪中伏大非雅。

麻盡透表方無後患。何以見其透表。但得粒頭尖大。離肉收根。及粒頭細小收根。二者俱為盡透表也。其有一種扁潤。掀赤成塊。塊上復有小粒。平塌不起。而未見塊上離肉。又有一種結成小塊。如風毒遍身痳痒。偏高而紅腫。但粒頭不尖者。此二症雖透表。其中必有熱邪伏留。後必變症。並宜用竹葉石膏麥冬連翹牛蒡子以滋潤之。或以化毒清表湯（見六條）去桔梗甘草薄荷防風加麥冬主之。縱有餘熱。從此渙散矣。

## 一齊湧出第三十九

一齊湧出莫驚惶。頃刻渾身硃錦裝。似痘出時隨又收。如斑紅赤却成瘡。

痘以三四次出。謂之出勻。麻貴一齊湧出。謂之出盡。故凡麻只要得出。毒便輕減。以火照之。遍身如塗硃之狀。此將出之兆。出形細密與痘相似。但痲則隨出隨收。非若痘之漸長而漸大也。出形鮮紅。與傷寒之發斑相似。但麻則粒粒成瘡。非若斑之皮紅成片。如蚊咬之跡也。故凡麻以一齊湧出為最美候。不須用藥。

## 麻色分治第四十

麻赤淨身似錦紋白色血少要滋營黑麻一現最凶惡解毒消斑用大青

痘瘡赤豔痒來攻麻疹鮮紅毒得鬆白色血虛猶可治黑斑惡候莫相逢

痘麻之色不可同論大抵痘怕太紅皮嫩易破必生瘙痒麻疹之色最喜通紅何則夫麻發於心心屬火紅者火之正色也故麻鮮紅者毒得盡發而吉也若麻色淡白者乃心血不足也治宜養血為主以養血湯除甘草或益營湯去人參赤芍藥甘草或養血化斑湯去人參治之又有以四物湯（見廿五條）

加升麻葛根治之者四物雖屬血劑而白芍川芎麻症不宜用而加升麻尤為不宜莫若養血湯隨症加減而用實為妥當也若麻色赤如錦紋者以古方化斑湯（見二十一條）去人參升麻甘草早米加元參或萬氏化斑湯（見二十一條）去吉梗甘草治之然俱宜加生黃芩生黃連治之如色大紅豔或微紫血熱也或出太甚者並宜以秘本大青湯去升麻吉梗或以古方大青湯俱加牛蒡子連翹黃芩黃連生地黃主之黑斑者死証也亦當以秘本大青湯去升麻吉梗加生地黃黃連黃芩火燒人屎末服之大便秘者加酒蒸大黃利之

養血湯　治麻出白色

生地黃　當歸身　紅花　陳皮　甘艸　生姜一片引

益營湯　治麻色白

人參　當歸（酒炒）　紅花（酒洗）　赤芍藥（桂水炒）　甘艸　水煎服

養血化斑湯　治白疹

人參　當歸身　生地黃　紅花　蟬退　生姜引

秘本大青湯

大青　元參　知母　石羔　木通　枝仁　人中黃（火煆研細）

吉梗　升麻　水煎調人中黃末服

## 陰陽兩部多少第四十一

麻本火候。先動陽。陽部多時症候良。陽部若是稀少者。恐有後患須當防。

先動陽分後歸陰。陰部雖少症亦輕。胸腹四肢向內者。若逢稀少喜盈盈。

麻症雖肺胃主之。而多屬於火。發則先動陽氣。而後歸於陰經。面本為陽。所以人身之中。麻疹陽部宜多而不宜少。陰部宜少。多亦無妨。何為陽部。頭為諸陽之首。面乃陽中之陽。背與四肢向外者。皆屬陽。但得此數處。麻多而透表。則無後患。何為陰部。胸為陰。腹乃陰中之陰。腰與四肢向內者。皆為陰。

但得陰部少而陽部多。或陽部透表。而陰部不能盡透。均為順候。若陽部少而陰部多者。須防後患。如解毒湯（見二十六條）除去吉梗。消陽湯（見第九條）除去升麻吉梗甘草生姜等劑。俱可隨症加減而用。若陰陽兩部俱少者。此乃麻毒輕也。不在此例。

## 紅潤不起已出不紅第四十二

紅潤尖聳如珠粒。此等麻疹最為上。若紅不起二便澁。急用清熱透肌湯。

出而不紅發熱甚。煩燥頭疼或身疼。葛根疎邪解表方。須宜早用莫遲延。

麻疹色貴紅潤。形貴尖聳。若色雖紅潤。而麻不起發者。或兼二便艱澁。宜用清熱透肌湯（見二十五條）去甘艸治之。如麻色淡而不起。二便如常者。此屬本虛。當兼培養氣血。以清熱透肌湯（見二十五條）去石膏甘艸。加生地黃當歸治之。若已出而標不紅。已現而發熱轉甚者。或頭痛身痛煩燥者。以葛根疎邪湯。

加元參麥冬主之。或更加連翹地骨皮亦可。凡欲解散表邪。但表實邪甚者。此方最宜。

葛根疎邪湯

葛根　防風　荊芥　蘇葉　牛蒡子　連翹　地骨皮

前胡　茯苓　只殼　木通　燈芯引

### 鮮紅色淡紅色第四十三

鮮紅光豔有重輕。粒頭離肉膚潤平若是低塌不高聳。清肺瀉火保安寧。

痲色淡紅正所宜。本來肺胃毒少稀。若是粒頭不離肉。低塌色焦又責毉

痲色鮮紅。內多有熱。鮮紅者。必光活而有豔色是也。若是粒頭離肉。皮膚活澤。症還輕平。倘粒頭低塌不高者。其症多重。急宜清肺瀉火如黄芩知母麥冬天花粉牛蒡子石膏清金之藥。黄連枝仁連翹元參大青黄栢瀉火之品。在所必用。以黄芩瀉肺湯。去吉梗大黄甘艸。加麥冬牛蒡子元參主之。至若痲色淡紅痲所正宜。蓋肺胃之毒原輕。痲色故淡。再得粒頭高聳而離肉。此上古之候。若粒頭低塌。而色焦枯燥。又因風寒外折。藥宜疎散之劑。以葛根解肌湯（見第五條）去赤芍藥甘艸治之。又有一等初出。粒頭不高。色帶赤淡紅。大便閉結。唇口燥赤者。此火邪內鬱。大熱症也。急宜用大寒涼之劑。佐以疎托之藥。以白虎解毒湯（見二十六條）去竹葉加元參荊芥治之。若不早治。過數日後。色變紫黑。而難治矣。

黄芩瀉肺湯　治肺熱裏實症

黄芩　枝仁　只殼　薄荷葉　連翹　杏仁　大黄

吉梗　甘艸　水煎食後服

### 粒紅白痲如肌白第四十四

痲出成片被風押。忽然一变為白色。若是粒紅只膚白。毒從血化症候吉。

痲之粒頭高聳。色紅淡潤。而肌膚白者。此肺胃之火原輕。乃上古之症。不須服藥。又有毒從血化。而見此候者。亦有因熱毒從汗解。而見此候者。俱不必用藥而愈。若初出之時。痲色如肌膚一樣白。不分肉地。惟粒頭高聳。晬時即收者。邪熱本輕也。然有表氣本虛而色白者。調護溫煖。無冒風寒。越二三日。而自變紅活也。古云白疹溫煖而後滅者。此之謂也。又有一等正出之時。為風寒所遏。致痲色如膚白者。其人必見毛竅竦慄。此等症候。必用疎散之劑。解毒散風。方得紅活。以葛根疎邪湯（見三十三條）或葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘艸。加蘇葉薄荷只殼赤茯苓主之。倘若失治。致毒難盡。變症多多。又有一種痲出成片。一被風寒所折。即變為白色。身不發熱。而毒反內攻。煩燥腹痛。痰喘氣急者。危候也。如毒攻於胃。則嘔吐清水。毒攻於脾。則腹脹不食。毒攻於肺。則鼻塞喘促。毒攻於心。則唇舌焦裂。不省人事。搖頭掣手。毒攻於肝腎。則變黑色而不救矣。

紫黑色第四十五

麻遇紫黑內熱極。光活潤澤生可得。紫赤乾晦無起意。縱是仙翁也費力。

麻遇紫色。內熱極矣。但得光活潤澤。粒頭尖聳者可治。宜用清涼解毒之劑。佐以消痰定喘之藥。以涼血飲子去赤芍。加貝母只殼葶藶連翹牛蒡子主之。胸膈煩燥者。以古方黃連解毒湯。（見三十五條）調辰砂滑石末治之。若既出之時。而色紫紅乾燥晦暗者。乃毒火熾甚。急以生地芩連湯去白芍防風粉葛。加只殼紫艸連翹。或涼血地黃湯。去甘艸。加木通只殼紫艸連翹牛蒡子黃芩黃栢解之。或以四物湯（見二十五條）加酒炒

紅花紫艸地骨皮黃芩連翹牛蒡子黃連粉葛之類。以滋陰涼血而內熱自除。所謂養陰退陽之義也。若麻收之時。身上麻形肌膚帶紫色。或青色者。此內毒實熱之候。以大連翹飲。（見三十五條）去柴胡赤芍甘艸。加地骨皮只實黃連牛蒡子以利二便。使實熱從二便而洩。如熱極甚者。再加大黃以治之。又有一等。見煖則紅活。不煖則焦枯。此為風寒所閉。治法雖應涼解。而不可大過。以煖為是。宜用養陰湯。（見三十二條）用生地黃六白芍川芎。加防風荊芥以治之。若麻紫而不光潤。顏色枯燥。而無起意者則難為矣。

涼血飲子

生地黃（一錢五分）　黃連（五分）　黃芩　荊芥　元參（各一錢）
紅花（三分）　丹皮　赤芍（各八分）　木通（七分）　水煎溫服

生地芩連湯

生地黃　黃連　黃芩　連翹　紅花　防風　粉葛
枝仁　元參　木通　石膏　當歸　牡丹皮　白芍藥
燈心引　如大便三四日不通。合河間涼膈散利之（見三六條）

涼血地黃湯

生地黃　當歸尾　黃連　枝仁　元參　甘草　水煎服

## 粒頭焦第四十六

麻粒頭焦黄可驚。熱極急將肺胃清。治之若遲不及時。必成紫黑命歸陰。

麻疹透表而粒頭焦者。不論麻色紅淡。皆爲熱極之候。急宜清肺凉胃。分利小便。並宜以白虎解毒湯（見二十條）重用石膏。加木通澤瀉。或加車前子治之。如乾燥無汗。加蜜酒炒麻黄以汗之。大便燥者。宜於清解劑中。佐以血藥。而潤燥以全書除熱清肺湯。加當歸火麻仁只壳治之。如不通者。方以承氣湯。或河間凉膈散。（見二十條）去甘草下之。倘治之不早。多致紫黑難救矣。有等原發小疥而頂焦。有似於麻焦。而實非麻焦。

臨症須宜詳審。

全書除熱清肺湯　清肺金。瀉心火。主方

麥冬　黄芩　石膏　元参　生地黄　貝母　赤茯苓

壯熱。加地骨皮黄連。　氣粗。加炒葶藶子栝蔞霜。

便閉。加當歸火麻仁只壳。

承氣湯　治少陽胆經陽明大腸症

生大黄（四兩）　厚樸（姜汁拌炒六錢）　只實（麵粉拌炒三枚）　水煎服

加芒硝三合名大承氣湯。

## 雲頭片第四十七

麻如雲片嫩紅赤。或作腥臭出膿血。一因表火一因裏。治分内外免疎失。

麻出有如雲頭大片。其形微起。此症有二。一樣現大片。嫩紅赤腫而微離肉者。一樣於紅腫大片之上。復有小紅點現於片上者。皆因表火熾甚所致。當分内外。用大寒凉之劑。或分利之。以白虎解毒湯（見二十六條）加葛根元参治之。若麻出如錦紋斑爛。或出膿血腥臭不乾。心胸煩悶。嘔吐清水。身温熱者。以白虎解毒湯（見二十六條）加貫仲以散結積諸毒。而除濕熱。加防風荊芥穗以治風而消瘡毒（有加蒼术治之者雖云甚當然似乎當慎）慎勿遲延。恐致不救。若麻稠密。身痛煩燥者。以凉血飲子（見四十五條）去赤芍。加紫草連翹牛蒡子治之。倘係癮疹。遍身狀如雲頭片。斑點乍有乍無者。則當以消風散治之。

消風散

當歸　生地黄　防風　蟬蜺　知母　苦参　荊芥

胡麻仁　牛蒡子　石膏（各一錢）　木通（五分）　水煎食遠服

一方有蒼术甘草

## 發斑似發斑屑已出夾斑第四十八

發熱蒸蒸便已艱。皮紅似錦是名斑。莫將痲毒雷同看。夭殺庸醫一樣觀。

斑症血勝氣不足。痲候營血虧耗多。初熱皮膚覺似斑。莫作真斑用寒藥。

痲症初起。全類傷寒。但中指冷者。乃是痲候。若發熱時。大便閉結。或艱硬。皮膚上紅如錦者。乃熱留胃中是發斑症。非痲症也。不可認作是痲。而妄用發散之劑。用之反增危劇。宜以加味人參白虎湯。（見二十九條）去人參天花粉甘草粘米。加大青元參生地黃只實木通主之。一者則可以化斑屑。二則無碍乎痲候。如大便不通者。以三黃丸微利之。夫發斑之症。乃血有餘而氣不足也。痲症乃是火熬血分。血多虛耗。陽氣多旺。何得有此。若發熱之時。皮膚上有覺似痲屑者。此實非斑。乃風寒所協在表。而成癮疹。此等症候。只宜疎散之劑。內加清解之藥。俟痲一透。癮疹自退。慎勿認作真斑。而施苦寒之品。遂用紫草紅花石膏等化斑之藥。以致大便水泄不止。元氣日衰。致痲內陷而難救也。如葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草。可以施治。若痲已出而夾斑者。以犀角紅花飲主之。

三黃丸

黃連　黃芩各一兩　大黃二兩　為末水丸白水送下

犀角紅花飲

犀角（鎊）　紅花　生地　當歸尾　丹皮　連翹　牛蒡子

木通　只殼　水煎服

## 易收早收難收第四十九

痲出高聳潤澤點清鮮重施肺無險自表至裏漸次收。膚無疹痕名為斂。

痲出一日即便收。非胃風寒即挾熱、誤食酸物亦能致。三者原來有分別。

旋出旋收病勢輕連綿不盡勢堪驚化斑解毒令消滅莫使餘邪染病身。

麻疹出收合陰陽出以溫和收以涼違出不收陽氣盛遲乜間出是陰強。

麻疹出收常以六時為準如子後出午時即收午後出子時

即收。乃陽生陰長。陰生陽成。造化自然之數也。凡此旋出旋收者。乃為易收、其症則輕、然麻之易收。必須先時麻出高聳。粒尖淡紅色潤、以其毒輕。而肌表易濟。肺無加咳。故易收也。又有一等。火毒雖重。而重施清解。以致肺胃火邪息退。而易收者有之。然必於三日之間。從肌表而漸收於裏。或三日之間、一時收盡。膚上並無疹痕形影者、方為易收治者當詳審之。若麻出一日而收者、乃見風大早。為風寒所冲。麻毒內攻。消失者、非為易收。急宜施治。若不早治。必致胃爛而死。宜以葛根疎邪湯（見三十三條）主之。雖不復出。亦無後患。即三日後。麻已收斂明白。如有被風寒所襲者。亦宜以此方主之。至於

早收。則與易收不同。早收者。痲出未經三日、或一二日。或半日而收盡。週身肌膚壞處、絕無紅影。乃為早收。終變危候。若雖未經三日而早收。肌膚上壞處、尚未全收、其毒未盡而攻於內。急宜清毒解肌透表以救之。宜用解毒快斑湯。去查肉生甘艸川芎桔梗並紫艸。加石膏知母元參治之。發之不起。當審其所因。而與內解。何則。早收之候有三因。一因正出未透之際。而胃風寒。麻因風寒所遏、邪反內攻。以致早收。宜以葛根疎邪湯（見三十三條）加葱白與之。熱服、或以消毒飲（見二十二條）去甘草加葱白葛根與之。熱服。服後便透者。吉。不透。則再用消毒飲（見二十二條）去甘艸加酒蜜炒麻黃。有更則穿山甲者。當

酌量而加以治之。不急治。必發喘脹而死。亦有遍身清紫熱腫。喘脹氣急。此毒滯血凝。半匿肌表。急用河間涼膈散（見二十六條）去大黃芒硝甘艸。加元參紫艸茸丑牛。須蜜炒麻黃石膏以發越之。若腹脹喘促。溺清膈實者、以河間涼膈散（見二十六條）去大黃芒硝。加丑牛葶藶芥子治之。庶或可救一二。一因內挾熱痰。火毒抗劇。而伏匿煩燥。或腹脹喘急。不省人事者。以白虎解毒湯（見二十六條）除天花粉淡竹葉。加元參牛蒡子連翹括蔞霜治之。一因兵食酸醋收斂之物。以致肺竅不通。毛竅閉密而伏匿。壯熱喘咳煩悶者。以豬膽汁煮甘艸煎湯。續續與服。或以苦參同生甘艸煎濃湯。灌之以探吐。吐中便有發散

之義。然仍宜疎托。當以消毒飲。（見二十二條）去甘草與服。如誤食猪肉。喘脹氣急者。亦以消毒飲。（見二十二條）去甘草。加只壳丑牛豆肉以下奪之。有用只壳湯。去厚朴甘草。加神曲麥芽治之者。確無濟於事。若誤食桃李生冷。喘咳聲瘖者。以消毒飲。（見二十二條）加木通只壳石膏馬兜鈴。去生甘草主之。果得熱退身安。氣息漸調者。方可無虞。又有因大病。或久病之後。而出麻。其人中氣虛耗。致毒不能發越。而收早者。或有因初潮始熱之時。泄瀉久經不止。或未發熱之先。曾經洞泄者。亦致中氣虛損。麻經出盡。而隨即收者。此數者雖用疎托之藥。而毒終難發盡。惟當健運中氣。略兼解表清熱之劑。如香砂六君湯。去半夏。少用白朮木香砂仁等分。加麥冬連翹牛蒡子。酒炒黃連。酒炒黃芩。荊芥防風葛根之類。可以施用。（愚意當以沙參易人參。薏苡仁易白朮。木香砂仁可除。更可加貝母。）但與微蹩門户。仍即用消毒之劑。如消毒飲。（見二十二條）又宜緋用。慎勿遲延。恐致肺胃敗爛而不救。若麻已出而復收。（有用當歸紅花飲。加葱白牛蒡子連翹。葛根治之者。大爲不妥。姑録是方証謬。）或出不盡。心慌啼哭不止。十分危急。死在須臾。或下痢腹痛。（有用黃芩白芍二味治之者不妥。）須當以解毒快斑湯。去吉梗甘草。查肉紫草茸川芎。加只壳赤茯苓。隨症加減治之。大抵麻在三四日之後。覺漸次收斂。方爲順候。然必待肌表清涼。麻方能收。若麻出至三四日。五七日不收者。肌膚必然壯熱。此爲難收之症。宜

用解肌涼血之劑。佐以利水之藥。以涼血飲子。（見四十五條）除去赤芍。加木通赤茯苓只壳葛根主之。若一出連綿。至四五日不收者。乃陽毒大甚。須用化斑解毒湯。去升麻大黃。加黃連黃芩生地黃地骨皮以解之。便閉而有腹疼者。並用大黃以利之。或以秘木大青湯。（見第四十條）去升麻吉梗。加黃連地骨皮黃芩生地黃以解之。便閉腹疼者。加丑牛以利之。解其毒使之發於外。庶裏無餘邪。免生後患。若解之而仍遲延不出者。乃風寒外束。皮膚秘密也。宜以葛根疎邪湯。（見三十三條）加薄荷地骨皮治之。若麻點帶白燥色。隱匕於肌表之間。似收非收。而實不收者。此必因風寒所絆。而不能透表。非難收也。宜急用疎托之劑。佐以寒涼之藥。以葛根解肌湯。（見第五條內）去赤芍藥甘草。加防風黃芩治之。若肌膚之上無點粒。惟見如片。膚平不高。此爲易收。而未收盡也。宜用解肌之藥。亦以葛根解肌湯。（見條）去赤芍甘草。隨見加減治之。如見有內熱之症。亦宜清內熱。倘內熱不除。多致不能盡收。如生地骨皮湯。（見三十條）去甘草。古方黃連解毒湯。（見三十三條）加味導赤散。俱可選用。加減而施。

張璐先生曰。西北水土剛勁。稟質亦厚。麻必五七日乃收。東南風氣柔弱。麻出不過二三日即收。邇來地運變遷。無分西北東南。稟質勁弱。未有不綿延日久方收者。當非難收之比。

若三四日後麻疹既燥色白隱隱於肌膚之間而難收者。此必衛氣素弱不能焮發或因衣被單薄。致冒風寒阻其發越之機。以致纏綿多日法當用辛散透表之劑如荊芥葛根前胡牛蒡子西河柳麻黃之類。以發散之。淡竹葉元參薄荷蟬蛻之類以透肌。切不可遽用寒涼。閉其開洩之路此訓可以為萬世治麻大法。

解毒快斑湯　麻疹現形一二日宜用

連翹　牛蒡子　荊芥穗　防風　當歸尾　吉梗（各）七

生地黃　查肉各八　蟬蛻（七個去頭足）　黃芩　紫艸茸（各六分）

乾葛（一錢）　西河柳（五分）　川芎（五分）　生甘艸（三分去皮）

水煎以犀角磨汁對服

只殼湯

厚朴（薑汁炒）　陳皮（白鹽湯三泡去）　只殼（麵炒）　炙甘艸（三分）

水煎服

香砂六君湯　治氣虛痰滯食滯氣滯等症

人參　白朮　白茯苓　炙甘艸　陳皮　半夏　木香

砂仁　紅棗薑引

當歸紅花飲　治麻已出而復收（保俗用方）

當歸（酒炒）　紅花　葛根　連翹　牛蒡子　甘艸　水煎服

一書有升麻　一書有生白芍吉梗

化斑解毒湯

元參　知母　石膏　牛蒡子　連翹　人中黃（火煅另研）

大黃（酒蒸）　淡竹葉　升麻　水煎調人中黃服

加味導赤散

薄荷葉（八分）　生地黃（酒洗）　木通　元參　車前子（炒研）

淡竹葉（各七分）　連翹（六分）　黃連（三分）　燈芯引

麻科活人全書卷之三

安成　璞齋謝玉瓊崑秀輯　　怡菴彭　肇緒刊
阜山劉齊珍原刊

## 咳嗽第五十

發熱蒸蒸咳嗽頻。涕流鼻孔淚滿睛。面浮眼腫雙腮赤。此是天行麻毒侵。

發熱蒸蒸咳聲頻。目腫面浮氣上行。坐臥不安痰唾少。肺葉焦舉熱邪蒸。

麻症百聲咳不歇。初熱未出正相宜。不咳少咳皆不順。歇咳須要用陳皮。

正收收盡宜無咳。此時有咳須早醫。清金瀉火爲急務。及待危時悔是遲。

麻毒連綿上氣咳。發作百聲終不歇。胸高肩聳蚓長流。擺手搖頭泉下客。

天行麻疹與傷寒相似。惟麻則噴嚏鼻流清涕。眼胞腫。目淚汪汪之爲異耳。但見此等症候。真是麻症。夫麻原發於心。心火內亢。則肺金受尅。以致肺葉焦舉。故有咳嗽。法當清金瀉火。以加味人參白虎湯（見二十九條）、去人參甘草粳米加牛蒡子連翹主之。有用白虎湯（見二十六條）去甘草粳米加牛蒡子薄荷葉治之者。或以三味消毒散。合瀉白散二方。俱去甘艸治之。方中桑白皮。取採鮮者多用爲妙。熱甚煩渴者。加知母天花粉石膏黄芩之類。如咳甚者。以二母散。或麥門冬湯。除去升麻赤芍甘艸。或消肺湯去吉梗甘艸加蘇子。或秘本清肺湯去吉梗甘艸。或聶氏清肺飲。去柴胡陳皮吉梗甘艸等方隨見而用之。然確宜清熱透毒。不可止咳。故古人多用清揚飲子。去甘艸加連翹主之。慎勿用五味子。及收斂等藥。秘塞肺竅。令咳嗽終身不已。只宜清餘熱。消痰壅。而咳自止。貝母麥冬飲。除甘艸吉梗。加連翹牛蒡子黄芩黄連之類。前後咳嗽俱可抛服。夫麻有咳。則肺氣疏通。毛竅開豁。而麻則易於出透。所以麻症初熱未出之先。最喜咳嗽。多咳則爲順候。俚言

所謂摸蘇是也。麻疹出透。則心經火息。肺無尅伐。而咳自止。正出之際。若無連聲咳嗽。及少咳與不咳者。則腠理閉密。麻雖透表。急於升發藥中。多加留白陳皮。以啟其咳。使毛竅開洩。腠理舒暢。而麻自易出透矣。已出之後。及將收收後。則又以無咳爲佳。如麻已出而咳不止。身熱作渴。煩燥不食。脉洪者。以古方黄連解毒湯。（見三十五條）加生地黄鮮骨皮治之。肺熱如咳喘者。用生地黄散。去陳皮加黄芩葶藶桑白皮治之。喘甚者。加括蔞霜北芥子蘇子萊服子治之。出盡及收後。微乜咳嗽者。此餘邪未盡。肺氣未平也。不須服藥。若欲治之。則以瀉白散。合三味消毒散。俱去甘艸與服。如肺燥塞不利而咳、

者。以利金湯去陳皮吉梗甘艸生姜、加麥冬牛蒡子黄芩桑白皮治之、痲盡透而壯熱咳嗽、大便閉澁、以除熱清肺湯去赤芍甘艸加黄連黄芩地骨皮火麻仁只壳以清利之、或加大黄下之、如出盡及收後、咳欬甚而仍不止者、是屬於熱、治宜清熱降火佐以消痰之品、以清咽滋肺湯去玉竹吉梗甘草加黄連桔黄芩、或薛氏清肺飲、去陳皮柴胡吉梗甘艸加貝母黄連主之、出盡收後、咳欬不止、而多痰者、以清咽滋肺湯。去玉竹淅麥冬吉梗甘艸、加只壳茯苓陳皮治之、或薛氏清肺飲、去北柴胡吉梗麥冬加只壳治之、若痲至五六日而仍咳嗽氣粗外熱不退、乃尚有餘毒留於肺胃、宜用孟介石清肺飲除僵蚕柴胡陳皮吉梗甘艸加地骨皮桑白皮葶藶治之、或以靜遠主人清肺飲、去吉梗甘、石膏黄芩治之、如痲後或嗽、聲音不清、不思飲食、眼目丁口乾燥者、以清肺消毒化痰湯、去吉梗甘艸治之、若痲後氣喘、咳嗽連聲不住者、此乃毒流於肺經、肺中伏火、金虚葉焦、故咳嗽連聲不住也、以秘本門冬清肺湯、或用骨皮清膈散、俱去桔梗甘艸糯米治之、如體熱者、亦以秘本門冬清肺湯、去甘艸吉梗糯米加黄連黄芩牛蒡子治之、咳嗽甚而氣喘、連聲不住、甚至飲食喰水者、此熱毒乘肺而然也、亦以秘本門冬清肺湯、去甘艸吉梗糯米、加麥冬枇杷葉治之、見血者、再以茅根阿

膠治之、如咳嗽有吐血者、以麥冬清肺湯、去查肉吉梗加生地黄主之。兼有喰水者、亦以此方。除查肉吉梗治之。如痲後咳嗽氣急者。以只壳前胡湯、除甘艸吉梗以蘇子易蘇梗。加芥子萊菔子葶藶括蔞霜以治之。然亦有加沉香者。在痲後似亦無害。如痲後但氣粗者。以薛氏清肺飲。仍除柴胡吉梗甘艸。加芥子蘇子萊菔子葶藶治之。如痲後咳嗽不止。内熱不清。心神不寧。夜臥不安以天真膏除黄芪白朮薏苡仁。加酒炒黄連酒炒黄芩辰砂主之。如痲後咳嗽失聲發熱者。以葶藶子。加地骨皮天花粉酒炒黄連黄芩水煎與服。痲後咳嗽。腹脹喘急。煩燥泄瀉。聲啞唇青口青者。以賈蘭峰傳方。除麻黄陳皮吉梗甘草白芍。加麥冬骨皮芥子治之。或不除白芍。更加柴胡亦可。此在痲後。活法變通。在乎其人。然切不宜遽用白朮等味。如痲後久咳不止。以生地黄當歸身白茯苓川貝母桑白皮杏仁柿霜等味。以養血凉血清金而咳自止。然黄有以四物湯（見二十五條）合只吉二陳湯。加括蔞霜杏仁治之者。雖曰無碍。反不若以前之七味治。藥簡而功捷也。如兼渴者。如麥冬只壳。痰喘者。加蘇子芥子治之。或更加葶藶萊菔子亦可。其有感觸風寒。咳嗽煩悶。嘔逆清水。眼赤咽痛。口舌生瘡者。以防風敗毒散。現稿加生黄芩治之。如咳嗽氣喘唇焦。熱結在内。煩燥不寧。或口鼻出血。不拘前後。[illegible][illegible]以犀

角解毒化痰湯去赤芍甘艸。加麥冬杏仁葶藶治之。或用蘇氏清肺飲。去陳皮柴胡淡竹葉甘艸吉梗。加黃連當歸尾治之。收後如見此候。以加味人参白虎湯。（見二十九條）去人參甘艸糯米。加生地黃地骨皮黃芩以滋潤之。倘或久咳不止。面浮目腫。胸高如龜。肩聳氣喘。搖手擺頭。口鼻出血。面色或青或赤。或白而枯。鼻燥昏悶者。皆不治之症也。

三味消毒散　治咽喉疼痛。及疹已出未出。而未出勻。又治一切瘡毒。並能凉膈消痰。

牛蒡子（二兩炒研）　荊芥穗（二錢五分）　甘草（五錢）

研末每用三錢水煎服

瀉白散　治喘嗽並脾經肺有熱目黃口不吮乳

桑白皮（炙）　地骨皮（各一錢）　炙甘艸（五分）

粳米一百粒引水煎食後服

加人参白茯苓知母黃芩名加減瀉白散治肺炎喘嗽

二母散　治麻後咳嗽甚及肺熱咳嗽

知母　貝母（去心童便洗）　生薑一片引水煎服

或為末白水下一錢

麥門冬湯（即二十八條內葛根麥門冬散去人參淡竹葉）

麥冬（去心）　葛根　熟石膏（各一錢）　茯苓　赤芍藥（酒炒各八分）

升麻　炙甘艸（各四分）　水煎服

清肺湯　治麻後咳甚

枯黃芩　貝母　知母　吉梗（各七分）　防風　炙甘草（各四分）

水煎服

秘本清肺湯　治不時咳嗽寒熱咽紅

黃芩　當歸　麥冬　防風　赤茯苓　生地黃　連翹

蘇葉　前胡　吉梗　甘草（各五分）　桑白皮（一錢）　水煎服

蘇氏清肺飲　治麻後氣粗咳嗽

桑白皮（蜜炒）　地骨皮（去骨各五分）　麥冬（去心一錢五分）　天花粉

元參（各八分）　柴胡（六分）　吉梗　黃芩（酒炒）　川木通（去皮各七分）

熟石膏　生地黃（各一錢）　陳皮　生甘草（去皮各三分）

淡竹葉　燈心引水煎加羚羊角磨汁對服

清揚飲子　痘疹主方

西河柳（五錢）　麥冬　元參（各二錢）　牛蒡子炒　葛根（各一錢五分）

知母（蜜炒）　蟬蛻（去土洗）　薄荷葉　荊芥穗　甘草（各一錢）

淡竹葉（三十片）　水煎服

貝母麥冬飲

貝母　麥冬　薄荷葉　元參　栝蔞仁　吉梗　甘草

水煎服

生地黃散　治麻肺熱喘咳斑疹身熱口乾心煩

生地黃（一錢）　麥冬（五分）　杏人　款冬花　陳皮（各八分）

水煎服準繩有甘草一書並有吉梗

刹金湯　治肺燥塞不利而咳

貝母　茯苓　只殼　陳皮　吉梗　甘草　生姜白蜜引

除熱清肺湯治痲盡透而壯熱咳嗽大便閉結

石膏（二錢）　麥冬（去心一錢五分）　元參　生地黃　貝母　栝蔞根

赤芍藥（各一錢）　甘草（五分）　水煎溫服

清咽滋肺湯　治痲後餘熱咳嗽聲瘖

元參　牛蒡子　荆芥　貝母　麥冬　栝蔞根　馬兜鈴

明玉竹　吉梗（各八分）　甘草（四分）　水煎服

前方繆仲淳有薄荷無馬兜鈴

孟介石清肺飲

熟石膏　生地黃（各一錢五分）　麥冬（二錢）　淡竹葉（七分）　陳皮（七分）

元參　柴胡（各一錢）　當歸尾　黃芩　知母（炒）　吉梗（各七分）

殭蚕（炒五隻）　甘草（去皮三分）　燈心五十寸引

靜遠主人清肺飲　治痲後傳肺胃二經咳嗽喘急

麥冬　牛蒡子　防風　茯苓　桑白皮　地骨皮　知母

吉梗　甘草　水煎服

清肺消毒化痰湯

牛蒡子　荆芥穗　防風　貝母各五分　連翹　黃芩　前

胡　茯苓（各七分）　只殼　吉更（各一錢）　甘草（三分）

---

水煎作十餘次徐徐服

秘本門冬清肺湯

天冬　麥冬　知母　貝母　杏入（去皮尖炒研）　石膏　骨皮

牛蒡子　欵冬花　桑白皮　馬兜鈴　吉梗　甘艸

糯米引　水煎服

骨皮清膈散

黃芩（二錢五分）　石膏（七分）　滑石（七分五厘）　地骨皮　當歸　知母

桑白皮　紫苑茸（蜜炒）　白茯苓　吉梗　甘艸（各五分）

姜三片引　水煎服

前方加人參柴胡白芍白朮黃芪（蜜炙各五分）名人參清膈散治

肺熱鼻乾涕唾稠粘

麥冬清肺湯

麥冬　知母　貝母　黃芩　杏入　天花粉　只殼

陳皮　丹皮　查肉　吉梗　水煎服

只殼前胡湯

只殼　前胡　防風　赤茯苓　蘇梗　吉梗　甘艸

水煎服　氣急者以沉香磨水對服

天真膏　治痲後咳嗽不上內熱不清心神不寧夜臥不安或

生瘡疥

生地黃　麥冬　元參　白茯苓　紫苑茸　知母　陳皮

桑白皮　沙參　生黃芪　薏苡仁　棗人　丹皮　茯神
當歸身　白术

右以生地麥冬元參沙參黃芪苡仁炒。白术為君。白茯苓炒棗仁茯神當歸丹皮陳皮紫菀茸為臣。以知母桑白皮為佐。以入砂鍋內。以長流水浸用。桑柴文武火煮兩時辰久。水乾再添水於內。取出去滓。將藥水以濾。從入砂鍋再熬。加蜜和成膏。以磁罐收貯。每用三匙。滚水調服。

葶藶丸　治麻出氣喘將成龜胸

葶藶子（隔紙焙炒）　漢防已　牽牛子（炒黑）　杏仁（去皮尖油）　萊菔子
水煎服　大便溏滑者除牽牛

賈蘭峰傳方

黃連　黃芩　連翹　元參　知母　杏仁　乾葛　麻黃
牛蒡子　陳皮　厚樸　白芍　吉梗　甘艸　水煎服

只吉二陳湯　半夏（二姜汁炒）　陳皮（去白）　白茯苓各一錢
甘草（五分）　只殼　吉梗（各八分）　姜引　水煎服

犀角解毒化痰湯　治麻後咳嗽氣喘脣焦結熱在內煩燥不安或口鼻出血

犀角（磨汁）　丹皮　連翹　貝母　天花粉　薄荷　紫艸茸
甘艸梢（各一錢）　當歸（八分）　牛蒡子（九分）　赤芍（六分）　生地黃（二錢）
黃連（五分）　淡竹葉（三十片）　水煎服

### 氣促發喘鼻扇胸高第五十一

氣促原因肺未清。開口出納喘候真。鼻扇痰鳴肺將絕。胸[illegible]
定肺幽冥

氣促之症。多緣肺熱不清所致。治法當分時候。若見於未出及正出之時。藥宜疎托。以清熱透肌湯（見二十五條）去甘草主之。如見於正收及收後。藥宜降火及瀉肺氣。以清咽滋肺湯（見五十條）去玉竹吉梗甘草。加茯苓陳皮以消痰。若開口而作出納胸肋高聳。起止不常不定。是為喘症。乃屬痰火之候。熱邪壅遏肺竅。氣道阻塞而然也。然喘症有虛實之分。實者易治。虛者難為。欲察其虛實之症。在於大便之溏泄。小便之清利。大

便之堅結。小便之赤濇上別之。若大便溏泄。小便清利。脣白而身無大熱。皆為虛症。須以半夏蘇子芥子葶藶吉梗甘草萊菔子陳皮南星茯苓之類。以清痰潤肺。多難獲效。實則大便堅燥。小便赤濇。脣紅而身發壯熱。用甘草吉梗陳皮枳殼蘇子括蔞仁杏仁桑白皮黃芩黃連天冬麥冬等味。多易於取效。果係實者。以竹葉石膏湯（見二十六條）去人參半夏甘草粳米。加括蔞仁貝母北芥子治之。冬月更加蜜酒炒麻黃少許。可以隨手而應。大抵未出時而喘者易治。收後而喘者難治。如發熱時多喘。邪熱鬱於肺故也。慎勿用定喘之劑。惟宜以大劑石膏知母竹葉湯或瀉前葛根湯去甘草主之。初發

熱而喘者。以麻黃湯去甘艸加連翹牛蒡子只殼。或以清金散火湯。去吉梗甘艸。加酒炒黃芩杏仁連翹只殼治之。初發熱未出之時而喘者。以三拗湯。去甘艸加荊芥石膏芽茶治之。如肺炎喘嗽。以加味瀉白散。去甘艸人參主之。發喘而鼻黑乾燥者。以白虎鮮姜湯。（見二十六條）主之。如痰實壯熱。胸中壅悶。臥則喘急。以前胡只殼散。除甘艸加貝母黃連黃芩括蔞霜治之。如痳已出而喘者。用加味清肺降火湯主之。如痳出三日後而作喘者。急以靜遠主人清肺飲。（見五十條）去知母吉梗甘艸加杏仁括蔞霜芥子治之。或以生地黃散。（見五十條）治之。如麻後發喘。以清咽滋肺湯。（見五十條）去玉竹吉梗甘艸合白虎湯。（見二十六條）去甘艸粳米以滋潤肺胃。若痳後而喘。日久胃虛。不可用白虎湯。（見二十六條）只宜以靜遠主人清肺飲。（見五十條）主之。痳後如有日久發喘不欬者。以小柴胡湯。（見二十二條）以貝母易半夏。沙參易人參。加五味子從權治之。若喘而無涕。兼之鼻扇者則難治矣。蓋鼻扇症。肺氣將絕。若鼻扇而兼喘滿痰鳴者。此必不治。如鼻扇而咽喉清利。無喘滿而精神似故不減者。十救二三。宜滋培肺氣。藥以潤肺清痰為主。以補肺阿膠散治之。收後而鼻扇者不治。若痳喘而胸高者。乃肺經熱甚。而脹起者也。其症多見於正收及收後。凡痳見胸高之症。為肺壞。乃不治之候。有用葶藶桑白皮散治之者。亦僅十全一二

而已。若冀其施無不應。未之有也。

石膏知母竹葉湯

石膏（五錢至一兩）　肥知母（一錢至二三錢）　淡竹葉（三十片至一百片）

麥冬（三錢至五錢）　薄荷葉（二錢）　西河柳（四兩）　水煎服

檉前葛根湯

西河柳　前胡　葛根　荊芥穗　貝母　元參　知母

麥冬　甘草　水煎服

麻黃湯

麻黃（泡去沫汁）　杏仁（去皮尖油）　甘草（各五分）　石膏　臘茶葉（一錢）

一方去石膏加桑白皮　水煎服

清金散火湯

麻黃（泡去沫汁）　蘇葉　牛蒡子　吉梗　甘艸　水煎服

三拗湯

麻黃（不去節三錢）　杏仁（不去皮尖二十粒）　生甘艸　水煎服

加吉梗荊芥名加味三拗湯

加味瀉白散

桑白皮　地骨皮　白茯苓　知母　黃芩　人參

甘艸　糯米一百粒　引水煎食後服

前胡只殼散

前胡　只殼　赤茯苓　炙甘草（各五錢）　大黃（量症加減）

右㕮咀每服三錢。水一盞。煎六分。旋服。

加味清肺降火湯　治麻出喘急

陳皮　枯黃芩　麥冬　桑白皮　生地黃貝　杏仁

括蔞仁　天花粉　石膏　葶藶子　地骨皮　蘇子（炒）

燈心二十根引水煎服

補肺阿膠散　治肺虛有火嗽無津液而氣哽鼻扇

阿井膠（蛤粉炒一兩五錢能補血液清肺滋腎益血補陰氣順則不哽液補則津生火退而嗽寧）

馬兜鈴（一兩長肺欬入肺清熱降火）

牛蒡子（炒香一兩利膈滑痰而潤肺解毒能治火嗽）

杏仁（去皮尖七個潤燥散風降氣止嗽）

粳米（一兩即粘米益脾胃）

炙甘草（一兩[illegible]脾胃）　水煎服

李時珍曰補肺阿膠散。用馬兜鈴。非取補肺。取其清熱降氣。而肺自安也。中間之阿膠糯米。乃補肺之正藥。要知清熱降氣。瀉之即所以補之也。若專於一味用補。反能助肺火而增咳嗽

葶藶桑白皮散　治胸高氣喘

葶藶子（隔紙炒香研）　漢防己　杏仁　貝母　蘿蔔子（姜汁炒研）

家蘇子（姜汁炒研）　桑白皮（蜜炒）　只殼　黃芩　北芥子（姜汁炒研）

二劑水煎服　胸高而喘者加蜜炒麻黃茸

---

齁鮯第五十二

喉中齁齁鮯鮯。毒火不得發越者。未出正出十全一。正收收後難為也。

麻毒傷肺胃。如喉中有痰齁鮯而鳴者。其症屬痰火之候。此因毒火內結之極。邪熱阻逆不得發越所致也。若見於未出正出之間。治當清肺降火消痰為主。十中可救一二。以除熱清肺湯（見五十條）去赤芍甘草主之。若見於正收及收後者。必邪熱未盡。毒火傳裏。或露風早收。餘熱內攻。而肺氣受傷也。實為難治。此症宜防之未得之先。

瘖啞聲音不清第五十三

咳嗽咽傷聲瘖啞非與痘瘄同例也此乃痲疹之常候認作危症是愚者

痲本屬火瘖啞乃痲之常候多吉無凶不可以痘瘄瘖啞比例盖因肺胃熱邪為風寒所襲不能盡達於表咳甚咽傷故瘖啞也治宜清肺降火消痰為主以清咽滋肺湯（見十五條）除去玉竹吉更甘草加黄芩木通主之若肺熱咳嗽聲啞者以萬氏清肺飲去菖蒲訶子仁吉梗加黄芩貝母主之若聲瘖而咽痛者以射干消毒飲去甘草加黄芩山豆根主之如痲後聲音不清咳嗽不思飲食眼目不清唇口乾燥者以清肺消

毒化痰湯（見十五條）去吉梗甘草加麥冬黄連天花粉主之如心虛聲音不揚者以導赤通氣湯除去甘草人參加沙參主之如係肺熱聲音不清響者以甘草清金散主之兼有咳者以清金降火湯主之或以驗方治之

射干消毒飲

射干　元參　連翹　荊芥　牛蒡子　甘草　水煎溫服

萬氏清肺飲

麥冬　荊芥穗　天花粉　知母　吉梗（各一錢）　石菖蒲

訶子仁（各八分）　水煎

導赤通氣湯

木通　生地黄　麥冬　當歸身　石菖蒲　人參　甘草

燈心引

甘桔清金散　痲後肺熱聲音不清皆用之而瘖甚者宜刪

桔梗（一兩）　甘草　連翹　訶子皮（各五錢）　牛蒡子（七錢）

為末每用一錢加薄荷葉少許水煎服

清金降火湯　治痲肺熱聲啞咳嗽

當歸　白芍藥（酒炒）　生地黄（酒洗）　栝蔞仁　白茯苓　陳皮

貝母（去心薑汁蒸）　桑白皮（蜜炒）　麥冬　黄芩（酒炒）　杏仁（去皮尖）

黄連（酒炒）　枝仁（炒）　元參　蘇梗　石膏　天冬　甘草

姜三片引水煎服

治痲後咳嗽失聲驗方

牛蒡子　黄芩　天花粉　薄荷葉　桔梗　甘草

水煎服

## 呃逆第五十四

呃逆雖曰有虛實麻症實多虛無一以因逆氣上冲挾胃火炎
炎作呃逆

呃逆之症乃氣逆上冲而作聲也其症雖有虛實之分而麻屬火候而發呃逆乃胃火上冲所致實者八九而虛者未嘗見一二也治法宜以清火安胃為主如實熱痰火發呃逆者以竹茹柿蒂湯去半夏甘草加貝母石膏（三六）如呃逆不止者以安胃散去查肉治之若呃逆一連二三十聲不歇者以紙條寘鼻孔中得嚏即已或以生姜汁同蜜汁煎熱頻服之亦可

竹茹柿蒂湯

竹茹　柿蒂　陳皮　半夏　甘草

因惱怒發呃者加柴胡青皮黃芩

安胃散

陳皮　麥芽　木通　澤瀉　黃芩　石斛　查肉

水煎食遠服　胃火甚者加石膏

## 噴嚏第五十五

噴嚏能令肺氣清。始終有嚏麻必輕。若還鼻塞而無嚏。風邪留
滯毒來侵。

麻疹初起而多嚏者。乃內火因風邪搏激而然。故有噴嚏者則肺毒得解。而肺氣全通矣。初熱未出之時。若有噴嚏者。必是先因外感。而後得通也。其毒繼出可散。正出之時有噴嚏者。其麻必輕。收後而尚有噴嚏者。方為盡退。乃毒得盡解。可無餘患矣。若嚏而多涕。濁痰得出。肺氣自清。最為吉兆。若無嚏而鼻塞不通者。必有風邪留滯。如清肺湯（見五十條）除去吉梗甘草。加荊芥薄荷葉連翹牛蒡子只壳赤茯苓。或利金湯（見五十條）去吉梗甘草生姜。加赤茯苓薄荷葉連翹牛蒡子。或全書除熱清肺湯等方。俱可施用。但凡遇有鼻塞不通之症。總宜用辛涼之劑以疏達之。如荊芥乾葛牛蒡子薄荷葉麻黃辛散之品。元參石膏淡竹葉栝蔞根清涼之味。在所當施。

全書除熱清肺湯（重出）　瀉心火清肺金主方

麥冬　黃芩（酒炒）　石膏　元參　生地黃　貝母　赤茯苓

水煎服　壯熱加地骨皮　壯熱大甚更加黃連

氣粗加葶藶子栝蔞霜　氣喘加蘇子芥子

便閉加火麻仁只壳　便閉甚加大黃

## 鼻通多涕鼻乾無涕第五十六

始終多涕木爲吉鼻乾無涕肺府熱其間形症有數般叮嚀良工細認識

鼻通多涕肺氣順也所謂多涕者鼻常有涕非鼻涕暫見比也痲症得肺府平和鼻無阻塞此爲順候初熱至出時多涕者皆爲吉兆收後亦以多涕爲易治至於鼻乾無涕必須鼻孔之內絕無物塞而鼻乾燥方是真候此乃肺府熱極閉塞而不通也初熱未出之間見之其症必重以清肺飲去陳皮五味子吉梗甘艸合清揚飲子（見五十條）除甘艸淡竹葉加石膏黃芩更重加蜜酒炒蔴黃以解表而疎通肺氣或以聶氏第二清肺飲去柴胡陳皮姜蚕吉梗歸尾淡竹葉合蘇葛湯（見第六條）去柴胡赤芍甘艸加只殼治之若已出大熱致鼻乾無涕者此症亦重宜以全書除熱清肺湯（見五十五條）加黃連地骨皮連翹牛蒡子只殼治之或暫有而暫無涕者雖重亦可救以杏仁清肺湯去吉更甘草加黃芩治之又有先無涕其後熱退鼻通有涕者又有因熱甚鼻外被塞乾結似於無涕者以利金湯（見五十條）去吉梗甘艸生姜陳皮加牛蒡子黃芩赤茯苓連翹治之或更加桑白皮杏仁治之以上數症總皆要肺氣通暢雖凶可救醫家須宜詳察施治

清肺飲

杏仁　貝母　茯苓（各一錢）　陳皮　吉梗　五味子

甘艸（各五分）　水煎服

聶氏第二清肺飲　治痲出四五日同時有餘毒留於肺胃多咳嗽氣粗外熱不退

熟石膏　生地黃（各一錢五分）　元參　柴胡（各一錢）　麥冬（二錢）

陳皮（六分）　枯黃芩（酒炒）　當歸尾　知母（炒）　淡竹葉

吉梗（各七分）　殭蚕（炒五條）　生甘草（去皮三分）　燈芯引　水煎服

杏仁清肺湯

杏仁　麥冬　貝母　款冬花　牛蒡子　吉梗　甘艸

水煎服

## 微汗自汗大汗無汗第五十七

微汗常出。熱不留。初出未收。總沐麻升發之味。須禁引用之人減反為佚
自汗之症屬陽虛。麻後見之更可危。勿令見風成痙病。治陰抑陽症自除
發熱渾身汗最宜。元府開豁麻出時。衛中表邪從此散。汗多亡陽又忌之
壯熱無汗大非吉、不因風寒內火鬱。自始至末總無汗。縱麻已收症百出

麻有自汗微汗大汗無汗等症。而均有宜有忌。麻初出至未收之時皆宜微汗。有微汗則皮膚通暢。腠理開豁。而麻易透。發熱之際有自汗者則有發散之義。乃為常候。蓋麻過自汗則毒從汗解。元府開而麻毒透。衛中之表邪則從之而散矣。不可遽止。亦不可復用升發之劑。若自汗而更升發。恐汗大過致有亡陽之患。夫自汗之症。原屬陽虛。初時無妨。若麻後自汗多成痙病。切勿見風。法當治陰抑陽。使腹內虛熱清退而汗自止。以四物湯（見二十五條）仍去白芍川芎。加元參牡礪粉主之。如麻後自汗兼不食吐蚘者。真是虛症。最為難治。亦宜以四物湯（見二十五條）加牡礪藿香釵石斛。用舊蒲扇或舊蒲蓆燒灰研細末入藥中調服。若誤投藥餌。傳變多端。難收功矣。

切勿拘治麻初起常法而用辛溫解散之劑。如果係脾熱。可用瀉黃散去甘草。因症加減而治。則又可拘麻初之常法矣。若自汗而煩渴氣壅脈數者。則以靜遠主人化斑湯加括蔞霜主之。至於大汗過多之症。則有二因。一因衣被蓋厚而致大汗過多者。一因用升發之劑過甚而發汗過多者。二者皆不宜也。蓋恐大汗過多致有亡陽之變。輕則症難脫體。重則多有不救。倘遇麻有隱暗不透之壞症。從權施治。而用升發之劑。取其大汗。使毒從汗解。此特語其變而非正治也。然亦多凶。經曰汗多亡陽。急須止之。以秘木黃連湯或當歸六黃湯。外用溫粉撲法治之。（有以人參白虎湯合古方黃連解毒湯見三十五條治之者似乎未當方仍列）

（後備用）若婦人麻後汗多。心慌神昏者。亦有因而致。不可不察。有因麻症初起。適遇經行。麻乃火候。心火旺盛。榮血多虧。今又月期適至。血又下洩。虧耗大過。至麻收之後。氣血兩虛。未有不成汗多怔忡神昏等候。急宜以玉屏散加牡礪粉與服。以止其汗。免至亡陽。旋用人參養榮湯去桂心五味子。多加牡礪粉龍骨數大劑與服。須宜急治。遲則不救。若麻症初起壯熱而無汗者。多因外感風寒大重。以致皮膚乾燥。毛竅不開。麻疹壅滯。而汗亦難出。多成內攻之症。或肚腹脹痛。或發喘促。夏秋之間。宜微升散。以葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草。加木通只殼治之。春冬寒月。重為發散。如加味三拗湯去吉

梗甘草。或葛根疎邪湯（見三十三條）加炒麻黄治之。但不可過劑使渾身常得微汗為妙有微汗則腠理潤澤而痲易出。又有一等因熱極火鬱而無汗。亦致皮膚乾燥而不活潑。痲亦難出此症外必見唇舌破裂。二便結澁昏沈壯熱或身痛肚腹脹疼。多發喘促齁齁痰鳴。不拘何時。無分遲早。急用寒涼降火清肺之劑。佐以升發之藥。以白虎解毒湯（見二十六條）加地骨皮貝母元參牛蒡子前胡乾葛治之遲則恐成壞症。大抵痲症常以微汗為順。自始至末。必以得汗為妙。經曰微汗常出。熱〻越而不留。此之謂也若始終無汗痲難收斂。後必有餘症宜用寒涼升發解毒為當。

瀉黄散

防風（四錢）　枝仁（炒黑一錢）　藿香葉（七分）　石膏（五錢）　甘草二錢為末白湯下或用蜜同酒拌炒仍用白湯下

加味三拗湯

麻黄（不去節三錢）　杏仁（不去皮尖油二十粒）　生甘艸　荊芥穗

吉梗　水煎服

静遠主人化班湯

石膏　知母　元参　麥冬　牛蒡子　連喬　黄芩

地骨皮　淡竹葉　水煎服

秘本黄連湯

---

黄連　黄柏　黄芩　麥冬　生地黄　當歸　生黄芪

水煎加入燒蒲扇灰調服

當歸六黄湯　治自汗盗汗

當歸　生地黄　熟地黄　黄芪（蜜炒各一錢）　黄芩　黄連

黄柏（各五分）　水煎服

温粉撲法

黄連　牡蠣粉　貝母（各五錢）　粳米粉（一升）　為末撲身上

玉屏風散

黄芪（炙炒一兩）　大當歸（六錢）　陳粇米（一合炒黄色）　水煎服

玉屏散　治自汗不止氣虚表弱

黄芪（蜜炒）　防風（各一兩）　白朮（土炒五錢）　生薑紅棗引水煎服

人參養榮湯　治脾肺氣虚榮血不足驚悸健忘寢汗發熱食少無味身倦肌瘦

人參　白朮（土炒）　黄芪（蜜炒）　炙甘草　陳皮　全當歸

桂心（各一錢）　熟地黄　五味子（蜜炒）　白茯苓（各七分）

白芍藥（酒炒八分）　遠志肉（去骨甘草水煮五分）　生薑紅棗引水煎服

人參白虎湯見六十四條

黄連解毒湯見五十五條

## 衄血諸失血第五十八

毒邪併迫血離經。衄流於鼻。不須驚。當知熱毒從茲解。血去榮中毒少輕。

吐血便血與溺血。當分熱甚和血甚。熱入血室勞動火。總而名為失血症。

鼻之衄血。因內熱熾甚。恥火沸騰。血隨火載。自肺胃上行而溢於鼻也。麻疹本乎肺胃。故初起及未出之先。而衄血者。是爲順候。亦發散之義也。蓋麻毒從衄而解。而榮中之毒則輕少矣。不必遽止。熱得開洩。不藥而衄自已。非錯經妄行之比但不宜久耳。如衄血過多。此爲火迫經曰奪血者亡。急須止之。如衄之不已。或有失血者。俱宜清肺瀉火。佐以涼血之藥治之。以犀角地黃湯。去白芍加荊芥穗、枯黃芩主之。凡初熱見形衄血者。乃心火上沖。煩悶其症。不妨用生地黃枝子湯加枯黃芩以散心火之鬱熱。而清肺已出而衄血者。以加減犀角地黃茅花湯去甘草治之。已出大便下血。或小便溺血者。或吐血衄血。或二便閉澁。熱渴赤痛。以犀角解毒湯。去赤芍治之。如衄血不已。急須止之。以茅根湯加黃連。或元參地黃湯去升麻白芍甘草加茅根黃連。或茅花湯去甘草加黃連等方主之。已收之後。或出鼻血。或失血者。俱宜以加減犀角地黃茅花湯。去甘草治之。（有用四物湯加茅根治之者）凡麻症血熱及勞動火熱入血室。吐血衄血發狂發黃者。俱宜用犀角地黃湯去白芍加桃仁治之。若正收及收後仍衄不止者。以四物湯（見二十五條）加茅根麥冬以滋潤之。然麻症衄血。或便血溺血俱稱失血之候。須當分熱甚血甚施治。熱甚者以黃連解毒湯（見三十五條）主之。血甚者以犀角地黃湯去白芍主之。

犀角地黃湯　治傷溫病一應發汗而不得汗內蓄血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便出血面黃或中脘作痛

犀角　生地黃（另酒浸）　牡丹皮　白芍　各等分水煎服

喜妄如狂加大黃黃芩　吐血衄血者加扁柏藕汁童便

脈大來遲腹不滿而自言滿者加當歸肉桂

生地枝子湯　治心火上沖衄血

生地黃　枝仁　葛根　薄荷葉　燈心引

加減犀角地黃茅花湯

犀角（磨汁）　生地黃　茅花　丹皮　只殼　黃芩　枝仁

連翹　黃連　麥冬　當歸尾　甘草　灯心三十根引

犀角解毒湯

犀角　黃連　黃柏　黃芩　枝仁　生地黃　牡丹皮

赤芍　水煎服

茅根湯

茅根　當归　生地黃　山梔仁　枯黃芩

水煎加百草霜入藥中服

元參地黃湯　止癍疹衄

元參　生地黃　丹皮　枝仁　升麻　中甘草（各一錢五分）

白芍一錢　水煎

按此方宜均勿用升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明胃經即可用升麻也

茅花湯　治衄血

靜茅花　當歸頭　牡丹皮　生地黃　甘草　水煎服

附方

茅花湯

茅花　鬱金　生地黃　黃芩　水煎入百草霜調服

元參解毒湯　治衄血失血

元參　黃芩　枝仁（炒）　生地黃　粉葛　荊芥穗

吉梗　甘草　水煎加茅根汁京墨汁對服

犀角地黃湯　治失血衄血便血尿血

犀角　升麻　生地黃　木通　吉梗　京芍　甘草

水煎服

嘔吐第五十九

毒火鬱遏胃氣傷　初熱嘔吐原無妨。欲吐不吐乾霍亂。二者一見最猶當

痲症初起嘔吐。亦屬常候而吐瀉交作者順。乾霍亂者逆。欲吐不吐者危。夫痲症之有嘔吐者。皆因胃間火毒不能發洩而鬱於內。致傷胃氣而作也。初熱而得嘔吐之症。此毒未發出。藥宜疏托以葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草。或葛根疏邪湯（見三十二條）主之。正出及正收時。而見嘔吐之症者。是毒未盡藥宜清涼解毒。少加疏散可也。以消毒飲（見二十二條）去甘草加只殼黃連治之。多痰者加括蔞霜貝母治之。收後而仍有嘔吐者。乃是餘毒留於胃脘所致脾胃虛而熱滯也。宜用清涼脾胃之藥。佐以分利之劑。用石斛清胃散去赤芍甘草主之取此方中之陳皮扁豆藿香以止嘔吐若嘔一止。而陳皮藿香葉扁豆又宜除之。不可過用恐致燥害。此症若不間以金石之品。全用輕浮之藥其嘔難定。如嘔吐不止者以竹茹湯主之如熱毒嘔吐者。以解毒湯（見二十六條）去吉更加竹茹枇杷葉主之

石斛清胃散　治痲後嘔吐胃虛不食熱滯

石斛　茯苓　只殼　丹皮　扁豆　藿香　陳皮

赤芍（各一錢）　甘草五分　生姜引

### 竹茹湯

竹茹　陳皮　柿蒂　查肉　水煎服

### 吐痰麻後有痰胸口痰甚第六十

吐痰之症有多般。都緣肺胃火邪干。俱宜清肺消痰火。治者須作一例看。

吐痰之症有二。有吐出而白者。有吐出而成塊者。皆肺胃之火欠清而作也。俱宜清肺消痰除火為急。以杏仁清肺湯（見五十六條）去甘艸吉梗加黃芩。或以清肺飲（見五十六條）去五味子白吉梗甘草加麥冬黃芩知母石膏治之。但清痰切勿用半夏南星等燥藥。惟宜用天花粉貝母陳皮之類。清肺降火宜用

天門冬麥冬杏仁桑白皮黃芩黃連之類。切勿用吉梗中州之品。如麻後有痰而不吐痰者。宜用加味二陳湯去半夏甘艸加貝母括蔞霜主之。如麻後胸口痰甚者用經驗數方或數或指治之

### 加味二陳湯

陳皮　半夏　白茯苓　防風　天麻　連翹　甘草

水煎服

### 經驗數方　治胸口痰甚

吳茱萸（一兩炒）　葱白　餘

為末以生姜自然汁和葱白搗和作餅蒸温敷胸上立效

### 吐蚘虫第六十一

吐蚘之症是何因。胃虛無穀虫上行。急宜施治免胃爛。調養脾胃症自平。

麻前吐蚘乃胃熱不進穀食所致。治法宜清肺解散。以秋本門冬清肺湯（見五十條）去甘草吉更主之。若將出正出之際而吐蚘者。是因胃間有熱膈上有痰。虫不能安故也。患者能食則已。不必用藥。若欲用藥。則以殺虫丹與之。在初熱未見麻時而吐蚘者。與吐蚘過多而不能食者。皆為胃氣虛敗。必不能治。然吐蚘之症。多見於正收及收後之時。亦因胃火熾甚。多致少食。虫無所養。故望上而出。或三四條。或五六條。或十餘

條而止。不宜過多。多則有害。治當安胃為急。久則胃爛難救矣。以七味白朮散。加烏梅再斟酌加減而治之。虫得酸則安矣。如麻後熱退。能食而吐蚘者。宜調養脾胃。庶無他變。以安蚘散除胡粉白礬。七味白朮散加烏梅等方治之。若麻後吐蚘不食而兼自汗者。真是胃虛最為難治。以七味白朮散加烏梅牡礪粉斂石斛治之。如係脾熱。則以瀉黃散（見五十七條）加烏梅牡礪粉斂石斛治之。

### 殺虫丹

生葱（一把）　炒吃虫即化為水

### 七味白朮散　治胃虛津氣不行而渴

第一〇〇八冊　續修四庫全書第 24 版反內

人參　白朮炒　白茯苓　炙甘草　合香葉　干葛根炒

木香　水煎服

**安蚘散**　治吐蚘色赤成團而活屬熱者

烏梅肉三錢　黃連　蜀椒　藿香　檳榔各一錢　胡粉

白礬各五分　為末每用三錢水煎如糊空心服

## 吐沫（唾沫也）口中流涎不止第六十二

清涕之中見白沫。實為胃火旺所致。治宜清胃並降火。莫以白沫作寒治。

吐出涕中有白沫。流涎不止均非虛。都因胃中邪火旺。急宜清胃免傾危

吐沫者。吐出清涕之中而有白珠是也。乃是胃火旺甚所致。治宜清胃降火為急。宜以加味清胃散。加連翹牛蒡子主之。其不去升麻者。蓋欲用之以開提胃熱故也。然亦須斟酌而用。如麻後有口中流涎不止者。亦是胃火旺甚所致也。宜以河間涼膈散（方見二十六條）治之。但方中有大黃芒硝。須要察人之虛實強弱大小及大便之堅溏而施。不可槩用以誅伐無過

**加味清胃散**　治胃中蘊熱中脘作痛。々後火氣發泄。必作寒熱乃止。及齒齦腫痛出血疼引頭腦

生地黃四錢　川升麻一錢五分　牡丹皮五錢　當歸尾（酒洗二錢）

川黃連（酒蒸三錢）　防風　荊芥　石膏　水煎服

## 泄瀉第六十三

麻初泄瀉最為宜。瀉而日久須治之。熱寒食冷便膿血。數般當分新與遲

麻症泄瀉。慎勿遽止。蓋麻有瀉而胃與大腸之邪熱得解。是亦表裏分消之義也。初熱作瀉者。用猪苓湯去阿膠甘草。加葛根連翹牛蒡子主之。（有用香蘇散者。然終不若分利之為當也。香蘇散方仍列）若麻見二三日泄瀉者。以透斑和中湯。去升麻川芎柴胡吉梗半夏陳皮甘草生薑。加連翹牛蒡子地骨皮主之。若身熱煩渴泄瀉者。用三苓散。（見三十七條）加地骨皮黃連黃芩麥冬主之。夏月用辰砂益元散。去甘草治之。如麻後泄瀉者。以薏苡仁散去

香附甘草主之。麻後泄瀉及便膿血者。皆由熱邪內陷故也。大忌止泄。惟宜用升散之藥。以黃連葛根湯。加扁豆滑石白芍藥數劑與服而自愈。然麻症泄瀉。須分新久寒熱傷食傷冷。大般若初熱瀉者。用三苓散加木通以重瀉心經之熱。寒瀉則十中無一。或有傷食傷冷而作寒瀉。四肢冰冷肚腹不熱。口不作渴。小便不赤者。不得已而用理中湯一劑止之。久瀉不止者。以六君子湯加肉豆蔻。或香寇丸止之。如再不止。用醒脾散與服。或以五棓子罌粟殼燒灰。用米飲調下濇之。凡後數方。蓋亦萬不得已從權而用。切不可目為定規而濫用也

猪苓湯

猪苓　澤瀉　赤苓　滑石　阿膠　甘草　水煎服

香蘇散

蘇葉　陳皮　白芷　川芎　香附米　甘草

生姜葱白引

透斑和中湯

葛根　猪苓　澤瀉　茯苓　川芎　升麻（各七分）　前胡

吉梗（錢一）　柴胡（五分）　陳皮　半夏（各七分）　甘草（三分）

生姜三片引水煎分作數次服

辰砂益元散　治暑月小便不利

辰砂（一錢）　桂府滑石（水飛過六兩）　甘草（四錢）　炙甘草（六錢）

為細末清水調下二三錢老人虛人及病後傷津而小便不利者不宜用

又治暑月發驚多汗小便澁痛兼瀉心火

前方加薄荷葉少許以清肺熱名雞蘇散

加青黛少許以散肝火名碧玉散

加石膏少許以除胃熱名白玉散治同本方

加紅麹五錢以治赤痢名清六丸

加吳茱萸一兩以治濕熱吞酸（一書治白痢）名茱萸六一散

加乾姜五錢以治白痢（一書消飲食）名温六丸

加生栢葉生車前生藕節以治血淋名三生益元散

加牛黃治虛煩不得眠名至寶益元散

加葱白五根香豉四合名葱豉益元散以水煎服則兼散表邪

薏苡仁散

薏苡仁　淮山藥　白茯苓　穀麥芽　白藊荳　香附米

山查肉　甘艸　水煎服

黃連葛根湯

黃連（酒炒）　葛根　升麻　甘草　水煎服

理中湯

人参　白术　乾姜　甘草　水煎服

一書加肉豆蔻　一書加肉荳蔻去人參

六君子湯

人参　白术　白茯苓　炙甘草　陳皮　半夏

紅棗姜引

香蔻丸

黃連（炒）　肉荳蔻（麵包煨）　訶子肉（麵包煨去壳）　木香　砂仁

白茯苓　為末飯丸蘇子大米飲下十五丸

醒脾散

北全蝎（五隻糯米拌炒）　白附子（烏豆水浸蒸）　人参　木香　白茯苓

天麻（姜汁蒸）　石菖蒲（去尾姜汁蒸）　炙甘草　為末水調服

## 糞溏水瀉第六十四

糞溏之症不須除。麻得斯候毒得舒。始終糞如黃褐色。雖有變症保無虞。

糞出有沫名水泄。初潮正出見為吉。久瀉氣陷恐成痢。溺赤燥渴脾胃熱。

麻症溏糞理勢必然。此肺胃之火所作而致。不必施治。何則火勢極則大便閉結。麻本火候。倘再便閉。則火毒內作極矣。

麻出必險。是以糞溏為正候。初出與出時見此症。其麻縱險可救。正收與收後而糞溏色如黃褐者。雖有變症可保無虞。若水瀉之症。糞色必黃而有沫。小便赤。口乾唇燥。皆由脾胃有熱所致。然麻症泄瀉。熱邪得以開洩。是為順候。初熱未出之間水瀉者。以三苓散（見三十七條）加葛根、連翹、木通、滑石主之。正出之時水瀉者。亦以三苓散（見三十七條）加連翹、麥冬。潮熱甚者。更加黃連、黃芩主之（古人有用人參白虎湯去知母加麥冬治之者實為不妥方仍收列）。夫麻泄瀉。毒火因瀉而解。雖曰美候。然不可令其久瀉。倘或久瀉不止。則正氣必衰。脾氣下陷。凡有未發熱之前水瀉至正出之際而不止。其為日已久。則麻毒難以發越。後則留毒為害不小。宜以加味三苓散主之。倘執泥毒邪得瀉而解之說。縱其久瀉而不為之早治。恐至麻收靨之後。變成痢症。或下紫紅血等症。治療維艱。正收及收後而水瀉者。毒邪雖得瀉而盡。然止宜瀉三五次。不可過多。若自首至尾水瀉不止者。宜用清涼利水之藥。而佐以升提。古有用三苓散（見三十七條）加香白芷、淅麥冬治之者。須當審理察宜。隨機加減而施。正收及收後水瀉過甚者。須以理脾胃為主。宜以只實理中湯隨意消息加減而治。若不急治。多成腫脹、便血、痢疾等候。至若麻後瀉利不止。口渴目閉。四肢不溫。與嘔吐不食。洞泄不知者。皆為不治之症。

**加味三苓散**　治症麻瀉甚小便紅黃

豬苓　木通　赤苓　車前子（炒各七分）　澤瀉（六分）　黃芩（酒炒）

牛蒡子（各五分）　黃連（酒炒二分）　燈心五十寸引水煎食前服

**人參白虎湯**　治熱病舌乾大渴發熱背寒

人參　炙甘草（各一錢）　生石膏（一錢一書用五錢）　知母（三錢）

粳米（半合）　水煎分作三次溫服一日飲盡

**枳實理中湯**　治胃挾食及結胸本虛不能受攻者

乾姜（炒黑五分至一錢）　人參（一錢至三錢）　白朮（炒焦一錢至二錢）　只實

茯苓（各一錢）　炙（一五分至一錢）　水煎服

## 瀉清第六十五

麻症泄瀉本常候、當分屬熱與屬寒、瀉下清稀白沫者莫作熱候一般看、

麻症泄瀉。本屬常候。屬熱者多。屬寒者少。然亦有瀉下清稀白沫者其症喜溫腹疼喜按此屬寒瀉直以胃苓湯。去蒼朮少用白朮肉桂、加煨姜治之、不可一例而治也。

胃苓湯　治飲食停積浮腫泄瀉脉症俱實者

蒼朮（米泔水浸去皮以芝蔴同炒黃色四兩）　川厚朴（去皮姜汁炒）　廣陳皮（去白）

炙甘草（各三兩）　生白朮　白茯苓　堅猪苓（各二錢）　澤瀉（三錢）

肉桂燵　水煎服

平胃本平胃氣之墩阜、若因脾土之虛不能消運。又須稍藉參苓、如養胃湯之類、然復有土衰不能分利而成腫脹。且氣壅不勝參朮、難合理中者、乃合五苓以健運水土與正氣之假、蘇養以散外邪而不移易之定例也。

## 瀉而腹痛脹滿第六十六

瀉下腹疼與脹滿噯氣臓息如敗卵。飲食不節腹中停。寬腸化食自安妥

瀉而窘迫。腹痛脹滿。或有噯氣如敗卵者。此乃飲食不節停滯腹中宜用只壳湯（見四十九條）去炙甘草加山查肉麥芽木通以治之

## 咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第六十七

咳衄吐瀉麻之宜、熱毒由斯消滅時、治法解毒同一例、用方首尾不共施

麻疹初出。必要咳嗽使腠理疏通。鼻衄則熱毒得以隨衄而解泄瀉則上下熱毒得出、嘔吐均屬美候、亦肺胃二經熱毒所致、且麻出自肺胃、其理只以解熱毒為主六一散至寶丹、或四物湯（見二十五條）加黃連黃芩、仍憑擇用若麻出之後而見咳嗽鼻衄吐瀉等候、則又不宜用上三方俱宜以三味消毒飲（見三十三條）主之可也

六一散　治表裏、三焦之熱解肌清燥

滑石（六兩） 甘草（一兩） 為末灯芯湯或姜湯下

前方滑石等分四兩甘草等分一兩名曰天水散治痘乾燥而痛用冷水調塗並白湯調服

至寶丹（又名祛風至寶丹）

防風 荊芥 連翹 麻黃 卜荷葉 川芎 當歸

白芍（炒） 枝仁（炒黑） 大黃（酒蒸） 芒硝（各五錢） 枯黃芩 石膏

吉梗（各一錢） 甘草（二兩） 滑石（三兩） 人參 熟地 川黃柏

黃連 羌活 獨活 天麻 細辛 全蝎 白朮（五錢）

為末蜜丸彈子大不拘茶酒任下一丸

前方即防風通聖散此處加人參補氣熟地益血黃柏黃連除熱羌活獨活天麻細辛全蝎祛風

自利去硝黃 自汗去麻黃加桂枝 涎嗽加姜製半夏

## 大便秘第六十八

火壅血燥津液竭大便因之而閉澀無分先後急通潤稽延日久變紫黑

大便秘結者乃火壅血燥而耗精液故也麻之為候大便宜滑如黃褐色乃為正候若大便閉而不通大非所宜無論前後日期但大便閉者急當用通潤清涼之劑初時大便難通而堅結難出者宜微潤之不可通利以通幽湯去升麻甘草熟地黃加火麻仁只實黃連治之如麻未出之初有面色或青或紅或昏紫或煩悶而大便秘而不通者宜以大承氣湯去厚朴加連翹牛蒡子防風葛根荊芥穗下之使毒從大腸經而出然後再用宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉梗甘草以發出麻疹其症自痊若正收及收後大便不通者則宜用大通潤之劑以四順清涼飲治之甚則用河間涼膈散（見二十六條）以通利之若大便閉結發熱身痛者以大柴胡湯主之腹痛氣喘者以前胡只殼湯（見五十一條）去炙甘草加姜汁炒芥子治之凡麻見便閉之症急宜早治慎勿遲延日久則麻變焦紫枯黑而難救矣

通幽湯 升清陽降濁陰治噎塞便閉

油當歸（二錢五分） 升麻（醋浸三分） 桃仁（研如泥一錢） 紅花 生甘草

炙甘草（各五分） 熟地黃 生地黃（各一錢五分）

水煎以藥汁磨檳榔五分對藥稍熱服（加火麻仁大黃名當歸潤腸湯）

大承氣湯

大黃（酒洗四錢）　芒硝（三錢）　厚朴　只實（各八分）　水煎服

四順清涼飲（一名四順飲）

當歸　赤芍　大黃（酒蒸）　甘草（各等分）

水煎入生白蜜一二匙對藥熱服

大柴胡湯　治表症未除裏症又急汗下兼行用之

柴胡（一錢）　黃芩　芍藥（各三分）　只實（三分）　半夏（五分）　大黃（二分）

薑棗引

---

## 小便赤澀第六十九

膀胱餘熱小便澀火毒如何消散得。無分初潮與收後。三苓導赤為定格。

小便赤澀此裏熱甚之症也。在初熱正出之時見之。乃熱邪澀滲是為正候。麻出現時小便赤澀或淋者。以三苓散（見三十七條）加燈芯石膏葶藶射干治之。若熱甚小便赤澀譫語驚悸者以導赤散（見二十六條）去甘草。合三苓散（見三十七條）加辰砂主之。夏月以辰砂益元散（見六十三條）去甘草加石膏主之。若小便不利而嘔吐者。以三苓散（見三十七條）加藿香竹茹枇杷葉治之。一二日不通者。以加味導赤散（見四十九條）主之。若於正收及收後而見小便不通者。是內有熱毒。不得消散而餘熱下匯膀胱。用導赤散（見二十六條）加麥冬。或用加味導赤散。（見四十九條）以滋氣化導利而小便仍不通者。必因大便秘鬱之故。速宜通利大便以通幽湯（見六十八條）去升麻熟地甘草加只殼丑牛合導赤散（見二十六條）治之。大便一通而小便自利矣。

大小便不通第七十

麻疹二便閉不通。邪火熾甚在裏中。通關涼膈利臟腑。曾取一服見奇功。

麻疹自出至收。總宜大小便滑利。二便俱不宜閉。閉即急宜通利。若麻疹有大小便俱不通者。是火邪内熾之極。宜以河間涼膈散。（見二十六條）去甘艸加牛蒡車前木通治之。甚則以通關散去甘艸人參八正散去甘草治之。

通關散　通心經利小便良方

枝仁炒　大黄（酒蒸一錢五）　木通　赤茯苓　車前子炒

瞿麥　滑石　扁蓄炒　人參　甘草（各五五分）

燈芯十根引

八正散　治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿

木通　瞿麥　車前子　枝仁　大黄　滑石　扁蓄

甘艸　燈芯引

木通瞿麥燈芯。入小腸而降心火車前入膀胱而瀉肝火枝仁瀉三焦之鬱火。大黄滑石。乃瀉火利水之捷藥。扁蓄利水止痛甘艸梢入莖止痛。雖治下焦。而不專治下焦。必三焦通利。水方能下行也。　一書加木香

吐利並作下滞裏急後重脱肛第七十一

發熱之時吐利并。任他吐利不須驚。胞胎蓄毒從斯解。腸胃停污自此清。

發熱蒸蒸吐利并。或時滞下作腸鳴。火邪内迫宜清解。法向時行麻症尋。

自利甚時多變更。裏急後重症隨生。須為通利洩其毒。若犯澀劑病更增。

麻症脱肛何所因。火邪内迫後重成。升提清熱是神手。若作氣虚定傷人。

久瀉脱肛氣血虚。治法不可一例拘。養血升提成妙用。破滞用

下更增危。

麻本胎毒。發熱之時吐利並作毒火因之而解。此為美候如吐利並作。或時下滞或作腸鳴亦是火邪内迫而然。純是熱候不可作寒而治。治法總宜清解依麻科憑症施治。庶保無虞。如上焦火甚者則吐。下焦火甚者則瀉。中焦火甚者則吐瀉並作自利甚者。則必見裏急後重。而為滞下矣如見裏急後重之症。則病者不耐猛力下氣催便而脱肛之症又勢所必致也如麻發熱之時吐多者。以竹茹石膏湯。去半夏加柿蒂主之。自利甚者以秘木猪苓湯。去升麻甘草分利之發熱時吐利並作者。以三苓散（見三十七條）加竹茹柿蒂滑石主之。下

滯以加味黃芩湯去白芍藥甘草加只實連翹牛蒡子青皮以治之。麻收後熱毒未曾解盡。有下積滯者。當以連石茱萸丸去升麻乾葛甘草白芍藥。加只殼山查肉麥芽青皮治之。但方中茱萸。若非陰寒膈寒。而挾有熱者亦須除去。忌投下積滯之症。非僅麻收後有之。即將出正出之時。亦常有見者。愚謂不拘先後。但麻見有下積者。則當以清熱導滯湯（見七十二條）去白芍藥厚朴甘草當歸淡竹葉。加山查肉麥芽治之。更為妥當。若利甚。而變為裏急後重者。以黃連解毒湯（見三十五條）加連翹牛蒡子青皮治之。若小便短少者。更加木通滑石治之。如裏急甚者。則當加半生半炒黑白丑牛以利之。或以銅

壁山人黃芩湯去人參赤芍甘草加連翹牛蒡子丑牛以利之。或以加味黃芩湯去白芍甘草。加只實木通連翹牛蒡子丑牛以利之。若夫脫肛之症。多見於將收已收之後。而治法有不可一例者。若因毒火內迫。大腸枯濇。肺金受傷。不能傳送。致成裏急後重之症。而病者難忍。無耐下力送。氣催便以冀稍鬆。致肛脫出。不可認作氣虛拖治。治法總宜清熱解毒導利行滯。瀉火清金兼用升提之品。以加味導赤散去薄荷淡竹葉加當歸尾潤腸胃。破惡血而養心血。牛蒡子以消毒枯黃芩瀉肺火以涼肺血。只殼以破氣滯。滑石各八分通利六腑九竅以蕩熱散濕。丑牛四五分。以除壅滯。丹皮四五分以開陷伏之邪。使之外散。升麻五六分以升散大腸胃胆三焦之火熱。如兼有潮熱者加鮮地骨皮二三錢治之。若因久瀉而脫肛者。亦以加味導赤散去卜荷竹葉。加當歸身錢許川芎錢許升麻六七分。以養血理氣。升散大腸胃胆三焦之火熱。而只殼丑牛。又不宜驟用矣。

### 竹茹石膏湯

竹茹　石膏　黃芩　陳皮　半夏　水煎服

### 秋本猪苓湯　治瀉

猪苓　澤瀉　滑石　赤茯苓　黃連　升麻　甘草

燈心引水煎服　并治病人用力催便脫肛

### 加味黃芩湯

黃連　黃芩（各一錢五分）　滑石　白芍（各三錢）　甘草七分

水煎服　血痢加地榆皮二錢

### 連石茱萸丸

黃連（酒炒）　滑石（水飛過各一兩）　黃芩　干葛　白芍（各八分）

茱萸一兩　升麻七分　甘草四分

為末以山藥研粉作糊合丸梧子大食遠用白湯送下三五錢

### 銅壁山人黃芩湯　治裏急後重

黃芩　黃連　生地黃　木通　只殼　當歸尾　赤芍藥

人參　甘草　三劑水煎服　初劑加大黃微利之

加味導赤散

生地黃（酒洗一錢五分）　川木通　川元參（各五分）　連翹（六分）

川黃連（八分）　卜荷葉（四分）　淡竹葉（七分）　燈心引水煎服

## 痢症第七二

熱邪內陷因成痢。憑症施劑莫雷同。用心調理起沉痾。勿輕劫濇圖霸功。

麻之成痢。乃熱邪內陷所致。多見於正收及收後。間有見於初熱未出及正出之時者。亦有自首至尾而作痢不輟者。又有因久瀉而成痢者。當分別治療。不可混施。若於初熱未出與正出之時而作痢者。秉宜以疎托爲君。行滯氣爲臣。爲佐解毒爲使。以葛根解肌湯（見第五條）少用葛根。去赤芍蟬蛻木通甘草。暑加青皮檳榔。再加防風主之。若麻已出透。身熱未全退。毒氣流注而成痢者。以清熱導滯湯去白芍查肉甘草川厚樸加生地黃地骨皮木通主之若麻毒未清變成赤白痢者。以加減黃芩湯去白芍查肉甘草加地榆皮連翹牛蒡子主之。如麻後成痢赤白腹痛者。以古方黃芩湯加只殼治之。亦有久瀉而成痢者。原因氣血已虛。不得已用人參黃連枯黃芩乾姜煎湯從權治之。如正收及收後而下痢白色者。藥宜用解毒凉血行滯氣之品。以靜遠主人黃芩湯除去人參木香甘草加生地黃牛蒡子連翹防風主之。痢下膿血者。以白頭翁湯去黃柏加防風主之。或因食積下滯者。以消食化氣爲主。用只殼湯（見四十九條）去甘草加山查麥芽木通青皮主之若腹中作脹時痛時止者以厚樸湯去乾姜甘草加檳榔

山查主之。夫麻後成痢。乃積熱移於大腸。以治麻後痢統方加減主之。（有以三苓散（見三十七條）加木通枯黃芩治之者）麻後下痢而身熱腹痛者。以古方黃連解毒湯（見三十五條）治之。若壯盛之人。內有挾食積滯能食者。以三黃丸（見四十八條）利之。若麻後赤痢以四物湯（見二十五條）合古方黃連解毒湯（見三十五條）去枝仁用當歸尾加只殼治之。稍輕者以四物湯（見二十五條）加姜汁炒黃連榆皮治之。如麻後白痢以四物湯（見二十五條）加陳皮白苓木香。更有加生白术者。須宜酌用。麻後作痢。如兼小便赤濇者。以四物湯（見二十五條）加車前子木通治之。麻後痢症或赤或白者。以四物湯（見二十五條）倍白芍藥當歸加大黃少許。以利瀉數次。麻後泄瀉成

痢者以四物湯（見二十五條）加地骨皮酒炒黃芩主之若麻前曾經泄瀉日久未曾清解至於麻後变爲休息痢不問赤白但見裏急後重晝夜無停者此餘毒在大腸乃積熱移于大腸也急宜行氣養血切不可妄施澀劑以圖霸功河間曰養血而痢自止行氣則後重自除誠格言也宜以河間治久痢方去人參白芍藥主之（有用古方黃芩湯合天水與香連丸大見附三相間服者有用靜遠主人黃芩湯送下香薷丸體虛者香連丸內更加人參腸滑者香薷丸內加榆根白皮治之者實不若河間治久痢方之爲當也）如自首至尾下痢不輟者必有風毒留滯於內宜解毒行滯而兼疎風實脾之劑庶幾立應以清熱導滯湯去當歸淡竹葉加防風荊芥治之（有用四君子湯加山藥吳茱萸治之者侄而有理方并列後）若痢而兼嘔吐噤口不食更腸滑不止或下鮮血或下紫黯色或下如瘀膿或下如屋漏水或下如雞肝色如黑荳汁之類兼之氣喘煩渴熱甚發呃麻色紫晦者皆不治之症

清熱導滯湯（十六條用）

黃連（酒炒）　梹榔　黃芩（酒炒）　生白芍　只殼（麩炒）　厚樸（薑汁炒）

陳皮（各七分）　青皮　甘艸（各三分）　連翹　牛蒡子（炒研各八分）

查肉　當歸　淡竹葉（各二分）

燈心五十寸引水煎加犀角末三分調服

紅多者加紅花（二分）地榆皮桃仁（酒炒各八分）

秘澀甚者與裏急後重之極者加酒炒大黃（八分）

加減黃芩湯

黃芩　黃連　當歸　只殼　檳榔　青皮　澤瀉　山查

槐花　白芍　甘艸　燈心引

古方黃芩湯　治伏氣發溫小便膀胱三焦胆腑合病自痢

黃芩（一錢五分）　白芍（六分）　炙甘艸一錢　大棗二枚

加半夏（二錢）名黃芩加半夏湯生姜引

人參黃芩黃連乾姜湯　治胃虛客熱痞滿

人參　黃芩　黃連　炮乾姜（各二錢）　水煎溫服

靜遠主人黃芩湯

黃芩　黃連　當歸　只殼　梹榔　青皮　川芎　木香

人參　甘艸　水煎調六一散服

白頭翁湯　治熱痢下重

白頭　黃連　黃栢皮

各等分水煎溫服下愈再服

厚樸湯　治脾胃虛作脹腹中時痛時止

厚朴（薑汁炒）　陳皮（去白）　茯苓　乾姜　炙甘艸　水煎服

治麻後痢統方

黃連（酒炒）　黃芩（酒炒）　麥冬　防風　天花粉　元參　只殼

牛蒡子　木通　枝人　滑石　吉梗　京芍　勾藤勾

甘艸　二劑水煎服不愈加猪苓青皮

河間治久痢方

當歸　白茯苓　黄芩　車前子　陳皮　人参　白芍藥

甘草　炮乾姜少許爲引水煎服

四君子湯

人参　白术炒土　白茯苓　甘草　紅棗姜引

附治麻後痢丹方

西河柳　爲末以沙糖水調服四錢

附萬氏治麻後痢下鮮血驗方

當歸尾　生地黄　條子芩　黄連酒炒　只殻炒、烏梅肉

人参　白芍　生甘草　水煎服

## 下蚘虫第七十三

上膈胃火盛少食。蚘上不安往下行。此便不須用方藥。調其飲食症自平。

下蚘之症多見於麻收之後。乃上膈及胃火壯盛少食。虫不能上安。而往下行。虫往下行。亦順症也與過食傷脾虫不能容。而下不同。但調其飲食自愈。非若口中吐虫之比耳。不須施治。

---

# 麻科活人全書卷之四

安成（朴齋謝玉瓊昆秀輯　鼻山劉齊珍原刊）　白華彭　重鐫刊

## 眼光如水眼眶紅爛羞明赤腫眵（音鴟）淚生翳第七十四

眼光如水是何因、肝腎之熱極而熱。未發初熱必見此　如無斯候別病侵

目赤弦爛淚常淋非失撻風即媢嫉治若不早成痼疾急爲疎通奏奇勲

熱毒餘毒上攻目羞明怕日眵淚多暴赤腫閉目生翳眼眶皮爛宜清毒

眼光如水此肝腎兩經熱極所致乃麻之正候也未發熱與初熱之間有此症者方爲出麻之候如無此症即非麻候。如有麻毒入目生翳障者以蟬菊散主之。如熱毒上攻眼目生翳并暴赤羞明者用羌菊散主之、大便滑者去大黄少加生只殻微導之。如麻後餘毒不解上攻眼目羞明怕日、雲翳眵淚俱多紅赤腫閉。用羚羊角散去黄芪升麻加連翹牛蒡子黄連主之、如麻後眼目生翳。目赤紅腫、眼眶皮爛俱宜用朱純眼加減清毒撥翳湯主之、其有眼眶紅爛當多淚者、其症多因麻之正收時及麻收後不避風寒、爲風熱所侵、或被烟薰、皆能令目赤弦爛而常流淚者、即爲疎解息以柴胡飲子治之、若日久不治、則爲終身痼疾。

蟬菊散　治痘痳入目或病後生翳障

蟬蛻（去土　甘）　白菊花（去梗葉淨）

各等分為末水煎加蜜汁少許再煎食後溫服

羌菊散

羌活　白菊花　蟬蛻　防風　木賊　枝仁　穀精草

大黃　白蒺藜　黃連　沙苑蒺藜　甘草

為末清米水調下一錢

羚羊角散

羚羊角（鎊）　黃芩　草决明　車前子　防風　大黃

芒硝　黃芪　升麻　水煎稍熱服

朱純嘏加減清毒撥翳湯　此方最驗可隨症加減

生地黃（一錢五分）　甘菊花　黃芩（酒炒）　牛蒡子　連翹（各七分）

當歸尾　柴胡（各八分）　川芎（六分）　紅花　木賊（各五分）

草决明（炒研）　白蒺藜（炒去刺研各一錢）　甘草（去皮二分）

水煎服

柴胡飲子　治風熱眼眶赤爛

柴胡　羌活　防風　赤芍　桔梗　荊芥　生地黃（各一錢）

甘草（五分）　水煎熱服

---

## 眼閉第七十五

未曾睡着閉雙眸。脾經火旺欠清消。正收收後多見此。急宜利水清上焦

眼閉之症。非熟睡而兩目閉。謂未曾睡着而雙目自閉也。其症多見於正收及收後。蓋因脾經之火旺盛未消而然。治宜清上焦之熱。兼以利水為急。以瀉白散加木通薄荷葉玄參牛蒡子連翹荊芥治之。火退而目自開矣。

或問脾火旺。當用瀉黃散。而用瀉白散何也。曰土為金之母。實則瀉其子也。

瀉白散　治肺熱咳嗽手足心熱

桑白皮（蜜汁炙和）　地骨皮（去骨各一錢）　炙甘草（五分）

淡竹葉一把　粳米一百粒引水煎服

加陳皮桔梗亦名加味瀉白散有熱更加知母黃芩

或問地骨皮。乃三焦氣分藥。而瀉白散用之何義也。曰三焦屬腎。腎為肺之子。實則瀉其子也。或曰唯。

### 眼多眵淚第七十六

眼生眵淚本屬熱。脾肺二經火未息。無分初起與收後。清降肝脾火為患。

眼生眵淚者。脾肺火甚故也。見此症者。無分前後。即當清降脾之火。以瀉白散（見七十五條）除甘草。加龍胆草治之。

### 白珠紅赤第七十七

白珠絡屬手太陰。初熱紅赤是本經。正收收後仍赤紅。肺家風熱猶未清。

目之白珠屬肺。今痳之發正合本臟。故初發熱之時。未出痳之際。目即赤紅。此正候也。如出現後。及正收與收後。而白睛仍前赤紅者。此乃肺經風熱未盡所致。宜清肺瀉火為急。以瀉白散（見七十五條）加荊芥薄荷葉連翹元參牛蒡子治之。赤而腫痛者。風熱上壅也。以加味導赤散（見四十九條）加荊芥治之。

### 雀盲第七十八

痳發於心火烊烊。丙丁反悔壬癸鄉。以致痳後患雀盲。照月夜靈四六湯。

雀目者。每至日暮而眼不能見物是也。又名雞目矇。又名高風障。經曰。眼得血而能視。肝藏血。肝血有虧。被之火邪旺盛熱乾。壬癸津血虧耗。致病雀目。至日暮屬陰之時。而目不能視物矣。治法宜以四物湯（見二十五條）合六味地黃湯。加石決明夜明砂主之。或以照月飲。決明夜靈散治之亦可。

六味地黃湯

熟地黃（一錢）　石棗肉（去子五分）　淮山藥（炒五分）　白茯苓（六分五厘）

牡丹皮（去骨六分五厘）　澤瀉（六分五厘）　水煎空心服

照月飲　治雀目立效

真雄黃（研細末飛過）　用活雞剖開取熱肝擂極爛入雄黃末五厘溫酒調服

決明夜靈散　治男婦大小眼目至暮則昏夜間雖有燈光月亮不能視物

石決明（炒）　夜明砂（水淘淨）　二味各二兩

公猪肝一兩（用雄猪肝更妙母猪及瘟猪之肝切不可用）

方肝勿犯鐵器。以竹刀切肝作兩片。將藥末鋪於一片肝上。將第二片肝蓋合。以線扎緊。勿令藥末漏出。放入砂罐內以

淘米泔水一大碗煮肝。煮至米泔僅存小半碗時。將火熬乾
時。以藥肝與汁。一齊與服
前方石決明鎮腎益精以之為君
夜明砂升陽主夜以之為臣
米泔水主脾胃以之為佐
肝與肝合以類相從引入肝經以之為使

### 口氣臭第七十九

足陽明經有蘊熱。口中因之有穢息。倘或臭氣不可聞。雖是神仙醫不得。

口氣穢濁。乃熱邪蘊隆於胃。宜用清金降火之劑為急。以清胃散少用升麻。以開提胃氣。加連翹牛蒡子治之。如麻收之後有口臭口瘡唇爛兼之咽喉疼痛者。以生地敗毒散。除去赤芍桔梗甘草柴胡。加黃連治之。其有口臭不可聞者。此是胃爛必死之症。若其人原有口臭者。則不在此例。當詳問施治。

清胃散　症治。與六十二條。加清胃散同。

生地黃（四錢）　升麻（一錢五分）　丹皮（五錢）　當歸　黃連（酒蒸各三錢）
石膏引

生地敗毒散

生地黃（一錢五分）　丹皮　黃芩（酒炒）　柴胡（各七分）　牛蒡子（炒）
連翹　天花粉　元參　金銀花　桔梗（各八分）　薄荷葉
黃柏　赤芍（各五分）　生甘草（去皮三分）　熟石膏　淡竹葉（各錢）
燈心五十寸引水煎另以犀角磨汁對服

## 口瘡第八十條

心脾胃經毒未降熱壅上焦口生瘡滿口唇舌俱赤爛獨有牙齦不受傷。

口瘡之症滿口唇舌生瘡或黃或赤或白而爛獨牙齦無恙者是也。其症多見於正收及收後。乃心脾胃三經火甚。餘熱未盡。而毒壅上焦。下必大便燥結。小便赤濇。治宜清利心脾之火。兼潤大腸之劑。以導赤散（見二十條）去甘草。加豬苓澤泄以導脾胃之火。火麻仁杏仁。以潤大腸之燥。若得大便通利。小便頻行。其毒自退。外以綠袍散吹之。如乳下嬰兒。乳母有熱。亦當服藥使無熱。兒亦清安以釀乳方去甘草與乳母服之。若麻收之後。口瘡唇裂者。均宜以秘本洗心散。去麻黃或以河間涼膈散。（見二十六條）去芒硝甘草。俱加石膏牛蒡子下之。如係牙疳之症。則又從牙疳門施治。

綠袍散　治一切口瘡腐爛

荊芥穗　卜荷葉　青黛（各五錢）　元明粉　硼砂（各五錢）

百藥煎（二錢五分）　甘草（一錢五分）

為末點舌上令其自化或用新汲井水和蜜調點舌上亦可

釀乳方

木通　澤泄　豬苓　生地黃　赤茯苓　天花粉　連翹

黃芩　茵陳　甘草稍　燈心引水煎

右藥俱乳母食後。令把去宿乳服之。服後令乳母仰臥。使藥味傳貫於乳。再令乳母畧去乳汁少許。然後以乳乳兒。仍以此藥與兒同服。

秘本洗心散　專治口舌生瘡

當歸　生地黃　木通　黃連　大黃　卜荷葉　麻黃茸

各等分燈心引水煎服

## 舌生白珠第八十一

舌上纍纍生白珠。心脾鬱熱致夬危。急宜清心與降火。依法調治症自除。

舌者心之苗。而脾脈又絡於舌。心脾二經之熱。觸所感而發於舌。故舌生白珠。纍纍如粟。甚則上腭牙齦滿口遍生。其症多見於正收及收後。法當以秘氏洗心散。去甘草。加黃連。或加味導赤散。（見四十條）加麥冬治之。如大便不通者。以洗心湯去京芍甘草。合瀉心湯。加石膏牛蒡子。或以河間涼膈散。（見二十六條）去芒硝甘草。加黃連石青牛蒡子治之。外以桑白皮搗自然汁塗之。或用塗方塗之。或用綠袍散（見上）點之。如食乳

孩子以釀乳方（見八十條）去甘草與乳母服之

朱氏洗心散　治心經有熱。口舌生瘡。白珠等症。

生地黃　枯黃芩　麥冬　歸尾　知母　卜荷葉　甘草

鮮藕節　側柏葉引。甚者加黃連。水煎服

洗心湯　治心熱白珠滿口。二便不通。

防風　荊芥　黃芩　木通　大黃　連翹　生地黃

歸尾　京芍　甘草　燈心引水煎服

一書無京芍有黃連　有潮熱。加柴胡羌活

一書有潮熱。加黃連骨皮元參黃柏枝仁

瀉心湯

川黃連　為末臨臥蜜水調服。

塗方　治口瘡甚者

黃柏（去粗皮剉碎以蜜炙黃色）　青黛　各等分為末以蜜調塗患處

塗方

薄荷葉　黃柏　硼砂　氷片　黃連

為末以蜜調塗患處

---

牙疳第八十二

陽明胃火留為殃。毒上冲牙生疳瘡。比症非同口瘡比。頃刻能
令性命傷。

麻毒流連走馬疳。牙齦黑爛食難嘗。敗唇崩鼻牙齒落。漏頰穿
腮旦夕亡。

牙疳者。專於上下牙齦腐爛。其毒最重。其症最危。非若口瘡舌珠之比。此乃胃火留而不去。餘毒上冲所致。急宜清胃涼血。佐以潤大腸之劑。以秘本加味清胃散。加石膏荊芥火麻仁杏仁治之。大便閉者。以秘本洗心散（見八十條）去麻黃。加牛蒡子石膏微利之。（有用當歸散者。寔為無濟。方仍存之。）外以栗根白皮。煎湯漱洗。

以馬鳴散。文蛤散。救苦散。無比散。燒鹽散。等方。隨用以塗之。若痲一出即收。痲毒收入於裏。致生牙疳。大熱譫語不食等症。內宜用涼解之劑。以加減清胃湯。去陳皮桔梗甘草。加黃連葛根牛蒡子主之。外以熟附子切片。將水煮熟。敷患者兩手心。兩足心以拔之。如麻後牙疳腫痛者。以清胃散。（見七十九條）加荊芥元參牛蒡子主之。外以尿桶中白垢。火煆如鹽。加氷片研。和蜜調搽之。凡痲後牙齦黑爛。肉腐出血。呼吸氣息臭氣冲人者。名為走馬牙疳。急用尿白火煆。加氷片以蜜調頻塗。或用馬鳴散等方。或以龍硼散。黃龍散。雄黃散。神授丹等方吹之。又或以黃連硼砂各一錢。胆礬三分。氷片五釐。研末

搽之再加白鹽梅燒灰存性。人中白火煆同研。搽之更應內急以生犀地黄湯。加石膏治之。俟症平。以四物湯。（見二十五條）用生地黄。加木通枝仁生犀角山茵陳。以利小便。使熱血下行。而毒火不致上冲矣。若牙疳白色。為胃爛不治之症。有用栗樹根白皮煎水洗患處。而以五棓子雄黄百草霜枯明礬為末吹之者。間有取效。未必全驗也。若通齦白色。自外延入內者。無膿血者。牙齦爛而口臭者。喘促痰鳴者。面頰浮腫者。環口青黑者。頰漏腮穿者。喉穿齒落者。唇崩鼻壞者。皆不治之症也。

秘本加味清胃散　治痳疹口舌生瘡牙齦腐爛 [illegible]

生地黄　丹皮　當歸　黄連　犀角　連翹　升麻

甘草　水煎服

馬鳴散　治走馬牙疳良方

人中白（即尿桶中白垽。以竹刀括取。用新瓦盛。以火煆之。俟其色白如鹽。方可取用。五錢）　生五棓子（一錢）　明礬（研細二錢）

蠶退紙（又名馬鳴退燒灰二錢）

又五棓子（一個入明礬末於內。裝不盡。再用棓子一個裝盡。以火煆之。俟其礬枯為度取用）

同為細末。先用米泔水洗患處。然後以末搽之。

蚊蛤散

雄黄（五錢）　枯明礬（五分）　蠶退紙（燒灰一錢）　生五棓子（一錢）

又五棓子（一錢同明礬炒枯用）

為末。先將米泔水洗患處。然後以末搽上。一日數次。以愈為度。

救苦散　治口瘡牙疳

人中白（火煆五錢）　寒水石（飛過三錢）　青黛（五分）　姜蚕（炒）　黄柏

冰片（各一錢五分）　牛黄（二分）

為末。先以苦茶洗患處。然後以末搽上。三五次少愈。十次全愈。

無比散　治牙疳腐爛

黄牛糞（煆）　冰片（少許）　為細末吹患處

燒鹽散　治牙疳潰爛

取橡斗大者。實鹽滿殼。合起。將鐵絲扎定。燒化存性。以硯覆地上片時取起。加入麝香少許。研細塗之。

橡（音許。即栩也。詩陳風。宛丘之栩。柞櫟也。一名杼。三四月開黃花。八九月內結子。子為皁斗。子外有房。可染皂。又栩根析皆乾又性）

加減清胃湯　治痳後口瘡

元參　連翹　生地黄　黄柏　麥冬　木通　白茯苓

天花粉　陳皮　桔梗　甘草　燈芯（引）

龍硼散　治痳後口瘡

牡黄牛屎（火煆）　明礬（五分）　冰片（一分五厘）　朴硝（一錢）　硼砂（二錢）

為末以鵝翎管盛末吹患處

黄龍散

牡黄牛屎尖（煅）　冰片（一分）　為末以鵞管吹患處

雄黄散

雄黄（一錢）　黄柏（二錢）　麝香（一分）

為末先以艾葉煎湯洗患處然後以末搽之以愈為度

神授丹

枯明礬（七分）　麝香（一分）　白毡灰（二分）

為末以竹管盛吹患處

生犀地黄湯

連翹　葛根　元參　黄連　生地黄　荊芥穗　升麻

生犀角（另磨）　甘草

水煎入犀角汁二三十匙對服

---

狐惑第八十三

上唇生瘡虫食臓下唇生瘡虫食肛此名狐惑非佳候化䘌丸
兒是妙方

麻症唇口多瘡其聲嗄啞者。名曰狐惑其義云何。乃出自傷寒指掌之言謂上唇多瘡者。虫食其臓名曰狐。下唇多瘡者。虫食其肛名曰惑蓋取其進退猶豫之義也大非美候宜以秘本化䘌丸或古方化䘌丸酌量而治之。如更煩燥昏悶失聲者。死症也。

秘本化䘌丸

均子肉　蘆薈（煅）　龍胆草（酒洗各二）　五靈脂（一錢五分）　黄連（二錢）

川楝子（一錢五分）　烏梅

為末以烏梅去核搗爛合丸白水下

古方化䘌丸

黄連（五錢）　蜀椒（閉口者勿用去目炒二錢）　苦楝樹根白皮（四錢乾）

為末用烏梅肉七枚以艾湯浸。搗爛合丸艾湯下

## 咬牙第八十四

咬牙之症非痘比。痘有寒熱二症分。喜食熱物四肢冷。下血咽痛見閻君。

咬牙雖非痘症比。亦有寒熱二症分。未曾服藥從熱治。過用寒凉又宜温。

痳症之咬牙。非若痘比。痘症咬牙。有寒熱二症之分。而痳症咬牙。皆毒熱候。乃陽陷於陰。故多發渴而手足俱熱。喜飲食冷物。治宜滋陰降火。以麥冬湯去白芍加丹皮治之。若手足俱不熱。而反厥冷。喜食熱物。此為熱邪內亢。後必下血咽痛。痰鳴而死。即以白虎湯（見二十六條）治之。然多不可救。若飲食犯椒薑辛辣助熱等物。更非所宜。然痳後咬牙。亦有虛實。不可執泥無虛實之說。但不與痘症比耳。痳後咬牙。其先未曾服藥而咬牙者。乃實症也。解毒乃止。而三味消毒飲（見三十三條）之類。可以隨見加減而用。若已經服藥而咬牙者。恐服寒凉之藥過多。有傷氣血而然。宜以四物湯（見二十五條）加人參治之。

麥冬湯　治痳症便實而渴

生地黃　當歸身　麥冬　白芍藥　水煎服

## 舌胎第八十五

舌胎雖當分顏色。黃為胃火白肺熱。惟有黑胎莫相遇。痳症逢之心經絕。

舌者心之苗。心為君火。痳本火候。故舌有胎。胎有黃白黑三種。白胎為肺熱。黃胎為脾胃熱。均當清解疏利。更兼外症參詳而治。如宜毒發表湯（見第五條）去升麻桔梗甘草。葛根解肌湯（見第五條）去赤芍甘草。葛根疏邪湯（見三十三條）。防風敗毒散（見第五條）去桔梗甘草。蔡葛湯（見第六條）去柴胡赤芍甘草。俱可隨症加減而施。黑者則為心絕。黑而濕者。熱淫血分。黑而燥者。熱淫氣分。皆為危候。此症無分首尾。均宜清熱疏利一例而治。並宜用白虎解毒湯（見二十六條）。濕者多用生地黃。加元參。燥者倍用黃連。黃芩麥冬淡竹葉。加地骨皮木通。黑色漸退者吉。不退者不治。

### 唇燥第八十六

唇燥火熱在胃脾。紅赤熱重淡白微。若帶紫黑而燥者。苦寒之味正相宜。

唇燥。乃脾胃二經之熱。其症有三。一則唇淡白而燥枯者。其熱尚微。以白虎湯（見二十六條）去甘草秔米。加麥冬木通牛蒡子治之。一則唇赤而枯燥者。其熱極深。以白虎解毒湯（見二十六條）加元參牛蒡子連翹木通治之。一則唇帶紫黑而枯燥者其熱劇而重也。以白虎解毒湯（見二十六條）加犀角汁。元參牛蒡子木通車前子治之。惟宜隨症輕重。以清熱分利方稱良工。

### 唇舌破裂第八十七

少陰太陰火上冲。唇舌必然見赤紅。正收收後唇舌裂。心脾已絕醫難助。

唇舌破裂。此心脾之火甚上冲也。其色必深赤。間有紫黑者。若初發熱及正出之間。唇舌紅而破裂者。此症還輕。斯時其毒在未出將出之際。若得火輕血活。內能托出。口能食物。斯為可治。藥宜用寒涼。加以疎托之劑。以白虎解毒湯（見二十六條）加元參牛蒡子荊芥葛根薄荷葉治之。若正收與收後而唇舌破裂者。以白虎解毒湯（見二十六條）加黃柏元參山豆根木通治之。若唇舌破裂而紫黑枯燥。此心脾二經俱絕。兼之血不活者則難治矣。

咽喉痛第八十八

火邪拂鬱咽喉痛。射干鼠粘湯可用。吹喉惟有十宣散。莫犯金
針病增重。

毒火薰蒸氣上炎。咽喉自此正煩疼。從來痲症多咽痛。莫作尋
常喉痺看。

痲症屬火。咽喉疼痛。亦是常候。乃毒火拂鬱上薰。故咽痛也。切勿誤認作喉痺。而妄用金針去其血。初潮咽痛者。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻甘草桔梗。加射干山豆根主之。外以十宣散吹之。（有以甘桔湯加牛蒡連翹升痲治之者蓋不可用方竟）已出而咽痛者。以靜遠主人射干鼠粘子湯。去升麻桔梗甘草。或錢氏甘露飲。去熟地黃。酌用石斛茵陳加牛蒡子射干防風主之。痲痊有咽喉痛者。不拘初熱正出已收。俱以射干牛蒡子山豆根防風煎湯與服。外用十宣散吹之。或用二聖散吹之。如痲痊有結喉等候。以射干消毒飲（見五十三條）去甘草加防風主之。如痲毒上攻咽嗌腫痛熱渴。或腫毒不消等症。以加味骨皮清膈散（見五十條）去當歸芍桔梗甘草。紫菀。加石膏元參麥冬薄荷防風牛蒡子主之。（有以大如聖飲子治之者非惟不識避忌而實於病無濟才姑為收錄）如痲症血熱咽喉不利者。以加味消毒飲。去甘草。加射干生地黃。或以紫草消毒飲。去甘草加生地黃防風射干治之。如咽不利。而兼風熱咳嗽者。以射干消毒飲（見五十三條）去甘草加防風連

翹桑白皮貝母治之。如咽痛而痲不大起發者。以消毒飲（見二十三條）去甘草。加葛根前胡射干主之。如肺熱咽痛聲音不清者。以全書除熱清肺湯（見五十五條）去石膏。加射干牛蒡子黃連主之。（有以甘桔清金散治之者不可輕用方仍收）大凡痲症咽痛不堪者。照症用藥而外。不拘前後。外用十宣散。二聖散。上[illegible]起化[illegible]方。任憑選用吹之。

靜遠主人射干鼠粘子湯

射干　山豆根（各一錢五分）　牛蒡子　紫草　紫菀茸（各一錢）
蟬蛻　升麻（各六分）　木通　石膏　桔梗（各八分）　甘草（五分）
燈芯九根引水煎食後服

錢氏甘露飲　治心胃熱咽痛口舌生瘡症疹熱毒上攻牙齦腫。牙齒動搖

天冬　麥冬　生地黃　只壳（炒）　黃芩　金石斛（去苗）
熟地黃　茵陳　枇杷葉　甘草
水煎食後服　牙齒動搖者并以此漱口

加味消毒飲

牛蒡子（一錢五分）　荊芥（七分）　防風六分紫草茸一錢甘草五分
粇米一撮引水煎不拘時服

紫草消毒飲

紫草　連翹　牛蒡子各一錢荊芥七分山豆根　甘草（各五分）

水煎不時温服

十宣散

黃連　黃芩　黃柏（各一錢）　兒茶　雄黃　苦參（各五分）

硼砂（五分）　乳香（一分）　元明粉（三分）　氷片（少許臨用時下入藥內）

為末每用五釐以竹管吹入喉中

二聖散

苦參（三錢）　姜蚕（二錢）　為末。吹喉二三次。即痛止腫消。

玉鑰匙

飲硝（一兩五分）　硼砂（五錢）　姜蚕（二錢五分）　氷片（一字）

為末每用五分吹喉

化毒湯

薄荷葉　荊芥穗　雄黃　辰砂（各二錢）　朴硝（一錢）　牙硝

硼砂　甘草（各二錢）　桔梗（五錢）　山豆根（一錢五分）

爲細末。以竹管吹入咽中。或以水調服。

大如聖飲子

牛蒡子　桔梗　甘草（各錢）　麥冬（五錢）　水煎服

甘桔清金散

牛蒡子（一錢）　連翹　甘草（各五錢）　桔梗（一兩）　訶子皮（三錢）

為末。薄荷少許。煎湯下一錢。或加薄荷。水煎服亦可。如非声音不清者。則去訶子皮。

附治平常咽喉方備用

射干鼠粘子湯　治咽痛

牛蒡（四兩）　射干　升麻　甘草（各一兩）　水煎服

甘草防風湯

甘草（一錢）　防風（二錢）　桔梗（六錢）　水煎服

加味甘桔湯　治咽喉暫用

桔梗（八分）　甘草（一錢二分）　牛蒡子　射干（各六分）　防風

元參（各四分）　生姜一片引　熱甚者去防風加黃芩

五物湯　治咽痛

麻黃　杏仁　荊芥　桔梗　甘草　姜引水煎服

射干散　治咽喉腫

射干　元參（各錢）　牛蒡子（一錢）　升麻（八分）　桔梗　甘草（各一錢）

水煎服

海上方　治骨硬

金鳳花根　打碎。以米醋煎。用有嘴瓶盛之。令患者將口啣瓶嘴。仰面噙之。其骨即出。吞藥之時。勿令沾牙。

或用玉簪花根。威靈仙根。如前法治之亦可。

### 頭疼背强頭項腫遍身痛第八十九

寒熱頭疼兼背强。遍身痛楚苦難當。更有頭項俱腫者。都緣毒火未清降。

痲症本類傷寒。倘或不避風寒。未經清解。邪火内迫。毒攻於裏。症生多端。或有傷寒並作。頭疼背强。或頭面頸項浮腫。或脉强火盛。大熱作渴。或痲收之後。發熱而遍身疼痛。種種症候。在所不免。急宜清火解毒。如寒熱並作。頭疼背强者。當用表散。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻桔梗甘草。畧加白芷治之。（有加羌活者大非所宜）頭面頸項腫者。以宣毒發表湯。（見第五條）去升麻白桔梗甘草。加牛蒡主之。脉强火熾。熱盛作渴者。則以白虎解毒湯（見二十六條）主之。如痲出稠密。遍身疼痛煩躁者。以凉血飲子（見四十五條）去赤芍。加連翹牛蒡子主之。如痲收後。遍身疼痛者。以古方黃連解毒湯（見三十五條）加葛根前胡白芷防風治之。（有加升麻羌活者亦非所宜）

### 腹痛第九十

腹痛原因毒内攻。首尾治法不相同。清解通利消飲食。更分虛實莫朦朧。

腹痛之症不一。總由火毒内鬱而不能出。或為風寒壅滯遏抑。或因飲食停滯不化。而皆能致痛。若見於初熱正出之間。風寒壅遏。毒反内攻而腹痛者。急與踈表。痲出透而痛自止。以宣毒發表湯（見第五條）去升麻桔梗甘草淡竹葉。或葛根解肌湯。（見第五條）去赤芍甘草。加只殼。或葛根踈邪湯。（見三十三條）治之。若飲食過傷。腹滿脹痛者。以只實導滞化毒湯。去山查厚朴檳榔甘草治之。（有用平胃散加神麴山查麥芽只殼木通治之者治腹痛添設當而治麻腹痛亦非所宜方仍）

附收大便閉者。加丑牛。或大黃以利之。小便赤澁不通者。加猪苓澤瀉以導之。若於正歛及歛未盡之時而腹痛者。乃外邪未盡。而復入裏所致。宜兼清中外。法當踈托。佐以清解。使毒復出而痛自止。以清熱透肌湯（見二十五條）加只殼木通黃芩治之。如麻全歛之後而腹痛者。治宜清凉解毒。佐以風藥。兼分利餘熱。使毒内消而痛自愈。以化毒清表湯（見十六條）去知母花粉桔梗甘草。加只殼治之。又須驗其有無他症。分別屬虛屬實而治。若邪熱内結而腹痛者。以通利大便為主。以河間凉膈散（見二十六條）去甘草治之。如麻後脾氣不調而致腹痛。而了四肢浮腫者。以分利小便為主。以導赤散（見二十六條）治之。[illegible]

而小便不通者。以導赤散（見二十六條）加芍梔仁之。若痲症毒重腹痛。煩燥潮熱者。以連翹敗毒散。去赤芍甘草治之。倘腹痛不止。加黃連苓冬治之。若痲症首尾肚痛者。此皆由毒火內蘊而然。宜先發散。以防風敗毒散（見[illegible]條）去桔梗甘草治之。後以山查肉煎湯與服。至若元氣大虛。陰陽不能升降。小水不利。遍身浮腫喘促兼見者。則難治矣。

只實導滯化毒湯

只實　青皮　麥芽　木通　牛蒡子　連翹　赤苓

山查肉　檳榔　厚朴　甘草　燈心引水煎服

連翹敗毒散

連翹　防風　牛蒡子　荊芥　木通　赤芍　甘草

水煎服

平胃散　治胃中宿食不化。澀滯之人宜之。

蒼朮（米泔水浸去皮麻油拌炒黃色）四錢　厚朴（去皮薑汁炒）　陳皮（去白）

炙甘草（各二錢）　姜引水煎服

## 腰痛第九十一

痲疹腰痛症候惡。嬰兒罕有婦老多。男為腎敗女血耗。治法不同切莫錯。

痲疹之症。原係胎毒有感而發。而臟腑所蓄之毒。因之而洩。故諸經皆有見症。惟腎為清淨之府。不宜見症。腰者腎膀胱之絡繫焉。故凡痲症。多忌腰痛。如見腰痛。則為逆候。然腰痛之症。幼孩罕有。惟男婦多有腰痛者何則。蓋男人有五勞六慾之傷。腎多虛弱。痲乃火候。丙丁熬煎。壬癸必涸。痲收之後。陰血必虧。津精重耗。故多見斯症。乃為腎敗之候。最為難治。宜以四物湯。（見二十五條）合六味地黃湯。（見七十條）加枸杞杜仲

故紙之類主之。如尚有餘毒未盡者。更加牛蒡子連翹治之。如兼有潮熱者。加酒炒黃連黃芩鹽酒炒黃柏地骨皮等藥。治之。如初熱正出已出之時腰痛者。則於宣發清解藥中。多加生地黃當歸以滋養之。若婦人出痲之際。或值經來之期。或因熱重迫血妄行。天癸非期而來。血既下行。已經暴耗。兼之毒火熬煎。耗中加耗。人身之血。能有幾許。當此重耗。未有不生腰痛之疾者。凡有此候。急宜以四物湯。（見二十五條）多加元胡索主之。倘仍有餘毒未清者。或兼有潮者。則仍加炒黃連炒牛蒡連翹之類。以解其餘毒。清其餘熱。如見於初潮已出之間者。則亦於宣發清解藥中。多加生地黃元胡索當歸治

之總宜急為調治。免致奪血而亡之患。

## 氣痛第九十二

氣疼皆因風邪干內有餘熱與風搏。此症逢之休矣。治法當寒熱分兩般。

麻症氣痛。皆因內熱未泄。外為風寒所襲。風熱相搏。內外夾攻。致有此候。然有寒熱之分。寒者易治。熱者難為。治之者先

宜採其寒熱而施治。方無差謬。凡遇此候。先以冷飯炒熱。以絹包裹。乘熱而揩其胸。喜揩而痛稍減者。此寒多熱少。以香茱湯與之頓服。得吐則寒邪外泄而痛即止。不吐亦即痊愈。若揩之而更加痛者。此內熱已極。外感最深。熱毒與寒搏結胸中。吐之難。洩下之不利。溫之增劇。涼之弗息。延經一二日。肺胃腐敗而死。雖用清熱保肺清胃之劑。亦僅十全一二而已。

香茱湯　治寒痛絞腸痧等症

香附米　吳茱萸　五靈脂（俱用醋炒）　台烏藥（各三）

水煎濃汁頓服。中病即止。

---

頭溫足冷下體冷過膝。四肢身體冷如冰。第九十三

麻症屬陽身宜溫。身不溫煖有災迍。首尾不溫非美候。變症一見謁閻君。

頭溫腳冷症候逆。初出見之且莫急。正出正收腳仍冷。縱有神方也無益。

遍身發熱麻之常。若不發熱苦難當。收後下體冷過膝。此為腎敗治無方。

四肢身體冷如雪。初熱見之毒難出。正收收後逢斯症。脾胃敗壞死可決。

痘症頭溫足冷為順。如麻見頭溫足冷之症。則為逆候。然而

麻症有下身冷者。亦有順逆。但有先後之分耳。何則。麻之為症。上膈主之。必從頭上熱至腳。其初熱時。上身壯熱。下身及腳涼冷。必須壯熱至足。麻方得出。故初發熱之時。下身及腳涼冷。此為順候。若出後及正收之時。則上身下體俱以不冷為佳。此時下身冷者。則為逆候。至於麻收之後。則宜遍體溫涼如常。倘有麻收之後。雖遍身溫涼如常。獨下體厥冷過膝上止者。此為腎敗不治之症。若初出之時。腰以下不熱。毒不能透。而反漸收者。亦為逆候。急當溫養脾腎。或有得生者。溫脾如白芍藥炙甘草之類。果仁白朮等味。在所宜禁。養腎如熟地黃當歸之屬。杜仲枸杞等味。又在所必忌。只可用[illegible]

湯。（見三十二條）去麥冬玄參薄荷荊芥川芎。加炙甘草以補其脾。養其腎耳。夫麻乃肺胃火熱所發。本屬於陽。故四肢身體。常宜溫煖。若四肢身體。反冷如冰者。則是大逆症矣。若初出正出之時。四肢身體冷如冰者。則毒不得透。而麻必衝收。若正收及收後。肢體冷如冰者。此乃脾胃倒壞。氣血大虛。毒必不盡。定不治矣。

## 瘄疾第九十四

麻疹寒熱似瘧症。柴芩湯兒加減進。收後患瘧用鱉甲。神而明之醫中聖。

麻症初熱已出之時。有寒熱似瘧者。此時切不可專以瘧疾施治。宜以葛根疎邪湯。（見三十三條）加薄荷葉主之。至出盡之時。如有寒熱似瘧者。以柴芩湯。去人參半夏。加肉桂白朮。加貝母骨皮治之。如麻後竟成瘧疾者。治法以清涼健脾開胃為主。宜以靜遠主人鱉甲飲主之。渴者加熱石膏少許。不渴者方中之麥冬知母。須除去之。夫瘧多因脾虛生痰而作。若出麻之後。果是瘄疾。亦無餘毒。則柴芩湯中之人參半夏。又何妨施用。但肉桂白朮。不可輕使耳。又何必拘泥麻初當法。麻後餘邪等症之不宜用燥悍之藥耶。如小柴胡湯。（見二十二條）正所宜用。所謂神而明之。存乎其人者。此也。

柴芩湯

柴胡　半夏　人參　黃芩　甘草　豬苓　澤瀉　白苓

白朮　肉桂　姜棗引

靜遠主人鱉甲飲

九肋鱉甲飲（新瓦上焙以醋淬數次至黃色研為末再用醋拌炙干二錢）　山查肉（三錢）

麥冬　薏苡仁（炒各一錢）　白茯苓（二錢）　橘紅（去白五分）　知母（一錢二分）

干葛　白芍（各一錢五分）　柴胡（一錢）　貝母（錢五）　淡竹葉（一錢）

炙甘草（六分）　姜引水煎服

## 沉睡昏睡似寐非寐煩燥不眠第九十五

沉睡昏睡似寐同如有分別在其中。更有煩燥不眠者。臨症先識是良工。

沉睡者謂沉沉熟睡。精神意志皆自若是也。夫麻原屬火候火症得安靜沉睡。本為上吉。然當分首尾而治。蓋熱出現之時。其人精神困倦。沉睡少醒者。則為逆候。何則。蓋緣正氣虧損邪火內鬱。而未能發揚於外。乃正氣不勝所致。後必變大熱煩燥者有之。宜以養陰湯（見三十二條）去熟地黃川芎白芍。加生地黃主之。若正收及收後能食而安靜沉睡者蓋緣氣血俱虛火毒退去而得安寧。此為順候。治法當以補脾養血為要以四物湯。（見二十[illegible]條）加薏苡仁。白苓主之。又有一等。名曰昏睡。昏睡者。謂昏昏而睡。不知起止雖睡多久。醒來不知人事掐其夾車合谷二穴而不知痛者是也。又有一等似寐非寐者。此兩症無問正出收後。見之良非吉兆。多難治療當察其兼見何症而施治之。夫沉睡昏睡兩症雖相彷彿。而實不同昏沉二字醫家最當詳辨。庶幾臨症無訛。又有麻疹發熱作。麻不出。煩燥不眠者。法當解毒清涼。以白虎解毒湯。（見二十六條）加連翹牛蒡子。以清解之。熱除麻出而煩燥自寧。可以安寢矣。若收後煩擾而反不得寐者。是餘火復燃。急須滋陰養血以六味地黃湯（見七十八條）合四物湯。（見二十五條）加生棗仁二三錢

與服。而陽自斂而得寐矣。

## 中惡第九十六

麻疹收完幸平復。動止如常飲食足。心腹絞痛忽然亡。此是氣虛中惡毒。

麻疹收完之後。動止飲食如常。忽然心腹絞痛而死者。此是元氣虛弱。兼之乘以疫癘之氣。正不能勝邪。邪伏於中。外若無病。內已漸損。一中即死。謂之中惡。

## 發搐第九十七

痰熱聚於心胞絡。喉中哈哈發驚搐。未透之時反為吉。慎勿妄投金石藥。

痲毒流連為壯熱。煩燥不寧時搐掣。養血安神清心肝。神爽身涼生可決。

發熱無休神漸昏。忽然瘈瘲似堪驚。莫將風癎同調治。小便須多患安寧。

痲之發搐。不同常論。乃痰熱聚於心胞絡中所致。若見於發熱初出未透之時。俱為無害而反吉。治法宜以疏散之劑。少加清涼之藥治之。以清熱透肌湯（見二十五條）去生甘草、杏仁。加括蔞霜、淡竹葉治之。若收後而發搐者。則為難治。法當消痰清上焦之火。兼利小便。只宜用輕清之劑調之。不可誤用鎮驚金石之藥。以加味導赤散（見四十九條）去薄荷、石膏。加貝母、括蔞霜主之。如痰壅甚者。以括蔞仁一味煎湯與服。以湧吐之。如痲後渾身壯熱不除。未至羸瘦。但多搐掣煩燥不寧者。此乃熱在心肝二經。然不可與急驚同治。以當歸養血湯去川芎甘草。加酒炒黃連、地骨皮。與黃連安神丸相間而服。或以安神丸去氷片、甘草。用導赤散（見二十六條）去甘草。加人參、麥冬。煎汁送下治之。小便清長者可治。小便短少者不可治。宜以抱龍丸與服。若搐而喉中無痰鳴。或自咬指者。是非痲之發搐。乃正虛不能主持之候也。必死不治。

當歸養血湯

當歸　川芎　生地黃　麥冬　木通　棗仁　甘草

淡竹葉　燈心引

黃連安神丸

黃連　當歸　龍胆草　硃砂（各二錢）　全蝎（去毒糯米拌炒乾七隻）

石菖蒲（薑湯泡去毛薑汁蒸）　白茯神（各一錢五分）

為末滾水和作餅蒸熟。以積豬心血同搗為丸。以硃砂為衣。黍米大。燈心湯下十丸。

安神丸

黃連　當歸身　麥冬　白茯苓　甘草（各五錢）　硃砂（一錢）

氷片二分（[illegible]）

為末滾水和丸蒸熟。以積豬心血同搗合丸。黍米大。燈心湯下十丸。

抱龍丸　治痰疾驚

琥珀　天竺黃　白檀香　人參（各一兩五錢）　白茯苓（一兩五錢）

甘草（去節三兩）　只殼（麩炒）　只實（麩炒各一兩）　辰砂（五錢）　金箔（一百張）

山藥（去黑皮炒熱一片）　牛胆南星（一兩）

為末每藥一兩。取新汲井水一兩。同入乳鉢內搗勻為丸。如皂子大。勿見日陰乾。晒則燥烈。每用一丸。薄荷葉煎湯化下

## 譫語第九十八

手厥陰經心胞絡熱邪壅滯譫妄作。正收收後兼涼血。發熱正出用疏托、

譫語妄言。其症皆由熱邪熾盛。火毒壅滯於心胞絡而作。若初發熱而煩燥狂言。或痲癮而不出者。以宣毒發表湯。（見第一條）去升麻、桔梗、甘草、煎汁調辰砂滑石末治之。（有用第二條內荊防敗毒散去柴胡川芎羌活人參、甘草、加木通桑皮骨皮治之者、並註記聽用、）若發熱未出正出之際。而譫語者。俱為火邪內伏不得透表而致。藥宜疏托。佐以清涼分治之品。以葛根解肌湯。（見第五條）去赤芍、甘草加麥冬赤茯苓石膏知母、只殼治之。甚則加蜜酒炒麻黃以發越之。使麻得以盡出肌膚而譫語自止。若麻已出之後。狂言亂語者。以淡竹葉燈心煎湯調辰砂滑石末治之。正欲及斂後譫語者。藥宜清涼解毒。佐以分利涼血之劑。以白虎解毒湯。（見二十六條）去天花粉、加牛蒡子、連翹木通赤苓、以清解涼血而分利之。（有以竹葉石膏湯去人參半夏甘梢、粳米加生地黃治之者。實為無稽、）使火退毒消。而譫語自止矣。慎勿遲延。以致不救。如熱輕餘毒未除者。必先見諸氣色。宜預防之。始終以消毒飲。（見二十二條）除甘草加連翹、只殼、木通赤苓、以分利之。（有用柴葛湯加減黃連解毒古方治之者、并註記聽用）若麻收後。餘熱內攻。循衣摸床。譫語妄言。神昏志喪者。死症也。

## 虛羸第九十九

麻毒流連熱不除。渾身似火毛髮枯。尪羸漸匕成疳瘵。得遇良工病可甦。

麻疹收後。身有微熱者此虛熱也不須施治。待氣血和暢。自然退去。若麻疹既收。其毒不解。邪火拂鬱。渾身發熱。晝夜不退。精神倦怠。飲食減少。或咳嗽不止。或便泄不已。或身熱不除。形體羸瘦。毛髮枯豎。皆真元虛損所致。若不及時調理。恐成疳瘵之患。倘不早治。以致睡則揚睛。口鼻氣冷。手足厥逆。微匕瘈瘲。變為慢風。不救者多矣。並宜以雙和湯。去川芎、以和之。有嗽加橘紅貝母。咳加麥冬百合。有溏加土炒白术與炒扁豆。加食難孚化加砂仁麥芽。如氣血俱虛。以雙和湯合四君子湯。（見七十二條）隨症調治之。切禁用寒涼傷犯脾胃之藥。專力資培。緩圖平復可也。蓋此虛羸之候。雖係真元虛損。故不宜用寒涼傷犯脾胃之藥。亦不宜湊用大補之劑。但當清其餘熱。滋其陰血。和其脾胃。平其肝氣。殺其疳蟲。使營衛和暢。脾胃健運。自然日漸平復。神全體肥。若以雙和散而治虛羸。竟用芪桂。是猶抱薪救火。非惟無益。而又害之矣。曷若以柴胡四物湯。（見三十條）去川芎、加薏苡仁、與清熱除疳丸。去川芎加薏苡仁。相間而服。實為妥當。若麻後元氣不復。而羸瘦身無潮熱者、乃脾胃虛弱所致。調理脾胃。平其肝木。必漸康強

以白芍湯主之。或以八珍湯去白术人參加欠實米薏苡仁治之。慎勿輕用人參白术。恐閉其餘邪。致難攻理。如麻收之後。失於調理。以致體瘦氣弱。且又泄瀉。將成疳積者。宜以奇效神應肥兒丸。或健脾肥兒丸治之。如麻後眼青體弱精神不如平日。又有咳嗽氣急者。以蘇子四君湯加薑汁炒芥子尖杏仁治之。氣急甚者。加葶藶子栝蔞仁治之。若熱太甚或日久不減。而漸羸瘦者。總宜清熱平肝。以柴胡麥門冬散（見三十條）加酒炒黃連黃芩骨皮治之。甚則以古方黃連解毒湯（見三十五條）合人參白虎湯（見六十四條）與柴胡麥門冬散（見三十條）相間而服以治之。

青黛除疳丸

黃連　當歸各二錢　龍膽草　川芎各一錢　青皮　陳皮

蘆薈煆　乾蟾頭（又名蛤蚾即蝦火炙酒淨）　均子肉（麵粉包煨去殼并黑皮各錢半）

為末神麯糊合丸米飲下

白芍湯

白芍藥　炙甘草（此二味為君）　蓮肉　山藥　扁豆　龍眼肉

青黛　麥冬（此六味為臣）　合三四劑水煎服

八珍湯

當歸　川芎　熟地黃　白芍藥　人參　白术　白茯苓

甘草　薑棗引

奇效神應肥兒丸　治肌瘦面黃。或面青面白。泄瀉少食。肚腹膨大。青筋滿腹。或傷飲食。常有吐瀉。尿如米泔。及一切疳症。

原枝人參（三錢如力微者用一錢或以乳汁蒸北直參一兩代之）

大川黃連（酒炒二錢）

真蕪荑（炒焙去皮取淨者五錢）

均子肉（麵粉包煨去殼并去內黑皮四十五粒）

夜明砂（水淘去土砂布取淨砂醋炒乾一兩）

漂白术（陳壁土炒五錢不宜白术者以薏苡仁炒代之。）

吳神曲（炒五錢）

穀麥芽（炒五錢）

天蝬子（即五穀蟲肉湯浸洗淨炒一兩）

淮山藥（炒三錢）

化青皮（醋炒三錢）

胡黃連（酒炒三錢）

山查肉（去子肉酒洗三錢）

乾蛤蚾（火炙醋淬極切三隻。切音堨蚾也）

花檳榔（三錢）

篩等分。如製為細末。每早空心。以米飲調下二三錢。

健脾肥兒丸

人參　陳皮　甘草（各五錢）　黃芪（蜜炙）　扁豆（炒）　山藥（炒）

白术（泔水洗漂土炒）　白苓（炒各一兩）　神曲（炒）　查肉（去子各二兩）　百合
當歸（去尾各八分）　黃連（酒炒三錢）　白芍（酒炒）　地骨皮（去骨酒洗各六錢）
陳皮（去白五錢）　為末蜜丸彈子大老米米飲化下一九

### 雙和湯

熟地黃　白芍（酒炒各一錢）　黃芪（蜜和酒炒）　當歸（各七分）　川芎
炙甘草（各四分）　上肉桂（三分有熱者去之）
生薑一片　紅棗一枚去核為引水煎服

## 妊娠出麻第一百

妊娠麻症若相當。潮熱蒸蒸胎易傷。子去母應無害事。症輕子活兩無殃。

大熱蒸乜血海乾。毒火內攻胎難安。急宜清熱養營血。治不依法生禍端。

古云胎遇熱則墜。麻乃火候。內必有熱。最易墜胎。孕婦出麻。此症極險。當於初熱未出之時。須察其熱之輕重。正出之際。須驗其麻色之紅淡。法宜疏解。佐以清涼。滋血安胎之藥。不可犯動胎氣。初熱時。宜用參蘇飲去人參半夏木香陳皮加條實子芩大腹皮以發之。或以四物湯（見二十）加子芩荊芥蘇葉蘄艾之必散。以四物湯（見二十條）加白术各半子芩蘄艾金殼砂仁各二錢主之。或以安胎飲。罩胎散主之。始終以安胎清熱為主。則胎不動而麻易出。此理誠當。愚按孕婦出麻。初熱之時。而用四物湯加白术艾葉砂仁。與夫安胎散罩胎散方中之人參白术川芎砂仁香附白芍等味。恐燥悍之藥。觸動毒火。而熱轉甚。酸收之味。斂固毒火。毒只內攻。麻難得出。症必增危。非但墮胎。且難保妊娠無虞。即如參蘇飲。雖曰除去人參半夏木香陳皮。而紫蘇桔梗甘草。亦不宜遽用。其若以宣毒發表湯（見第五條）去升麻吉更甘草只殼木通。加當歸條實子芩生地黃元參酒炒黃連主之。使麻毒透出。內熱自

退。而胎自安矣。麻出之後。則宜以四物湯（見二十五條）加條子芩黃連牛蒡子之類主之。至於麻收之後。故宜以四物（見二十五條）爲主。和安胎散罩胎散四物加白朮砂仁斷艾。及安胎飲等方。俱可加減選用。倘無渴。而大便秘嗇結滯者。則人參白朮又當慎用。大抵凡一切實脾行氣燥澀之藥。既礙麻症。復傷子氣。咸宜禁用爲是。

參蘇飲

人參三分 蘇葉 桔梗 葛根 前胡各四分 木香一分五釐
陳皮 茯苓各五分 只殼三分 半夏 甘草各二分
生薑引水煎服

安胎散

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 當歸身 白芍藥
大腹皮 陳皮 連殼砂仁 蘇葉 香附米 條實子芩
早米引水煎服 初發熱加升麻葛根連翹
麻未多加酒炒黃連牛蒡子山查肉
口渴加麥冬知母天花粉
若係痘症痘不起發加牛蒡子倍用白芍

罩胎散

白朮 當歸 白芷 白芍 白茯 柴胡 川芎 阿膠
陳皮 砂仁 甘草 秐米引水煎服

一書加乾柿蒂七個苧麻根七寸甜瓜蒂一個將藥入銀器內放水二鍾以薄荷葉蓋定煎至七分去渣仍將薄荷葉蓋之溫服（按苧麻根蘇葉[illegible]內宜加入）

安胎飲 孕婦出麻宜用

條實子芩（酒炒水浸二錢） 白朮 當歸身 白芍藥 人參（各一錢）
川芎 陳皮 蘇葉 大腹皮（黑豆水浸洗淨各八分） 連殼砂仁（姜炒）
甘草各五分 秐米一撮引

婦人出麻適值經行及經水非正期而來第一百零一

女人麻症最難醫。陰質從來血多虧。待得疹子將發日。又恐天癸正行期。

發熱經行非正時。大都熱毒血奔馳。急須涼血停為主。若待中虛悔卻遲。

正理論云。嬰兒女子益以滋甚。以女子陰質血常不足也。麻症血一不足。多生变症。故女子十四已後有出麻者常恐天癸正行。血走氣虛而成伏陷也。宜以養陰湯（見三十一條）去白芍川芎熟地黃加生地黃主之。若女子出麻於發熱之時。經水忽來。却非經水來臨之期。此乃毒火內蘊。擾乱血海。迫血妄行。故經水不依時下也。宜以涼血飲子（見四十五條）去赤芍木通或涼血地黃湯（見四十六條）去甘草。或元參地黃湯（見五十八條）去升麻白芍甘草。俱加荊芥連翹牛蒡子主之。或以古方黃連解毒湯（見三十五條）加生地黃當歸炒荊芥連翹牛蒡子治之。總以涼血為主。必得經止方妙。如服藥不止。久則中虛氣弱。麻必隱伏。

產後出麻出麻胎墮第一百零二

產後如逢出麻疹。此時怕去氣虛惶。大補氣血功最效。莫犯寒涼生氣傷。

嬰兒尚在母腹中。未行麻疹正　大熱熏蒸胎因墜。治法莫與產後同。

婦人血常不足。產後則血更虛。如產後又值出麻。須當養血。而兼解毒之品。以四物湯（見二十條）少加荊芥牛蒡子主之。不可妄用寒涼。恐傷生發之氣。有用十全大補湯主之者。但方內白芍肉桂須宜酌用。若欲用之。當俱以酒炒用。以逐瘀生新。白朮須以芡實米易之。若係孕婦出麻。熱甚胎墮。不拘已現麻未現麻。俱宜以四物湯（見二十條）加生蒲黃、炒蒲黃、牛蒡子黃連黃芩連翹炒荊芥主之。以去其舊污。生其新血。解其毒而清其熱。自獲奇效。又不可拘產後之例。宜用補氣血也。

十全大補湯

人參、白朮、白茯苓　甘草　川芎　當歸　熟地黃、

白芍　黃芪各一錢　肉桂三分　姜三片　紅棗一枚　引水煎

## 產婦痲後無乳第一百零三

產婦痲後乳汁乾心火煅煉竭津泉惟有養血爲急務。莫施峻劑塞乳源

乳汁乃津液化成。婦人產後去血過多。兼之痲火煅煉。血更枯而津又涸故乳汁乾竭宜養血以滋生化之源。切不可妄用峻補之藥塞其化源之源也宜以四物湯（見二十五條）加花木通主之

## 痲後遍身腫第一百零四

遍身浮腫因何作。只因痲後氣血弱嬰兒閨秀從無此老翁婦人此條多

痲後遍身浮腫。童孩罕有此候。惟老人婦人多有之。蓋老人氣血本虧。兼之痲火耗血。以致出痲之後遍身浮腫。宜以四物湯。（見二十五條）合四君子湯。（見七十條）去白术。加薏苡仁甜葶藶治之。若女人痲後遍身浮腫。必係初熱正出已出之間適遇經行。陰血重耗。故痲後遍身浮腫。如無餘熱便閉等候則當以養榮湯。或四物湯。（見二十五條）或四君子湯。（見七十條）俱多加甜葶藶以治之。

養榮湯　治脾肺氣虛營血不足。驚悸健忘。寢汗發熱。食少無味身倦肌瘦

人參　白术（土炒）　黃芪（蜜炒）　炙甘草　陳皮（去白）　桂心

當歸（各一錢）　熟地黃　五味子（槌炒此宜除）　白茯苓（各七分）

遠志肉（五分）　白芍藥　姜棗引水煎服

## 餘邪為殃第一百零五

痲後餘邪最作殃。發經惡候甚郎當。時行厲氣相傳染。疫鬼勾魂赴北邙。痲疹出盡得安寧。邪未盡時症未平。拂拂煩熱邪尚熾。頻頻嘔吐毒猶蒸。

痲疹於欲出未出之時。宜早發散以解其毒。則無餘邪之為後災也。若不知解毒於初。使痲盡出以致毒停蓄於中。未有不為殃者。或為壯熱。日久枯瘁。或為驚癎。或為泄瀉。或咳民寄血喘急。或嘔膿膿。而成肺癰。或作瘖瘂而死。此雖一時癘氣之染。彼此相傳所致。而未有不由於人事之未盡者也。業

斯道者。但見先出疹者。有為餘邪之發死而不治。則後之初發者。即早為之預解。使無餘邪為害。而不至於夭札。方稱良工。但凡痲疹只要出得盡。則毒便解。而正氣和平矣。若痲正收之際。而猶拂拂煩熱不寧。如蛇在灰。如蚓在塵之狀。或嘔吐。或泄瀉者。此乃毒邪壅遏。尚未盡出故也。煩熱者以古方黃連解毒湯（見三十五條）加麥冬生地黃地骨皮牛蒡子赤茯苓治之。嘔泄者以柴胡橘皮湯去人參半夏。加枇杷葉木通治之。倘果痲未出盡。以苧麻醮酒。或醮胡荽酒戛之。待痲出盡。則煩熱自除。嘔瀉自止矣。如痲收後。只發熱而無他症者。以加減清肌湯加黃連治之。如痲後有餘毒未盡而發壯熱者

以古方黃連解毒湯。（見三十五條）加生地黃鮮地骨皮木通只壳主之。如痲後身熱不除者。以柴胡四物湯（見三十條）去人參白芍川芎。加酒炒黃連。或生地骨皮湯。（見三十條）加黃連治之。如痲後餘毒未清。餘熱未盡者。以十仙湯加骨皮。或連翹清毒飲去赤芍桔梗甘草。加黃連黃芩地骨皮生地黃治之。如痲後餘毒未清。留滯肺經。致吐濃黃膿者。乃成肺癰之候。以桑連散治之。如不愈。以百部湯治之。倘不全愈。以花蘂石丸治之。並以白芨為末。用猪肺切薄片蒸熟。醮白芨末食之。若用此數方如不愈。則成肺痿。宜以紫菀湯治之。

柴胡橘皮湯

柴胡　橘皮　黃芩　白茯苓　人參　半下　甘草
竹茹一團　生姜一片　引水煎服

加減清肌湯

柴胡　黃芩　生地黃　當歸　地骨皮　茯苓　知母
淡竹葉七片　引水煎服

十仙湯

柴胡　葛根　元參　黃連　黃芩　梔子　赤茯苓
只壳　生地黃　陳皮　生姜引水煎服

連翹清毒飲

連翹　防風　荊芥　牛蒡子　石膏　赤芍　桔梗

甘草　水煎服

桑連散

菉豆粉　桑白皮（蜜炙）　苦參各五錢　黃連　天花粉各二錢

為末白湯送下三四茶匙

百部湯

地骨皮　麥冬　天冬　知母　元參　瓜蔞仁　百部根

百合　地茄根　水煎服

花蘂石丸

地骨皮　百部　百合　天冬　麥冬各五錢　薏苡仁

花蘂石各一兩　寒水石　胡黃連各三錢　真熊膽三錢

為末菉豆粉合丸白湯下

紫菀湯

人參三錢　桔梗　白芍各一兩　知母　貝母各一錢五分

阿膠　紫菀　甘草各五分　水煎服

不食吃食大早貪食不厭第一百零六

數日不食有何妨。麻色淡潤保無殃。吐虫自汗相兼見。果係脾熱用瀉黃。

胃火蒸亡食頻亡。通利小水便安寧。實食大早生奇症。咬指嘶牙好怕人。

痲於初熱未出之際。多有不食者。乃胃經火邪熾甚故飽而不索食也。但得麻色淡紅潤澤。雖數日不進飲食。亦無妨害。不必強與之食。蓋熱毒未解。內蘊實熱。自必不食。若見初熱未出及正出之時。以白虎解毒湯（見二十六條）。去天花粉黃連山梔仁麥冬。加荊芥葛根牛蒡子連翹主之。使麻透盡內熱清

散。自能食也。出盡而不食者。宜清解胃火。以石斛清胃散（見五十九條）。去赤芍甘草。量加健運之味治之。麻收之後。如仍不食者。以四物湯（見二十五條）。加神曲山查麥芽。或更加砂仁。以三劑與服。則自能食。但方內有熟地黃。胃虛弱者。宜少用之。如元氣委頓者。急須培補。防有虛羸之患。若麻收後。胃虛而不納五穀者。當以理脾養胃為主。宜以六仙散（見七問內）治之。若麻後身熱不除。煩燥不食者。此屬膈熱。以河間涼膈散（見二十六條）。去芒硝天黃加丑牛以治之。如麻後身大熱。口渴不食。唇烈眼腫。閉大便秘小便不知出者。以河間涼膈散（見二十六條）。通利三回即愈。若麻後臉青唇紫赤身熱不食。乃毒火大甚。或瀉

或渴或咳嗽俱宜以古方黄連解毒湯（見三十五條）倍用枝仁加薄荷葉地骨皮。以二劑與服即愈。若麻收後而不思飲食鼻乾無涕者。以清肺消毒湯。除桔梗甘草。加桑白皮貝母主之。若因先服凉藥過多。有傷脾胃身熱虛煩不食者。以四君子湯。（見七十條）去白术。加薏苡仁連翹牛蒡子解毒之味。治之但方中之人参。必要察人之虛實而施。須其臉不紅。口不渴唇不赤。方可用之。否則不宜。若麻不食而兼吐虫。則為胃敗不治之症。若麻後不食而吐虫。又兼自汗者。真是危症。最為難治。用藥不當變症多端。不可依麻初常法。當用辛温解散之劑。如果係脾熱。則以瀉黄散酌量加減而治之。凡出麻之後。胃氣未平。飲食不可湊進。宜以清粥緩緩調和。使胃氣舒暢。漸進飲食。自無復患。麻後若喫食太早。咬指甲。撕口唇。撓眼毛。看手咬人等症。宜以解毒化滯湯。去甘草桔梗。加青皮治之。又有麻收之後。貪食不厭者。乃胃火太盛所致。宜以大連翹飲（見十八條）去赤芍甘草柴胡。加地骨皮黄連石膏知母生地黄治之。

六仙散

馬蟻花（燒灰）　蓮肉　薏苡仁（各二錢）　藕節（一兩）　鈫石斛

陳早米（炒各五錢）　為末米湯送下三錢

清肺消毒湯

---

防風　只殼（各五分）　連翹　前胡　黄芩　桔梗（各一錢）

荆芥　甘草（各四分）　水煎作十餘次服

瀉黄散

防風（四錢）　枝仁（炒一錢）　藿香葉（七分）　石膏（五錢）　甘草（二錢）

為末白湯送下或用蜜酒拌畧炒仍以白湯送下

解毒化滯湯

防風　荆芥　只殼（炒）　神曲（炒）　麥冬（去心炒各五分）　連翹

黄芩（酒炒）　前胡（各七分）　茯苓（七分）　查肉　甘草（各二分）

桔梗（一錢）

水煎作十餘次服

## 痲後生瘡痲後遍身瘙癢第一百零七

浴早水氣浥腠裏。乾疥濕瘡由斯起。莫道小疾難為患。只愁終身瘡不已。

不知避忌見風早。遍身瘙癢如蟻蚤。此症不因浴早致。消風疎解痒如掃。

瘡疥之生。多見於痲收之後。皆緣生水澡浴太早。水氣流浥肌腠而發是以痲後浴洗必須過一月之後者慮其生瘡也。如遇此症。即以防風荆芥艾葉煎湯洗之。或用苦參四兩。石菖蒲二兩。煎水。臨洗時。加入猪胆汁二三個。於水内洗之。或縛墻楓艾葉楓樹葉柑子葉紅浮萍煎水洗之勿用生水洗

亦不用治瘡方藥薰洗恐致閉毒反裏變生他患為害非小然不早治。必致每歲對出痲之月而發。雖云小疾。亦須慎之。如痲後生瘡不已。此乃餘熱未盡所致。宜以連翹生地黃湯。或生地化毒煎及胡麻丸。加何首烏刺蒺藜白芷薄荷之類。煎服治之。或用苦參湯治之。如痲後餘毒未清。變生疤疽瘡痲者。以解毒湯加防風荆芥牛蒡子治之。或用陳氏苦參丸。荆防敗毒散。（見第二條）去人參。加連翹金銀花治之。若瘡如癩者。以胡麻散主之。如膿水淋漓。以羌活當歸散主之。若痲收之後。遍身瘙痒者。又非浴早之比。乃見風太早所至。以消風散疏解之。其症即愈。如皮膚瘙痒不能忍者。以二味消風散

之

連翹生地黃湯　治痲毒未盡生瘡不已

連翹　生地黃　金銀花　元參　黃連　荆芥穗　木通

胡麻仁　甘草　水煎服

生地化毒湯

生地黃　金銀花　白蒺藜（炒去刺）　連翹　元參　胡麻仁

白附子（烏豆水煮透）　何首烏（烏豆水煮曬乾）　威靈仙　黃連　木通

薄荷葉　荆芥穗　甘草稍　乾紅浮萍為引水煎服

胡麻丸　治風熱瘾疹及疹後瘙痒生瘡日久不愈

胡麻仁（四兩）　防風　威靈仙　苦參（各二）　石菖蒲　獨活

白附子（烏豆水煮）　甘草五分　為末米糊合丸白湯下

苦參湯

苦參　大楓子（去殼）　荆芥　防風　白芷　何首烏（烏豆水煮乾）

獨活　白附子（烏豆水煮乾）　威靈仙　胡麻仁　北全蝎（炒米）

姜蠶（薑汁炒）　白蒺藜（炒去刺）　牛蒡子（炒）　蔓荆（本方無獨活）

（本方有甘草）

解毒湯　治一切熱毒腫或風熱瘙痒

黃連　金銀花　連翹　水煎服

陳氏苦[illegible]遍身瘙痒癬疥疤瘡

苦[illegible]元參　黃連　大黃　獨活　只殼　防風　各

兩

黃芩　枝仁　白菊花各一兩

為末蜜丸桐子大食後或茶或酒送下三四十丸日三服

胡麻散　治風熱癮疹瘙痒并治癩

胡麻仁一兩　苦參　荊芥　何首烏各八錢　防風　威靈仙

石菖蒲　牛蒡子炒　白菊花　蔓荊子　白蒺藜各六分

為末。食後薄荷葉煎湯下或以茶下亦可。

羌活當歸散　治癮疹瘙痒風水淋漓。

羌活　當歸　川芎　升麻　防風　白芷　荊芥　連翹

牛蒡子　黃連酒炒　黃芩酒炒　甘草

以酒總拌曬乾酒煎服或以水煎用酒對服

消風散　治風熱或瘡疥遍身疥癩小兒痘疹餘熱痛痲癮疹

川芎　羌活　防風　荊芥穗　藿香葉　人參　赤茯苓

殭蠶各一錢　陳皮　厚朴姜汁炒　炙甘草各五分　蟬蛻一錢

一方無藿香有薄荷　水煎服　如久病頭風目翳日三服。

此方妙用全在厚朴人參。當知肌表之疾無不由胃而發。故

用厚朴清腸胃其內。即以人參助諸風藥消散風熱於外。則羌

活防風荊芥輩方始得力耳

一味消風散　治皮膚瘙痒不可忍

薄荷葉　北蟬蛻（去頭足土炒）　為末食遠酒下

見毒醫毒勿泥痲法第一百零八

風寒暈腥失禁忌。現點即收不透肌毒歸於內肚角腫見毒且

將毒來醫。

痲有至六七日。稍受風寒。未忌暈腥。致四肢面部。忽有痲疹

影點點現而即收不見。不能透發於肌表。以至毒歸於裏忽

然肚角紅腫。似毒非毒。初用玉樞丹與服。合瀉數次。繼用活

命飲服之。後以人參黃芪白朮蟬蛻木通當歸之類。耗出火

毒。起頂出膿用外科敷藥與膏藥治之自愈此見毒醫毒之

法。不可拘泥痲毒清涼。而竟不敢用補也。

玉樞丹（又名太乙紫金錠）　解諸毒。治諸瘡通治百病。有起死回生之

功

山慈菇洗去皮毛淨　五棓子打破洗淨焙乾各二兩

上麝香檢淨皮毛　明硃砂　明雄黃各三錢

紅牙大戟（綿大戟紅紫胡切不可用去蘆根洗淨一兩五錢）　千金子（去殼油取淨者一兩）

為細末秤過分配合以糯米粉攪糊和丸或作錠子聽用

活命飲又名活命丹　治痲出即收忽爾作毒毒將出及毒出

後並宜

當歸　獨活　杜仲　秦艽　細辛　白茯苓　桑寄生

上肉桂　熟地黃　北防風　川芎　黃芪　甘草

加人參　水煎服

## 附錄進賢舒馳遠先生麻疹論一篇并案五條

貴成阜山劉齊珍輯刊

### 麻疹論

經云痘稟于陰而成于陽麻稟于陽而成于陰此陰陽互根之妙也麻乃先天真陽中之胎毒然必得陰與之交感而後能生其化故曰成于陰也方其初發熱三日必周身發乚微似有汗而苗乃見汗者陰之液發熱而發乚者陰陽交感施化之驗也苟非有發乚之汗則榮衛乾澁腠理閉固其苗何由而得出耶及其齊苗肌膚顆粒紅活鮮明是乃榮血附隨其氣領載使頑而精華發見於外也其後以漸回填嗣復之暴併歸氣府必由感而化陰得之而為麻迹麻迹者陰血之所為也不欲其遽收恐其餘毒復返入內必有後患是功成于此豈非成于陰乎所謂麻稟陽而成于陰如此然必內外無邪方能成功邪則傷正有害於麻法當分經辨証依法定方使邪去而正無害則榮衛和順陰陽交會無所往而無不得之矣凡麻症重在養陰麻症只要齊苗苗齊均屆八九其後不過調理而已形色喜鮮明而嫌晴滯不妨其多總要出得透乚則內無留毒其症常兼咳嗽及咽喉痛咽痛治以甘草桔梗為主相症加減若紅腫惡熱口渴尿赤宜加黄芩生地牛蒡子外用蘄艾蛇床子研末新烟到盌燃吸烟取出痰涎咽痛漸愈若不惡熱舌胎白滑宜加半夏南星外用蘄艾半夏南星研末吸烟出涎若聲音重濁更加阿膠玉竹雞子白之類若不紅腫舌胎滑而冷不渴惡寒喜熱宜用半夏南星附子肉桂之類外用柚葉夾紙燃烟其後頸或用生附子研末敷之自愈凡此不應拘引其端而未詳其法非畧也用法不在於經論症重在本氣相爲斟酌

### 附案

台醫老瑕者年二十有七夏月出疹頭身微熱苗色頗紅咽喉痛甚時醫惧用柴葛牛子甘桔等藥轉加作泄大泄數次疹頓沉設咽喉轉閉口不能言人事恍惚昏昧欲絶時夫有在坐子謂天有曰此証全是一團陰寒挾症若用疹家通套藥必不可生天有問何以言之予曰若內實有火苗當紫赤何得復紅且咽喉雖痛而不赤腫又無煩渴躁熱等証明明陰勝虛寒陰火上攻也且陽和布令百脈順昌麻疹屬陽必乾陽始得出透見點之時如前半初味遽陰寒肅殺之氣摧殘所生麻斯不遺今値此陰邪猖獗肆攻真陽而疹不沈沒者幾希惟急陡進附子乾薑半夏甘草白术茯苓肉桂黄芪溫補兼行以驅陰回陽俾敢出悉返沖和乃得功收再造危乎微乎

從姪經千年三十出疹初熱時心中煩燥腹內疼熱甚爲剎床彼因問三豆湯可服乎余曰可急煎服于是心腹煩熱乃解苗不出見人事暈眩咳逆喘促鼻竅扇動靜察其証知其爲熱毒

壅遏于肺。々壅則津液不行。肌竅不開。苗故不見。因用黃芩以清裏熱。阿膠麥冬。以潤肺燥。桔梗開提肺氣。紫葛蒡薄荷解外熱。甘草緩中。杏仁定喘。服二劑。苗雖出透。而色皆紫黑。人事昏覺沈重。飲食一點不能下。余悄謂其家曰。痲書有云。淡紅者生。紫黑者死。其家駭怖無似。余復安之曰。豈真死症耶。但其症極險耳。此為內熱甚而血結也。其証舌乾口臭。惡熱喜冷。聲音响亮。仍用黃芩麥冬阿膠。以清肉熱。而潤肺燥。加以丹皮瀉血中之熱。合紅花之活血者。以散血結。蟬退牛蒡解其外毒。黃連甘草解其內毒。連進三劑。人事漸安。飲食漸可。紫黑漸退。而痲疹塌矣。然有陰邪內蓄者。苗亦紫黑。法宜驅陰回陽。其証舌潤不渴。聲低息短。惡寒喜熱。與此不同。

前月其弟字志于者。年二十一歲。疹出甚艱。信任內戚所薦之醫。不知解托。概用寒涼。遏鬱苗氣。而不能出透。至九日而死。經于謂其弟不自謹慎。起居失節。飲食失調。以至此耳。傷哉。其弟為庸醫所殺。不歸罪於醫。而反躬自責。足徵心地惇良。皇天豈無默庇。所以自出痲疹。其症雖險。而終無害也。竊謂賞善自應罰惡。殺命之醫。寧不速誅之耶。抑何日得蒙上天併顯誅其薦醫之人。方快吾心焉耳。諺云。賢不薦醫。々為賢人所不薦。獨愚人可得而薦乎。于是余又痛恨夫薦醫殺人者。

曾醫天瑞之子。大熱大渴。舌乾口苦。咽喉腫痺。氣喘腹痛。下痢紅白。小便涉熱。苗色紫而暗滯。此為火邪充斥三焦。與為熱壅。傷津。以渴。嗣肺而喘。上攻而為喉痺。下迫而便紅白。精津血脈受其煎熬。故苗色不紅潤。口苦者。少陽之裏熱也。方用柴胡黃芩清解少陽。大黃通瀉三焦實熱。梔仁引三焦之火。屈曲下行。生地紫草以解血分之熱。杏仁定喘。桔梗開提。甘草和中。服一劑。諸証畧減。但腹痛未減。小便如故。是復用神砂六一散二錢。桔梗煎湯化服。使桔梗通天氣于地道。則氣下降而壅自疎。六一散。開支河以瀉小腸之熱。一服而小便通。腹痛即愈。次日苗轉紅活。諸証俱已。于是方中減去柴胡黃芩大黃梔仁。更加當歸茯苓數劑。而全愈矣。

曾醫國光之孫。苗色淡紅頰腮。口渴唇燥而腫。清涕成流。飲食不思。小便短。大便閉。于細察之。此証內真寒而外假熱。其人惡寒。身倦欲寐。乃少陰証也。內有真寒。舌胎滑而冷。口雖渴而喜熱飲。且不能多飲。小便短大便閉者。以清涕上湧。津液逆而不降也。諸証皆非真熱。乃假象也。方用附子白朮茯苓半夏吳萸服一劑。苗色畧轉。人事飲食。亦漸就痊。再投一劑。口唇全愈。清涕亦不吐矣。大便初硬後溏。旋即又行。轉紅白痢。吾知其裏邪從下行矣。亦胃氣有權。穢腐當去之徵也。但小便仍短。方中宜用肉桂末。藥內化服三四劑。諸証皆愈。而成功矣。

## 附錄胥山王琦先生醫林指月書內論瘄一篇附證一則

安成阜山劉齊珍輯刊

### 瘄論

瘄猶錯也。皮膚甲錯之謂也。俗名曰瘄。實係疹也。紅點隱々。謂之隱疹。々之根源。乃毫毛之內。皮膜之間。因于寒。致血凝濇。其凝濇之血散發于皮膚之外。則發而為疹。蓋人身通體毫毛之氣。肺所主也。毫毛之內。腠理之外。則裹胞中之血。熱肉充膚。淡滲皮毛。肝所主也。皮膚寒。而血凝濇。始焉凝濇。繼欲流通則發熱。咳嗽。散而為疹。々之發也。有稀少。有稠密。極稀少者。不過數點。以及數十點。極稠密者。則遍身頭面。無有空隙。醫者不知其

故。見有數點。即行攻發。若皮膚肌膜之間。果有凝濇。則發熱咳嗽。自當湧出。其不即能出者。非肌表不和。即氣虛不振。治之之法。當以紅花歸芎荊柴羌丹之劑。和其肌表。或以桂枝蒼朮歸芍苓甘之劑。助其氣虛。若緊以蘇麻前杏芩連石膏之劑。投之其氣虛不出者。此為虛其原本。々自稀少者。此為無故受賊。必雖疹不能出。其經脈表裏受虧。致身大熱。而喘急生。愈熱愈表。愈喘愈發。輕者重。々者死矣。蓋瘄之發也。見有一二點。其勢必出。疹之發也。見有一二點。可出可不出。若肌表果有凝濇之疹則身熱咳嗽。其勢自出。若無疹。則止此數點。不能再增。善治者明乎此理。不行攻發。但調其經路。和其榮衛。虛者補之。[illegible]

之。則熱退身安而愈。無奈蒙昧不明。當疹毒盛行之時。見有數點。即行攻發。轉攻轉劇。愈發愈危。必致真藏虛敗而死。真可痛耳。夫瘄毒起于腎。不從經脈而出。[illegible]為腎經瘄。雖有良醫不能挽回。若疹則其根源在于肌膜皮膚。々腠之血。根于胞中血海。膚腠寒。而胞血稽遲。則有疹毒之證。得其源。而活法以治。或其自然。而不加妄治。百無一死也。

### 附證

己巳春。長男甫六歲。次男甫三歲。于元旦次日。俱發熱見疹。余初不知疹之根源。以為嬰兒生下時。口含惡血。開聲嚥下。其後發為疹毒。治疹自當攻發。即用清涼透發之劑服之。次朝暴增

十餘點。究不暢達。心甚惶惑。長男七月而生。先天怯弱。問其胸膈寬否何如。答曰飢甚。又問口味燥苦何如。答曰淡甚。因知其虛。即投蒼朮苓甘桂枝紅花一二劑。次朝疹發遍身。熱稍退而神情猶煩躁。夜發熱頻咳嗽。至一月方安。蓋因見點之初。過服表劑。虛其經脈故也。次男尚幼。未省人事。不能致問。上冬患肺風痰喘證。諸藥不效。服麻杏桂枝石膏湯一劑。而痊。謂其稟質畧強。不與長男同。其疹不透。必寒凝毒甚。因與蘇麻前杏黃芩石膏藥。紅點不增。人與紫蘇蔥薑芫荽等煮之熨之。疹總不出乃與同道諸公商之。俱云舍透發並無別法。至五日而口吐蛔蟲。兒醫曰。此熱極蟲生。余有牛黃散。可與服之。牛黃散即大黃

末也。一服痰喘止。而神氣稍平。自是此兒遂無言矣。計無可施復針百會穴。開其瘖門。服西黃分許及諸單方。觀其形證實不能生。友人張衡生來望。因曰。此大虛大寒證也。今既無言又不能食。恐無濟矣。然心猶不忍。勉投參附。合藥而亡。因自嘆曰。此庸醫現身食報。天理當然。自身行醫。何尤乎人。因悔昔日所見之皆非。益信治病求本之不謬。次日有同居舫汪姓者。伊子出瘄。已經三日。見余孫悲傷。不邀診視。自用前杏麻黃石膏藥一二劑。疹出廿餘點。不能再增。心胸煩悶。不得已而告余。乞余診視。余曰若再攻發。即和吾子矣。急與蒼术官桂茯苓紅花等。服一劑。而熱退身安。余因此始悟疹之根蒂。凡治瘄但調其氣血和其經絡。寒凉攻發槩置之不用。所以屢試而屢效也。次年春友人吳題仙之子甫一歲出瘄。延兒醫馬聖則兒診治之。攻發不透。神情恍惚。喘急不寧。又延余診視。余往吳宅。聖兒先至。余視之。知其虛也。因告主人曰。若但發瘄已斷不出。必至身命不保。主人曰。為之奈何。余曰惟有溫補藥一劑。益其臟府。安其腸胃。助其氣血。方可。聖兒曰吾治四朝。不能透發。悉聽尊裁。余即與蒼术姜桂歸芍苓甘銀花紅花諸味一劑而安。次日仍用原方加人參一錢。此後並不服藥。連服獨參湯數日霍然矣。又有夏姓耀如之子出瘄。其顏色紫黯。神氣不寧。余曰此證大凶。治須得法。連看二次。皆用溫散藥。次早其家人來告曰口吐蛔蟲

另有藥否。余曰昨藥二劑。俱服否耶。曰尚存一劑。因與附子八分。令入藥內煎服。自此遂無音耗。越三載。至其家。見其子長大余因問曰。昔年出瘄。吐蛔。何由得愈。其家答曰。服先生之藥後。因無力相延。仗天覆庇。得以漸愈。余默嘆曰。因死吾子。得生他人。治疹之法。可無憾矣。余因附載斯冊。雖不能見信於兒醫。而正道闡明。實有裨於兒科治疹之根源。而為有子出瘄者所當致慎也夫。

# 跋

自來可法而可傳者類皆身心性命之編此活人一册所由壽世也第有傳書而遞續傳書者不得其人勢必簡斷篇殘甚至以贋亂真而不可救斯即善藏如楊玠善閱如王充其如無善本何湘西李星懷堂好善士林也余擁皋比十稔竊嘗窺其居恆范堯夫之憐貧竇禹鈞之濟急蓋駸駸乎其力效之今又不惜工資續梓是書以傳世更復遥遥相望於同志蓋本乎昔憐濟之善心充之以利人身心性命於無量而又逆知人之好善誰不如我是誠心前賢之心以心後賢之心者所繫豈淺鮮哉余亦不禁心心相印因誌數語以殿其編云

溈甯張壽基敬軒氏謹跋

道光丁亥年鐫

# 引痘略

引痘新詠附刻

板存琉璃廠西門内中間路北奎光齋陳

---

## 種牛痘序

治雜病難而治痘尤難非痘果難治特天下之業是科者罕能精其術而小兒之夭枉者衆矣且雜病未必人〻患之而痘則鮮有能免者雜病尚可緩以訪醫而痘則生死剋期於數日間余官京師二十餘年每於通衢見孩車纍〻然日載數十嬰孩之屍詢之皆殤於痘者爲之惵戚久之既而思種痘之法或可善全而痘之因種而殤者亦

復不少夫生死固有定數而人事亦不可無補救之權頃得邱君浩川種牛痘之法其書頗詳明讀猶慮其奇而誕也因受之曾賓谷前輩確然乃此復詢之龍華田中允張翰山編修兩太史皆籍廣東其子女悉種牛痘之越十餘年皆無恙即阮雲臺師督兩廣時曾招至署中種之與阮小雲農部所言俱足之信也余不幸兩子皆殤於痘一女復以種痘而殤因見種牛痘之法百無一失竊喜天下之嬰孩或可藉以保全之而特念此書流布甚少乃復付梓以廣其傳惟牛痘若何取用書中不言訪之錢金粟學士則云牛痘皆生於股色青而甚稀用之以前股為宜金粟曾親試之因附識顛末於簡端

道光丁亥孟夏月海鹽朱方增書

自盧扁不世出善攝生者多持勿藥之說然必慎之於未病斯能百不失一余曩在京師見安徽人來北方種痘詢其苗則来自江南多能獲效心已奇之及歸里晤南海　邱君浩川其法更捷云嘉慶初元外洋醫者試於嬰兒臂上依穴法挑破見膜而止用薄刃取牛痘之漿傅之不數日即出數顆如期收效永不再出嗣是以人傳人如火之傳薪無不應手而愈嘉慶十年適重洋到粵欲傳其術人未之信獨　邱君詢得其詳驗之果效遂傳其方活人無算時方伯曾公學使傅公先後延至署中並奏效如神方伯取

義經勿藥有喜四言書扁以贈傅公亦賦詩贈之一時名流題詠幾徧余觀本艸綱目見其稀痘方用白牛蝨以此蝨僕緣牛身食飽自墜用之能稀痘即取其中有牛血耳牛蝨尚能稀痘則牛痘必稀用其苗以種宜獲十全之效理有固然無足怪者是中國人

已發其端而外洋人專心致志觸類引伸亦其一長也用能順其自然不假方藥無小無大無有恐怖豈非補名醫之未備爲活嬰之妙術而能百不失一者耶余嘉　邱君之志故備書之以告來者嘉慶丁丑仲冬順德温汝适題

## 序

順造物之生成易補天地之缺憾難嬰兒之患天花十損二三甚者不存五六古之醫痘者惟待其毒之既發而治之宋以來始有取痘苗絮於鼻孔一法後人效之可謂善於所感事捷而功鉅矣然猶失十一於千百未能操勞而十全也

聖朝德化涵濡躋民仁壽薄海內外讋慄偕徠嘉慶元年外洋醫人憫其國中嬰孩常遭此厄盡心講求得牛痘之法於毒之未發先行引之不擇天時不煩禁忌不延醫不服藥以此流傳鄰近諸國如響斯應迨嘉慶十年四月由小呂宋舟載嬰兒遞傳其種以至澳門予時操業在澳聞其事不勞而效甚大也適予未出天花身試果驗洎行之家人戚友亦無不驗者於是洋行好善諸公以予悉此屬於會館專司其事歷十數寒暑凡問途接踵而至者累百盈千無有損失夫嬰兒之無不出痘者天也治之有效有不效者人也嘗恭讀

御纂醫宗金鑑云正痘感於得病之後而種痘則施於未病之先正痘治於成病之時而種痘則

調於無病之日既無諸症夾雜於其中復有善方引導於其外然則牛痘之理原包於種痘諸法之中雖種之法有不同而其爲善方引導於外則一也熺素不知醫亦未嘗以此取人絲毫之利其所以力行此者則以出痘人所同患慈幼人之同情苟可以去險履平避危就安少有濟於人詎或私於己第念是

不越國門名不踰鄉曲而痘之患處處有之此法予既得之最先且行之無誤用敢筆之於書以質之於世爰取其法之歷驗者條述之並繪爲圖都爲一帙仁人君子知有此法不鄙是編相與講明而流布之俾嬰兒不罹天花之厄共嬉游於

光天化日中也不亦慈幼者之所同快哉

嘉慶二十二年丁丑冬南海邱熺浩川識

---

### 手少陽三焦經圖



此圖按銅人圖尺寸孩兒大小不等宜因此類推

### 種牛痘穴分圖



種痘刀式



此刀鋒宜尖薄利約長寸許外用玳瑁殼蔽護

取痘漿象牙小簪式



此象牙小簪約長寸許兩頭宜尖利

執刀式



---

# 引痘略

## 引痘說

南海邱熺浩川手輯

痘何以曰牛也痘之種自牛來也外洋向無此疾後由他處傳染患亦滋多惟畜牛取乳之家獨不沾染醫人欲窮其故見牛乳傍有青藍小疱形與痘類因悟牛之患痘必之傳人必然無害於是按古針刺法取牛痘之漿種人兩臂消爍清冷淵二穴旬日果於所刺之處隨出數顆按日灌水按日滿漿按日結痂落靨無一損傷無一復出蓋牛土畜也人之脾屬土以土引土同氣相感同類相生故能取效若此痘種自牛而來故曰牛痘也

一第一〇一二冊 續修四庫全書 第 5 文匯本

其曰引何也曰痘之爲毒受於先天感於時氣散於經絡男女交感之會先天胎毒既有淺深感時行之氣復有善惡而散於經絡分配五臟又有輕重正痘有發熱即現點者最險之症腎經之毒也由腎而肝而心而肺而脾傳經既多其症亦遞減故痘之發毒腎最重脾最輕按古痘苗塞鼻孔法亦必五臟傳

徧始能發熱緣鼻者肺之外竅也苗塞鼻中其氣先傳於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脈心傳於脾脾主肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳於腎腎主骨痘毒藏骨髓之內感苗氣而發其毒自骨髓盡達於筋腎藏之毒解矣自筋盡達於肌肉肝藏之毒解矣自肌肉盡達於血脈脾藏之毒解矣自血脈盡達於皮毛心藏之毒解矣自皮毛盡達於顆粒肺藏之毒解矣苗氣必歷五臟層遞而入內毒亦必歷五臟層遞而出此傳送之次序也今種牛痘法擇於兩臂中消爍清冷淵二穴上下交述之處種之似與塞鼻孔法有異殊不知人身兩臂乃手少陽三焦經也三焦者人身最關要之腑如天地之三元總領五臟六腑營

衛經絡通內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通得其關要之處引之直從皮毛血脈肌肉筋絡同時直傳而入使縱有胎毒深藏於腎亦自然同時引挈而出如引路然引諸坦途則無顛躓之患如引絲然引其端緒則無棼亂之憂金鑑所謂引其毒於未發之先者即此意張遜玉種痘新書所謂

以佳苗而引胎毒斯毒不横而症自順者亦此意故凡種痘皆用引法而引毒從皮毛血脈肌肉筋骨同時而出則牛痘爲最捷也

痘爲小兒一大病當天行時人人尙思遠避今無故取嬰孩而與之以病可乎曰非也譬之捕盜乘其羽翼未成就而擒之甚易矣譬之去莠及其滋蔓未延芟而除之甚易矣人

家小兒出痘如遇險症延醫服藥舉家日夕守視多少險辛問卜求神多少驚恐其輕者亦須多方調護今牛痘則止種四顆或六顆小兒嬉笑飲食一切如常旬日之外告厥成功無災無害不惟小兒省卻疾苦卽育子者亦省卻憂勞法誠善也

或問種牛痘有死者否曰斷無致死之理予少時未出天花洋醫爲予種時年三十二歲今已十有三年矣經予手所種小兒不下萬千皆根基長養以至娶妻生子不能悉數卽如南城賓谷曾大中丞年近六旬艱于得嗣前開藩吾粵時舉一子命予爲種痘隨手奏效蒙贈以勿藥有喜四字扁額其他所種萬無一失人所共知若非身試無誤敢以人爲戲乎

## 首在畱養苗漿

牛痘法全在養苗此苗始自外洋嗣後以人傳人貴乎連綿不絶予旣於洋行會館設局夏月以八日爲一期春秋冬三季以九日爲一期周而復始來種者風雨勿改而洋行好善諸公復醵金生息自四月至九月來種者

前以菓金與取漿之人其所以設菓金者蓋當盛夏溽暑之時卽平日深信者亦多拘執而不肯來痘不種則漿無從取漿不取則苗無以繼今既設菓金俾來者孩童既獲安全而貧乏亦不無小補於是種痘者源源而來而佳苗乃綿綿弗絕行之既久人咸知牛痘之法雖盛暑亦無礙也

次在認識瘋疾

父母愛子之心人人皆同粵東地勢卑濕不無瘋疾來求種痘者恐一同混雜誤取其漿傳之無疾小兒爲害不淺以此告知洋行諸公甚請　有司派令養濟院認識瘋疾之人具結存案逢期到局伺候凡來種者先令驗過然後取苗自無貽誤

引泄法

其法不論春夏秋冬隨時皆可不揀天氣不擇良辰不避風不禁忌不分男女不拘大小自小兒生百日後但現在無瘡癩無瘰癧無胎毒及皮膚血熱疳積諸疾病便可隨時引種牛痘灌漿滿足總在八九日故種痘之期大都以八九日爲率（太早則漿無力遲則漿老無功）至期於先一期所種漿水滿足之孩童擇其痘頂不尖腳不斜不皺不黃不暗不破要如紅線圍纏收束緊實色若珍珠寶光者又察此童現在無瘡癩瘰癧胎毒皮膚血熱疳積疾病等症者是謂佳苗若其痘色淡白暗而無寶光頂雖平而腳斜似漆中央無一點焦硬者不宜

用苗既佳矣取苗時用刀尖向其痘面四圍輕輕剔破將痘面中央一點焦硬小靨微揭其漿清亮者可用若見漿水濁白或黃即使刀尖三兩次點去濁漿俟其流出清漿如圓珠一粒不流散者爲貴好漿一粒可種數人

種時孩童衣衫兩袖捲貼膊上用小繩二前後各一橫勞兩袖結束緊緊（令兩臂露出雖寒天不忌）男先左女先右種痘者左手執定孩童之臂勿令伸縮右手將刀尖點取佳苗向兩臂消爍清冷淵穴每臂每穴各種一顆如孩童年至八九歲以上日啗腥膩五味恐或有後天之毒則於兩穴上下相連之處中間更各種一顆不宜出四顆六顆數外

其刺法用刀不宜直豎宜輕巧將點苗刀尖輕輕平刺皮膜如一紙之薄刺處約寬一分以微見血爲度將刀尖之漿輾轉技拭同其微血注于所刺穴中使漿與血調和其氣達于三焦之經血氣相感自然攻效斷不宜手重恐深刺入肉出血畧多反將苗漿帶去

如法種畢其兩臂微血勿被衣衫拭去（如拭去可

將漿補種原處）俟血點既乾徐將衣袖垂下不必用紬包裹束扎反令血氣不行貼身之衣宜用柔軟絲紬若衣服漿洗粗硬者恐致擦損

### 度苗法

按期取鮮漿種痘以人傳人固妙但祇可施之近處若遠處難取鮮漿可尋佳苗之靨（如前式者）罐藏密封帶在身旁日夜不離可以留十

日半月倘不能即用逢痘期之日將其磨背鋪在鮮漿之上使其氣息沾潤或用刀尖沾鮮漿抹過磨背亦可凡用磨時取備人乳少許將刀尖刮取磨中之肉（即痘痂向內一面朦所結成者）放於磁器面上以人乳滴入令其濕潤然後用刀尖研刮乳漿照法刺于臂上此特爲路遠不能取鮮漿者而言即痘磨亦可取效

又有乾苗法將象牙小簪二枚各就滿漿之孩童痘上兩三次沾取痘漿俟其乾了藏于鵝毛筒內用蠟密封可留三兩日用時取備清水一碗煎滚以牙簪在滚水氣上熏潤互剔刮淨其漿推漿于簪尖上即用刀如前法刺破孩童皮膜隨將簪插入所破皮膜孔裏輾轉略爲搖動得其微血洗此漿於肌膚內亦可或將有漿之簪插入滚水內立即提起搖去滚水如法用之但乾苗有引出有引不出者不如用痘磨更不如用鮮漿得氣較全自然之理也

### 出痘時宜辨

自刺引之後並不發熱起初一二日所刺處常如蟻咬然至第三四日始露形影發出痘

尖頂脫血跡第五六日起如小疱週圍灌水第六七日水足灌漿微微覺癢第八九日灌漿滿足而腋底微疼略似結核頭額掌心俱見微熱此週身毒由此出毒發則火動正要其元陽運化也其痘灌漿滿足有如茶豆大有如門豆大者第九十日鄰外紅暈隨散微熱必退漿轉黃蠟色先從痘心焦硬處變

蒼而結靨半月之外靨落有疤其靨光澤堅厚捲邊如小香菰樣細看疤內更有幾點小疤居其中此種情形齊備可以告成功矣予身曾親歷故知之更詳

天行之痘醫家先論成色牛痘則須分眞假凡痘頂平而不尖脚收束緊實色如珍珠寶光中央一點焦硬根脚如有紅線圍纏痘脚

外有紅暈（如先天毒重始有紅暈毒輕則無）如此者乃眞痘也無水無漿無紅線脚或有灌水而不上漿或灌漿如黃白膿者其痘頂尖而不平脚斜散而皺不收束色淡白暗而無寶光結靨黃而薄又有中央厚而邊薄者此假痘也眞痘既出之後天行永不復出即再引之亦無復出者假痘仍要再種恐其過天行復出務須

---

於此等處辨清而種痘之小兒至灌漿後亦必須請原種痘之人看過方保無誤

天行之痘必由五臟一經而發牛痘亦然間有夜睡略驚搐略煩燥者主心經也有略多眼眵者主肝經也有略作渴略作悶嘔及泄瀉者主脾經也有略咳嗽及噴嚏者主肺經也有夜睡齘牙者主腎經也何以既走五經

而不用服藥哉蓋引之則症輕所謂毒不横而症自順也

種牛痘宜診天行未到之先引泄更佳誠恐孩童沾了天行氣息引泄適逢其時則有出天行而不出牛痘者亦有天行與牛痘並出者如播種之日即晚或次日發熱此乃天行在先非牛痘發作否則係夾感冒別症自須

延醫診視恐有射利之徒自作聰明竟將天行痘漿與人刺引及過發時渾身俱出其天毒輕者出痘少尚無妨礙毒重者出痘必多更須醫治若依牛痘之法以所種之痘苗種人則引一顆即出一顆斷無多出之理種此穴即出此穴亦無橫出別位之理種痘家宜致謹焉勿謂言之不早也

牛痘間無多出之理亦有四顆六顆不能出全者予曰有有將奈何曰無傷也假如兩臂各出一顆則泄引已匀可無後慮或止一臂種出或獨出一顆其毒已發十數年來亦未見有再出者然或慮引泄未清恐有後患則須俟其元氣既復一年半年之後再補種一次更爲細密然彼時毒氣已輕即或種出必不如初次之形象矣又有八九日灌漿如藍紫色此係胎毒極深亦必須次年補種更有種一次一顆不出至種第三次始出者此非引泄不驗良由小兒先天毒氣太盛根深蒂固一時難于引拔尤須隨期復種倘不再引恐毒已微動不得其苗引發必然惹出天花雖有痘科醫治亦無牛痘之從容自在也余所見不一爲父母者不可自悞憶　盧濟庵農部囑予爲其子女數人齊種獨其少君連種三次不出隔年餘天行時出痘症果危險此可見毒氣深伏一時引泄不出之故然至三次不出則吾見亦僅矣

種痘之初四五日宜食火腿臘鴨瘦猪肉鮮魚素菜豆付冬笋元荽芋薺甘蔗清湯粥飯

一切清淡各物。（肚瀉則不宜食魚腥灌漿後亦不宜食元荽冬笋及豆付甘蔗孛薺諸凉物）到、灌、水、時。觀其似弱。則稍食鮮蝦鮮蟹催助漿水。壯旺者不食亦可、忌食生雞、鯉魚、牛肉、（誤食恐痘破成坑。不能合口。又恐結痂後痂旁紅腫。如類痘疱。）及一切煎炒熱毒麵食凝滯之物。放、苗、之、初。太酸太鹹各物不宜食。豆付食多。亦恐致癈。

## 出痘後須知

種痘後斷不再出。問、有、出、者。名、曰、小、痘。非、眞、痘、也。猶之天花之後。亦有水痘。必先發熱一兩日。然後發出。仍亦灌水。其中或有數顆略大。亦似灌漿。痘脚亦似有淡淡紅線。但六七日必結癟。癟薄如紙。萬無妨礙。幸、勿、誤、聽、人、言。認、爲、再、出。

其有先天毒盛。發泄未清。出痲疹時必需。延醫用一二發表之劑疏解之。卽安然無事。問有痘後卽出痲疹等類。亦須延醫治之。非、恐、大、礙。特、要、孩、童、不、致、辛、苦、耳。

又問有結痂後。臂上痘痂之旁紅腫。略類痘疱。此因萬中無一。宜用豆心渣。（卽豆腐渣）或三豆、散、紫花地丁、芙蓉膏、四圍敷之。留頂勿敷。使其毒由頂出。憶予所種。惟　常博何公夢谿

少君又本坊　崔渭生令嫂、及中協兵弁張耀淸之孫、有此。按藥治之。無不立效。十數年來。種小兒以萬計。所見者僅三人。此外不復有矣。

或腠理氣血凝結。致枝節生瘡。用綿繭散敷之。卽愈無論諸瘡。如濕爛。用金華散摻之。瘡乾。則以豬油調敷。若生瘢癬。燒乾陳牛糞敷

之

或問天花忌抓破此獨不忌何也予曰此原是針刺法毒以刺而引出刺且不妨抓破何害

又問取鮮漿時於取漿之小兒有妨礙否曰予已試驗諸千萬人俱未見其有妨礙也其所以疑有妨礙者緣種痘之人見有好痘捏

破痘漿盜以作種其取漿之時或手力太重或捏人太深或漿未灌滿而取之非其時或筋脉有關而取之非其處如是則或致有礙耳若牛痘之法則不然俟其八九日灌漿滿足輕輕點取於己無損於人有益何樂而不爲予蓋痘之患在毒痘漿旣滿則毒已盡泄取之得法斷然無礙且予之行此亦不過以

善方濟人耳若損此而益彼卽予亦不肯爲也

遇有抓破者係在第七日以前仍必灌復漿水如在八九日以後則不能灌復然其毒已引動洩破亦無妨礙或有隨而結痂者倘成膿不乾用武夷茶煎濃洗之或黃豆皮煎水洗之或删脂膏、鯽魚膏、蠟梅油貼之皆可若

成膿而不能合口用生肌散摻之（外洋原有藥水藥膏治此立效因不能常得故不錄）

以上各條皆予所親試而立效者引無不出出無不佳不患後災不憂復發以醫痘至難之事今變而爲至易莫非上蒼愛憐赤子有意使然夫父母之于子未有不欲其以生以長以至成人顧聽其自出天花症有險易醫

有賢愚。懸懸莫必。孰若趁其毒之未發。引而出之。不費一錢。不受一嚇。何等放心。何等快意耶。所願爲父母者深信勿疑。同志者廣爲傳布。此則予之厚望。亦凡爲父母者所厚望也夫。

方藥

〇治痘損破膿水不止

綿繭散

取出蠶蛾繭不拘多少將生明礬爲末塡入繭內燒煆成灰研爲細末摻之其水自乾　或用甘草水浸過其灰候乾復研爲末摻之其性更醇

又方

每繭入明礬伍分（煆過）其礬壹兩加配陀僧

伍錢白芷壹錢爲末以蜜調敷

捲舒散

菉豆（壹兩）茶葉（伍錢）雄黃（叁分）冰片（貳分）

共爲細末加痘乾用芙蓉花油或臘梅花油開搽若痘濕則用末摻之

又方

松花粉（貳錢）黃丹（壹錢）研勻摻之

又方

用武夷茶煎濃水洗淸膿拭乾以京都胭脂膏貼之或用鯽魚膏貼之或用蠟梅花油潤紙貼之亦可

〇治痘潰爛

灰草散

荔枝殼（微燎存性）草紙（燒灰存性）多年陳茅草（晒乾）

第一〇一七册　續修四庫全書　第28版反内

三味共爲細末摻于爛處即收水結痂

白龍散

用陳久乾牛糞燒過取中間白者研末敷之

豆灰散

黃豆燒灰研爲細末摻之

○治痘潰爛流血不止

敗毒散

取多年蓋墻屋之爛草或稻草洗淨泥垢曬乾爲末　此久經風霜雨露之滋而感天地陰陽之氣善解瘡毒收濕氣也

○治痘破成坑不能合口

生肌散

黃連貳錢　黃柏貳錢　甘草叁錢　以上俱生用

地骨皮貳錢　五棓子貳錢　枯礬貳錢　共爲細末摻之

○治痘後諸瘡

金華散

黃連　黃柏　黃芩　黃丹　大黃（以上生用）輕粉（各等分）　麝香少許　共爲細末瘡乾則用豬油調敷瘡濕則摻之

○治痘疔

拔毒散

雄黃　輕粉　共爲細末用胭脂水調敷

○治痘風癬

黃豆衣殼煎水洗之自散

○治餘毒紅腫（凡敷藥皆留頂勿敷使其毒由頂出以下皆同）

三痘散

菉豆　黑小豆　赤小豆　共爲末調醋敷之或以七夕水調敷

又方

用豆心渣敷患處

又方

口嚼爛白豆敷之

又方

用紫花地丁搗爛外敷任無名腫毒無有不退

芙蓉膏

用芙蓉花或葉或皮或根俱可（花更佳）黄荆子各等分共搗爛用雞蛋白調敷兩三次立效

必勝膏

馬齒莧搗汁　豬膏　蜜糖　共熬膏敷之

如意膏

南星捌錢　半夏壹兩　大黄壹兩　以上俱生用

白芷伍錢　鬱金伍錢　姜黄伍錢　蒼术五錢

共爲末用醋調敷

又方

黄豆　姜葱　共搗敷之亦消

引痘略終

# 劉涓子鬼遺方卷第一（并序）

龔　慶宣　撰

昔劉涓子晉末於丹陽郊外照射忽見一物高二丈許射而中之如雷電声若風雨其夜不敢前追詰旦率門徒子弟數人尋蹤至山下見一小兒提罐問何往爲我王被劉涓子所射取水洗瘡而問小兒曰主人是誰人云黄父鬼仍將小兒相隨還來至門聞擣藥之聲比及遥見三人一人開書一人擣藥一人卧尒乃齊唱叫突三人並走遺一卷癰疽方并藥一臼時從宋武北征有被瘡者以藥塗之即愈論者云聖人所作天必助之以此天授武王也於是用方爲治千無一失姊適余從祖叔涓子寄姊書具叙此事并方一卷方是丹陽白薄紙本寫今手跡尚存從家世能爲治方我[illegible]叔傳之孫道慶與余隣居情款異常臨終見語家有神方兒子幼稚苟非其人道不虚行尋卷詳候兼辨藥性欲以相傳屬余既好方術受而不辞自得此方于今五載所治皆愈可謂天下神驗劉氏昔既龔方故草寫多無次第今輒定其前後族類相從爲此一部流布鄉曲有識之士幸以自防齊永明元年太歲巳夘五月五日撰道慶曰王祖劉氏有此鬼方一部道慶祖考相承謹按處治万無一失舅祖涓子兄弟自寫寫稱云無紙而用丹陽録永和十九年資財不薄豈復無紙是以此別之耳

黄父曰夫言癰疽何以别之岐伯荅曰榮衛稽留於經脉之中久則血澁不行血澁不行則衛氣從之不通壅遏不得行火不止熱勝熱勝則肉腐爲膿然不能陷膚於骨髓不爲燋枯五藏不爲傷故曰癰　黄父曰何謂疽岐伯曰熱氣浮盛當其筋骨良肉無餘故曰疽疽上皮肉以堅上如牛領之皮癰者薄以澤背其候也　黄父曰及如所說未之癰疽之性名發起處所許候形狀治与不治死活之期願一一聞之

岐伯曰癰疽圖曰

赤疽發額不寫十餘日死其五日可刺也其膿赤多血死未有膿可治人年　二十五　三十一　六十、　九十五者在額不可見血見血者死

禽疽發如軫者數十數其四日腫合牽核痛其狀若攣十日可刺其肉發身核寒齒如噤欲痓如是者十五日死

杼疽發項若兩耳下不寫十六日死其六日可刺其色黑見膿而癰者死不可治人年　十九　二十三　三十五　三十九　五十一　五十五　六十一　八十七　九十九

百神在耳下不可見血見血者死

丁疽發兩肩此起有所逐惡結血流內外榮衛不通發爲丁疽三日身腫痛甚口噤如痓狀十一日可刺不治二十日死

蜂疽發髀背起心腧若連肩骨二十日不治死八日可刺其色赤黑膿見青者死不可治人年　一十八　二十四　三十五　六十七　七十二　九十八者　百神在肩不可見血見血者死

陰疽發髀若陰股始發腰強內不能自止數飲不能多五日堅痛不治三歲而死

刺疽發起肺腧不寫二十日死其八日可刺發而赤其上肉如椒子者死不可治人年　十九　二十五　三十九　三十九　五十七　六十　七十三　八十一　九十七

百神在背不可見血見血者死

脉疽發頸項如痛身隨而熱不欲動悄悄或不能食此有所

大畏恐駭而不精上氣嗽其發引耳不可以腫二十日可刺不刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不寫死九日可刺不刺其上赤下黑若青膿黑死發血膿者不死

首疽發熱八十日一方云八九日大熱汗頭引血盡如嗽身熱同同如沸者皮頰腫淺刺之不刺二十日死

榮疽發脅起若兩肘頭二十五日不寫死九日可刺膿多赤白而可治也人年　一歲　十六　二十六　三十二　四十八　五十八　六十四　八十　九十六　百神在脅不可見血見血即死

行疽發如腫或後合相從往來不可要其所在刺之即愈

勇疽發股起太陰若伏鼠二十五日不寫死其十日可刺勇疽發膿青黑者死白者尚可治不可治人年十一　十五　二十　三十一　三十三　四十六　五十九　六十三　七十五　九十一　百神皆在尻尾不可見血見血者死

摽叔疽發背熱同同耳聾後六十日腫如聚水其狀若如此者可刺之但出水後及有血出即除愈也不可治人年　五十七　六十五　七十三　八十一　九十七者　百神在背不可見血見血者死

瘭疽發足趺若足下三十日不寫死其十二日可刺瘭疽者白膿不太多其瘡上痒赤黑者死不可治人年　十三　二十九　三十五　六十一　七十三　九十三　百神在足不可見血見血者死

衝疽發小腸痛而振寒熱四日五日悄悄六日而變刺之五十日死

敦疽發兩指頭若五指頭七八日不寫死其四日可刺其發而黑擁者不堪未過指節可治（一方不呼為敦疽恐是刺寫明堂引為敗疽）

疥疽發腋下若兩臂兩掌中振寒熱而嗌乾者飲多即嘔心煩悄悄六十日而漸合者如此可有汗如無汗者死（一方去床疽明堂亦引為床疽）

筋疽皆發脊兩邊大筋其色蒼八日可刺若有膿在肌腹中十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱而赤六十日可刺如刺無血三四日病愈

搔疽發手足五指頭起節其色不變十日之內可刺過時不刺後為蝕有癰在脉腋三歲死

叔疽發身腫牽核而身熱不可以行不可以屈申成膿刺之以除

白疽發髀若肘後痒自痛傷乃身熱多汗五六處有者死心主癰疽在股脛六日死發膿血六十日死

黑疽發腫居背大骨上八日可刺過時不刺為骨疽

骨疽膿出不可止壯熱碎骨六十日死脅少陽有癰腫在頸八日死發膿血者十日死

倉疽發身痒後痛此故傷寒氣入藏篤發為倉疽九日可刺之不刺九十日死矣

腰太陽脉有腫交脉屬於陽明在頸十日死發腫七十日死

尻太陽脉有膿腫癰在足心少陽八日死發膿血六十日死或八十日死

頭陽明脉有腫癰在尻六日死發膿血六十日死

股太陰有腫癰在足太陽十七日死發腫血百日死

肩太陽脉有腫癰在頸八日死發膿血百日死

足少陽脉有腫癰有脅八日死發膿血六百日死

手陽明脉有膸癰在腋淵一歳死發膿三歳死

黒疽發腋淵死

黒疽發耳中如米大此疽不治死

黒疽發肩死黒疽發缺盆中名曰伏疽不治死

赤疽發於髀半夜可治出歳死

黒疽發肘上下不死可治

髀解除指本黒頭赤死

黒疽發掌中不死可治

赤疽發陰股軟可治堅死

赤疽發肥腸死

黒疽發膝臏軟可治堅不可治

赤疽發掌中不可治

黒疽發趺上堅死

足下久腫癰色赤死

癰高而光者不大熱用薄雍其肉平平無異而紫色者不須治但以黄耆并淡竹葉湯申其氣耳癰平而痛用八物黄耆薄大癰七日小癰五日其自有堅強色訡寧生破發背及發乳若熱手近不得者令人之熱熟先服王不留行散外散外摩發背大黄膏若背生破無善在乳者熟之候手按之若隨手起便是熟針法要膿看以意消息之肯背不可過一寸針良久不得膿即以食肉膏散着兊頭肉癰口中人躰熱氣歇服木瓜散五日後癰欲差者排膿内寒散

凡破癰之後病人便連綿欲死内寒熱腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連是風毒耳勿針可服昇麻湯外摩膏破癰口當合流下三分近一分針唯令極熱便不痛破癰後敗壞不差者作猪蹄湯洗之日再下湯二日故可用冬六七日湯半劑亦可用肯中斷氣斷氣者當入闇中以手按左眼視右眼見光者肯中結癰若不見光者熛疽内發針傷脉血不出住實不寫留成癰腎脉來者大漸小陰結若肌肉瘒癰瘢為發寸口如此來大如未漸小矣

有黒色者是石留黄毒　有赤色者是丹砂毒　有青色者是硐砂毒　有似盐顆者是鍾乳毒　有黄水者是杏桃人毒　有白水者是附子乾薑毒　有膿者熱肉麪等毒硐砂發　白雄鴨項上血一合已來取黒鈆湯一茶梡調服之解

鍾乳發　雄雞肘上血一合將鐵粉湯一茶梡調服之解

附子發　取附子皮三半豉半升相和以水一升煎約一茶梡服之解

丹砂發　取黒鈆黄耆防風伏龍肝各半兩水一升煎半茶梡去滓服之解

劉消子鬼遺方卷第一

## 劉消子鬼遺方卷第二

治金瘡止血散方
治金瘡血肉瘻蝙蝠散方
治金瘡肉瘻蒲黄散方
治金瘡箭肉不出白蘞散方
治金瘡中腸出小麥散方
治金瘡腸出欲入磁石散方
治金瘡煩悶心煩石膏散方
治金瘡先有散石消石散方
治金瘡痛不可忍當歸散方
治金瘡弓弩所中悶絶琥珀散方
治金瘡弓弩所中筋急弩筋散方

治金瘡內傷虵啣散方
治金瘡中筋骨續斷散方
治金瘡煩疼麻黃散方
治金瘡煩滿白薇散方
治金瘡去血當歸散方
治金瘡去血多虛蓯蓉散方
治金瘡內塞澤蘭散方
治金瘡內塞黃耆散方
治金瘡中茵藥藍子散方
治金瘡大渴瞿麥散方
治被打腹中瘀血蒲黃散方
治癰疽金瘡止痛生肉膏方
治癰疽金瘡生肉甘菊膏方
治癰疽金瘡生肉膏方
治金瘡腹內瘀血烏雞湯方
治金瘡內有瘀血未及得下烏雞湯方
治金瘡有瘀血桃核湯方
治金瘡驚悸㹠心湯方
治金瘡癰疽生肉膏方
治被打有瘀血白馬蹄散方

治金瘡止血散方
烏章根（三兩）　白芷（一兩）　鹿茸（二分燒灰）　當歸（一兩）
芎藭（一兩）　乾地黃（一兩切蒸焙）　續斷（一兩）
右七味擣篩令調着血出處即止

治金瘡血肉瘻蝙蝠消血散方
蝙蝠三枚燒令煙盡沫下絹篩之
右以水服方寸匕一日服令盡當下如水血消也

治金瘡肉瘻蒲黃散方
七月七日麻勃（一兩）　蒲黃（二兩）
右二物擣篩爲散溫酒調服一錢匕日五服夜再兩服

治金瘡箭肉中不出出箭白斂散方
白斂（二兩）　半夏（三兩湯洗七遍生薑浸一宿熬過）
右二味爲末調水服方寸匕日三服若輕淺瘡十日出深二十日出終不停住肉中

治金瘡中腹腸出不能內之小麥飲噴瘡方
取小麥五升水九升煮取四升去滓復以綿度濾之使極冷傍含噴之瘡腸自上漸漸入以冷水噴其背不中多人見亦不欲令傍人語又不可病人知或晚未入取病人席四角令病人舉搖須臾腸便自入十日之內不可飽食頻食而宜少勿使病人驚驚則殺人

治金瘡腸出欲入磁石散方
磁石（三兩）　滑石（三兩）
右二物下篩理令調白飲方寸匕日五服夜再服

治金瘡煩悶止煩白芷散方
白芷（二兩）　芎藭（二兩）　甘草（二兩炙）
右三味熬令變色擣爲散水調服方寸匕日五服夜再服

治金瘡先有散右煩悶欲死大小便不通止煩消血解散消石散方
消石　澤瀉　白斂　芍藥　寒水石　苦蔞（已上各一兩）
右六味擣篩爲散水服方寸匕日夜各一服或未通稍增之

治金瘡不可忍煩疼不得住止痛當歸散方
當歸　甘草（炙）　藁本　桂心　木占斯（已上各一兩）

右五味合擣篩令調水服半方寸匕日三服夜一服

治金瘡弓弩所中悶絶無所識琥珀散方

琥珀隨多少擣篩以童子小便服之乃熱不過三服便差

治金瘡弓弩所中筋急屈伸不得敗弩散方

乾地黄（十分） 乾棗（三枚） 杜仲（二分） 當歸（四分）

附子（四分炮） 故敗弩筋（燒灰取五分）

右七味合擣篩理令匀温酒服方寸匕日三服夜一增至三

治金瘡内傷蛇啣散方

蛇啣 甘草（炙） 芎藭 白芷 當歸（各一兩） 續斷

黄芩 澤蘭 乾薑 桂心（各三分） 烏頭（五分炮）

右十一味合擣篩理令匀酒服方寸匕日三服夜一服

治金瘡中筋骨續斷散方

芎藭（一兩半） 乾地黄（二兩） 蛇啣（二兩） 當歸（一兩半） 蓯蓉（一兩半）

乾薑（三分炮） 續斷（三兩） 附子（三分炮） 漢椒（三分出汗去目） 桂心（三分）

人參（一兩） 甘草（一兩炙） 細辛（二分） 白芷（三分） （一本用芍藥一兩半）

右十四味擣篩理令匀調温酒服之方寸匕日三服夜一服

治金瘡煩疼麻黄散方

麻黄（六分去節） 甘草（五分炙） 乾薑（三分） 附子（三分炮） 當歸（三分） 白芷（三分）

續斷（三分） 黄芩（三分） 芍藥（三分） 桂心（三分） 芎藭（三分）

右十一味擣篩理令匀調温酒服方寸匕日三服夜一服

治金瘡煩滿疼痛不得眠睡白薇散方

白薇 苦蔞 枳實（炒） 辛夷（去毛） 甘草（炙）

石膏（已上各一兩） 厚朴（二分炙） 酸棗（二分炙）

右八味爲末調温酒服方寸匕日三服夜一服

治金瘡去血多虚竭内補當歸散方

當歸（三分） 芍藥（五分） 乾薑（三分） 辛夷（去毛二分） 甘草（三分炙）

右五味擣篩理令匀調温酒服方寸匕日三服夜一服

治金瘡去血多虚竭内補蓯蓉散方

蓯蓉 當歸 甘草（炙） 芎藭 黄芩 桂心 人參

芍藥 乾薑 吴茱萸 白及 厚朴（炙） 黄耆（各一兩） 蜀椒（三分出汗去目閉口）

右十四味篩理令匀調温酒服方寸匕日三服夜一服

治金瘡内塞澤蘭散方

澤蘭 防風 蜀椒（去汗目閉口） 石膏末 附子（炮） 乾薑

細辛 辛夷（去毛各二兩） 芎藭（三分） 當歸（三分炒） 甘草（四分炙）

右十一味篩理令匀調温酒服方寸匕日三夜一服膿多倍甘

草渴加苦蔞二分煩加黄芩二分腹滿氣短加厚朴二分

瘡中血瘀加辛夷一倍

治金瘡内塞黄耆散方

黄耆（三兩） 芎藭 白芷 當歸 麻黄（去節） 鹿茸

黄芩 細辛 乾薑 芍藥 續斷 桑虫屎（已上各一兩）

附子（半兩炮） 山茱萸（一兩）

右十五味擣篩理匀調温酒服方寸匕日三服夜一服漸

可至二匕

治金瘡中菵藥解毒藍子散方

藍子（五合） 升麻（八兩） 甘草（四兩炙） 王不留行（四兩）

右四味擣篩理令匀調冷水服二方寸匕日三夜二及以

方寸匕水和匀塗瘡上毒即解去矣

治金瘡大渴内補瞿麦散方

瞿麦 芎藭 當歸 甘草（炙） 乾薑 桂心 續斷

厚朴（炙） 白歛 蜀椒（去目閉口汗） 辛夷（去毛） 牡蠣（末） 芍藥

桔梗 乾地黄 防風（各三分） 細辛（二分） 苦蔞（一分） 人參（三分）

右十九味擣篩理令匀調温酒服方寸匕日三夜一或筋

骨斷更加續斷三分

治被打腹中瘀血蒲黃散方

蒲黃（一升）　當歸（二兩）　桂心（二兩）

右三味擣篩理勻調酒服之方寸匕日三夜一不飲酒熟水下

治癰疽金瘡續斷生肌膏方

續斷　乾地黃　細辛　當歸　芎藭　黃耆

通草　芍藥　白芷　牛膝　附子（炮）　人參

甘草（各二兩）　臈月猪脂四升

右十四味㕮咀諸藥內膏中漬半日微火煎三上候白芷色黃膏即成傅瘡上日四五膏中是猪脂煎

治金瘡癰疽止痛生肌甘菊膏方

茵草　芎藭　甘草（炙）　防風　黃芩　大戟（已上各一兩）

生地黃（四兩）　芍藥（一兩半）　細辛　大黃　蜀椒（去目閉口汗）

杜仲　黃耆（各半兩）　白芷（一兩）

右十四味㕮咀以臈月猪脂四升微火煎五上下白芷候黃成膏一方添甘菊二兩以傅瘡上日易兩次

治癰疽金瘡生肌膏方

大黃　芎藭　芍藥　黃耆　獨活

當歸　白芷（已上各一兩）　薤白（二兩別方一兩）　生地黃（一兩別方二兩）

右九味合薤㕮咀以猪脂三升煎三上下白芷黃膏成絞去滓用磨之多少隨其意

治金瘡腹內有瘀血烏雞湯方

烏雌雞（一隻）　大黃（三兩）　細辛（三兩）　人參（一兩）　甘草（一兩炙）

地黃（三兩）　杏人（一兩去皮雙人）　盲虫（一兩）　當歸（二兩）　芍藥（一兩）

黃芩（一兩）　桃人（二兩去皮尖）　大棗（二十枚）

右十三味理烏雞如食法以水二斗煮雞取一斗㕮咀諸藥內雞汁中更煮取三升絞去滓通寒溫傷出困甚者初服五合以一日二夕盡湯便應下食之粥慎食他物

治金瘡內有瘀血未及得出而反成膿烏雞湯方

烏雞（一隻）　白芷　麥門冬（去心）　甘草（炙）

芍藥　當歸（已上各一兩）　桂心（二兩）　瓜練（二兩）

右八味先理雞如食法以水二斗煮取七升㕮咀諸藥內汁中更煮取三升去滓服七合日三夜勿食

治金瘡有瘀血桃核湯方

䗪虫（三十枚熬）　虻虫　水蛭（各三十枚熬）　桂心（二分）

大黃（五兩）　桃核（五十枚去皮切）

右六味酒水各五升㕮咀合煮取三升去滓服一升日三服

治金瘡驚悸心中滿滿如車所驚怛豘心湯方

豘心（一具）　人參　桂心　甘草（炙）　乾地黃

桔梗　石膏（末）　芎藭（各一兩）　當歸（二兩）

右九味細切剉諸藥㕮咀先以水二斗煮心取汁八升內諸藥煮取一升一服八合一日令盡

治金瘡癰疽生肉膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒（去目閉口汗）　當歸

芍藥　薤白　芎藭　獨活　蓯蓉

白芷　丹參　黃芩　甘草（已上各一兩）　臈月猪脂（二斤半）

右十五味㕮咀以苦酒一升合漬諸藥夏一夜冬二夜浸以微火煎三上候苦酒氣成膏用之

治被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡擣篩溫酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血疾消爲水

劉涓子鬼遺方卷第二終

# 劉涓子鬼遺方卷第三

治強壯熱癰疽大黄湯方
治發癰疽熏結實淡竹葉湯方
治發背發乳癰疽生地黄湯方
治乳癰已服前湯又淡竹葉湯方
治癰疽虛熱生地黄湯方
治癰疽内虛熱大渴黄耆湯方
治背生地黄湯方
治癰疽内虛黄耆湯方
治癰疽五味竹葉湯方
治癰疽發背乳遠志湯方
治發背乳下復住白石脂湯方
治發癰疽取痢竹葉湯方
治發癰疽痢小便竹葉湯方
治發癰疽痢後小竹葉湯方
治發背癰熏味竹葉湯方
治發背已潰白石脂湯方
治發背大去膿汁黄耆湯方
治癰疽内虛生地黄湯方
治發背黄耆湯方
治炎疽枳實湯方
治腸癰大黄湯方
治背上欲有瘀大黄湯方
治婦人妬乳辛夷湯方
治婦人乳結腫黄耆湯方
治癰腫熱盛黄耆湯方
治發癰疽去膿血多内補黄耆湯方
治癰疽去膿多虛滿竹葉湯方
治癰腫增損竹葉湯方
治癰壞後黄耆湯方

治年四十已還強壯常大患熱癰无定處大小便不通大黄湯方

大黄（三兩）　梔子（二十枚）　升麻（二兩）　黄芩（三兩）　芒消（一兩二兩別）

右五味切以水五升煮取二升四合去滓下消絞調分溫三服快痢為度

治發癰疽熏結實大小便不通寒熱已服五痢湯吐出不得下大渴煩悶淡竹葉湯方

淡竹葉（切四升去火）　苦蔞（四兩）　通草　前胡　升麻　茯苓　黄芩　知母　甘草炙　石膏（末已上各二兩）　生地黄（十兩）　芍藥（一兩）　大黄（三兩）　黄耆（三兩）　當歸（一兩半）　人參（一兩）

右十六味先以水一斗六升煮竹葉去葉取九升内諸藥後煮取三升二合分四服日三夜一快痢便止不必盡湯湯盡不痢便合取痢

治發背發乳四躰有癰疽虛熱大渴生地黄湯方

生地黄（十兩）　竹葉（四升）　黄芩　黄耆　甘草炙　茯苓　麦門冬（去心已上各三兩）　升麻　前胡　知母　芍藥（各二兩）　苦蔞（四兩）　大棗（二十枚去核）　當歸（一兩半）　人參（一兩）

右十五味先以水一斗五升煮竹葉取一斗去葉内諸藥煮取三升六合分為四服日三夜一

治發背乳癰已服生地黄湯取利後服此淡竹葉湯方

淡竹葉（四升）　麦門冬（去心）　黄耆　芍藥　乾地黄

生薑（已上各三兩） 前胡 黃芩 升麻 遠志（去心） 苦蔞（各二兩）
大棗（十四枚） 當歸（一兩）
右十三味先以水一斗八升煮竹葉及小麥一斗去滓內
諸藥再煮取三升分溫三分（右論煮竹葉小麥服是麥門冬也是小麥也）

治癰疽虛熱生地黃湯方
生地黃（五兩） 人參 甘草（炙） 黃耆 芍藥 茯苓（各三兩）
當歸 芎藭 黃芩 通草（各二兩） 大棗（二十枚） 淡竹葉（切成三升）
右十二味先以水二斗煮了水取一斗五升去滓復諸藥
再煮取四升八合一服八合日三夜再能頓服爲佳

治癰疽內虛熱渴甚黃耆湯方
生地黃（八兩） 竹葉（切成三升） 小麥（二升） 黃耆 黃芩 前胡
大黃（各三兩） 苦蔞（四兩） 通草 芍藥 升麻 伏苓
甘草 知母（各二兩） 人參 當歸（各一兩）
右十六味先以水二斗煮竹葉及小麥取一斗二升去滓
復煮諸藥取四升分四服日三夜一小便利除通草伏苓
加麥門冬腹滿加石膏三兩熱盛去人參當歸

治甘生地黃湯方
生地黃（八兩） 人參 甘草（炙） 芍藥（各三兩） 通草 伏苓
黃耆 黃芩（各三兩） 淡竹葉（切二升） 大棗（二十枚） 當歸 芎藭（各一兩）
右十二味先以水三斗煮竹葉取一斗去滓內諸藥再煮
四升一服八合日三夜再若能每服一升佳

治癰疽內虛黃耆湯方
黃耆 人參 甘草（炙） 芍藥 當歸 生薑（各三兩）
大棗（二十枚） 乾地黃 茯苓（各二兩） 白朮（一兩） 遠志（一兩半）
右十一味以水一斗三升煮取四升去滓分溫四服

治癰疽五味竹葉湯方
竹葉（切三升） 五味子 前胡 當歸 乾地黃 人參（各二兩）
小麥（二升） 黃耆 黃芩 麥門冬（去心） 生薑（各三兩） 甘草（一兩半炙）
升麻（一兩） 大棗（十四枚） 桂心（半兩）
右十五味先以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內諸藥
煮取三升分溫四服日三夜一

治癰疽發背乳大去膿後虛惙少氣欲死服此遠志湯方
遠志（去心） 當歸 甘草（炙） 桂心 芎藭（各一兩） 黃耆
人參 麥門冬（去心各三兩） 茯苓（二兩） 乾地黃（二兩） 生薑（五兩） 棗（十四枚）
右件十三味以東流水一斗煮取三升二合分溫四服日三夜一

治發背乳下復拄服此白石脂湯方
白石脂（四兩） 龍骨（三兩） 當歸 桔梗 女萎 黃連（去毛）
甘草（已上各二兩） 白頭翁（一兩） 乾薑（二兩）
右九味以水九升煮取三升二合分四服下住便止不必
盡服當下未即來日止

治發癰疽取利熱小便退不用食物竹葉湯方
淡竹葉（切三升） 小麥（二升） 乾地黃 人參 黃芩 前胡
升麻（各二兩） 麥門冬（去心） 生薑 黃耆 芍藥（各三兩）
大棗（十四枚） 桂心（半兩） 遠志（半兩去心） 當歸（一兩） 甘草（炙）
右十六味切先以水一斗八升煮竹葉小麥取一斗去滓
內諸藥又煮取三升分二服羸者分四服日三夜一

治癰疽取下後熱少退小便不利竹葉湯方
淡竹葉（切三升） 小麥（三升） 乾地黃（四兩） 黃耆 人參
甘草（炙） 芍藥 石膏（末） 通草 升麻
黃芩 前胡（各二兩） 大棗（十四枚） 麥門冬（三兩去心）
右十四味先以水一斗六升煮竹葉小麥取九升去滓內諸
藥煮取三升二合強即分三服羸即四服日三夜一

治癰疽取利後熱小便不利竹葉湯方

竹葉（切三升）　小麥（二升）　人參　黃芩　前胡　芍藥

甘草（炙）　乾地黃　當歸　桂心（各二兩）　黃耆（三兩）　麥門冬（三兩去心）

龍骨（三兩碎）　牡礪（一兩末）　赤蛸蜋（三十枚炒）　大棗（十四枚去核）

右十六味以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內諸藥煮取四升分四服日三夜一

治發背癰及發乳兼味竹葉湯下

淡竹葉（切三升）　小麥（三升）　黃耆　黃芩　五味子

人參　前胡　乾地黃　當歸（各二兩）　大棗（十四枚）

麥門冬（二兩去心）　升麻（一兩）　桂心（半兩）　甘草（一兩炙）　生薑（三兩）

右十五味以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內藥煮取三升分溫三服一日服

治發背已潰而下不住白石脂湯方

白石脂（四兩）　龍骨（三兩）　當歸（二兩）　桔梗（二兩）

女萎　白頭翁（各四兩）　黃連（二兩）　乾薑（三兩）

右八味以水九升煮取三升三合去滓服八合日三夜一

治發背已潰大膿汁虛惙少氣力內補黃耆湯方

黃耆（三兩）　乾地黃　人參　茯苓（各二兩）　當歸

芍藥　芎藭　桂心　遠志（去心各一兩）　甘草（一兩半）

麥門冬（三兩去心）　生薑（五兩）　大棗（十四枚）

右十三味以水一斗煮取三升二合去滓分溫四服日三夜一

治癰疽內虛熱生地黃湯方

生地黃（五兩）　人參　甘草（炙）　芍藥　茯苓

芎藭　通草　黃芩　當歸（各二兩）　大棗（二十枚）

竹葉（切三升）

右十二味以水三斗煮竹葉取半去滓內諸藥煮取四升分五服日三夜二能服一升可佳

治發背黃耆湯方

黃耆　黃芩　遠志　麥門冬（去心各二兩）　乾地黃

人參　芎藭　甘草（炙）　芍藥　當歸（各一兩）

大棗（二十枚）　生薑（五兩）　雞肶胵二具（勿去皮）　桒螵蛸（十四枚炙）

右十四味㕮咀以水一斗先煮取四升五合一服九合日三服夜一服

治炎疽枳實湯方（甘林所秘不得）

枳實（炙）　夜干　升麻　乾地黃　黃芩

前胡（各三兩）　犀角（二兩半）　大黃（二兩半）　麝香（半兩）　一方用甘草（二兩）

右九味㕮咀以水九升煮取分溫三服須差也

治腸癰大黃湯癰之爲病訴小腹腫痞堅按之則痛或在膀胱左右其色或赤或白色堅大如掌熱小便欲調時色色汗出時復惡寒其脉遲堅者未成膿也可下之當有血脉數膿成不可服此方

大黃（四兩）　牡丹（三兩）　芥子（半升）　消石（三合）　桃人（五十枚去皮熬切之）

右五味㕮咀以水六升五合分爲兩服膿下無者下血大良

治背上初欲作疹便服此大黃湯方

大黃（三兩）　梔子（一百枚去皮）　升麻　黃芩　甘草（炙各三兩）

右五味以水九升煮取三升半分爲三服得快下數行便上不下更服

治婦人妬乳辛夷湯方

辛夷（一升去毛）　大棗（三十枚）　桂長一尺　防風（二分）　白术

甘草（一尺炙）　生薑（二分）　澤蘭（一升切）

右八味切以水一斗煮取三升分溫三服

治婦人客熱乳結腫或潰或作癰內補黃耆湯方

黃耆　茯苓（各三兩）　芍藥（二兩）　麥門冬（去心三兩）　甘草（炙二兩）
厚朴（炙一兩）　人參（三兩）　生薑（四兩）　乾地黃（二兩）
右九味切以水一斗二升煮取三升分五服日三夜一

治癰腫患熱盛黃耆湯方

黃耆　麥門冬（去心三兩）　黃芩（六分）　梔子（十四枚）
芍藥（三兩）　苦蔞（二兩）　乾地黃（二兩）　升麻（一兩）
右八味剉以水一斗煮取三升分溫三服

治發癰疽腫潰去膿多裏有虛熱內補黃耆湯方

黃耆（二兩）　茯苓　桂心　人參（各二兩）　麥門冬（去心三兩）　甘草（炙六分）
生薑（四兩）　遠志（去心二兩）　當歸（二兩）　五味子（四兩）　大棗（二十枚）
右十一味切以水一斗煮取四升分六服日四夜二

治癰去膿多虛滿上氣竹葉湯方

竹葉（切二升）　半夏（湯洗二兩）　甘草（炙二兩）　厚朴（炙三兩）
小麥（二升）　生薑（五兩）　當歸（一兩）　麥門冬（炙二兩）
人參　桂心（各一兩）　黃芩（三兩）
右十一味切以水一斗半先煮竹葉小麥取九升去滓又煮諸藥取二升分溫三服

治癰疽腫煩熱增損竹葉湯方

竹葉（切一握）　當歸　茯苓　人參　前胡　黃芩
桂心　芍藥（各二兩）　甘草（炙三兩）　大棗（二十枚）　小麥（一升）　麥門冬（去心一升）
右十二味切以水一斗六升煮竹葉小麥取一斗一升去滓內諸藥煮取三升分服日三夜重加黃耆二兩消中惡加生薑六兩下者減芍藥黃芩各六分如躰強羸者以意消息之

治癰疽後補塞去客熱黃耆湯方

黃耆　生薑　石膏（末）　甘草（炙）　芍藥
升麻　人參（已上各二兩）　知母　茯苓（各一兩）　桂心（六分）
麥門冬（去心二兩）　大棗（十四枚）　乾地黃（一兩）
右十三味切以水一斗二升煮取四升分溫四服日三夜一

劉涓子鬼遺方卷第三

## 劉涓子鬼遺方卷第四

九江黃父癰疽論
釋癰疽色訣
相癰疽知是非灸法
相癰疽知有膿可破法
治癰疽腫松脂帖方
治癰疽松脂帖腫方
治癰疽升麻薄極冷方
治癰疽始一二痛猪肝薄方
治癰疽白蘞薄方
治癰疽腫熱盛除熱黃耆湯方
治客熱鬱積在內或生癤黃耆湯方
治癰未潰黃耆湯方
治癰內補竹葉湯方
治補度冷下赤石脂湯方
治取冷過寒下溫中湯方
治斷下補胃附子湯方
治癰及惡瘡猪蹄湯洗方
治癰腫壞多汗猪蹄湯方
治肘疽方
治癰㝡膿增損散方

治癰消膿木占斯方

治發背婦人發房木占斯散方

治諸癰腫未潰瞿麦散方

治瘡食惡肉散方

治癰疽食惡肉散方

治癰疽兊膏方

治食宍青龍膏方

治癰疽金瘡生肌膏方

治癰發壞出膿血黃耆膏方

治熛疽侵淫瘡膏方

治熛疽或如桃核雞子燩熱愉湯方

治熛諸疽十指燩熱猪蹄湯方

治熛疽多汁浸大粉散方

治丹癰疽始發燩熱愉湯方

## 黃父癰疽論

九江黃父問於岐伯曰余聞腸胃受穀上焦出氣以温分宍而養骨節通湊理中焦出氣如露注谿谷而滲經脉津液和調變化而赤為血血和則乘脉先滿乃注經絡經絡皆盈乃注於經絡陰陽已張因息乃行行有經紀周有道理与天合同不得休止切而調之從虛去實寫則不足疾則氣留去虛補實則有餘血氣已調形神乃持余已知血氣平与不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期期有遠近何以度之可知聞乎

岐伯曰經脉流行不止與天同度與地同紀故天宿失度日月薄蝕也經始紀水道流溢草蓂不成五穀不植經路不通民不往來巷聚邑居別離異處血氣猶然則言其故

夫血脉榮衛周流不休上應星宿下應經數寒客於經絡之中則血泣泣則不通不通則歸之不得復反故癰腫与寒氣化為熱熱勝則肉腐肉腐則為膿膿不寫則爛筋筋爛則傷骨骨傷則水髓消不當骨肉不寫筋枯空虛筋骨肌肉不得相親經脉敗漏薰於五藏五藏傷故死矣

黃父曰願聞於癰疽之形与其期日

岐伯曰略說癰疽極者一十八種癰發於嗌名曰猛疽猛疽不治則化為膿膿塞其咽半日死其為者寫則已含豕膏无冷寫三日而已（一方无冷食）發於頸者名曰夭疽其狀癰大而赤黑不急則熱氣下入淵脉腋前傷任脉內薰肝脉十餘日死陽氣大發消腦名曰腦鑠其色不樂項痛如刺以藏頭乘心者不治（本作留字）發於肩及臑者名曰雌癰其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏

發於腋下赤堅者名曰米疽治之砭石欲細長踈或云塗豕六膏日以勿裹其疽堅而不潰者馬刀夾纓乃治之

發於肯者名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治十日死

發於臆者名曰甘疳其狀如穀實萋芪常寒熱急治之去其寒十歲死死後膿自出

發於脅者名曰敗訾敗訾者女子之病也久之其疾大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉陵翹草陵根各一升水六升煮之竭為三升即強飲厚衣坐釜上令汗出至足已

發於股陽明名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿附骨不急治四十日死

發於股陰名曰赤施疽不急治六日死在兩股之內不治六日死（一方云十六日死）發於尻名曰兊疽其狀赤堅大急急治

之不速治三十日死

發於膝名曰雌疽其狀癰色不寒熱而堅勿破破之死須以手緩柔之乃破

諸疽發於節而相應之者不可治之也

發於陽者百日死

發於陰者四十日死

發於腦名曰菟齧其狀疢赤至胃急治之不治煞人

發於踝名曰走緩其狀癰也急不變灸而止其寒熱不死

發於足上名曰四淫其狀如癰不急治之百日死

發於足名曰厲疽其狀初小指發急治之去其黑者不輒益不治百日死

發於足指名曰脫疽其狀赤黑不死治之不衰急漸去之治不去必死矣

夫癰疽者初發始微多不為急此實奇患惟宜速治之急治不苦速成病難救以此致禍能不痛哉具述所懷以悟後賢謹按黃父癰疽論所著緩急之處生死之期如有別癰之形色難易之治如右僣納私撰是用非是先賢恐後高雅故記之名字令惑之耳

發皮宍淺腫高之赤即消不治亦愈

發筋宍深腫下之堅其色或青或黃白黑或復微熱而赤宜急治之成消中半發附骨者或未覺肉宍已殃者癰疽之甚也

凡發背外皮薄為癰皮堅為疽如此者多現先兆宜急治之皮堅甚大者多致禍矣

夫癰壞後有惡宍當者以猪蹄湯洗其穢次傳食宍膏散惡宍盡乃傳生肌膏散乃摩四邊令善宍速生當須絕房室慎風冷勿自勞動須筋脉復常乃可自勞耳不尒新宍易傷則重發便益潰爛慎之慎之

相癰疽知是非可灸法

癰疽之甚未發之兆肥渴為始始發之始或發日疽皃似若小癤或復大痛皆是微候宜善察之欲知是非重按其處是便隱復按四邊比方得失審定之後即灸第一便灸其上二三百壯又灸四邊一二百炷小者灸四邊中者灸六處大者灸八處壯數處所不患多也亦應即帖即薄令得所即消內服補暖湯散不巳服冷藥外即冷薄不巳用熱貼貼之法開其口泄熱氣

相癰知有膿可破以未

癰大堅者未有膿半堅薄半有膿當上薄者都有膿便可破之所破之法應在下逆上破之令膿得易出用排針膿深難見上宍厚而生宍火針若外不別有膿可當其上數按之內便隱痛者宍殃堅者未有膿也按更痛於前者內膿巳熟也膿泄去熱氣不尒長速速即不良

治癰疽腫松脂怗方

黃蘗　芎藭　白芷　白斂　黃耆

黃芩　防風　芍藥　茵草　白臈

當歸　大黃（各一兩）　細辛（二分）　腽脂（三兩）　松脂（二斤）

右十六味切曝乾極燥微火煎三上下手不得離布綿絞去滓貼之

治癰疽腫松脂貼方

當歸　黃耆　黃連　芍藥　黃芩

大黃　臈蜜　芎藭（各一兩）　松脂（一斤半陳）　腽脂（一合半）

右十味細切合煎微火三上下膏成綿布絞去滓向火塗

紙上貼之

治癰疽松脂貼腫方

松脂（一斤）　大黃（三分）　膃脂（一兩）　細辛（半分）　黃芩（一分半）

防風（半分）　白芷　白斂　芎藭　當歸

芍藥　茼草　黃連　白臈　黃蘗（各一分）

右一十五味細切曝令極燥先煎脂臈下松脂洋盡內諸藥三上下候色足絞以綿布水中以新竹片上火炙之施紙上貼之此藥大秘實有奇効不妄傳之

治癰疽升麻薄極冷方

升麻（一兩）　大黃（一兩）　白斂（六分）　黃耆（一兩）　黃芩（六分）

白芨（一分乾者）　牡礪（二分粉）　龍骨（一兩）　甘草（二分炙）　芎藭（一兩）

右十味篩和以猪膽調塗布傅之癰上燥易之

治癰白斂薄方

白斂　大黃　黃芩（各等分）

右三味擣篩和雞子白塗布上薄癰上二燥輙之亦可治又以三指撮置三升水中煮三沸綿注汁拭腫上數十過以寒水石沫塗腫上紙覆之燥復易一易輙以煮汁拭之晝夜二十易之

治癰疽始一二日痛微內薄令消猪膽薄方

黃耆　龍骨　青木香　梔子人　羚羊角　乾地黃

升麻　白斂　大黃　黃蘗　黃芩　芎藭

赤小豆　麻黃（去節）　黃連　犀角（一兩）

右十六味各等分擣篩以猪膽調令如泥以故布開口如小豆大以泄熱氣

治癰腫熱盛口燥患渴除熱上渇黃耆湯方

黃耆　苦蔞　乾地黃　升麻（各二兩）　麦門冬（三兩去心）

梔子（二十枚）　芍藥（三兩）　黃芩（一兩半）

右八味以水一斗煮取三升分温三服

治客熱鬱積在內或生癤黃耆湯方

黃耆（二兩）　人參（一兩）　芎藭　當歸　甘草（炙各一兩）

遠志（去心）　乾地黃（各二兩）　大棗（二十枚）　生薑（五兩）　麦門冬（去心五兩）

右十味切以水一斗二升煮取三升分温三服

治癰未潰黃耆湯方

黃耆（四兩）　甘草（二兩炙）　桂心（三兩）　芍藥

半夏　生薑（各八兩）　飴（一斤）

右七味以水七升煮取三升飴化分三服

治癰內補竹葉黃耆湯方

竹葉（切一升）　黃耆（四兩）　甘草（二兩）　芍藥（四兩）　黃芩（一兩）

人參（二兩）　桂心（一兩如冷用半兩）　大棗（十二枚）　乾地黃（二兩）　升麻（三兩）

茯苓　生薑（各一兩）

右十二味以水二斗煮竹葉澄清取九升內諸藥更煮取三升分温三服

治補度冷下赤石脂湯方

赤石脂　人參　甘草（炙）　乾薑（各二兩）

龍骨（一兩碎）　附子（大者一枚炮）

右六味切以水八升煮取二升半去滓分温三服如人行十里進一服

治取冷過寒下飴見出温中湯方

甘草（六分炙）　乾薑（六分）　附子（炮去皮破六分）　蜀椒（二百四十粒去目閉口者出汗）

右四味切以水六升煮取二升分温三服

治断下補胃附子湯方

附子（二分炮）　當歸　人參　黃連　甘草（炙各一兩）

乾薑　桂心　芍藥（各二分）　蜀椒（去汗目閉二半分）

右九味以水五升煮取一升五合去滓分溫二服

又癰瘡及惡瘡有惡宍猪蹄湯洗方

猪蹄（一具治如食法）　白斂（二兩）　白芷（二兩）　黃連（一兩）　狼牙（二兩）

芍藥（三兩）　黃芩　獨活　大黃（各一兩）

右九味以水三斗煮猪蹄一斗五升去蹄内諸藥又煮取五升洗瘡日四次甚良

治癰疽腫壞多汁猪蹄湯方

猪蹄（一具治如食法）　芎藭　甘草（炙）　大黃　黃芩（各二兩）

芍藥（三兩）　當歸（一兩）

右七味先以水斗五升煮蹄取八升去蹄内諸藥更煮取三升更去滓及溫洗瘡上日三亦可以布内湯中薄瘡腫上燥復之

治肘疽方

黃連　皂莢（各等分炙去皮子）

右二味擣下和以淳苦酒調令如泥塗滿肘以綿厚薄之日三易良

治癰疽最膿增損散方

黃耆（五分膿多倍之）　小豆（一分熱口乾倍之）　芎藭（二分肉未生倍之）

白斂（三分有膿瘡不合倍之）　苦蔞（三分若小便利倍之）

右六味擣篩令細酒調溫服方寸匕日三

治癰消膿木占斯散方

木占斯　桂心　人參　細辛　敗醤　乾薑

厚朴　甘草（炙）　防風　桔梗（已上各一兩）

右十味擣篩酒服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽亦之不能發壞者可服之瘥未壞去敗醤已發膿内入敗醤此藥時有化癰疽成水者方正桂為異故兩存焉

治發背及婦人發房并腸癰木占斯方

木占斯　厚朴（炙）　甘草（炙）　細辛　苦蔞

防風　乾薑　人參　桔梗　敗醤（已上各一兩）

右十味擣篩清酒服方寸匕日七夜四以多為善敗醤草名也病在上者當吐在下者當下膿血此謂腸癰之屬也諸病在裏唯服此藥即覺有力及癰疽便即復痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便即早愈凡俗流醫不知用此藥發背有不善而渴便勤服之若藥力行覺渴心便消散若雖服壞終无苦但晝夜服勿懈也發此藥消散不覺腫去時即愈或長服即去敗醤偏治婦人乳腫諸產疵速愈良又去唯服有異始覺背有不善之也

治諸癰疽已潰未潰瘡中疼痛膿血不絶瞿麦散方

瞿麦　白芷　黃耆　當歸　細辛

芍藥　薏苡人　芎藭　赤小豆（末各一兩）

右九味先以清酒小豆出於銅器中熬令乾復漬漬後復熬五過止然後治末合擣篩溫酒服方寸匕尽夜各五三日後痛痒者肌肉也　又方用苦酒漬小豆多痛倍瞿麦瘡由未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡人芍藥等

治癰食惡宍散方

藜蘆（一分半）　真珠（一分半）　石硫黃　雄黃　麝香（各三分）

馬齒　礬石（熬）　漆頭　蘆茹（各三分）

右九味篩擣粉瘡上亦可為膏和傅瘡上

治癰疽食惡宍散方

雄黃（一兩）　礬石（一分熬）　蘆茹（一兩）

右三味擣篩稍著之隨用多少不限一兩

治癰疽兊膏

當歸　芎藭　白芷　松脂（各二兩）

烏頭（一兩）　猪脂（二升）　巴豆（十一枚去心皮）

右七味㕮咀内膏中微火合煎三沸已内松脂攪合相得以綿布絞之去滓以膏著綿絮兊頭丈作兊兊之瘡雖深淺兊之膿就兊畫即善肉瘡淺者不足兊着瘡中日三惡肉盡則止

治食宍青膏方

白礬（二兩火燒末之）　熟梅（二升去核）　塩（三合）　大錢（二十七枚）

右四味於銅器中猛火投之摩滅成末乃和猪脂搗一千杵以塗瘡上甚痛勿怖此膏食惡宍盡復着可傅虵嚙膏塗之令善宍復生

治癰疽金瘡生肉膏方

大黃　芍藥　黃耆　獨活　白芷

芎藭（各一兩）　當歸（一兩）　薤白（二兩）　生地黃（三兩）

右九味㕮咀以盛煎猪膏三升煎三上下以綿布絞去滓用兊摩多少隨意常用之

治丹癰疽始發焮熱浸淫長成搨湯方

升麻　黃芩（各三兩）　黃連　大黃（各二兩）　當歸（一兩）

甘草（一兩炙）　芎藭（二兩）　芒消（三兩）　羚羊角屑（一兩）

右九味㕮咀以水一斗三升煮取五升絞去滓鐺中内芒消上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱帖帛搨腫上數過其熱隨手消散王練甘林所秘不傳此方

劉涓子鬼遺方卷第四

# 劉涓子鬼遺方卷第五

治癰疽敗壞生地黃膏方
治癰疽瘡生肌黃耆膏方
治發背乳急痛丹參膏方
治癰疽腫痛堅強不消黃芩膏方
治癰疽止痛鷗脂膏方
治癰疽金瘡續斷膏方
治癰疽金瘡止痛甜竹葉膏方
治癰疽敗壞生肉茵草膏方
治癰疽敗壞膿爛虵嚙膏方
治癰疽食肉膏方
治癰疽食肉大黃膏方
治癰疽食惡肉蘆茹膏方
治癰疽始作硬敗壞膏方
治久病疥癬膏方
治瘑疽惡疥癬五黃膏方
治瘑疥癬散熱水銀膏方
治面䵟皰麝香膏方
治面皻皰木蘭皮膏方
治皻皰鸕鷀屎膏方
治髮頹生髮膏方
治婦人乳腫丹參膏方
治疽漏瘑疥惡瘡膏方
治頭白頹經年五味子膏方
治久瘑疽諸瘡野葛膏方

治丹沙膏三首
赤膏治百病方
治熛疽丹沙膏方
治熛疽麝香膏方
治釘腫芎藭膏方
治熛疽始發丹沙膏方
治風温病疽諸惡瘡膏方
治瘑疥諸惡瘡丹沙膏方
治小兒頭瘡紫草膏方
治小兒熱瘡水銀膏方
治火瘡栢皮膏方
治熛疽浸淫廣大羊髓膏方
治熱毒瘡升麻膏方
治熱瘡生地黃膏方
治諸瘡爛雄黃膏方
治瘑疥疽漏水銀膏方
治痱瘰癧瘡白芷膏方
治皮膚中熱痱瘰白斂膏方
治熱瘡生地黃膏方二
治温熱諸瘡黃連膏方
治熱瘡蛇床子膏方
治熱瘡木蘭膏方
治熱灸瘡甘草膏方
治諸癰破大去膿黃耆膏方
治痱疽已潰白芷摩膏方
治諸疽瘡膏方
治鼻中塞白芷膏方
治竹木所刺手脚羊屎膏方
治湯泼人肉爛壞朮膏方
治火燒爛壞栢皮膏方
治久病瘑疽惡瘡蘆茹膏方
治婦人妬乳生瘡雄黃膏方
治惡瘡麝香膏方
治頭瘡骨疽牛屎薰方
治諸傷六物滅盤膏方

治癰疽敗壞生肉地黃膏方

生地黃（一斤）　辛夷　獨活　當歸　大黃　芎藭

黃耆　薤白　白芷　芍藥　黃芩（各三兩）　續斷（二兩）

右十二味切以臘月猪脂四升微火煎白芷色黃膏成絞

夫滓傅日四

治癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒（去目閉口汗）　當歸

芍藥　薤白　白芷　丹參　甘草（炙）

蓯蓉　獨活　黃芩（已上各一兩）　臘月猪脂（一斤半）

右十四味細切以苦酒一升二合夏即漬一日冬二夜微

火煎三上下酒氣尽成膏傅之極良

治發背乳口已合皮止急痛生宍膏方

丹參　防風　白芷　細辛　芎藭　黃芩　芍藥

甘草（炙）　黃耆　牛膝　槐子　獨活　當歸

右十三味切以臘月脂五升微火煎三上下白芷黃膏成

病上摩向火日三四

治癰腫堅強不消不可用傅貼熨黃芩膏方

黃耆　黃芩　芎藭　白斂　防風

茼草　白芷　芍藥　大黃　細辛

當歸（已上各一兩）

右十二味㕮咀以猪脂四升微火上煎一沸一下白芷黄即成膏成傅之堅硬者日可十易

治癰疽止痛生肌鷗脂膏方

松脂（七兩）　芍藥　當歸　芎藭

黄芩（各二兩）　鷗脂（七兩）　白臈（五兩）

右七味㕮咀以臈月猪脂二升二合微火煎一沸一下三十過成以摩於瘡上

治癰疽金瘡續斷生宍膏方

續斷　乾地黄　細辛　當歸　芎藭

黄耆　通草　芍藥　白芷　牛膝

附子（炮裂）　人參　甘草（炙已上各二兩）　臈月猪脂（四升）

右十四味㕮咀著銅器中下膏諸藥漬之半日微火煎三上下白芷候黄膏成傅之瘡上日四五過良

治癰疽瘡止痛生肉甜竹葉膏方

甜竹葉（五兩）　生地黄（四兩）　大戟（二兩）　臈月脂（四升）　當歸

續斷　白芷　茼草　芎藭　防風（各二兩）

甘草（一兩半炙）　芍藥（一兩半）　蜀椒（半兩去目汗閉口）　細辛

大黄　杜仲（各半兩）　黄耆（半兩）

右十七味㕮咀以猪脂微火煎五上下候白芷黄膏成傅瘡上甚良

治癰疽敗壞生肉茼草膏

茼草　當歸　薤白　黄芩　甘草（炙各二兩）

生地黄（五兩）　白芷（三兩）　大黄（四兩）　續斷（一兩）

右九味㕮咀以猪脂三升微火煎三沸三上下白芷黄膏成傅瘡良

治癰疽膿爛并小兒頭瘡牛領馬鞍革及腸中諸惡耳聾痛風腫脚疼金木水火毒螫所中衆森皆赤无所不治虵衘膏方

虵衘　大戟　大黄　芍藥　附子（炮）

當歸　獨活　茼草　黄芩　細辛

芎藭　蜀椒（去目閉口汗）　薤白（已上各一兩）

右十三味㕮咀以苦酒漬之淹一夜以猪脂二升半微火煎三上下膏成綿布絞去滓病在内酒下彈元大

治癰疽食宍膏方

松脂（五兩）　雄黄（研）　雌黄　野葛皮（各二兩）

猪脂（一斤）　漆頭蘆茹（三兩）　巴豆（一百枚去皮膜心）

右七味先煎松脂水氣尽下諸藥微火煎三上下膏成絞去滓内雄雌二黄攪調以膏着兊頭内瘡内日方六七勿宍兼新故初用病更腫赤但用如節度惡宍尽止勿使過也

治癰疽大黄食宍膏方

大黄　附子　茼草　芎藭　雄黄　眞珠末（各一兩）

白歛　礬石　黄芩　漆頭蘆茹（各二兩）　雄黄（一兩）

右十一味㕮咀六物以猪脂一升四合微火煎三上下末蘆茹下煎成膏中以塗兊頭傅瘡中須惡肉尽勿使過也

治癰疽食惡肉蘆茹散方

漆頭蘆茹　礬石　硃黄　雄黄（已上各二分）

右四味擣篩攪令著兊頭内瘡口中惡宍尽止勿使過也

治癰疽始作便敗壞發瘡膏方

羊髓（一兩）　甘草（二兩）　胡粉（五分）　大黄（一兩）　猪脂（二升）

右五味切合脂髓煎二物令洋内甘草大黄三上下去滓内胡粉攪令極調傅瘡日四五上

治久病疥癬惡瘡膏方

丹砂　雄黄　雌黄　乱髮（洗）　松脂　白蜜（已上各一兩）

蘆茹（三兩漆頭者）　巴豆（十四個去皮心）　臈月猪脂（二升）

右九味先煎乱髮消盡內松脂煎三上下成膏絞去滓末茹內膏中煎撓極調傅瘡上日三易之

治久病疥癬諸惡瘡毒五黃膏方

雌黃　雄黃　黃連　黃蘗　黃芩

青木香　白芷（各二兩）　乱髮（一團雞子大）　雞舌香（一兩）　狼跋子（四十枚）

右十味㕮咀以苦酒半升漬諸藥一夜以臈月脂三升先煎髮一沸內諸藥三五沸止絞去滓成膏傅瘡上日五易之

治病疥癬惡瘡散熱水銀膏方

水銀　礬石　虵床子　黃連（已上各一兩）

右四物兩度篩以臈月猪脂七合和并水銀攪令調打數万過不見銀膏成傅瘡若膏少益取并小兒瘡良（[illegible]宜加蘆茹一兩）

治面黖皰麝香膏方

麝香（二兩）　當歸　附子　芎藭

白芷　芍藥（已上各一兩）　細辛（二合）　杜衡（二分）

右八味㕮咀以臈月猪脂一升二合煎諸藥三上下絞去滓別末研麝香安膏中攪令調傅皰上日三易之

治面查皰木蘭膏方

木蘭　防風　白芷　青木香　牛膝

獨活　藁本　當歸　芍藥　杜衡

辛夷　芎藭　細辛（各一兩）　麝香（一分）　附子（二分炮）

右十五味㕮咀諸藥以臈月猪脂一升微火煎三沸三上下去滓末下攪令調膏成傅皰上日三

治查皰鸕鷀屎膏方

右取鸕鷀屎一升擣篩臈月猪脂調和傅之

治髮頹生髮白芷膏方

白芷　蔓荊子　附子　防風　芎藭　茵草

細辛　黃芩　當歸　蜀椒（各一兩去目閉口）　大黃（一兩半）

馬鬐膏五合（此所用多無）

右十二味切以臈月猪脂三升合諸藥微火煎三上下白芷色黃膏成洗頭澤髮勿近面

治婦人乳腫痛丹參膏方

丹參　芍藥（各二兩）　白芷（一兩）

右三味以苦酒漬一夜猪脂六合微火煎三上下膏成傅之

治頭白頹瘡髮落生白痂經年不差五味子膏方

五味子（二分）　兎絲子（五分）　蓯蓉（二分）　雄黃（一分）

松脂（二分）　虵床子　遠志（去心各三分）　雌黃

白蜜（各一分）　雞屎（半分）

右十味以猪膏一升二合煎先內雌黃次內雞屎次內蜜次內松脂次內諸藥並先各自末之膏成先以桒灰洗頭後傅之

治疽瘻瘑疥諸惡瘡連年不差并小兒頭瘡悉治之膏方

黎蘆　附子　蘆茹　桂心　天雄　虵床子

野葛皮　雄黃　乱髮（洗）　白芷　半夏（湯洗）　礬石

細辛　杏人　芎藭　芍藥　白朮　烏頭（各二兩）

黃連　當歸　藁本（已上各二兩）　班猫　茵草

巴豆（去心皮）　黃蘗　吳茱萸　蜀椒（各一兩去目閉口汗）

右二十七味㕮咀以苦酒漬一夜以臈月猪脂四斤微火煎令酒氣盡膏成日四五傅用多妙

治久瘑疽諸瘡治葛膏方

治葛皮　黃連　細辛　杏人　茵草　芍藥

黎蘆　附子　乱髮　蘆茹　芎藭　白芷

蚳床子　桂心　藁本　烏頭　白朮　吳茱萸
雌黃　礬石　天雄　當歸（已上各二兩）　班猫
巴豆（去皮心）　蜀椒（去目汗閉口）　黃蘗（各一兩）

右二十六味㕮咀各擣篩以猪脂五升於銅器内微火煎諸藥七沸七下絞去滓更煎攪匀成膏以傅瘡上日四五

## 丹砂膏方三首

丹砂（五兩）　芎藭（三兩）　大黃（二兩）　蜀椒（二兩去目出汗）　白芷（二兩）
麝香（三兩）　升麻（二兩）　冶葛皮（二兩）　麻黃（五兩去節）　丹參（五兩）
巴豆（二升去皮心）　桂心（二兩）　附子（十二枚）　皂莢（二兩去皮子）

右十五味以猪脂六升春夏共用調合在後方消停

又方

丹砂（三兩）　芎藭（三兩）　大黃（二兩）　蜀椒（去汗目二兩）　白芷（二兩）
麝香（六兩）　术（二兩）　附子（十二枚）　乾薑（五分）　冶葛（二兩）
丹參（六兩）　細辛（二兩）　巴豆（三升去皮心）

右十三味秋冬共用亦在年中有所宜以意消息藥各擣羅之巴豆細切以苦酒漬一夜量足不須覆之明旦以猪脂成六升鐺中微火煎三上下膏成勿使傍人及雞犬猫見其膏同治共敘此方須是細意事持

又方

丹砂（末二兩）　蜀椒（去目閉口汗）　大黃　白芷　甘草（炙已上各二兩）
巴豆（三升去皮心）　麝香　芎藭（各二兩）　附子（二枚）　升麻（二兩）
冶葛皮　犀角　當歸　烏頭（各二兩）　丹參（一斤）

右十五味切以苦酒漬之一夜以猪脂六升微火煎三上下膏成絞去滓用之此膏是四時常用日三此方无比

丹砂膏敘治百病傷寒溫毒熱疾服如棗核大一枚　鼻塞取半核大内鼻中縮氣令人聦衆　若耳聾取如兩棗核大洋之如水内其耳中三五年聾可差　或寒澼腹滿堅脹及飛尸惡毒楚痛溫酒服　霍乱當成未成已吐未痢白湯服棗核大若已痢一兩行而腹煩痛更服之　眼中風膜膜或痛常下泪取如粟大注眼中自當下止或半目痛便愈又肖背喉頸痛摩足口中亦稍稍令常聞有膏氣人躰自有不同者易為藥當服取利為度老小增減服膏之法得利若不利如人行十五里可与熱飲發當預作白薄粥令冷若過利要止者多進冷粥便任若能忍待藥勢尽自止更佳

赤膏治百病方（治病同丹砂膏用之）

冶葛皮（一兩）　白芷（一兩）　蜀椒（二升去目閉口汗）　大黃　芎藭（各二兩）
巴豆（三升去皮心）　附子（十二枚）　丹參（一斤）　猪脂（六升）

右九味㕮咀以苦酒漬一宿合微火煎三上下白芷黃即膏成絞去滓用傷寒鼽鼻溫酒服如棗核大一枚賊風癰疽腫身躰惡氣久溫痺骨節疼痛向火摩之　瘑疥諸惡瘡以帛薄之　鼠瘻疽痔下血身躰隱軫痒搔成瘡汁出馬鞍牛領以藥傅之即愈　腰背手足瘀腫拘急屈申不快以膏傅之日三婦人產乳中風及難產服如棗核大井以膏摩腹立生　如食魚哽日五服愈　如耳聾以膏如小豆大着耳中　患息肉以膏内鼻中愈　眼齒痛以痛如桼注皆中白盧醫當童子視以膏如粟注皆愈

治摽疽丹砂服膏方

丹砂（末）　犀角　夜干　大黃　芎藭　麝香（末）
黃芩（各二兩）　生地黃（十兩切）　升麻　前胡　沉香（各三兩）
青木香（一兩）

右十二味㕮咀以苦酒漬淹一宿以猪脂五升微火煎三上下絞去滓内丹參麝香末攪調稍稍服之

治𤺌疽麝香膏方

麝香（末）　凝水石　黃芩　丹砂（末）　芎藭

雞舌香　青木香（各二兩）　茵草（三兩）　升麻（三分）　羚羊角

夜干　大黃　羊脂（各三兩）　地黃汁（一升）

右十四味切以苦酒漬一夜用猪脂六升微火上煎三上三下絞去滓內麝香丹砂末攪令調膏成以摩病上甚良

治丁腫生芎藭膏方

生芎藭汁（一升）　丹砂（二兩）　生地黃（二斤）　白芷（三兩）　大黃（三兩）

麝香末（三兩）　甘草（三兩炙）　當歸（二兩）　升麻（二兩）　薤白（八兩）

右十二味㕮咀以苦酒漬一夜猪脂五升微火煎三上下膏成摩於腫上

治𤺌疽始發未曾治宜速服丹砂膏方

丹砂（末）　犀角（二兩）　夜干（三兩）　生地黃（十兩）

大黃（三兩）　升麻（三兩）　芎藭（三兩）　麝香（二兩）

前胡（三兩）　沉香（二兩）　黃芩（三兩）　青木香（一兩）

右十二味㕮咀以猪脂五升微火煎三上下止絞去滓入麝香丹砂末攪令調溫酒服如棗核大日三服

治風溫瘑疽諸惡瘡經年不差其著肖臆背日大不可視之恐見肺肺髓者皆主之傳當火須以意用之丹砂膏方

丹砂（末）　雄黃（末）　附子　天雄　乾地黃

大黃　當歸　秦膠（各二兩）　烏頭　桂心

黃連　松脂　茵芋（各四兩）　蜀椒（一升去目汗）　乾薑（二兩）

巴豆（一百枚去皮心）　蜈蚣（四枚去頭足赤者）　石南草（二兩）

右十八味㕮咀十六味以苦酒一斗漬一夜以猪脂六升微火煎三上下藥色膏成絞去滓內二石末撓令調傅瘡有口亦可紝瘡口此脂多治合即隨多少苦酒不必盡一斗以意量用之

治瘑疥癬諸惡瘡丹砂膏方

蜀椒（三升去目汗）　丹砂　細辛　桂心（各二兩）

附子（三十枚）　前胡　白芷（各一升切）　芎藭（切）

白朮　吳茱萸（各一升）　當歸（一兩）

右十一味㕮咀諸藥唯椒茱萸不擣以苦酒漬一夜令淹以猪脂不中水者十斤細切令諸藥於銅器內煎三上下白芷黃成膏以綿布絞去滓如患風溫腫不消服如彈元大一枚　若鼻塞不通以膏着鼻中　若青盲風目爛眥痒痛茫茫不見細物以綿絮裹筯頭注膏中以傳兩眥至卧時再傳之齒痛亦如耳聾亦准之諸惡痛皆治之　金瘡牛領馬鞍瘡亦可傳之　治下赤腹中有癰并癥疾在外即摩之在內即服之如彈元大一枚日三服此膏无所不治

治小兒頭瘡并惡紫草膏方

紫草（三兩）　黃連　女青　白芷（各一兩）

礬石（三兩燒令汁出）　苦酒（五合）　生地榆根（一兩）

右七味內三味礬石紫草黃連爲末入諸藥煎白芷黃膏成傳瘡上

治小兒熱瘡水銀膏方

水銀（二兩）　胡粉（二分）　松脂（二兩）　猪脂（四升）

右四味煎松脂水銀氣出下三物攪令不見銀放冷以傳瘡上

治火瘡栢皮膏方

右皮去黑皮用白肉以猪脂少多煎去滓候凝隨意使之

治𤺌疽浸淫廣大赤黑爛壞成瘡羊髓膏方

羊髓（二兩）　大黃（二兩）　甘草（一兩）　胡粉（二分）
右四味㕮咀以猪脂二升半并胡粉微火煎三上下絞去
滓候冷傅瘡上日四五
治熱毒并結及腫成瘡升麻膏方
升麻（三兩）　白术（一兩）　牡礪（三分）　白芨（二兩）　白蘞（二兩）
茼草（二分）　夜干（二兩）　大黃（二兩）　黃連（二兩）
右九味㕮咀以猪脂三升微火煎膏成絞去滓以傅瘡上
日四五
治熱瘡生地黃膏方
生地黃　白蘞　白芷　黃連
升麻　黃芩　大黃（已上各十兩）
右七味㕮咀以猪脂一升半微火煎成膏絞去滓傅瘡日
四五

治惡瘡皆爛雄黃膏方
雄黃　礬石（末）　藜蘆　當歸　黃連
附子（各二兩）　茼草　芎藭　白芨（各一兩）　巴豆（六十枚去心皮）
右十味㕮咀以猪脂二升微火煎膏成絞去滓內石末攪
調傅瘡日四五
治瘑疽瘻水銀膏方
水銀（二兩半）　胡粉（二兩）　松脂（二兩）　猪脂（四升）
右四味先煎松脂水氣盡下胡粉攪令水銀盡不見可傅
瘡日三亦治小兒疳熱瘡頭瘡
治癰瘰癧瘡白蘞膏方
白蘞（三兩）　白芷（三兩）　芎藭　大黃　黃連（各二兩）
當歸（三兩）　黃蘗（二兩）　豉（八合炒）　羊脂（三兩）　猪脂（二升）
右十味㕮咀以二脂合煎內諸藥微火煎膏成去滓候凝

傅之
治皮膚中熱癰瘰癧白蘞膏方
白蘞　黃連（各二兩）　生胡粉（一兩）
右擣篩容脂調和傅之
治熱瘡生地黃膏方
生地黃（四兩）　黃連（四兩）　大黃（三兩）　黃蘗
甘草（炙）　白蘞　升麻（各二兩）
右七味㕮咀以猪脂二升半微火合煎膏成絞去滓候凝
可傅之
又方治熱瘡生地黃膏方
生地黃（四兩）　黃連（五兩）　白蘞　芍藥
白芨（各二兩）　苦參（二）　升麻（各三兩）
右七味㕮咀以猪脂二升半內諸藥同熬膏成去滓候凝

傅之
治溫熱諸瘡黃連膏方
黃連　白蘞　白芷（各二兩）　生胡粉（一兩）
右四味細篩用猪脂調塗之
治熱瘡虵床子膏方
虵床子（二兩）　乾地黃（二兩）　苦參（一兩）　大黃（二兩）
通草（二分）　白芷　黃連（各一兩）　狼牙（二分）
右八味擣篩為細末用猪脂以意調和塗之
治熱瘡木蘭膏方
木蘭（一兩）　白芷　黃連（各三兩）　黃蘗（二兩）　芍藥（一兩）
梔子（二十枚）　黃芩（二兩）　狼牙（二兩）　夜干（一兩）　虵床子（一兩）
右十味㕮咀以猪脂二升合諸藥微火煎膏成去滓塗傅之
治熱瘡黃連膏方

黄連　生胡粉（各三兩）　白斂（二兩）　大黄（二兩）　黄蘗（二兩）

右五味為末用猪脂以意調和塗之

治灸瘡甘草膏方

甘草（一兩）　當歸（一兩）　胡粉（半兩）　羊脂（一兩半）　猪脂（三兩）

右五味㕮咀以猪羊脂并諸藥微火煎成膏絞去滓候凝傅之

治諸癰破後大膿血極虚黄耆膏方

黄耆　附子　白芷　甘草　防風　大黄　當歸　續断　芍藥（各一兩）　茯苓（一分）　生地黄（五分）　細辛（三分）

右十二味切以猪脂三升内諸藥微火慢煎候白芷黄色膏成絞去滓候凝塗瘡摩四邊口中日四過

治癰疽已潰白芷摩膏方

白芷（三分）　甘草（三分）　烏頭（三分）　薤白（十五枚）　青竹皮（如雞子大一塊）

右五味以猪脂一升合煎候白芷黄膏成絞去滓塗四邊

治諸疽瘡膏方

臈（一兩）　乱髪　礬石（熬各一兩）　松脂（一兩煉）　猪脂（四兩）

右五味先下脂煎令消下髪髪消下礬石礬石消下松脂松脂消下臈臈消膏成濾過候凝塗傅之

治鼻中塞利鼻白芷膏方

白芷　通草　蕤核（各一分）　薰草（二銖）　羊髓（八銖）　當歸（一分）

右六味以清酒煉羊髓三過㕮咀諸藥煎膏成絞去滓用小豆大内鼻中日三

治竹木所刺入手足壯不出膿疼痛羊屎膏方

右取乾羊屎擣篩用猪脂和以塗之瘡口立出

治湯沷人宍爛壞朮膏方

朮（二兩）　附子（二枚大者炮）　甘草（一兩）　羊脂（五兩）

松脂（如雞子大一塊）　猪脂五兩（不入水者）

右六味微火上煎猪脂後内羊脂并諸藥又煎膏成絞去滓候凝塗瘡上日三

又方

栢樹皮（四兩去黑皮）　甘草（三兩細切）　淡竹葉（二兩切）

右三味以不中水猪脂一升二合入藥煎膏成絞去滓塗瘡上日三

又方

麻子一合（取人）　栢皮一兩（取白）　白芷（一兩）　生柳皮一兩（去白）

右四味㕮咀以脂一升同藥煎膏成濾去滓候凝傅瘡日三

治瘑疽疥癬及惡瘡藘茹膏方

藘茹（三兩漆頭者）　雄黄　雌黄（各一兩末）　丹砂（一兩研）　乱髪（半兩洗）

右五味擣篩令調煎以先用猪脂二升半煎髪取尽内諸藥微火更煎候膏成不令他人雞猫犬見傅瘡上日三

治婦人妬乳生瘡雌黄膏方

雌黄　白斂　雄黄　漆頭藘茹（各一兩）　乱髪（一團如雞子大）

右五味各研擣篩以不中水猪脂二升先煎乱髪令尽下諸藥再微火煎候膏成放凝塗瘡上日三四

治諸惡瘡麝香膏方

麝香　冷石　雄黄　丹砂（各五分）

右四味各細研如粉以臈月猪脂量其多少調和如塗傅瘡時先用大黄湯放温洗了纔乾然後塗膏

治頭瘡惡瘡骨疽等牛屎薫方

取苦瓠截除底断其鼻取牛屎着地上燒以无底瓠籠屎上引煙從瓠空中出以瘡着煙上薫之自然止過三度即除

六物滅瘢膏方

衣中白魚　雞屎白　鷹糞白　芍藥

白歛　白蜂（等分）

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良

小品滅瘢方

雞矢白（一兩）　辛夷人（四分）　白附子（二分）　細辛（二分）

右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓傷瘢以甘草湯洗訖塗之（一方有桂心二分）

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三

竇太師著

# 外科全書

舒白梓行

## 重校竇氏圖註瘡瘍經驗全書序

余讀遷史記載秦越人淳于髡俞跗之徒其治人疾病皆能觀察體脉輙洞臟腑决死生至不爽毫末如與齊相魏太子所辨治多驗弗誣盖其伎神妙得之於心而又持其機權以識其陰陽寒熱之辯經絡腸胃腠理之殊而後施夫刀圭方藥若燭照而數計者是以業是者未易及也然非太史公為之記敘其何以聲施後世而千載誦法之哉宋有竇漢卿者以瘍醫行於慶曆祥符之間詔治太子疾召入什智殿下訊之未幾太子病愈輙嘉勞之封為太師以國老稱遂

命製諸方以弘濟寰海外內一時神其術者咸知有竇氏瘍醫矣然其書之傳於世者分析種種繪圖定方具有法度信利人之妙術濟世之弘軌也我

明以來家有傳焉其方多驗裔孫楠續授太醫院醫士其子夢麟術業益工

聲稱籍甚乃緝遺書重增經驗諸方梓以行世盖得其一技之良有功於人庶幾繩祖父之萬一矣遡漢卿為合肥人嘗遊江湖遇一至人而其術益神則醫業之精信非偶然者矣夢麟號仲泉今家常之無錫與華太學復陽游復陽為秋官補菴公之子比來京師備能道之欲乞一言為序余知竇氏之醫如盧扁而深媿吾言之不能如遷史令其信今而鳴後也聊書以歸之

隆慶三年龍集己巳菊月望日

賜進士及第翰林院　國史脩撰分校

永樂大典纂修

世宗實錄兼理

誥勑

經筵講官吳郡申時行書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之一目錄

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢太[illegible]補梓

咽喉說一　又說二篇　[illegible]說

喉舌諸症或說　（凡四十二說）　急喉風圖說

單乳蛾圖說　風熱喉症圖說　舌癰圖說

舌微黃圖說　酒毒喉痺圖說　風毒喉痺圖說

風熱喉痺圖說　上腭生瘡圖說　又酒毒喉痺圖說

重舌症圖說　重腭症圖說　口瘡圖說

蓮花舌圖說　陰毒喉痺圖說　纏喉風外症說

積熱喉癰圖說　木舌症圖說　纏喉風內症說

虛牙圖說（方一）　牙宣圖說（方五）　啞瘴喉風圖說

弄舌喉風圖說（方卅七）　喉䐜圖說（方一）　喉節圖說（方一）

纏喉風圖說（方一）　氣癰喉閉圖說（方一）　搶食喉風圖說（方一）

喉癰圖說（方一）　脚根喉風圖說　喉閉圖說（方一）

喉瘤圖說（方症六）　懸癰圖說（方一）　鎖喉瘡圖說（方一）

傷寒喉閉圖說（方一）　雙蛾風圖說（方一）　口緊圖說（方一）

木舌乳蛾圖說（方一）　第一卷目錄畢

---

瘡瘍經驗全書一卷　咽喉說一　宋竇漢卿撰集

呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間肺經主之喉嚨已下言六臟為手足之陰咽門已下言六腑為手足之陽蓋諸臟屬陰為裏諸腑屬陽為表以臟者藏也藏諸神流通也腑者府庫主出納水穀糟粕轉輸之謂也自喉嚨已下六臟喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾為天乾金也故天氣之道其中空長可以通氣息但喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之蓋喉嚨為息道咽中下水穀其喉下接肺之氣一云喉中三竅者非果喉中具三竅則水穀與氣各從一竅而俱下肺中肺下無竅何由傳送水穀入于下焦

黃帝書云肺為諸臟之華蓋藏真高之氣于肺經也故清陽出上竅濁陰出下竅若世人不知保養風寒暑濕（燥熱）六氣喜怒憂思悲恐驚之七情役冒非理百病生焉病瘍既成須尋所自若喉痺乳蛾纏喉風喉瘡喉閉風毒熱毒等症當刺則刺不可亂醫當吐則吐不可妄治此等症係性命之根本生死立見不識其標本而攻之失其決則禍不旋踵矣　又咽喉說二

○丹溪云咽喉者一身總要與胃相接呼吸之所從出若胸膈蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽喉之病喉內生瘡或狀如肉赤肉為腫窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌大法先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝於上腭而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利宜用解施法或曰治法視火微甚微則正治甚則反治探痰出血隨所宜治或於手太指少商穴出血行氣衝達於外者必外敷以藥予嘗以鵞翎蘸米醋繳喉中摘去痰涎蓋酸能收痰又能消積血乳鵞而不散者以小刀就鵞上出血皆用馬牙硝吹点咽喉以退火邪服射干青黛甘草桔梗黃芩山梔大黃白礬牛旁子之類隨症佐利為方以散上焦之熱外所付藥如生地伏龍肝韭根皆可用若咽喉生瘡或白或赤者多血大率多是痰熱先以桐油吐之後用甘草湯解桐油之氣

---

## 咽喉訣

咽喉一科昔先太師公立論於前矣予豈敢復言乎竊坐細思又不容已也咽喉之症司性命出納氣飲之所深為至重然飲食精氣之要路肺與大腸表裏之別臟腑上通咽喉下由大腸出入之門戶肺為華蓋發蔭五臟死生之玄門也入穀則昌絕穀則亡朝生暮死暮生朝死須臾之間變症不一惟肺主金金主氣而生津液灌溉一身流潤百骸金能生水生生不已循環無端順則五臟華敷百關通暢此所謂養身之道也陽明燥金以致火尅而生疾矣咽喉之症從熱而係乎太陽之標故推而治之可以解熱除毒袪風順氣則自然平金也丹溪先生以米醋攪口中以出痰酸以收之之義也愚見以為太酸則燥先用黃虀汁加玄明粉少許灌喉中以吊其痰次用醋水仍前加玄明粉灌之后用蜜湯潤之漸漸探吐其痰則咽喉開利矣復以氷片散滋之無有不効若纏喉風用前三味不能探吐其痰宜用生桐油灌之鵞翎攪之再用蜜湯潤之急服牛黃清心丸或豁痰丸以滌其痰旋以二陳湯加減服之無不愈者若

喉中聲出如雷嗆食眼張天狂倒陷面黑唇焦鼻無氣息目睛突出汗出如珠盧扁復出不能生矣然既患咽喉口舌之症延及頸項頭面發腫紅如火光藥不能療急用磁鋒砭去惡血用鷄子清調乳香末潤之立瘥再用芭蕉根汁潤之以解其毒若口舌腫大紫黑急用針點去血隨吹末藥甚効予父以此法行之頗活衆多故以此理論而發明之再俟高明校裁勿罪迂謬幸甚．

鈖山裔孫　夢麟識

新增一應咽喉口舌等症神効方（目見誤對下藥害多矣致枉死有力之家宜備合施人以積子孫）

黃芩（生）　黃連（生）　山梔仁（炒黑各碾細末三分）　青梅乾（煅存性）　青黛（水飛去查晒干各五分）　雄黃　雞内金（各）　人中白（煅五）　白朋砂　牛膽硝（各三分）　枯白礬（二分）　已上各為細末和勻加真射香三分真冰片六分再碾和入小磁罐内以鵝金紙蜜蠟紮罐口每用苦管挹藥吹入患上一日夜吹十余次徐徐流出痰涎漸愈如有腐臭急用蚌水灌淨或用猪牙草扁栢子和搗加水去查灌淨前藥每錢加牛黃三分銅青熊膽珍珠各五分兒茶八分

製梅法大青梅（一斤去核入白凡食塩各五錢拌和再加挺硝不拘多少層層間之一日夕取每晒干收尽汁再晒干候用加入）

製膽硝法冬月入朴硝在黑牛膽内掛在風處百日去皮用之（[illegible]）

## 纏喉風訣

夫纏喉風屬痰熱咽喉裏外皆腫者是也外面無腫者必身發熱面赤此乃熱毒之氣極也外面有腫者身亦發熱邪火發外之原也或牙關不強外面不腫但喉中紅者曰暴感熱在心必左邊病退傳右邊此餘毒未盡故也咽喉有數症有積熱有風熱有客熱有病後餘毒未除變化双乳蛾者且如病中喉間有腫紅色數日其光似鏡者此積熱也且如喉中有腫其色微白其形若臂者此風毒喉痺也此熱毒因而感風相搏而發故也或咽中有腫其色帶紫色者此乃客熱謂其人暴感熱毒之氣壅塞喉間須用木通玄参生地黃芩黃連山梔仁瀉心經之火為要或有傳變木舌者皆心熱蘊積於胷中故口中痰臭服劑以涼膈為要搽藥以冰片散佐之或用小磨刀点之以出紫血或風毒喉痺内外俱腫其故何也風毒之氣結於喉間則壅塞喉間乃風毒與痰相搏故也素問云無風則不動痰無痰則不受風風痰相搏結塞咽喉其外症咽喉形如雞子大其色微白外面腮上有腫其形似瘡身發寒熱牙関緊强語聲不出者是也先用韲汁加玄明粉或蜜湯探取其痰急服

荊防消毒散牙關腫處紫黑用小刀点破即用氷片散吹之無不效驗

○或蓮花重舌者具蘊熱乘風而發心火炎上之義治法同前

○或病人瘥後口中臭腹中絞痛者何皆因熱毒積於脾家急用蘇子降氣湯服之

蘇子　前胡　厚朴　甘草
陳皮　半夏　黄芪　人参
五加皮　乾薑　肉桂　桔梗

當歸　羌活　麥門冬　連翹

○或病人瘥後喉中乾痛者何皆腎水枯涸心火衝上耗散津液先用麥門冬五味人参杏仁天門冬甘草天花粉生地當歸桔梗山梔仁之類噙以雙消丸

薄荷　杏仁　桔梗　玄参
砂仁　甘草　石煉雞丸

○或病人瘥後氣短及聲不出者皆肺氣不行降氣湯多加前胡臨服加薑汁以佐之若病後聲啞不言此乃肺經受刑百無一生

○或風熱喉閉内外俱腫者謂其人久積熱毒因而感風風熱相搏發出外來則塞喉閉其人面赤腮腫身發寒熱喉中有塊如拳外血鮮紅先用玉字藥蜜調点之次用荊防消毒飲加减治之

○或牙關緊強不得開者此皆風痰相搏塞咽喉先用木針排開或黄蘿菜汁或温蜜湯或醋水俱下玄明粉灌喉再用鵞翎攪之吐出痰涎幾碗外用五倍末醋調敷之急服荊防二陳湯口吹氷片散

○或喉中有瘡其色帶黄探痰同前用小刀点瘡上出膿

後即吹氷片散宜用服鼠粘子觧毒湯

○或風熱喉閉其因皆由病人久積熱毒因而感風風熱相搏故爾發外治法同前

○或虚陽上攻由於久病元氣虚弱邪火上行咽喉腫痛上下不升降水火不既濟心火衝喉故腫痛而閉塞其形若何語聲不出牙關緊急痰涎滿口手足厥冷頭目昏眩者是也治法如前

○或厥重不省人事目張直視可用茱萸研爛醋調塗脚心然後用降氣湯治之氣喘加前胡烏藥氣短加沉香

人参徉手足溫飲薄粥以斂元氣入斂則呂絶斂則亡此之謂也

○或腮頷浮腫外面赤者此必感於風毒急用紫蘇楓葉相枝煎湯洗之外用荊防羌活湯以祛其風或十宣散

○或病人手足厥冷口唇搐動者宜用小續命湯薑棗煎熱服

○或病傳右畔者餘毒未除急服牛旁子湯降氣湯加減治之

○或舌上有白胎結硬必作木舌用前法治之

○或舌下生小舌名重舌况舌乃心之苗心火炎上故生之用小刀点紫黑處吹氷片散服甘桔湯加山梔仁連翹之属

○或病後夜間不得睡津液少者杏蘇膏或人参酸棗仁湯治之

○或虛陽上攻上下不升降水火不既濟腰冷不知痛癢口中痰效唇黒者不治

○或前証口中紅活吐得血又有痰涎息和青者不治

○或前証手足冷者聲音不響喉中無腑乾痛者不治

○或前証手足冷不能自收頭低不能自舉眼暈暗者不治

○或舌捲大不得吞嚥皆由熱毒衝上急用紫雪加腦麝掺舌上再用氷片散吹之

○或咽喉有腫復生重舌此兩經受病俱有邪也心邪發於舌下謂邪出於喉嚨蓋因喉間之邪觸起於心經之邪則其病俱發外症頭疼項強身發潮熱者是也採痰法同前再用紫雪氷片散等治之

○或舌症白胎堅硬藥味不得入者揩拭潔淨用竹片刮

舌然後用藥

○或熱毒攻於舌則舌生瘡客風吹乾津液則舌硬也王妝和云三部俱数心家熱舌上生瘡唇破裂治法同前

○或上腭生瘡其因乃上焦積熱脾之氣行也然上腭屬脾故脾經受熱則上腭生瘡也務須服清上膈去風痰之劑

○或咽喉有腫兼舌上生瘡此心經受熱也邪熱存心日久則為喉閉餘毒干心則舌生瘡也須用氷片散玄参升麻湯加減治之其形如楊梅故謂之重腭

○或酒毒喉閉酒毒蒸於心脾二經則壅咽喉其人面赤而目睛上視者是也取痰法如前再用水片散吹之清凉散飲之

○或口中卒然有腫轉脹轉大此名飛瘍也漸至殺人用小刀点出血鼠粘子解毒加紅花牡丹皮惡心腹脹滿者難生

○大凡男婦治法一般惟女人喉中有腫而色紅者此月經不調也經不能行則壅塞於上故咽腫痛也蓋由榮衛不和但男子以氣為主女人以血為主男婦各隨其

氣血之分調治宜調榮湯可也如病勢重其色微白脚冷者此虛陽上攻宜服降氣湯探痰吹藥同前婦人有孕心頭痛者不治

○或牙關緊強不得開心頭悶亂氣絶者可用皂角末吹喉中

○或婦人産前咽喉痛而脈浮者不治

面赤而目睛上視者不治

面黑頭汗出者不治

心胸緊滿吐痰不出者勿治　自利不治

---

氣促四肢厥冷勿治

心中怔忡胸前紅甚舌捲面赤目上視者不治

血氣攻心欲絶面紅勿治　自利喘不治

手足厥冷不治

潮熱往来時發譫語不治

胸腹脹急不治

喉中或雷聲或搶食不治

○或婦人傷寒身發潮熱咽痛者此經行上也活人書云婦人傷寒經水適来晝則明明暮則譫語如見鬼神狀

此乃熱入血室無犯胃氣及上二焦不可下也小柴胡湯主之今咽喉痛而潮熱往来面赤唇紅者此熱邪上壅也不用小柴胡湯宜用竹葉石膏湯清上膈除心煩所以為妙次用四物湯

○或傷寒病四五日發熱鼻乾口燥咽喉者陽明自病也陽明屬胃汗多則胃汁乾故津液不能潮咽而乾痛也宜用人参敗毒散主之

○或傷寒三五日咽喉中有腫其色鮮紅痰涎自出頭痛項強須知屬太陽經邪氣入於經絡觸動心悶但積熱

之毒攻咽則咽喉腫痛甘桔湯內加牛旁子玄參生連之味吹藥同前

○或傷寒八九日已上身無潮熱腹痛自利而咽喉痛者此太陽經受病也傷寒得汗已不解轉入太陰腹滿時痛自利而咽喉腫痛其色微白此症可治如手足厥冷自利不止者用真武湯主之所謂真武者能補下元助陽正氣以手足和煖為妙經云但要口中紅活有痰可治宜隨症加減用藥若口中黑則血已枯乾聲啞目上視汗出者不能治矣切宜仔細看症

○或傷寒八九日已上得汗已不散喉嚨痛舌乾唇燥者此少陰經自病也太陰經受病得汗後未解傳入少陰經少陰屬胃汗多則腎汁乾其腎水不能潮潤咽喉故其病也如自利腹中痛手足厥冷咽中腫痛不可吞嚥如無涎唾及舌上乾者不治

○或病人八九日已上身微濕無他症但喉中痛而無腫聲啞者不治

○或傷寒十餘日已上得汗已病解無潮熱脉平靜而咽喉痛者此餘毒上攻也宜用牯子解毒湯

○或陰毒傷寒身体重背强眼痛不堪任小腹急痛口青黑毒氣冲心四肢厥冷惡心吐逆咽喉不利脉沉細者能速灸臍輪下六日之內全愈否則難生

○若傷寒十餘日已上病後煩滿咽喉痛舌卷而卵縮者不治

○若十餘日已上病不解傳變咽喉痛外症唇青舌捲者此病屬厥陰經受病也難治

咽喉乾痛無痰不治

咽喉痛而唇捲不治

咽喉痛而頭汗出不治

口中黑者難治

鼻中塞者不治

○或口中乾夜間潮熱不得睡卧時發譫語舉足妄動者用十味人參散主之

一地松汁亦妙

一谷精草碾末吹之

一小青草汁亦妙

一雄黃女明粉白礬為末吹之吐痰

夢麟校正

# 急喉圖

## 雙乳蛾



左咽軟主吞嚥

咽門分兩路其受病不同

右喉主出聲

經云喉能厚氣咽能嚥物故喉中病總而言之故為之咽喉醫者可別而治之其症種種各類其狀各各不同切宜仔細詳審此即雙乳蛾也

## 单乳蛾



左畔虛陽上攻其腫微紅者若肺氣外症手足厥冷痰涎自出頭重目昏急用薑萊酸汁加玄明粉灌之旋去痰涎即吹氷片散再服蘇子降氣湯二陳湯甘桔湯如厥重不省人事氣欲絕者急以茱萸研爛酸醋調塗脚心

## 風熱喉症



此症之起由于憂思勞碌太過或對風言語風入肺經作痰務多去痰為要其色鮮紅久而紫赤急用小鈹刀點之或用芦刀點之血微出火已瀉矣再服煎劑并氷片散吹之甚効凡紫赤色者變成淡紅色愈之漸也

## 牙瘥



牙邊生瘥者如豆大此脾胃二經火也宜用小刀点破之搽以氷片散再服清胃湯甘桔湯無不愈矣

## 舌微黃



右畔虗陽上攻其色微黃其形若蚕蛋故謂之乳蛾其症亦手足厥冷治法同前倘腰痛加乾薑赤芍藥

## 酒毒喉痺



其形若雞子其腫鮮紅其光如鏡外症發熱惡寒頭痛頸強此上焦積熱心脾受之蓋心脾二經主上焦宜服粘子解毒湯治法同前

---

## 風毒喉痺



外赤腫內腫微紅帶白色其形似炎餅連腮腫痛外症身惡寒而無熱腮頷浮腫牙關緊強此乃風痰相搏結塞喉間治法必以去痰為要吹藥吹之若外面腫紅用圍藥敷之中留一大孔再潤之以助藥力

## 風熱喉痺



其腫紅而微紫其形如拳其人面赤而目上視外症壯熱惡寒儼若傷寒此病人久積熱毒因而感風所致如病人聲音不響宜用潤肺之藥治之

### 上腭生瘡



上腭生瘡如黄、粟口中腥臭外症爲手伯冷脚怯寒此脾經積熱也上腭屬脾脾氣通於口故脾經受熱則上腭生瘡此先用蚌水布蘸繳淨患處先服清脾降火湯再吹氷片散無不効又宜戒酒戒色

○附取蚌水法用蚌洗淨打碎取水另用濕綿布濾清若用夏布則夏布孔遇水即疎滑則蚌中馬蝗虫竟在水碗矣偶入口中將何處之其綿布孔遇水即緊密則蝗不能下故用之口喉之症屬太陽之火然蚌乃河中之物屬太陰之精故借水以濟火耳

### 又酒毒喉痹圖



其腫黄其血黑其形若臂其腫若坎外症面赤目睛上視此乃熱毒傷於心脾氣通於口循環上下故咽喉痛治法先取其痰次用氷片散乾吹鼠粘子湯多加乾薑天花粉生黄連山梔仁連翹玄參桔梗枳殼

### 重舌症



其舌下生一小舌其舌鮮紅其外症須下浮腫有硬核此心經受熱毒氣出於舌下先用紫雪摻上流出熱涎急服卄桔湯加薑燈心煎服

### 重腭症



舌上生一瘡其狀若楊梅外症無寒並熱但作事煩心先以卄桔湯多加山梔後服黄連解毒湯再吹氷片散不宜用刀

## 口瘡



舌生瘡如黃粟外症怯寒而口張先用蚌水或田螺水或苦茶繳淨然後搽藥次服鼠粘子觧毒湯加山梔黃連口臭氷片吹藥內加人中白枯礬銅青黃連末

## 蓮花舌



舌下生三小舌其類如蓮花狀但舌乃心之苗心火上炎或思慮太過或火氣所傷或酒後當風取凉以致風痰相摶而成此症急用清凉觧毒湯加減服之再吹氷片散如腫不散次用小刀針出紫血爲妙

## 陰毒喉痺



腫如紫李見黑色其色光血紅可治○陰毒血黑不治外症惡寒其身瞤動振腰痛脚冷此冬月感陰濕火邪相干也其血微紅及腫處軟喉中有痰可治血紅黑甚腫硬喉乾難治先服五福化毒丹次以蘇子降氣湯再吹氷片散一月之內戒酒



## 纏喉風外症

此症外面症如蛇纏頸身發潮熱頭目大痛其症其腫紫糖色依總論治之前吹藥內加雄黃腦麝服荆防粘子二陳湯急用鵝毛蘸燈窩濁油攪去痰涎三四碗方活如痰不能去難生矣須要避風

## 積熱喉痷



其腫如黃糖李微黃上面紅絲外症頂上痛齒疼此胃經受熱胃氣通於喉嚨故患喉痷探痰法同前吹藥冰片散加玄明粉煎藥加當歸黃芪倍片芩

## 木舌症

其木舌硬如穿山甲見人舌做一拳外症增寒壯熱語言蹇澁此心經受熱也心者舌之本因心而病治法以小刀點紫黑處煎藥內多加山梔　山梔瀉火之要品也

## 纏喉風內症



其腫紅線白色腫塞不見咽下外症身發寒熱頭痛

## 虛才

此症齒屬腎經或風乘虛而入發腫或飲酒太過而腫或血虛而腫或剔傷而腫或房勞陰虛而腫治法宜以意詳症消息而治

川烏

藁本　獨活　荊芥　香附

當歸　皂角　細辛　川椒

水醋各半煎乘熱噙嗽另服清胃湯玉池散

牙齦

牙宣謂脾胃中熱湧而宣露也（亦謂之齦宣）此症牙齒縫中出血上屬脾下屬胃吐血痰至斗深難療者急宜速治遲則難生先用蚌水灌淨然後吹藥

冰片（三分） 麝香（二分） 大紅絨（灰一錢） 珍珠（一錢）

黄連末（一錢五分） 朋砂（一錢） 牛黄（一錢） 雄黄（五分）

靛花（一錢） 鹿角灰（一錢） 五倍子（三分） 人中白（煅一錢）

玄明粉（一錢） 栢末（一錢蜜炙焦色） 雞內金（一錢煅）

右藥品穿腮腫毒治之亦妙 另細末和勻吹入患處

清脾抑火湯

犀角 生地黄 當歸 芍藥

青皮 鼠粘子 連翹 牡丹皮

紅花 天花粉 桔梗 黄連

防風 黄芩 薄荷 石菖蒲

琥珀犀角膏 咽喉舌上生瘡

琥珀 犀角（八錢） 辰砂 茯神（各兩）

冰片（一錢） 遼参 酸棗仁（二錢炒去皮）

右將人参犀角茯神為末入餘藥令勻以蜜搜為膏子用磁器收貯每服一弹大麥門冬湯化下日進三次

清胃湯

當歸稍（一錢） 升麻（一錢） 黄連（酒炒一錢） 牡丹皮（一錢五分）

生地黄（一錢酒洗）

水一鍾半煎服

玉池散

藁本 升麻 防風 細辛

白芷 甘草節 當歸 槐花

川芎 獨活 黑豆

水二鍾薑三片煎食遠服

## 啞瘴喉風

此啞瘴者風痰祀於咽膈之間以此口不能言牙関不開急用蟾酥磨水滴入鼻孔即開随用桐油滴入喉中仍将鵞毛攪喉間風痰出盡再用甘草湯解桐油之氣即用氷片散吹之更服荊防敗毒散連進三服

如若面紫舌青唇黑鼻流冷涕爪甲俱青目中多淚不可治

## 弄舌喉風

此症啞不能言舌出常将手挲急将兩手大指側爪甲縫用三稜針每指刺三針有血可治無血不治若針少商穴亦妙用銅匙排開口用胆硝丹吹入喉中燈窩內油脚再用鵞翎蘸攪出痰涎仍服雄黄化毒丸七丸茶清送下後服疎風甘桔湯再用氷片散頻吹之其方具後

當歸稍　枳殼　桔梗　茯苓

黄芩　人参　山梔　黄連

荊芥　防風　玄参　甘草

連翹　縮砂　天花粉　陳皮

乾葛　川芎

水二鍾煎服

吹藥名氷片散

氷片（一錢真者）朋砂（五錢）雄黃（一錢）蜜炙栢（細末一錢）

鈔三張（燒灰）鹿角霜（一兩）枯礬（一錢）粉草末（一錢）

靛花（一錢）黃連末（一錢）玄明粉（一錢）雞內金（燒存性一錢即雞肫內黃皮）

口中氣臭加人中白（煆一錢）銅青（煆不可過五分）

紫雪

青礬（不拘多少火煆通紅取出放地上出火毒）氷片

麝香（各少許）硼砂　玄明粉

右為末放舌下或喉間

一字散

用明礬一兩火上熬滚隨下巴荳仁廿一粒即取出待冷取出巴荳仁研末乾吹名曰玉鑰匙

杏酥膏

甘草（一錢）硃砂（一錢）桔梗（一錢）朋砂（一錢）

麝香（少許）白芍藥（一錢）杏仁（三錢去皮尖）俱為末

---

右味蜜丸噙化

化毒丹

人参（二錢）茯苓（五錢）靛花（五錢半爲衣）麝香（無亦可）

玄参（一兩）桔梗（二兩）甘草（一兩二錢）薄荷（一兩二錢）

牙硝（五錢）

右為末蜜丸

十味人参散

人参　茯苓　甘草　當歸

桔梗　紫蘇　羌活　白附子

天花粉　黃芩

薑棗煎

烏藥順氣散

烏藥　沉香　人参　枳殼

陳皮　甘草

薑煎服

蘇子降氣湯

前胡　蘇子（真者）半夏（薑汁拌晒）陳皮

肉桂（分）厚朴　甘草　桔梗

黃芩　防風　枳殼（各等一錢）

薑三片煎服

清火降氣湯　治雙乳鵞

蘇子（炒研）　前胡　厚朴　甘草

陳皮　半夏（用陳老湯炒）　黃芪　人参

五加皮　乾薑　肉桂　桔梗

當歸　羌活　天花粉　玄参

二陳湯

陳皮　半夏　茯苓　甘草

玄参　升麻　桔梗　天花粉

牛旁子（研）　連翹　當歸　生地黃

赤芍藥　黃連　白术　黃芩

青皮　紫蘇梗　山梔仁

甘桔湯

甘草（三錢生）　桔梗（三錢）　花粉（一錢）　鼠粘子（一錢）

連翹　山梔仁（一錢）　生黃連（一錢）　生地黃（一錢）

鼠粘子解毒湯

鼠粘子　甘草　升麻　生地黃

---

天花粉　連翹　白术　黃芩

黃連　山梔仁　桔梗　青皮

防風　玄参

清脾降火湯

牡丹皮　青皮　當歸　生地黃

黃連　黃芩　桔梗　白芍藥

薄荷　防風　茯苓　白术

澤瀉　猪苓　山梔仁　麥門冬

玄参

八正散

大黃　瞿麥　木通　甘草

滑石　車前子　山梔　萹蓄

黃連解毒湯

黃連　鼠粘子　桔梗　天花粉

連翹　當歸　生地黃　白芍藥

牡丹皮　青皮　枳殼　前胡

小柴胡　乾葛　玄参　金銀花

雄黃解毒丸

雄黃（一兩水飛）　欝金（一兩勿鐵[illegible]炒黃）　甘草節（一兩）　巴豆仁（三十五[illegible]）

菉荳粉（一兩）

右為末醋糊為丸豆大每七丸茶清下吐出痰涎立惺未吐再服七丸如人死者心尚熱研末灌之

牛黃清心丸

牛胆南星（一兩）　麝香（五分）　珍珠（五分）　冰片（五分）

黃連末（二錢）　防風末（一錢）　荊芥末（一錢）　五倍末（一錢）

桔梗末（一錢）　玄參（一錢）　茯神（一錢）　當歸（一錢）

雄黃（二錢）　輕粉（三分）　天竺黃（一錢）　犀角末（一錢）

右為細末和勻甘草膏為丸如龍眼大辰砂為衣日中晒乾入磁瓶中塞緊瓶口勿令出氣臨服用薄荷湯磨服一丸

圍藥名鐵箍散

多年陳小粉炒黑（四兩）　五倍子末（二兩）　龟板（火煅存性一兩）

右三味為細末醋蜜調敷常用餘醋潤之以助藥力

又方名善消散

白芨（一兩五錢）　雄黃（五錢另末）　大黃（八錢）　黃栢（五錢）

山茨菇（五錢）

右為末葱一把搗爛加蜜少許再搗取汁調勻搽四向空中出毒氣如前潤之

玉樞丹　即紫金錠

五倍（三兩淡紅黃色者搥碎洗淨）　山茨菇（二兩）　麝香（三錢真）

續隨子（去殼研細以紙包壓去油一兩）　紅芽大戟（洗淨一兩五錢）

右各另末和勻旋下糯米粥在木桕中搗千餘下分作四十錠於端陽重陽七夕脩合辰日亦可焚香在淨室中勿令婦人孝服不完形人及鷄犬之類見之須要至誠否則無効日中晒乾貯瓶中塞口勿令出味如遇喉

閉癰疽疔癀蛇咬水磨服之塗患處尤妙

萬靈丹

木香　乳香　沒藥（各三錢）　血竭（一錢）

蟾酥（五錢）　紫石英（二錢）　雄黃（一錢）　犀角（一錢）

冰片（五分）　麝香（一錢）

右為細末糯米粥和勻搗千下成條每條五分如遇前症以津液磨搽水亦可

追疔飛龍奪命丹

辰砂　雄黃　蟾酥　蜈蚣（炙）

枯礬（二分）輕粉（三分）麝香（五分）冰片（二分）

右為末蜒蚰搗膏為丸如豆大辰砂為衣如遇疔瘡惡症用葱白二根同此丸五丸嚼爛熱酒送下以衣覆患處出汗為妙其酒隨量飲之

### 大小人口内臭瘡藥

枯礬（煅極過三錢）　人中白（即多年馬桶内尿積一錢火煅）　雞内金（炙一錢）

銅青（一錢）　麝香（三分）　冰片（一分）　阿魏（一分）

右為末先用米泔漱淨患處將此藥乾吹蚌水漱尤妙

### 平舌薰法

一人舌長三寸不能入口用芭荳仁三粒用竹紙包打去荳仁將此油紙撚成条火點薰之其舌聞烟即時縮上急服清脾降火湯再吹冰片散

### 完舌圓藥

一人無故舌縮不能言用芥菜子碾末醋調敷頸項下即時能言服清脾降火等湯再用紫雪冰片散吹之

又一人舌忽脹大滿口以百草霜搽之即服粘子解毒湯多加黄連連翹紫蘓梗或服黄連解毒湯併服牛黄清心丸如無百草霜以冰片散代之用鈹刀刺之

喉腫



此毒起於脾經因食煎煿油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急即死治法先用醋水韲汁攪去痰涎即用吹喉藥吹數次後服八正順氣散

厚朴　砂仁　半夏　陳皮

茯苓　青皮　桔梗　芍藥

枳殼　木香　玄參　鼠粘子

山梔仁

右剉水三鍾薑三片煎服

## 喉節



此症生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐不出咽不下至三日漸上喉節之間名為喉節其疾須用刺破後用膽硝丹吹入喉中再用雄黃化毒丸吞下七丸仍用四七氣湯連進五服再用冰片散吹之

### 四七氣湯

甘草　桔梗　枳殼　天花粉
鼠粘子　山梔仁　生地黃　玄參
陳皮　連翹　茯苓　紫蘇

右㕮咀水二鍾薑三片煎服

## 纏喉風



此病因腎經有熱內枯不能上潤致令心火盛故發此症服敗毒散具採其法在前

羌活　防風　桔梗　黃芪
黃芩　白芷　甘草　陳皮
柴胡　芍藥　前胡　鼠粘子
玄參

仍用吹喉藥吹三五次又用白地松根醋搗汁漱出風痰如喉閉雷響者不可治切宜仔細

## 氣瘖喉閉



此症為因聚毒塞於喉間痰涎稠實發寒熱者仍分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹喉藥吹數次茶湯送下雄黄化毒九七丸然後服参苓順氣散

人参　茯苓　烏藥　蒼术
紫蘇　白术　粉草　陳皮
鼠粘子　枳殼　玄参　山梔仁
桔梗　天花粉

## 噙食喉風



此症因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若噙食者不可治用川桔散

川芎　防風　桔梗　鼠粘子
山梔仁　白芷　玄参　天花粉
枳殼　黄芩　烏藥　甘草
陳皮

連鬚葱一根燈心七寸同煎至七分食後服如蕩心肺間刺痛者仍用當歸連翹散加大黄利下如久不治变為飛絲勞毒能傷人命

## 喉癰



此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情鬱結成癰毒生喉間若不速治恐毒氣內攻喉骨若出必致口內出膿雖不傷命即成冷瘻終身之痼疾也治方於後

十宣散

治喉節初起有膿即散破用內補散外用金絲膏貼之

吹藥同前

---

## 脚根喉風

此症脚根發起至於喉間或一年發一次半年發一次切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行一穴至七日行七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒散如腥惡發泡者死

## 喉明



此症因外感寒邪内傷熱物或大寒後便入熱湯洗故将寒氣逼入脾經冷氣阻於中脘邪氣熱客於心經故生此疾急用三稜針刺手腕中紫筋上或少商穴出血却将雄黃化毒丸冷茶磨化灌之仍将氷片散吹入喉中待漱出風涎稠痰為愈更服八正順氣散

陳皮　砂仁　枳殼　桔梗
甘草　當歸　川芎　人參
鼠粘子　玄參　白芍藥

水二鍾煎八分後服玉樞丹

---

## 喉瘤



喉瘤生於喉間两傍或单或雙形如圓眼大血絲相裹如瘤故名之此症肺經受熱多語損氣或怒中高喊或誦讀太急或多飲燒釀酒或多啖炙煿物犯之即痛不犯不痛須要斂神晏息以藥攻之則此症脱落矣不可用刀點破

益氣䟽風湯

升麻　甘草　當歸　川芎
生地黃　白芍藥　桔梗　天花粉
黃芩　麥門冬　前胡　青皮

乾葛　紫蘓　連翹　白蒺藜
防風

### 麝香散　日夜吹之

真麝香（二錢）　冰片（三分）　黃連末（二錢）

右研末和勻蘆管吹入患處一日夜五六次

又一人口内生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方可飲食以手輕捻痛徹至心煎劑同前再用真麝香（二錢）分二次水調服之或用麝香散三日根化而愈

又一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有孔出臭

氣用臭狗橘葉煎頻服之而愈

一人舌上忽出血如箸孔赤小豆一升杵碎水三碗和擣取汁每服一盞不拘時服槐花末糝上尤良

一人齒齦邊津液血不止苦竹茹四兩醋煮含嗽吐之

---

### 懸癰

此毒生於上齶形如紫李墜下抵舌其人口不能言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時出紅涕若不速治毒入於腦即死治方於後

用銅匙挑開口竹批針破瘡頭用鹽湯攪淨血出盡用冰片散吹入患處閉口以待藥化自然嚥下連吹三五次仍服荊防敗毒散再服雄黃化毒丸三丸冷茶清下

此症形雖註外其實生口中上腭

## 鎖喉瘡



鎖喉瘡者心經毒氣小腸邪風發於聽會之端注於懸膺之側初生如瘰癧不能飲食閉塞難通漸次腫破化膿早治得生宜服當歸連翹散之類內用氷片散牛黄清心丸之類治之

蜒蚰不拘以麝香氷片和搗搽之

## 傷寒喉閉



此症傷寒遺毒不散致八九日後喉閉皆因熱毒入於心經脾經急服四七氣湯二三貼次用氷片散後服解毒流氣飲

白芷　防風　陳皮　連翹
人參　香附　川芎　當歸
玄參　天花粉　枳殼　甘草
桔梗　小柴胡　鼠粘子　山梔仁

一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花氷片搽舌上即收重者用五錢而愈

### 雙蛾風

此症有两枚在喉間兩邊如豆大急將黄蠶汁蜜少許玄明粉漱出風痰仍服當歸連翹散雄黄化毒丸七丸茶清送下次用氷片散吹入數次立効後服當歸連翹散

當歸　生地黄　連翹　前胡
甘草　枳殼　桔梗　黄芩
鼠粘子　玄參　天花粉　白芍藥

水二鍾燈心煎服

---

### 口緊

一名月関瘡　一名鴈來風　一名虫蝕瘡

此症急用馬齒莧汁洗緊唇仍用黄蠶汁灌去風痰再用氷片散吹之然後服防風通聖散

防風　大黄　朴硝　川芎
甘草　當歸　黄芩　滑石
石膏　薄荷　山梔　麻黄
荊芥　桔梗　白朮　連翹

如毒氣歸心胸前脹滿上氣頻促下部洞泄不止必死難治

## 木舌乳蛾

此症為因心經熱毒或因酒後温牀厚被以致熱氣攻於心經故生单蛾及舌脹而紫吐出風痰急用三稜針刺舌下金津玉液二穴及刺乳蛾俱破出血痰却用胆硝冊吹入喉中仍用荊防敗毒散雄黄化毒丸用茶湯清送下吹藥同前

一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以鈚針砭之五七次腫減三日方平血出盈斗服藥同前

宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之一畢

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之二目錄

宋燕山竇漢卿輯著
明三衢大酉堂繡梓

發腦圖說（方一）　頭後蜂窠散注圖說　枕疽圖說
腦疽圖說（方二）　對口瘡圖說（方二）　兩邊髮際發（圖說）
面發毒圖說（方三）　寒瘡圖說（方一）　瘰癧圖說（方三）
神效灸瘰癧穴法圖說（方十）　風毒發疽（圖說）（方一）
項門癰圖說（方三）　眉風毒圖說（方二）　發眉瘡圖說（方一）
上下眼丹圖說（方三）　發鬢毒圖說（方二）

鬢疽圖說（方二）　痄腮毒圖說（方二）　耳風毒圖說（方三）
耳門癰耳根癰圖說　發耳圖說　項疽毒圖說（方二）
風毒頸癰圖說（方一）　發頤毒圖說（方三）　穿腮圖說（方四）
頦癰圖說　面風毒圖說　發鬚發髭圖說（方一）
鬚發毒圖說　石疽圖說（方一）　頰疽圖說（方三）
漏睛瘡圖說（方二）　鴉啗瘡圖說（方一）　繭唇圖說（方三）

第二卷目錄畢

圖　論　方

## 發腦

此發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在風池之穴或多或少大小不同形如硬癤漸至潰爛遍生髮中痛如刀㓠赤腫無膿逆則黃水出順有白膿來治法以當歸川芎人參赤芍連翹桔梗天花粉升麻酒炒黃芩山梔金銀花黃芪乾葛之類以意消息治之外用紫金錠水磨搽之或大者以膏藥貼之一日三次宜服

蟾酥丸

蜒蚰不拘多少和葱搗爛絞汁加冰片射香少許搽之

---

## 頭後蜂窠散注



此症發于頭後如是蜂窠者急宜救之若焮赤腫痛起者得瘵痰發者必難治矣急用調治之若或流于兩肩者決不可療也治法與發胸者同

枕疽



此毒盇因風熱上攻入於內發此疽疾量人年紀老少用藥人年五十以上難治少壯可治更服內疎黃連湯十數貼加　羗活　金銀花　荊芥　千金托裏散

宜服黃礬丸　外貼金絲膏治法與對口瘡同

---

腦疽



此毒受在腎藏虛實熱壅上腦戶結伏成毒也初起三日者剃去髮以艾炷如豆大者灸五壯外用圍藥庶能消矣當用三香內托散定痛消毒飲治之

人參　當歸　升麻　川芎　白芍　桔梗　枳殼

茯苓　半夏　柴胡　甘草　羗活　防風　厚朴

白芷　天花粉　右剉薑三片燈心三十莖空心服

三香內托散

人參　木香　黃芪　厚朴　甘草　紫蘇　枳殼

官桂　烏藥　白芍　白芷　川芎　防風　乳香

薑三棗二水煎不拘時服　上中下三搭手俱用此

## 對口瘡



此毒因虛陽上攻熱入下腦故生此疽正近咽喉之所

諸陽之會間速宜調治初起用千金內托散加

羌活　獨活　柴胡　天花粉　煎服先散其虛熱

之氣然後服荊防敗毒散　外貼金絲膏

更服內托十宣散加　白芍　羌活　金銀花煎服

多服蠟礬丸護心散

圍藥

雄黃末（二錢）白芨末（一兩）和勻用蟹搗汁調敷留孔

時用水潤之

另有圍藥方在頂門疽中取用

---

## 兩邊髮際發



此證生頸後兩邊左右鬢髮邊發生急宜救之如核硬

而發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上攻于腦四

畔邊焮赤腫硬連于耳項其熱疼痛若不急療毒入血

肉腐壞為膿水頭中出血者氣喘及痰發者難治治法

同前宜加減用引經藥

## 面發毒



此症之發多起于房勞太過乘虛風入經絡陽明經虛發于面也或面生癤癰患者欲求速愈而庸醫或以毒藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯尻神惡宿或破後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服金石草木諸部惡毒相攻相反之劑以致病症日劇殊不知面為諸陽之首禁火禁刀禁毒况耳目口鼻之官總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面為陽火氣入之薰蒸肌肉刀針刺之即傷經絡毒藥點之暴剥皮肉轉轉為患繼之以風邪入之則頭面虛腫目臭腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作富楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清凉拔毒之藥內服参术內托之劑每合犀角鬱金散服之以拔積毒其命方可保也否則難生

清凉拔毒散

白芨　雄黄　射香　乳香　山茨菇　天花粉

黄栢　烏藥

右為末鷄子清調付蜜水潤之

参术內托散

人参　白术　粉草　犀角　貝母　黄連　防風

黄芩（酒炒）　羌活　桔梗　當歸　生地　白芍　前胡

天花粉

因病之逆從而加减之　水二鍾薑三片煎服

犀角鬱金散

犀角　鬱金　真珠　牛黄　粉草　乳香　真粉

辰砂

煉蜜為丸噙化

册 續修四庫全書

## 寒瘡



一人面上及遍身生瘡似猫眼有光彩無膿血冬則近脛名曰寒瘡此乃脾家濕熱所化宜服雄黃觧毒丸再服清肌滲湿湯多食魚鷄葱韮而愈惟鯉鮎魚蝦蟹不可食

清肌滲濕湯

蒼术　白术　升麻　甘草　澤瀉　山梔　黃連
厚朴　茯苓　當歸　川芎　青皮　木通　苦参
車前子　小柴胡

## 瘰癧



此症手少陽三焦經主之大抵二經多氣少血因驚憂思慮故生此疾初起生于耳下及項間并頗含下至缺盆在鎖子骨陷隱隱皮膚之内初生如豆漸長如李核之狀或一粒或三五粒按之則動而微痛不發熱惟午后微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠則堅而不潰潰而不合皆因氣血不足往往变為勞瘵自覔紅腫或上或下或左或右連串三五箇破潰遍項漸流膿血致成瘰癧獨形者為結核續欲連結者為瘰癧但此症原不係膏粱之变因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥治之其瘡自消若金石暴悍之劑血氣愈損不能生矣

第一〇一二冊　續修四庫全書　第52　版反内

若不速治必致喪生

益氣養榮湯　治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢腫硬或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治之大効

人參（一錢）白术（炒二錢）茯苓　陳皮　貝母　當歸　川芎
黃芪　熟地　白芍　桔梗　甘草　香附米（各一錢）

右作一劑水二鍾煎八分食遠服

胸痞減人參地黃各減三分　口乾加五味子麥冬　往來寒熱加小柴胡地骨皮　膿清倍加人參黃芪

膿多加川芎當歸　膿不止加人參黃芪當歸貝母　肌肉遲生加白歛官桂

馬刀瘡與瘰癧同係少陽膽經（主之）此二經亦多氣少血或在耳之前后或在耳下連及頤頷或在胸及胷側或在兩脇久堅不潰皆謂之馬刀瘡也故多堅少軟膿白如稀糊似泔水狀治者求水清可也形表如蛤者為馬刀瘡

夏枯草湯　瘰癧馬刀瘡不問已潰未潰或久成漏並宜服之

夏枯草六兩水三碗煎至一碗去查食遠服此生血補虛消毒之聖藥濃煎膏汁塗患處多服十全大補湯加貝母香附遠志

治瘰癧已成未成已潰未潰以手置肩上微舉起則肘骨尖自現是灸處如患左灸左肘患右灸右肘若左右俱患兩肘皆灸以三十四十壯為期更服補劑一年灸一次三灸其瘡自除如患三四年不愈者辰時灸起至酉時方止三灸即愈更服益氣養榮湯

又方灸法未成膿者用大蒜切片如二錢厚者安患上

用艾炷于蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十數蒜片以拔鬱毒如破久不合內有核或瘀肉此因氣血不足不能腐爛更用江西豆豉為末唾津和為餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼金絲膏瘡口自合矣

癧瘡痰核噙藥

昆布（酒洗）海藻（酒洗）大黃（酒拌蒸三次）殭蚕（薑汁炒）青黛（各二錢）
桔梗（一錢）連翹（二錢）胆星（二錢）柴胡　片芩（酒炒）
橘紅　黃連（酒炒）瓜蔞（各一錢）

右為末煉蜜丸如芡實大不拘日夜噙之

## 神効灸治瘰癧穴法



二鼠尾穴在手臂上大肉處是穴

治男子婦人小兒患此症者依此四穴燒灸無不効肩骨尾盡處是肩井二穴左肩灸左右肩灸右左右俱有俱灸鼠尾一穴用草一莖男比左手女比右手中節横紋搯量過四指紋盡處比交折斷將至絲螺骨尖中比至脚后拋筋中是穴鼠尾左灸左右灸右俱有俱灸一年五壯年深多灸專治一切發者須要禁忌房事神効不虛可以活人灸畢瘡爛車前草葉搗爛貼之看遍身神人所在禁忌并擇天醫黃道吉日

灸忌　既灸忌諸魚熱麵生酒生冷物鮮肉及房勞

---

又灸兩手掌后四寸兩筋間各七壯以病人中指横紋量至本指尖為四寸再灸肘尖左病灸右右病灸左各三壯不過三次除根

如神散　瘰癧已破瘡口不合

松香末（一兩）　白礬（三錢）為細末油調搽乾摻亦可

散腫潰堅丸　瘰癧馬刀服益氣養榮湯不能消散者宜服此丸五日再服益氣湯五日相兼服之

知母　黃栢　廣茂　天花粉（俱酒拌炒）　昆布（酒炒）　連翹

黃連（炒）　葛根　白芍　京三稜（各三錢炒）　升麻　當歸梢

甘草　小柴胡（各一兩）　草龍膽（四兩炒）　黃芩（一錢五分一半生用一半酒炒）

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸白沸湯送下

神祕散　服散堅丸益氣湯不愈宜進此藥再服益氣湯

班猫（廿枚去頭足翅同糯米炒去米不用為末）　荊芥穗（二錢）

黑牽牛末（一錢）　殭蚕末（二錢炙）

和勻每服二錢五更溫酒調下日午惡物從小便中出如小便澁或痛以葱白湯飲之或木通湯更以米

粥補之若不下明早五更再服以下為度無力者不可下每早服之五早為度

得効針頭散　追蝕惡瘡瘀肉

赤石脂（醉）乳香　白丁香（各二錢）砒（生用）黄丹（各一錢）

輕粉（七分）射香（三分）蜈蚣（一條炙）

右為末摻于瘀肉上或瘡口小就搽瘡口上瘀肉自去更以膏藥貼之肉亦去嘗用砒末二錢以白礬末二錢和勻同火上飛過用礬一錢合藥亦効但不及生砒之功速耳

柴胡連翹湯　治馬刀瘡

小柴胡（五錢）鼠粘子（二錢）薄桂（五錢）連翹（五錢）瞿麥穗（六錢）

炙草（三錢）生地（三錢）歸尾（一錢五分）黄柏（三錢酒拌炒）知母（三錢）

黄芩（酒拌炒）右勻作四劑水煎服之

消毒湯　治馬刀瘡

柴胡（二錢）連翹（二錢）歸尾（一錢）紅花（一錢）甘草（一錢）

生芩（二錢）黄連（五分）天花粉（二錢）鼠粘子（五分炒）黄芪（二錢）

柴胡通經湯　小兒項側有瘡堅而不潰亦名馬刀瘡

柴胡　連翹　當歸尾　黄連　黄芩

生甘草　鼠粘子　桔梗　三稜　紅花

川芎　水煎服

必効散　治瘰癧

朋砂（二錢五分）輕粉一錢　射香五分　檳榔一枚　斑猫（四十去頭足翅）

巴豆（五枚去皮心膜）

右同研末取鷄子清二枚去黄調藥勻傾在鷄子殼內濕綿紙數層糊定勿令透氣飯上蒸熟取藥晒干研末用時看病人虛實虛者用五分實者用一錢並用煨熟老薑煎酒五更空心調下天明取下惡物如

小腹內疼痛便用天麻子燒灰一錢沒藥一錢同研為細末茶清調下一錢取下惡物或如爛肉或如初出老鼠或新成卵內雀兒是藥効驗婦人有孕不可服

治頸上痰核飲之半月即效

青木香根葉　獨脚將軍草（各一斤）

右用大酒十斤放二味在瓶內封固瓶口重湯煮三枝官香為度埋地中三日出火毒飲之

又消紅腫痰核　（用石灰窯內紅土整為末菜油調搽空中出毒出膿以膏藥貼之）

## 風毒發疵



此瘡受在氣血不通凝滯脾胃有傷經絡或過食炙煿或被毒氣聚結成瘡或乘虛為賊風所吹當用溫中順氣飲　順氣飲孕婦加減服

溫中順氣飲

生地　茯苓　厚朴　白术　甘草
青皮　枳殼　桔梗　當歸　川芎
防風　木香　白芍　蓬术

右用薑三片棗二枚煎服不拘時

若孕婦去蓬术厚朴加砂仁陳皮

---

## 頂門瘡



此瘡受在六府與陰陽不調氣上熱壅而成瘻毒傷于腦經于是毒症不可輕忽先用敗毒流氣飲後服內托流氣飲治之

外用救苦拔毒膏

雄蜒蚰一二條和葱白二寸搗極爛加雄黃末一錢白芨末一錢和勻敷患處留孔乾用水潤之何為雄蜒蚰背上有白紋者是也對口瘡發背發疽之症亦治

用敗毒流氣飲

人參　乾葛　枳殼　桔梗　甘草
柴胡　防風　細辛　薄荷　川芎
羌活　芍藥　獨活　白芷　紫蘇
天花粉
薑三片棗一枚水煎食後服

不消用內托流氣飲

人參　木香　黃芪　厚朴　甘草
紫蘇　桔梗　官桂（冬加夏減）　檳榔　烏藥
枳殼　當歸　川芎　芍藥　白芷

薑三片棗二枚煎服
或熱加柴胡黃芩　去官桂
或痛加玄胡索　五灵脂乳香
或瀉痢加附子　人參　白朮（土炒）　澤瀉
胃氣不順加陳皮茯苓　半夏　山藥
嘔吐加生薑藿香

## 眉風毒



此毒受在肝經氣血上壅結聚成毒當用敗毒流氣飲

內托流氣飲清肝飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　生地　薄荷　青皮　枳殼　甘草
防風　川芎　羌活　前胡　連翹　芍藥　小柴胡

內托清肝飲

人參　黃芪　厚朴　甘草　防風　桔梗　天花粉
枳殼　蒼朮　升麻　烏藥　當歸　白芍　金銀花
白芷　川芎　薑三片棗一枚煎服
圍藥（用頭門經救苦長春膏治之如無與灿急用金箍散救之立効）

## 發眉瘡

發眉瘡從眉至頭生瘡色黑其腰漸漸腫氣浮滿面其瘡如石針刺無膿其水自出痛不可忍悶亂嘔逆者正是此瘡六日可刺出膿如吐逆心悶漸減可治如不能減男子二十四日而殞女子七日而終矣急用止疼之藥治之

止痛拔毒散

升麻　甘草節　鼠粘子　乳香　山梔

黃連　歸須　川芎　白芍　生地　桃仁

黃芩　羌活　獨活　桔梗　白芷　青皮

蟬殼　連翹　金銀花　宜搽紫金錠　服護心散

## 上下眼丹

此毒受在心肝氣毒上攻壅而聚此丹毒當用清心流氣飲治之兼服黃連敗毒丸

清心流氣飲

茯苓　防風　甘草　紫蘇　羌活

獨活　川芎　青皮　薄荷　黃芩　柴胡　荊芥

赤芍　麥冬　連翹　石膏　蔓荊子　右水煎服

黃連敗毒丸

黃連（二兩）　甘草（一兩）　連翹（一兩）　防風（一兩五錢）

羌活（一兩）　細辛（一兩）　薄荷（五錢）　黃芩（一兩酒炒）　甘菊花（一兩）

右為細末煉蜜丸如梧子大每五十丸食後白湯下

搽藥

皂礬（五錢）　大粉草一（兩）　二味同煎濃膏加冰片少許用鴨毛潤眼眶上即愈

## 發鬢毒

此毒受在手陽明經氣虛風熱上壅風毒成瘡當用清心流氣飲次用內托流氣飲治之此症客于會合之前灌在閃後形如米粒漸次赤腫遍身潮熱

清心流氣飲

茯苓 防風 甘草 柴胡 羌活 川芎 獨活

紫蘇 連翹 赤芍 人參 白芷 前胡 山梔

內托流氣飲

人參 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇 桔梗 枳殼

烏藥 細辛 當歸 防風 川芎 白芷 鼠粘子

芍藥 薑三片煎服 蠟礬丸日進三四服

## 鬢疽

此疽受在脾胃心肺熱氣結成毒也當用敗毒流氣飲清肝流氣飲治之或醫緩之命亦難生矣慎之慎之

敗毒流氣飲

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草 白芷 川芎 薄荷

生地 乾葛 麥冬 當歸 芍藥 柴胡 天花粉

鼠粘子 右水煎食後服

清肝流氣飲

桔梗 枳殼 甘草 防風 前胡 羌活 青皮

生地 黃芩 獨活 川芎 當歸 芍藥 茯苓

小柴胡 薑三棗一煎服 蠟礬丸時時服之

## 痄腮毒

此毒受在牙根耳聹通于肝腎氣血不流壅滯頰腮此

是風毒症先用淸肝流氣飲後用托裡流氣飲治之

淸肝流氣飲

枳殼　桔梗　黃芪　前胡　羌活　甘草　石膏
防風　川芎　芍藥　荊芥　白芷　生地　薄荷

托裡流氣飲

人參　黃芪　當歸　川芎　白芍　甘草　防風
厚朴　烏藥　官桂　木香

薑三棗一煎服

患處用劉藥敷之

## 耳風毒

耳風毒受在心腎氣不流行壅在心經致傷于耳玉徑

耳痔耳蕈耳壅耳濕耳爛可用淸肝流氣飲後用定痛降氣湯治之如遇耳痔耳蕈先用針刺破用紅玉膏點之耳脹痛用虎耳草汁滴入耳內痛即止耳疔以燒酒滴疔根上方得脫隨用苦茶洗解酒毒

淸肝流氣飲

枳殼　桔梗　黃芩　前胡　羌活　青皮　小柴胡
薄荷　生地　烏藥　甘草　防風　川芎　白芷
石膏　赤芍　（右用水煎服）

定痛降氣湯

紫蘇　厚朴　陳皮　甘草　半夏　前胡　川芎
防風　芍藥　白芷　當歸　黄柏　知母　乳香

小柴胡

薑三片棗一枚煎服不拘時

若耳輪赤爛清凉膏貼之

耳脹痛

用江魚齒又名腦内骨火煅為末水調滴入耳内

耳門癰
耳根癰



---

耳門癰受在肝經毒氣傳注血不周流此是惡毒症也

當用前藥治之

耳根癰受在腎經絡怒氣傷心凝滯肝經風熱蘊盛成毒也當用俏風藥治之

頦上者不為風　頦下者要成漏瘡此症不可輕易

用俏風藥治之可也

用前清肝流氣飲活法施治之

發耳



其瘡生于耳邊又名熱毒發疽五六月間漸長如蜂窠皮紫者亦熱諸處如火燒痛不可忍十日可刺無膿者十一日死若瘡不硬刺見白膿者不死黃膿出者不死無時出鮮血者及赤膿者死食不知味多譫語者亦死在二十日之間便見凶吉

煎藥用千金内托散隨時增損之

## 項疽毒

此毒因五藏受毒氣壅血枯伏在風府之間悪症也當用敗毒流氣飲治之後用内托流氣飲

敗毒流氣飲
紫蘇　桔梗　甘草　川芎　小柴胡
青皮　枳殼　防風　羌活　白芷　芍藥　當歸
連翹　獨活　右水薑三棗一煎服

後服内托流氣飲　人参　黃芪　厚朴　甘草
紫蘇　桔梗　枳殼　官桂　檳榔　烏藥　當歸
防風　白芷　芍藥　川芎　柴胡　煎同前
婦人加香附　夏天去官桂加麥冬

## 風毒頸瘡

一人肥壯素能飲酒酷暑遠行酒醉居于舟中卧於風内又為日色暑氣相侵并有七情所干帰家不免于色慾頸項間忽痛如失枕之狀其名曰何乃風熱鎖喉毒也久則紅色遂于肩背堅硬難消急服清暑踈風散

清暑踈風散

羌活　防風　荆芥　升麻　甘草
乾葛　蒼术　厚朴　川芎　當帰
白芍　獨活　白芷　桔梗　紫蘇
大柴胡　薄苛　薄桂　枳殼　蔓荆子

木香　藁本

水二鍾薑七片葱白三根濃煎熱服隨飲好酒以助藥力以衣覆患上出汗為要次用围藥并服千金托裏散加踈風清暑之劑

---

### 發頤毒一名流注



此毒傷寒後餘毒不散汗發不透故發此疽在頭耳一

寸三分在心窩兩肋在身者可治在耳後相連咽喉恐毒氣内攻難進飲食藥餌臭流清膿兩耳閉塞者即死無即生用前二十四味流氣飲熱服以出其汗次服千金内托散（患上用鉄箍散將薑汁好醋加蜜少許和勻火上熬熱調藥搽四向空中出毒時用絲汁温調之）

桔梗　厚朴　白芷　防風　人参　黄芪　川芎
甘草　當帰　官桂　黄芩　白术　煎服

不換金散

半夏　厚朴　蒼术　陳皮　人参　藿香　茯苓
木香　後再服乳香護心散　仍貼金絲膏

## 穿腮



一名骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名牙槽風

此毒因憂思驚慮太陽受症結于大腸之間邪毒交生淮于經絡之内初起生于耳下及項間隱隱皮膚之内畧有小核漸長如李子之狀便堯紅腫或上或下或左或右牙關口噤不開急用鵝毛探出風痰即服驅風破毒散立愈

驅風破毒散

白礬　巴豆（去油一錢）紅内硝　草烏尖　猪牙皂角

薄苛（各等分）　右爲細末吹之

又方

天麻　防風　草烏　蓽撥　細辛　乳香　川芎

朋砂　薄苛　射香　温水嗽口或鼻内吹之

此症小兒亦生者其故何也稟氣虚弱感風寒暑熱相結成痈或恣食肥甘生冷甜物餘穢積成于牙縫不能滌洗去垢漸爛至臭膿血淋漓日久則氣血凝滞結成多骨而出甚至爛漫穿腮急用珎珠氷片散搽之

珎珠氷片散

珎珠（一錢）紅絨末（一錢）人中白（煅一錢）枯礬（二錢）雞内金（煅存性一錢）

氷片（五分）射香（二分）銅青（一錢）青靛（一錢）黄連末（一錢）

孩兒茶（一錢）細牙茶（一錢）

右為細末先用蚌水繳净患處每摻入之一日夜一二十次之方愈男婦亦然并服前劑

清熱消痈散

乾葛　升麻　生草　貝母　黄連　黄芩　茯苓

桔梗　薄苛　防風　荊芥　羌活　青皮　牡丹皮

當歸　白芍　生地　鼠粘子　水二鍾燈芯三十莖煎服

虚加人參白术年久加草龍膽　熱加柴胡前胡

## 頦瘡



此毒生于頦上不為風頦下要成漏瘡不可輕易當用敗毒流氣飲　毋用内托清肝飲　二方見前

圍藥同前

---

## 面風毒



此毒氣血壅上結聚成毒當用㕥貿疽藥治之先用敗毒流氣飲　後用清肝流氣飲治之

外用圍藥敷之

發鬢毒　發髭毒



此發鬢者脾胃虛熱心肺邪風上攻禾髎之端多在承漿之側形如羊刺西邊腫硬痛楚難禁時流黃水麻痺增寒壯熱毒氣下流心胸主壯逆皆伏陽攻于心肺虛熱注于三焦內服當歸內托散外微擦破以神應散搽之

神應散

輕粉一錢　雞內黃二錢　射香三分　氷片三分　黃柏末二錢

韶粉二錢　五倍末一錢　黃連二錢

右為末先用甘草苦參豬蹄薄荷白芷防風荆芥煎湯洗淨拭乾將陳菜油豬膽汁調搽之

---

鬚發毒



此毒因腎絡有熱水枯不能上潤于心火故發此毒急服人參敗毒散加五味子　千金內托散　蠟礬丸每服五六十丸連進十餘服待瘡軟頭用替針丸咬破不可用針刺若針刺瘡口出黃水四圍生細黃泡延而遊走再用拔毒散圍四畔治法同發髭毒煎劑隨時施治

## 石疽



石疽雖與石癰同惟石疽深寒客于經絡血氣結聚不散隱于皮内腫按之如石此毒連頸項之間内先潰爛方出皮膚恐髓出頸項者即死用排膿内補十宣散待膿盡内補散恋心乳香護心散仍貼金絲膏渴甚加五味天花粉乾葛麥冬烏梅初起須用艾火灸患上三四十壯發于額而者不可灸

煉石散　堅如石硬其色不變

鹿角（燒兩）白蘞（三兩）粗厲黃石（二斤）在火好醋五升先燒石通紅淬醋中再燒再淬醋盡乃止為末加二味末將剩下醋調如泥塗上消軟灸處亦塗之（以方以南陸尚作益忠上）

## 頰疽



此毒生于頰車之上多者皆出于附骨亦名附骨疽若不速治漸倒其骨久後必致成漏終不能痊治方于後

内托散加　羌活　獨活　水煎服

次用十奇散加川椒　細辛　桔梗　青皮

外用圍藥搽之

漏睛瘡

夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎湍灌于瞳人初生痰癢漸成膿水其色如泔日久睛昏氣敗肝絕難救之症慎之慎之

先服黃芪當歸川芎生地白芍黃芩薄荷荊芥連翹白芷升麻桔梗天花粉之類

次用黃連地骨皮當歸煎湯溫洗

治方關要惟補腎宜肝為急學者宜參詳之不可輕視之也

---

鴉啗瘡

鴉啗者久中邪熱臟腑虛寒血氣衰少腠理不密發于皮膚之上相生如錢窠後爛似鴉啗日久將來損傷難治小兒同前其治法用陰蝕瘡之藥治之

鴉啗散

老鴉毛（燒灰）大紅絨（灰一錢）珎珠（五分）氷片（一分）枯礬（五分）

輕粉（三分）黃丹（一錢）射香（少許）

右為細末先用苦茶洗淨乾摻其煎劑以意加減用之

## 繭唇

此症生在唇上



繭唇者此症生于嘴唇也其形似蚕繭故名之内經云脾氣開于口又云脾之榮在唇但燥則乾热則裂風則瞤寒則揭若腫起白皮皺裂如蚕繭故定名曰繭唇也始起一小瘤如豆大或再生之漸漸腫大合而為一約有寸厚或翻花如楊梅如疙瘩如灵芝如菌形狀不一皆由六氣七情相感而成或心思太過憂慮過深則心火焦熾傳授脾經或食釅酒厚味積热傷脾而腎水枯竭以致之須審其病症之因惟補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消矣此亦眾症所生者少人亦难曉若久不愈者急用金銀鎔鉄在文火内燒紅溫之内服歸脾養柴湯庶易愈矣若外用追蝕悪毒線結之法反為所傷慎哉慎哉若婦人患此陰血衰少故也宜用四物逍遥散治之

### 歸脾養榮湯

當歸　川芎　白芍　生地　茯苓　陳皮　小柴胡

甘草　麦冬　升麻　山梔　桔梗　黄芪　白术

防風　黄連　牡丹皮　黄栢　知母　婦人加（澤蘭香附玄胡索）

### 烙鉄法



不拘金銀打成烙鉄每用文火鉄燒通紅乘热溫患上再鉄非溫一日止可五六次恐傷元氣須要擇上吉日不犯尻神溫畢隨將藥搽之庶不再生矣

### 除根搽藥

莧菜（明乾燒灰二系）　銅青二系　枯九二系　輕粉二系　雄黄二系　雞内金二系　射香二分　孩兒茶二系　右為細末麻油調搽明日再用甘草湯洗凈再烙如前以平為度後用生肌散

花蕋石（醋煆二系）　孩兒茶二系　雞内金二系　飛丹（煆水飛）　乳香二系　血竭二系　紅絨灰二系　黄連一系　右為細末加氷片一分搽

重校始祖宋寶太師瘡瘍經驗全書二卷畢

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之三目錄

宋燕山竇漢卿　輯著
明三衢大酉堂　鐫梓

肺疽肺癰圖說（方四）　井疽發圖說（方一）　穿心冷瘻圖說（方廿）
胃癰圖說（方二）　心肝癰圖說（方二）　血府瘡圖說（方二）
蜂窠發胸圖說（方一）　九發圖說　肚癰圖說（方一）
氣毒流注圖說（方一）　臍癰圖說（方一）　小腸癰圖說（方十）
盤腸癰圖說（方二）　發肚毒圖說（方三）　臍癰毒圖說（方一）
肋肚毒圖說（方一）　乳癰圖說（方一）　乳發圖說（方三）

妳癧圖說（方二）　妳癖圖說（方二）　乳巖圖說（方二）
風毒遍身串圖（方一）　火腰帶毒圖（方三）　內丹圖說（方一）
肩疽并丫疽圖（方一）　上下肋癰圖（方二）　訓疽標疽圖說（方十）
肘後癰圖說（方二）　左腋疽圖說（方四）　右腋疽圖說
筋疽圖說　中發疽丫刺毒天蛇毒圖說（方六）
肩疽圖說（方二）　背面毒圖說（方二）

第三卷目錄畢

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之三

圖論方

## 肺疽



此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生此疽在皮膚之間或生遍身形如木鱉子大如雞頭大若不速治毒氣入囊即死內服敗毒散加猪苓澤瀉當歸黃芪桔梗天花粉荊芥連翹外用圍藥敷之

升麻湯　治肺癰肺疽胸乳間皆痛口吐膿血作臭

升麻　桔梗　薏苡仁　地榆　黄芩
赤芍　牡丹皮　生甘草　黄芪　貝母

水煎服　虛甚加人參白朮

冬服護心散　蠟礬丸　牛黄清心丸

## 肺癰



夫肺者五藏之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮形寒飲冷以傷肺經遂致成癰身發寒熱兩肢脇脹俱痛口吐膿臭日夜無度喘欬胸膈喘滿兼脹悶不安已破入風者不治急服枳朮桔梗湯并升麻湯　十六味消化飲　黃礬丸　各進三五服夜服牛黃清心丸　更有乳香萬應膏貼之

參芪大補湯　節勞戒氣忌酒絕慾已破收斂瘡口合歡皮白蘞二味㕮咀每服五錢水煎溫服合歡皮即黃芪皮也

桔梗湯

桔梗　貝母　當歸　枳殼　防風　苡仁　瓜蔞仁

桑皮（蜜炙各一錢）　黃芪二兩伍錢　杏仁　百合

甘草節（各五分）　薑三片煎服

款花湯　嗽而胸滿振寒脉數咽乾大渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥狀者乃為肺癰

款花（一兩去梗）五錢　甘草一兩炙　桔梗（二兩）薏苡仁一兩

右作十劑水煎服

內癰有膿敗血腥穢殊甚遂致臍腹冷痛此乃敗膿所致以此推下膿血

白芷四兩　白芍一兩　枯礬一兩　单葉紅蜀葵根（八分如无以蘇木代之）

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸清米湯空心下其膿漸出生肌

## 井疽發



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大二四日起若不早治必入于腹入腹不瘵十日當死急服內固清心散可治若內發傷膜主死無疑治法與發胸發背同

保內清心散

粉草　升麻　當歸　川芎　黃芪

芍藥　山梔　乳香　黃芩　羌活

桔梗　天花粉　青皮　白芷　水煎服

即服護心散、飛礬丸　務要戒怒

圍藥同前

---

## 穿心冷瘻



此毒生于心窩初起則心頭如火熱其毒先內潰心胞

方出皮膚令人心神恍惚盜汗多出二日皆紅舌如雞金背裏外俱熱易治若毒發于外冷氣攻心常嘔吐惡心口吐冷痰惡聞食味然氣臭者死治方于後

辰砂　茯神　遠志　茯苓　人參　乳香　沉香

丁香　木香　藿香　射香　酸棗仁

各等分末之入辰砂末二錢金箔五片仝研細燈心薄荷湯下

內塞散　治穿心冷瘻

人參　白朮　白茯　熟地　甘草　芍藥　黃芪

肉桂　當歸　黃芩（酒炒）　桔梗　防風

水煎服連服十貼次服黃礬丸護心散常服

試治法

乾薑為末雞子清調付如潰爛洗净瘡口拭乾摻末覺熱如烘生肌易愈

六合回生丹　有回生之妙

真鉛粉（一兩）　輕粉　銀珠　雄黃　乳香（箬上炙黃）

沒藥（同前各二分五厘共一兩一錢二分五厘）

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先用

好苦茶洗净瘡口軟絹拭乾后剖猪腰子片用藥一二分摻腰上却付患上待腰子發熱如蒸良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不可手擠第二日依前法再付之第三日亦付之悪甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

治痛心育前有孔乂不愈即漏也胃癰并癰心肝癰心瘻之類

鹿茸（去毛酥炙微黃）　附子（炮去皮臍）　塩花（即塩好）　右三味各等分為末

用棗肉去皮核為丸每服三十丸空心酒下（亦治漏疾）

胃癰

素問云人病胃脘癰當候胃脉脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃口不行故胃為癰其發寒熱如瘧身皮甲錯或嗽或嘔或吐膿血

連翹升麻湯　熱聚胃脘留結為癰須要知戒

沉香（另）　乳香（另）　生甘草　青木香（三錢）　連翹

射干　升麻　羗活　桑寄生　木通（各七錢五分）

大黃（飯上蒸三兩）　射香（二錢）　右作十劑每劑以粗藥水煎去柤入五香細末溫服以利為度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角　梔子仁　赤茯苓　赤芍藥

射干　黃芩　大黃（炒熟二錢）（各）水煎去柤入蜜再煎溫服

### 心肝癰



心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二

官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心主行血氣血熱傷于經絡此是惡毒之症不可不審也當用定痛敗毒散如不散用內托流氣飲

定痛敗毒散　紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　烏藥

茯苓　防風　白芷　香附　白朮　羌活　人參

前胡　薑三片棗一枚灯心廿莖煎服

內托流氣飲　人參　黃芪　厚朴　甘草　紫蘇

桔梗　枳殼　白芍　當歸　防風　烏藥　白芷

川芎　薑三棗一食前服　腹痛加沒藥玄胡索

---

### 血疳瘡



夫血疳者臟中虛弱邪氣相侵眞氣衰少風毒閉塞腠

理發于肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身行處成瘡損傷皮肉痒痛難存治法先服當歸連翹散並服清肌滲濕湯并搽十神散

清肌滲濕湯

歸須（酒洗）　白芷　甘草　升麻　蒼朮

白朮（土炒）　川芎　白芍（酒炒）　連翹　山梔（酒炒）

黃連（酒炒）　黃栢（鹽酒拌炒）　知母（同上）　木通　青皮

木瓜　澤瀉　茯苓　苦參（酒炒）　枳殼

柴胡　石菖蒲　煎服治法亦同紫疥

蜂窠發胸



此症蜂窠發于胸乳間乃心火熱盛須用依前踈導心火之藥稍治之遲則熱必攻心必然死矣

煎藥

人参　黄芪　白朮　茯苓　甘草　金銀花

連翹　生地　白芍　山梔　黄芩　天花粉

桔梗　防風　青皮　乾葛　麥冬　鼠粘子

冬天加官桂　夏天加黄栢　雨天加澤瀉

先貼膏藥　后用掺藥方具于前

洗用猪蹄湯

九發



此症發為肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽三焦疽小腸疱右驗其人所膜依據此候審定疱疽淺深其病從何臟腑發先曾食何乳石又驗其氣血虛實穿潰出外者可治發于內者則傷膜流膿大便出者必難治若以藥會膿大便出者則藥味入于經絡引出無害當參詳而療之

参芪内托散具前愈後一年之外不許遠行及行房事若不知戒終至于斃

圖藥同前

## 臍癰

此症生于臍內因食冷物油膩之物積聚于氣海之間聚結成癰若不速治即內潰臍內出膿四圍堅硬或出此血水者即難治也無此即生

用內托散加　猪苓　澤瀉　帰消　黃栢　車前子

知母　膿盡多加　白术　黃芪　熟地　山藥

多服蠟礬丸

如未潰破按之有膿将治腸肚癰行藥從大便中出

其妙方亦同

痛加乳香

---

## 小腸癰

此症因膀胱有熱畜毒不泒結成此毒以致臍中堅硬結核小便疼痛日夜下利無度治方于後

用服敗毒散加

猪苓　澤瀉　木通　燈草　甘草稍　瞿麥

又用連根葱十根搗爛盦臍上多服金花丸

用前腸癰肚癰之法治之

即盤腸癰
用腕疘後右



此毒因悶肭而得之用獨活散　此即治腕疘藥

羌活　獨活　烏藥　茯苓　荊芥　當歸　川芎
桔梗　白朮　黃芪　升麻　貝母　枳殼　知母
黃栢　人參　再用前肚癰之法治之

會膿在大便中出法開后

大黃三錢　薑黃二錢　赤石脂二錢　穿山甲炮一錢五分
白芷一錢　髮灰一錢　巴豆（不去油一粒臨服和藥內研細）
右為末米酒早辰空心調服
行利十餘次用薄粥補之如瀉不止飲浙汲井水三酒盃其瀉立止須要服參芪膏大補之

---

發肚毒



發肚之毒有發腹肚或手肚足肚者俱為發肚若不速治必致喪命便服蠲毒流氣飲三四服并服六皮四子湯

內托散加　木瓜　檳榔　蒼朮　空心煎服
未潰用金箍散
已潰后外貼金絲膏　服蠟凡丸
六皮四子湯
陳皮　青皮　腹皮　加皮　韮皮　茯皮　天花粉
蘇子　蔔子　甘草　葶藶子　車前子

## 肚癰



此毒生于脾經因食煎煿油膩酒醉太過及行房事以致毒不流通聚成此癰或生在外或生在内若不速治潰透脾膜即死用此方服之

厚朴　砂仁　半夏　陳皮　茯苓　人参　青皮
芍藥　木香　枳殼　甘草　甜孚　黄芪　白术

次服内補十宣散　蠟礬丸

潰后久不愈用前六合回生丹猪胰子法治之

未潰爛之前按内有膿狀急用腸癰之行藥追膿大便中出庶易愈矣

---

## 肋肚癰



此癰受在大小腸二經氣癰發出在表此乃結熱聚毒也當用内托流氣飲

人参　木香　黄芪　厚朴　甘草　紫蘇　桔梗
枳殼　官桂　檳榔　烏藥　當歸　芍藥　白芷
川芎　防風　天花粉

薑三片棗一枚用水煎服

外用圍藥　内服腸癰從大便會膿之藥治之調理禁忌之法相同

## 氣毒流注



此症因喜怒不常飲食失節氣上停食或因負重努力傷其經絡故生此疾便服蠲毒流氣飲　內托千金散　黃礬丸　護心丹　此症乃乘虛感風濕熱相結而成初生一二漸至于多及有廿三五者遍體皆生先發汗以解風濕次用參芪之劑補之圍藥薑汁醋調有方（在前）

取汗流氣飲　川芎　白芷　升麻　甘草　當歸

羌活　獨活　烏藥　木香　紫蘇　防風　荊芥

蒼木　厚朴　肉桂　麻黃　黃芩　桔梗　大柴胡

白芍　（水二鍾薑五葱三煎熱服以衣覆身出汗為妙如無汗再服次鍾有汗不必服止可一劑）

次服內托千金散六加參芪　霖雨加蒼木澤瀉

---

## 臍癰毒



此癰受在心流于小腸經發在臍中堅硬如石與男子不同此是惡毒症也當用內托流氣飲定痛三香飲治之治法須用圍藥并同男子臍癰之藥加減治之

定痛三香飲

乳香　香附　木香　延胡索　人參

黃芪　當歸　川芎　芍藥　防風

官桂　甘草　枳殼　桔梗　烏藥

厚朴　白芷　夏天去桂加乾葛黃芩生地麥冬

薑三片棗一枚煎服

## 乳癰



乳房屬陽明經乳頭屬厥陰經此毒因驚憂鬱結乳間成癰初起二三日即用鹿角散

鹿角　乳牛角　穿山甲（燒過三味為末好酒調服）

外用金箍散蜜水調付若不能遂急用荊防敗毒散加　瓜蔞子　天花粉　水二鍾煎服若五七日不散服內托散加　白芍　金銀花

外吹乳者小兒吮乳吹風在內故也內吹乳者女人腹中有孕其胎兒轉動吹風在外故也煎藥中須用保胎之劑以治乳發之藥同用之

## 乳發



皂角散治乳癰及乳疼皂角（一條燒灰）蛤粉（三錢）乳香（一錢）末之酒調下以手揉乳令散　外用金箍散敷之

內服復元通氣散木香　青皮　白芷　貝母　金銀花

陳皮　穿甲（炮）　紫蘇　當歸　川芎　連翹　甘草節

木通　瓜蔞仁　已潰者用人參黃芪貝母白朮之類

治發乳癰疽一切腫毒　石膏　青皮　陳皮　穿山甲（酥炙）

當歸　木香　人參　麻黃　白芷　甘草　乳香

沒藥　川芎（各等）　漏芦　枳殼　貝母（以上為細末酒調服或剉水煎酒服亦可）

又方白芷貝母各半為末酒調下（二錢）日三次如乳不下加漏芦

乳疼洗法牡蠣（一兩煅）五倍（子二錢）枯凡（一錢五分）水二碗煎洗

## 妳癧



此疾因女子十五六歲經脉將行或一月二次或過月不行致生此疾多生寡薄氣體虛弱宜服敗毒散加地黄再服黄几九其毒自然而散不致損命每乳上只有一箇核可治若串成三四箇即難療也治法逍遥調經湯開鬱順氣解毒湯加減用之

開鬱順氣解毒湯（青皮當歸甘草撫芎生地柴胡香附陳皮梔仁赤芍）

（連翹砂仁桔梗天花粉烏藥黄芩羌活金銀花）冬天加桂玄胡索

再用夏枯草四兩水三四碗砂礶煎服

逍遥調經湯（當歸生地白芍陳皮丹皮川芎熟地香附甘草澤蘭）

（烏藥青皮玄胡索黄芩枳殼小柴胡）煎服

---

## 妳癖



此疾乃五六十歲年老之人生此疾症不成膿結毒莫用凉劑付貼若使凉藥付貼即毒入肺腑即死用鹿角散相和黄礬丸頻頻服之以好為度

開鬱順氣解毒湯方在前

千金托裡散

## 乳岩已嫁未嫁皆生



此毒陰極陽衰杰虛陽積而與血無陽安能散故此血滲于心經即生此疾若未破可療已破即難治捻之內如山岩故名之早治得生若不治內潰肉爛見五臟（而死）未破用獨毒流氣飲加　紅花　蘇木　生地　熟地

青皮　撫芎　烏藥　甘草　小柴　瓜蔞仁

又方

撫芎　柴胡　青皮　香附（各二兩）甘草　玄胡索

陳皮　桔梗　黃芩　梔仁　枳殼　天花粉

烏藥　白芷　貝母（各一兩）砂仁（一兩五錢）蔓荊子（炒一兩）

右為末水丸每服二錢日進三四服作煎劑服之亦可

---

## 風毒遍身生



此毒生於皮膚之間因中暑毒或食灾牛灾馬瘟猪等物以生此疽雖見勢兇亦易治忌食生冷毒入臓腑難治先服流氣飲次服人参敗毒散加

猪苓　澤瀉　當帰　防風　外用圍藥

次服蠟凡丸

用前醫流注取汗流氣飲治之甚宜

火腰帶毒



火腰帶毒受在心肝二經熱毒傷心流滯於膀胱不行

癰在皮膚此是風毒也當用清肝流氣飲敗毒和氣散治之不可便敷藥清肝流氣飲亦宜

桔梗　甘草　防風　前胡　羗活　獨活　赤芍
連翹　薄荷　荊芥　石膏　枳殼　黃連　白茯
歸須　青皮　黃芩　煎服之

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　防風　柴胡
甘草　川芎　白芷　芍藥　當歸　羗活　茯苓
烏藥　陳皮　薑三棗一煎服

患上用紫金錠水磨汁頻用鵝毛蘸汁潤之

---

丹



內外者從脇下至腰下腫發赤色名曰內丹如早斍可治至腰便不可治其病多大小便不通似有不過三日而飛遍身青黑色而死用救急丹醋磨付內丹處更服

連翹敗毒散

當歸　連翹　黃芩　甘草　麥冬
木通　柴胡　前胡　黃連　生地
薑二片棗一枚水二鍾煎服

## 肩疽并丫疽



病肩疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托散加烏藥　青木香　外貼金絲膏

又疽因空心于宿水內洗手恐水中有蚤遊過染其穢毒以生此疾急用鉄箍散暗醋調和厚付患處却服敗毒內托散神思昏迷色紫氣息者難治

## 上下肋癰



上下肋癰受在肝經寒熱不調風濕伏於腸胃結成癰毒發出皮膚生此惡症當用敗毒流氣散後服內托流氣飲

敗毒流氣散

紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　芍藥　烏藥　厚朴
青皮　茯苓　陳皮　柴胡　玄胡索（姜三棗一不拘時服）

後用內托流氣飲

人參　木香　黃芪　厚朴　甘草　紫蘇　桔梗
枳殼　官桂　烏藥　當歸　白芍　防風　白芷
川芎　茯苓　陳皮　天花粉　薑三棗一煎服

## 訓疔

一名熛疽



訓疔者肺經受熱發于兩手五指頭上一八日不瀉必死四日可刺如發黒瘡不甚過節猶可治也黒甚過節者死雖過節猶可治者藥入及之也其狀因小顆肉中生點子點小者如粟豆大惟大者如梅李或赤或黒乍青乍白有實核即根也不浮腫慘痛應心至骨或身體發熱若不急治毒遂冲上面恐腫泡點紫黒爛壞入藏殺人兩人得此名曰榻着毒即截去其指恐毒攻上罕有一生十指端忽然策策痛入于心不可忍之向明望看見見黃赤或點青黒是熛疽齒間出臭水血者七日亡矣但厚肉處即割去用炮鉄烙炮上令焦如炭亦如疔上灸百壯為佳須頻飲葵根汁青黛花竹瀝犀角汁枳殼湯消毒飲若吐膿血不治宜以灰掩膿血上不爾毒氣着人亦相染矣瘭疽害人不旋踵惡風入肌脉初未知斉毒發既發若火之烈其上隱小而深實點黒而不明其病應心稍緩則入臟矣

### 枳殼湯

枳殼　射干　升麻　生地　黃芩　前胡　金銀花

連翹　大黃（炒）　甘草（黃）　犀角（另磨汁臨服加之）

水二鍾煎日三服

**消毒散**　瘭疽熾甚十指舉赤痛而痒

梨芦　大黃（炒）　黃栢　黃連　甘草各一兩

水一斗文武火煮一升濾淨淋洗患處

### 皂角散

貴后用皂角去皮子燒灰為末鹽湯洗淨乾付三四次

**風疽**　由風濕之氣入于腠理流注血脉不利拳曲腫起疼痛經久不瘥蓋風勝則動故其疽留止無常得之醉卧當風汗出宜用前十六味流氣飲并服黃芪

丸

黄芪丸　酒醉汗出風入經絡成風疽

黄芪　犀角屑（各三兩）黄連　茯神　當歸　防風（各三錢）

甘草（三錢）芍藥　升麻　黄芩（各五錢）木通（八分）射香一分

右為細末拌勻煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心生薑湯下食後再服再用麥冬湯調服護心散時用胆礬乳香末付之大凡此症須剔去甲方愈

又方用烏梅十枚熨斗內炭火燒令通赤去火毒碾極細末以塩湯洗淨摻之仍軟帛裹之如瘡急痛即以

酥油塗瘡上

甲疽

足三陰經皆起于足氣血阻滯不行潰于指甲間或剪甲傷肌或長侵肉或屨小不適血氣阻遏不通腐潰久則浸淫爛指然病在四末不必治內惟用摻藥而愈

緑礬丸

緑礬五兩置鉄板上聚炭封之火熾緑礬沸流出沸定汁盡出火待冷為末先以塩湯洗淨瘡拭乾付末

多付愈佳軟帛紮裹當日即汁斷瘡乾若急痛以酥令潤每日一遍塩湯洗有膿處令淨其痂乾處不須近湯每洗訖付末如初但急痛即塗酥五六日其瘡上痂漸剝起依前洗付十日餘即瘥漸漸總剝痂落軟處或更生白膿疱即捺破付藥自然瘥也

甲疽赤肉生甲邊上裹甲用白礬燒令沸定為末付之濕則再付一日數易即消散矣須先以葱根湯浸洗足甲令軟快刀割去甲角入肉處挹乾取藥付之軟絹裹之半日藥濕則易之瘥后須用寬鞋勿穿窄者

又方

緑礬　蘆薈（各二錢）射香一分末之絹袋盛藥納脚于袋中線扎定以瘥為度

甲疽胬肉膿血疼痛

牡蠣厚者生研細末每二錢青散少許酒調下

嵌甲

硇砂　乳香（各一錢）部粉（五分）橄欖核（三枚燒存性）

黄丹（一錢飛過）

末之麻油調付先以塩湯挹乾拭之

代指　芒硝煎湯淋洗方濆

附脚背發此症由于消渴之症發于足指者名曰脫疽其狀赤紫者死不赤黑者可治宜服苦参丸

苦参丸　專治此發

苦参（四兩酒拌炒）　羌活　獨活　蔓荊子　茯苓
赤芍　川芎　何首烏　當歸　荊芥
甘草　白芷　防風　白蒺梨　山藥
黃芪　山梔仁　牙皂　川烏（生去皮再火炮）各三錢

酒糊爲丸每服二錢或酒或塩湯下茶清亦可

又方

苦参無名異各半同桐油煎三沸加川椒五錢再煎濾淨將桑葉或芭蕉葉浸油內七日貼在瘡上即安

手指發者同前治之



肘后瘡乃發背毒也

此發背毒受在心腎經通於五指絡毒氣流走通爲串漏此是惡毒也當用內托流氣飲定痛消毒飲治之此肘後毒氣血流注積結成毒此乃瘟毒也定痛流氣飲

當歸　生地　紫蘇　芍藥　甘草　桔梗　枳殼
烏藥　白芷　羌活　防風　川芎　茯苓　天花粉

消毒流氣飲

又方　木香　當歸　川芎　檳榔　黃芪　芍藥
防風　甘草　厚朴　桔梗　枳殼　烏藥　白芷
薑三棗一煎服

## 左腋疽



此左疽生扵左腋下乳側間因喜怒不常或飲食之間忽然被驚或忍氣而得之若不速治必成流注

急服千金內托散

蠲毒流氣飲　黃几丸

外用圍藥鉄箍散或金箍散敷治之

---

## 右腋疽



右腋疽生扵血堂之間初起一小核日漸長大成疽急服內托散三五貼外用圍藥并服黃几丸

再服十奇散三五服方可用針刺破

治法同前

筋疽或生臂撑上者即鵝疱也



此疽生動脉之間筋寄之上臂膊不能屈伸若不速治潰爛筋脉必致成疾若生于臂撑上者名鵝疱紅腫作痛初宜灸之若潰之必損命不可輕忽治方于後

內托散加木香五加皮更服黃丸九九十奇散護心散

外敷鉄箍散加薑汁調付

多服護心散

---

中發疽　丫刺毒　天蛇毒



中發疽受在肝經氣血不行壅聚結成毒也當用托裏流氣飲消毒流氣飲治之

羗活　人参　桔梗　枳殼　甘草　防風　柴胡
黃芩　川芎　獨活　前胡　蟬脫　芍藥　當歸
白芷　右水薑三片棗一枚煎服

托裏流氣飲

人参　黃芪　當歸　川芎　白芍　烏藥　甘草
防風　白芷　厚朴　茯苓　紫蘇　桔梗　青皮
黃芩　右煎法同前

## 手腕毒



此毒受在掌后因心經風寒、喜怒驚風痰盛血不流通結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之

定痛敗毒散

白芍　白芷　乳香（末）　桔梗　枳殼
防風　當歸　羌活　茯苓　甘草
薄桂　靈仙　木通　金銀花
姜三棗一煎服　夏天加黃芩

內托清氣飲

人參　黃芪　紫蘇　厚朴
川芎　桔梗　金銀花　枳殼　青皮　甘草
防風　天花粉　木香　羌活　當歸、　芍藥（煎同前）

天蛇毒受心風傷于指肘背此是惡毒疵也當用定痛流氣飲治之

定痛流氣飲

人參　當歸　蟬脫　黃連　桔梗　防風　甘草
白芷　乳香　青皮　白芍　烏藥　山梔仁

此症未熟不宜便用刀開針撥其弩肉即發起深難治者

又方　用蜈蚣一條火上炙乾末之猪胆汁調塗時用胆汁潤之

又方　黑生豆為末將黃梔子數二枚研末胆汁調塗一潰後經年不能長肉用二黃散摻之

二黃散

牛黃（真者）一錢　雄黃（透明）二錢　冰片一分

右為細末乾摻須要戒房勞湯火風氣之類

## 肩疽



肩疽受在腎膀胱氣血凝滯不行結成疽毒也先用流氣飲內托飲四圍以圍藥敷之

多服消毒散

人参　紫蘇　前胡　川芎　黄芩　桔梗　羗活

獨活　枳殼　茯苓　甘草　防風　赤芍　煎服

內托定痛散

人参　黄芪　地黄　白芷　川芎　赤芍　防風

赤茯　甘草　烏藥　桂心　枳殼　桔梗　木香

薑三棗一不拘時服　與有瘡藥同

## 背面毒



此背面毒受在肝肺經氣血凝滯不通結聚成毒此是惡症也當用清毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　烏藥　白芷　腹皮

黄芩　當歸　芍藥　川芎　防風　羗活　柴胡

白芨　連翹　姜三棗一煎服

后用定痛內托飲

人参　當歸　芍藥　厚朴　桔梗　川芎　甘草

防風　白芷　黄芪　茯苓　羗活　烏藥　官桂

紫蘇　香附　右煎法同前

圍藥用金箍散敷之

瘡瘍經驗全書卷之三　畢

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之四

宋燕山竇漢卿輯著
明三衢大酉堂繙梓

## 目錄（凡三十二症）

手心毒圖說（方二）　手腕毒圖說（方二）　腕疽圖說（方二）
蠖蛄三串圖說（方四）　發膊圖說（方一）　遊丹圖說
火赤瘡圖說（方二）　發背圖說（方一）　魚脊瘡圖說（方一）
散走流注發（圖說方三）　背發兩頭圖說　腎俞發圖說
對心發圖說（方二）　蜂窠發圖說（方一）　經體發圖說
連子發背圖說（方乙）　上中下三搭手圖說　連珠發（圖說方三）
上中下三發背圖說　對臍毒圖　腰疽圖說
痰注如袋形圖說（方四）　暑疔圖說（方六）　青疔圖說
黃疔圖說　赤疔圖說　白疔圖說　黑疔圖說
芝蔴疔圖說　氣疔圖說　冷疔圖說（方一）
魚臍疔圖說（方五）

第四卷目錄畢

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之四

圖論方

手心毒（與手背毒同治）

此毒右手受在陰火太陽陽明氣血流于左足厥陰經

左手毒在心火太陽流于右足太陰陽明土復生流于五行子母更相生養或因喜怒憂思寒凝氣血阻滯不通結聚成毒當用定痛解毒之劑

紫蘇　芍藥　甘草　桔梗　枳殼　烏藥　白芷
防風　羌活　獨活　川芎　茯苓　黃芩　薄桂
乳香　葳灵仙　右水姜三片煎服

后用內托流氣飲人参　木香　乳香　當歸　川芎
黃芪　芍藥　防風　甘草　厚朴　枳殼　桔梗
烏藥　白芷　檳榔　紫蘇（姜三片棗一枚煎服外用金箍散敷之）

## 手腕毒



此毒受在掌后因心経風寒喜怒驚風痰凝血不流通結成此毒當用定痛敗毒散内托清氣飲或透手心或透腕外再用三香内托散治之

定痛敗毒散

白芍　白芷　乳香末　桔梗　枳殼　防風　當歸

羗活　茯苓　甘草　薄桂　灵仙　木通　金銀花

姜三棗一煎服　夏天加黄芩

内托清氣飲　人参　黄芪　紫蘇　桔梗　金銀花

枳殻　青皮　甘草　厚朴　川芎　防風　天花粉

木香　羗活　當歸　芎藭　煎同前

---

## 腕疽



此毒生于右肋下三指初起如落日漸長大如桃即時就成水疱皮週圍攻結成腫形如蠱脹肚無青筋而臍不凸只是痞脹便服二十四味流氣飲　猪苓　茯苓

藿香　砂仁　桔梗　枳實　厚朴　澤瀉　陳皮

紫蘇　當歸　青皮　香附　枳殻　赤茯　檳榔

木瓜　川芎　赤芍　黄芪　甘草　肉桂　木香

肉滾水煎空心服只可一服不可再服　然後用

内托散　桔梗　厚朴　白芷　防風　人参　黄芪

香附　陳皮　川芎　甘草　官桂　當歸　赤芍

金銀花　或加木香　行藥用腸癰方

### 螻蛄三串



螻蛄三串上下三種因受濕毒傷于膚氣血傷于腎怒氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　烏藥　甘草　芍藥　白芷
川芎　防風　厚朴　木瓜　香附　官桂　川楝子

水二鍾姜三片棗一枚不拘時服

三香內托散

人參　黃芪　當歸　川芎　芍藥　甘草　乳香
烏藥　防風　官桂　厚朴　桔梗

姜三片棗一枚水煎溫服

又方

紫蘇　枳殼　桔梗　甘草　赤芍　防風
當歸　川芎　羌活　厚朴　茯苓　前胡　生地
白芷

姜三片棗一枚不拘時服

熱加　柴胡　陳皮　半夏

定痛降氣飲

芎藭　白芷　細辛（各一兩）　殭蚕（五錢生用）

右為細末煉蜜丸每服一丸清茶嚥化

治法同三串及諸瘡疽

### 發膊



蓋膽乃少陽經多氣少血厥陰因少陽有相火尤甚于厥陰究由多憂勞神于六氣七情相感須宜防肌肉難長暴戾之疾勿輕可之

一人右耳外側生一結核身微寒熱易怒平居素養甚厚診其脉浮大弦數重按似濇皆因憂鬱傷血時在初秋切勿輕視宜急補以防變証宜人參一觔作膏和淡竹瀝服之方保無虞奈病家吝費求他醫治之以十宣五香相間服之旬日右忽大風拔木病者發熱神思不佳其核即稍高大似有膿狀外腫起紅線延至有後

趨背脊入左脇下不痛有背重急食欲嘔急服人參膏入川芎生姜汁服盡三觔而安然瘡潰膿乾又以四物湯加人參白朮陳皮炙草生姜水煎服數劑而安此病生于春令甚難療者幸生在秋不幸暴風大作激起木中相火非人參川芎膏驟補何由得生也

人參（四兩）　川芎（一兩）　生姜（五錢）

右剉片水四碗煎至一碗去查重湯熬膏每次如之臨服加竹瀝

但此症之發紅腫或如栗勿以小而忽之

## 遊丹



遊丹者即遍身丹毒也初發兩手青腫徹上下急急痛若經一宿二宿瘴氣遍身入心内腫即死初發急治之宜服五香連翹湯木香流氣飲以金箍散敷之宜用治疔之法治之

## 火赤瘡



火赤瘡者氣血虛残邪毒攻發初生赤色燎漿走徹成腰生泡黄水時出沾破皮膚或如火燒疼痛須用清肌觧毒消邪熱降肺火補腎水之剤治之

犀角　甘草　乾葛　山梔　黄連　黄芩（夏天倍加）
白术　粘子　歸須　川芎　赤芍　黄栢　知母
荆芥　薄荷　青皮　桔梗　蟬脫　石菖蒲
天花粉

清凉膏　黄連黄芩山梔薄荷甘草桔梗枳殻煎數沸去柤加氷片射香各三分鵝毛掃上指日得愈

紫金錠水磨塗之

## 發背

### 太師明指發背論

發背之生積毒臟腑正氣盛滯留停緩元氣虛朝輕夕重如發弓矢外小内大内托則生敗毒則斃治法以参芪為主一定之論百世不易凡瘡發于背廣一尺深可一寸雖潰至骨不穿膜不死此症六氣七情或因飲食而感其毒積于脾肚之間用藥先消脾肚中之毒内外夾攻斯無患矣

發背癰疽惡毒

人参　黄芪　當歸　白术（各五錢）　橘紅（一錢五分）

右剉水煎入竹瀝姜汁和勻服之如欲煎膏加參芪等藥各四兩

腫瘍加當歸連翹羌活　潰瘍加芍藥川芎甘草白芷

酒毒加酒炒黃連　氣加炒香附

痰加瓜蔞仁　發熱加酒炒黃芩

渴加麥冬天花粉　惡心加半夏生姜藿香

解毒加金銀花甘草節　瀉加蒼朮白朮俱土拌炒

在太陽上加羌活　在少陽上加柴胡

在陽明經上加鼠粘子白芷升麻

## 魚脊瘡



魚脊瘡者臟中積冷腎氣虛寒故虛熱得傳經絡筋骨之間發動不知何處初生如疽癤破時黃水流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保先服神功活命湯次用歸芪調榮湯或參芪內托散

當歸　川芎　生地　白芍　連翹　黃栢　知母

茯苓　甘草　升麻　白朮　桔梗　黃芩　獨活

青皮　白芷　苦參　天花粉

体虛加參朮減苦參連翹

外用解毒潤肌散搽之或用金絲膏貼之

洗用猪蹄煎湯　或用地骨皮煎湯尤妙

## 散走流注發



太師指明散走流注發

大凡氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣乘虛熱而走是也此症因風盛而生熱之証熱極氣盛氣因熱之極而走于四散急宜踈風定熱則氣自然而息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四圍敷藥內服二十四味流氣飲無不愈者若流注于手脚腿者死無疑矣

妙貼散

白芷（五錢）南星（五錢）肉桂（五錢）蛤粉（五錢）五倍（一兩）芍藥（七錢）

多年小粉（八兩炒焦）白芨（四兩）

右磨末每用生姜自然汁好醋葱蜜搗汁和勻火上熬熱調藥如粥敷四向空中出毒乾再用前汁潤之以助藥力

加減二十四味流氣飲

陳皮　半夏　升麻　乾葛　甘草　澤瀉　茯苓

蒼术　厚朴　木香　羌活　獨活　防風　荊芥

薄荷　黃芩　川芎　當歸　生地　白芍　黃芪

青皮　木通　白芷

冬天加紫蘇大柴胡水二鍾姜五片葱白三根煎熱服以衣覆患上出汗為妙止可一服

參芪內托十宣散

人參（一錢五分）黃芪（二錢）陳皮（八分）甘草（三分）升麻（一錢）

茯苓（一錢）白术　澤瀉（二錢）當歸（二錢）川芎

生地　白芍　黃芩　天花粉　烏藥

前胡　黃栢　知母

冬天加桂　倘有餘內症因症加減全在活法施治

背發兩頭



此症兩頭小者因遶骸攻乃因飲酒休虛之所致也而兼食相關合陰虛而成之氣虛而散所以開口而闊急服內消藥亦宜補陽也治法與發背有瘡同前方加減服之

### 腎俞發



---

腎俞之發偏於人難知識因受其濕并怒氣飲熱酒而得之傳于內腎之間流毒在背急用解內腎之毒內外攻之若醫緩傷膜者難生矣切戒怒氣行房以稍或一犯決不可治

治法同發背瘡疽而補腎加黃栢知母　乳香沒藥廣膠

### 對心發此症難治



心者君主之官神明出焉恬澹虛無病安從來心有怫

背諸病生焉發于手足者皆由于心火故發于心平此症乃對心發因心火盛而熱氣會生于此處其毒愈盛急用疏導心火之藥解之用意調處若合兵法方不生機必須戒性若一怒不能生矣發于心之側者方可治

黃連解毒湯

黃連（酒炒）甘草　升麻　桔梗　茯苓　黃芩（酒炒）　山梔
當歸　川芎　白芍　生地　枳殼　玄參　天花粉
連翹　小柴胡　金銀花　灯心臨服加犀角汁服四
劑后宜加人參　護心散　蠟丸九日夜服之

## 連珠發



---

此疾生陰囊赤腫小便不通小腹脹痛[illegible]通度及[illegible]泡疹皆以傷腎水得此疾者必致成[illegible]令人口乾身發寒熱百節皆疼治方于後

十奇散　治發背傷于腎者

桔梗　人參　歸身　天花粉　五味子
芍藥　烏藥　香附　枳殼　木香
囊腫加　川楝子　檳榔
百節疼痛加木瓜　牛膝　赤芍
寒熱加　柴胡　黃芩

酒煎散　治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者用手按之如牛頸之皮上有黃泡出腥水乃毒入于肺若不速治即死

當歸　穿山甲（炮）白芷　升麻　肉桂
木香　川芎　赤芍　甘草
酒煎服

或患處好肉四边紅腫其色如火用磁鋒砭去惡血即用鷄子清調乳香末敷之時時用芭蕉根汁潤之以助藥功

蜂窠發



此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉亦紫色風毒氣傷于腠理可發出即生不發出即死此毒因膏粱之味溫牀厚被醉飽房事以致五藏積毒不流積而為瘖則心神恍惚夜夢不安小便頻數大便溏泄此疾串于左脇即死治方于後

內托十宣散

人參　黃芪　白朮　當歸　白芍　厚朴　白芷
川芎　連翹　官桂　桔梗　防風　甘草　荊芥
金銀花　水二鍾煎八分食前遠進十貼

---

虛甚者加附子
心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁
大便溏泄加黃連木香白朮（土炒）蒼朮
內陷不發加穿山甲乳羊角（燒灰）
小便頻數加薏苡仁益志
膿不透加歸須地蜈蚣炙赤芍藥
連服蠟丸九日進五服
膿將透便服排膿內補十宣散（即內托散）
加木香穿山甲　仍貼金絲膏

經體發



此毒因暑熱之時空心受其穢氣以致胃氣仍敗則致嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳香托裏散

再服五香連翹散蠟丸九外貼金絲膏

內服忍冬酒一日　三服　忍冬酒方具前

## 連子發背



此疽發于右胛中恐其毒氣奔入心大要用藥散之付圍藥點截住不令攻心如在中道遍于背皆腫不可救也消者可療諸瘡痛痒皆係于心以心生血而行氣之痛諸瘡皆有數藥就上下打大針三四針為妙用前化毒消腫散千金內托散多加參芪

圍藥　南星　草烏　木鱉　貝母　大蒜（另搗）白芨

五倍（已上為末）生姜（取汁）米醋

調付留口二三日夜即消盡矣常以醋潤之

護心散蠟丸久時刻不可缺

## 上中下三搭手



上中下三搭手受在五藏六府毒热憂怒氣結傷于脾經絡聚成毒此是悪症也當用腦疽發背疔疮等藥治之

閻藥亦然　時進忍冬酒蠟凡丸

上中下三發背



---

上發背受在陶道經上傷于肺肝心經驚搏結聚怒氣傷肝經出背毒此乃悪毒症也先用敗毒流氣飲次用護心托裹散後用内托流氣飲治之敗毒流氣方在後又并護心托裹散流方于後　中發背受在神堂灵道經正心毒心血湧出不能歸肝氣血壅在背中損于肝經此乃悪症當用煎藥治之敗毒流氣飲方在后

下發背受在脾肝經絡凝滯于五藏傷于三經此是三毒之症也先用敗毒流氣飲后用人参内托散外用閻藥敷之

對脇毒一名衝疽



[illegible]疽者生于腰臀也發背骨作踠疽又名對臍又名背脊主心流入腎囊三十日可刺其膿赤白色者不死青黃紫色又兼譫語及見物者遂發則內腎疼變爲渴者萬無一全也多服參芪內托散

加知母　黃栢　麥冬以滋腎水

腰疽



此疽受在陰包氣穴傷于濕氣血不行流注經絡此是毒症也當用發散藥治之三五日內宜灸七壯即消

痰注如纏袋形



所謂痰注者何來六氣七情所感痰不能流行結于一處伏于經絡之間而背爲明堂月深日久結成囊窠內連于臟腑外隔于皮毛宜早治之其形或圓或歪或如米袋堅硬如石外用圍藥次服人參內托散四五十劑元氣充足方可下行劑大便痰積數升而愈

萬應黑虎膏

多年小粉（八兩炒黑）五倍（四兩炒黃）蛤粉（四兩）天花粉（二兩）

白芷（二兩）乾姜（四兩）龜板（二兩醋炙）白芨（五兩）南星（四兩）

昆布（二兩）白芥[illegible]二[illegible]肉桂（三兩）[illegible]（二兩）

右各為細末和勻用生姜自然汁一碗好醋一碗蔥半觔搗爛加蜜三兩再搗取汁半碗三〃和勻火上熬熱調藥俟適手敷患上留一小洞出氣時用熱餘汁潤之一日夜方可易之敷至一月方得軟矣亦可下行劑

### 人参内托散

人参（二錢）白术（二錢）陳皮（一錢）半夏（一錢五分）芥子（一錢）
黄芪（一錢）茯苓（一錢）當帰（一錢五分）川芎（一錢）白芍（一錢）
黄芩（一錢酒炒）蒼术（一錢）香附（五分）麥冬（五分）枳實（一錢五分）
黄連（五分）桔梗（一錢）青皮（八分）烏藥（一錢）天花粉（一錢五分）
防風（七分）甘草（四分）升麻（一錢）厚朴（一錢姜汁拌炒）

加減存乎人

右作一劑姜五片砂仁末五分煎臨服加淡竹瀝姜汁半酒杯和服之服至百劑方愈

### 神仙救命丹

待硬處活動如綿煎劑服大半方可下之否則無益有損

珎珠（一錢）射香（一錢）氷片（三分）胆星末（五錢）甘草末（一錢）
枳實（一錢）蠐螬（六分）巴豆霜（五分）全蝎末（一錢）蛤粉（一錢）

右各為細末和勻米粉糊為丸如桐子大每服三錢空心或酒或蜜湯送下其瘀從大便中出盡為度如不行再服即行以薄粥補之若不待其軟遂下行藥命亦難生病者須要拱聽醫師之戒清心寡慾戒惱免憂并忌油膩生冷蒜茄等物如瀉不止另又一方

甘草（七分）黄連（一錢五分）蒼术（炒二錢）白术（二錢土炒）
豬苓　澤瀉（一錢）　車前子　炒芍
炒芩　茯苓（一錢五分）　人参　蓮肉

右水二鍾姜三棗二煎服即愈（又方早炭頭一吊井華水冷飲一酒杯其瀉立止）

### 暑疔



大抵疔瘡有十三種而有青黃赤白黑所以應五臟也復有暑疔火疔氣疔冷疔者皆以其時候緩急淺實之異但初發起或先后痛先寒后熱四肢拘急沉重強痛者得症便發寒熱瘡邊麻漸至半身大痛應心嘔逆自利足冷至膝四畔紫黑色皆為重症惟麻子始末皆痒若症候寒熱與諸疔瘡同但其背強其痛甚者乃觸犯所致即取枸杞根搗汁服之弥佳亦狗屎白色者得所露之功矣氣已去加枸杞根和匀絞取清汁服之尤良但有卒患喉痛心寒熱或腹痛惡寒發熱者當預防生此疔症也凡疔瘡多生口邊頰內或舌上赤黑點點如珠𥻆痛應心者是也不即治之日夜根長流入諸脉如箭入身不得動搖經久五六日后甚者毒氣入腹眼中見火神昏煩悶嘔吐恍惚如醉如痴不可療矣疔瘡有頭黑硬而凹者瘡頭白而腫實者瘡頭如豆垽色者瘡頭鮮紅色者瘡頭內有黑脉者瘡頭紅赤而浮虛者瘡頭如梔而黃者瘡頭如金箔者瘡頭如茱萸者瘡頭如石榴子者有初如風疹粉刺搔破入風則去黃水出其裏有赤黑脉而微腫者肉中突起如魚眼赤黑慘痛徹

骨者結久皆為爛瘡瘡下深孔如大針穿狀初生時忽起疔痂故名疔瘡令人惡寒發熱四肢強直而大痛一二日瘡便變色焦黑腫大光起根硬不可近犯之則痛甚則發于頭面手足骨節間者氣血之所聚會宜急治之有似炙瘡四邊泡漿者但疔瘡熱時膿水出瘡孔如蜂窠病易瘥也疔瘡惡症眼黃面青舌黑冷汗發渴脚冷至膝下不食自利瘡冷不痛嘔逆瘡不起發四畔不紅瘡邊麻木乾黑生刺瘡邊紫黑色𥻆痛應心眼中見火神昏煩悶神思恍惚猶如醉痴者皆難治也試以針刺患人手足中指不痛者難治疔瘡初生時紅軟溫和忽然頂陷黑謂之癀走此症危矣急服飛龍奪命丹追疔奪命湯其疔發于太陽眼邊者名曰釘腦疔十死一生内經以白疔發于右鼻赤疔發于舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發于目下盖取五色以應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在頭面手足骨節間者甚急

拔疔要法　妙法傳于後世　來學貴乎心求
不可妄治以傷生　不可過時而難療

凡疔瘡之起多發于嘴唇上邊初如米大或粉刺或疫入湯火風氣亦要變成疵瘡疵瘡者即疔之別名也先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熱酒半碗過下以衣覆患上略出汗為妙上午服藥下午即將絕利磁鋒劃破瘡口十字即摻飛龍奪命末在內而外用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服追疔湯劑若發于鬚髮者即剃去鬚髮如前法治之此法靜夜細思試而行之百發百中活人多矣焉敢自秘遂弁梓行病人一月內無色慾者患處平妥無努肉乃其徵也（此法余精思所得百發百中切勿輕視之　婁鵬謹述）

追疔奪命湯　服之速効能內消腫

羗活　獨活　青皮　防風　（倍用）黄連　天花粉

赤芍　細辛　蟬脫　殭蚕　桔梗　金銀花

歸稍　川芎　白芷　連翹　山梔仁　甘草節

在脚加木瓜牛膝薏苡仁　一方加澤蘭一錢生薑十片葱三莖煎熱服以衣被覆之出汗為妙

外用飛丹白凡各上為末和飯末鷄子清調敷之

又方用螻蛄焙燥敷瘡上能拔疔根

當歸蜈蚣

當歸　川芎　赤芍　荆芥　乾葛　烏藥　白芷

獨活　升麻　羗活　青皮　蟬脫　甘草　防風

枳殼　紅花　蘇木

瘡疼加乳香沒藥　瘡熱不退加淡竹茹山梔仁

腫不退加甘草節降眞香節

眼昏加川芎白芷荆芥防風蔓荆子

渴加天花粉乾葛麥冬　小便閉加滑石末車前子

右水二鍾烏豆十粒煎服病在上食后服病在下食前服

茺蔚散　治急慢疔瘡

本草云益母草味辛甘微寒無毒搗其莖葉以傅疔腫服其汁以使疔腫內消隨處有之多生背陰地四方莖梗對節生葉嗅之畧臭節間生紅白花四五月採之陰乾

益母草一味燒存性為末先以小鐮刀十字剖破疔瘡根至痛處令出血次繞疔根出血捻盡惡血拭乾以稻草心蘸益母草灰撚入瘡孔中遍傳到底良久當有紫黑血捻出令盡拭乾再撚入前藥見紅血則

出一日夜三五次重者三日根隨出輕者一日半出瘡根燕腸根出即瘡根起也針挑出之鋪以大蒜片根自爛無憂矣內服救生奪命丹如無則服忍冬酒日夜服之并服追疔奪命湯若得此症便發寒熱半身麻木嘔吐不食其痛應心者甚急三五日便死急用小刀劃斷疔根出血令盡若有疔發于三四處只去先發為要其餘即無害矣如前治之若陽症形体壯者實者以鋒針刺瘡四邊多出血以泄毒氣針刺所屬經絡而瀉之暑濕忌風寒房事酒肉魚腥蒜椒辛辣油膩粘滑生冷狐臭息香射香湯火氣

又方用蒼耳草野菊花二味擣汁和酒服之微醉患處以衣覆之睡一時痛定熱除矣

又方魚腥草擣汁和酒服之柤付患上

疔瘡頭陷碧綠色者不可用針刀出血畧挑開瘡付入益母灰又擣益母汁服之更妙

又有日久潰爛者不可用針出血只以鑱刀割去腐肉以益母草灰付之

護心散　疔瘡煩燥作渴惡毒攻心

青黛（二兩）　雄黃（五錢）　射香（少許）　蒼耳灰（二錢）

右為細末每服二錢冷水調下

一疔瘡走根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗絲綿濾淨銀鍋內煎三四沸服之痛者須臾腸鳴行利一二次甦醒方可

一疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬殼極効以一兩為末蜜調下

拔疔散

面粉　射香　人耳中膜各等分

右為末葱涎搜膏捏餅貼患處其瘡根盡拔出

凡疔瘡發于頭面上者切不可用冷藥敷之若敷冷藥遏熱毒惡癸之氣入于喉間斷不能生矣

疔瘡有十三種

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油及芝麻并着麻衣并入麻田中行走

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬

三曰雄疔其狀皰起頭黑靨四畔仰皰漿起有水出色

黄大如錢孔形狀高厚、
四曰蝌疔其狀瘡稍黄向裏黯亦似灸瘡四面炮漿起
心四色赤如錢孔
五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑黶四邊有烟漿又
如赤粟米者忌火燒烙
六曰爛疔其狀色稍黑有白班瘡瘵中潰有膿水流出
瘡形大小如匙面者忌食熱物
七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色
今日生一明日生二及至十餘若滿三十六藥不能
治未滿可治
八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼
大身体硬
九曰塩膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大
忌食塩
十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裡黑黶汁
出中硬忌飲漿水并水洗
十一曰刀鐮疔其狀濶狹如薤葉狀長一寸左側肉黑
如燒烙忌刺及刀并鐵器

十二曰浮嘔疔其狀瘡体貟尖少許不長而狹如薤葉
大內黄外黑其黑處刺之不痛黄處刺之痛
十三曰牛狗疔其狀肉色炮起掐不破已上十三種初
起瘡心先痒后痛先寒後熱定則寒多四肢沉重心
驚眼花嘔逆者難治惟麻子疔始末皆痒已上諸疔
切不可觸犯若觸犯之必難治者凡孝服鷄犬月經
婦人狐臭之類悉屏之須要戒怒寬懷為上策謹慎
謹慎

青疔



青疔者根在肝發迦于目下如瘤瘢色青如石使人目昏無見恐悸睡卧不寧或生筋骨之間久則令人目盲或舌強語澁或脱精此症不出一年病危最急治療之方一宗于后

一方用紫花草敷瘡上

黃疔



---

黃疔者脾中受熱根于胃氣邪風發于唇齒齦之邊初生色黃有水四邊麻木然發中有黃故令人多食手足麻木涎出煩燥腹脹嗜睡不言者死未者可治形如魚脂

赤疔



一名紅絲血箭疔　一名紅演兒　一名紫疥斑

赤疔者根在心發起于舌下根所供赤作痛舌硬不能言語恍惚煩渴飲水不竭小便不通者死未者可治七日可知禍至矣

內服救急丹　黃連解毒湯　連翹敗毒湯

馬蹄香搗碎加水取汁服之立愈

白疔



---

白疔者大腸虛熱根在肺起于右鼻初起如粟米大根赤頭白或麻木或疼痛使人增寒頭重鼻口乾咽喉燥不欲飲食如胸膈痛悶喘促昏聵者死未者可治不過七日禍必至矣

用紫花草付瘡上

疔



黑疔者膀胱虛熱根在腎發于耳前狀如癧瘡色黑堅硬使人牙關緊急腰疼脚膝不仁不然頭疼三日禍至矣　形似蕎麥皮　用紫花草敷瘡上

五疔者皆因喜怒憂思衝冒寒熱是以蓄其邪毒浸漬其臟腑久而發為疔瘡

## 芝麻疔



芝麻疔用黑雲膏　用紫花草敷瘡上　走注者遍身疼不能轉動　服調[illegible]流氣飲　蟾酥丸

## 氣疔



氣疔用勝金錠　服蟾酥丸　外用紫花草敷之

## 火疔



火疔用勝金錠　服蟾酥丸　紫花草付瘡上

冷疔



凡冷疔者高粱之变風濕餘毒天陰又冷攻于膝下傳于足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤敗血米侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累歲不能生肌先用艾葉蛇床子紫蘇希薟草煎湯洗之内服黄芪白术蒼术當歸白芍連翹生地之藥外用隔紙膏貼之節慾内省亦可瘳矣

鉄粉散

黄丹（一两）　生鉄粉（二两即針砂炒）　射香　輕粉（各五分）

松香（五錢）右為末清油調貼瘡口上立愈

魚臍疔



春用黑雲膏　夏用蟾舌膏　秋用桐淚膏

冬用勝金錠

五種疔瘡用蟾酥丸　能治諸般惡毒疔瘡其效不可盡述

珠砂　膽凡（各五錢）　血竭　銅青　蝸牛（各一两生用）

雄黄　白凡（各一两）　輕粉　没藥　蟾酥（各五錢）

射香（少許）

右十一味除珠砂蟾酥蝸牛三味將八味為末却將蝸牛蟾酥研極爛入前藥合均再入珠砂一半在内

為丸如雞頭大又將硃砂一兩為衣每服一丸先嚼葱白三寸吐在手心內裹藥熱酒一盞吞下重若行五里有汗出輕者再行三里有汗出立效服藥後用厚被蓋之以出邪汗

勝金錠

人言　雄黃　硇砂　輕粉　射香

共為末用黃蠟溶化和藥成膏于水浸少時取出用時捏餅子如錢眼大用羊骨針撥開瘡口放藥在內用膏藥貼之仍用蟾酥丸

黑雲膏

巻耳草連苗葉子俱用燒灰用臘月豬肝研爛成膏用厚皮紙攤貼瘡上其根自出

蟾舌膏

用蝦蟆舌一箇研爛用紅絹片攤貼其根自出（蝦蟆皮代絹妙）

桐淚膏

梧桐淚丸如赤豆大用羊骨針撥破瘡頭放藥在內用乾麵圍四畔仍用太乙膏貼之又用紫花草付上

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第四畢

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之五

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

## 目錄　凡二十五症

肩疽鼠疽圖說（方三）　三串毒圖說　胛癰圖說
左搭肩發圖　右搭肩發圖說（方四）　左右串圖說
兩肩兩脇癰疽發圖說　血潰流注疽圖說（方三）
痼發圖說　瘰瘡圖說（方三）　委中毒圖說（方二）
臀疽圖說（方二）　腿遊風圖說（方三）　腎癰圖說（方三）
陰蝕瘡圖說（方十七）　女陰蝕瘡圖說（方廿一）
左右便毒圖說（方二）　小腸流注圖說（方三）　穿襠發圖說（方四）
冷漏湿毒流注圖說（方三）　紫疥瘡圖說（方四）
坐馬癰圖說（方三）　貼骨疽圖說（方一）　附骨癰圖說（見上）

第五卷目錄畢

# 新校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之五

圖　論　方

## 上有疽下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服加味托

裏散

桔梗　厚朴　白芷　人参　黄芪　當帰　官桂
川芎　荊芥　黄芩　烏藥　防風　連翹　香附
枳殼　天花粉　　右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁　熱盛加小柴胡黄芩玄参

咳嗽加麥冬地芩五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黄凡丸通氣散仍貼玄武膏金系膏

如膿出盡時服内補散三四貼

膿未盡時服排膿内托散

小便赤澁用五苓散加黄連燈心服之

其毒從小便出

更服乳香護心散日進五服　又服黄凡丸日進（三服）

開胃散　治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁　枳殼　陳皮　茯苓　肉桂
甘草　藿香　厚朴　右水煎服

仍用神異膏貼之

## 三串毒



一第一一一号　續修四庫全書　第3　庫正戶

此疽上下生之其形雖一而中間皮好但內肉潰爛不起紅色亦不大痛日漸潰爛此症之來六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性度恬淡而亦患此者想平居坐卧湿地而然也若無外症得生者飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發背諸瘡同

## 腎俞怒發及脾疱



---

此証下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷肝受湿而得也陽發于外可治痰發陰發傷于腎膜臟稀者為虛難治若老少婦人性氣溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之湿氣或暑月以冷水沐浴而然脾疱發于左膊之間初發可用艾火灸之急服追疔湯汗之即散治法服藥同前蟾儿丸甚宜服之

## 左搭肩發



## 右搭肩發



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭肩骨上生者以動之處入可治难安串于右搭肩者必难治

凡此症由于風変之來以脉断之邪在表其症大小便如故飲食如常口能知味知其不在裏也不悪風只燥熱脉不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中凝于經絡其瘡斯出身半已上風從受之故云八風之変法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

摻藥

鷄黄皮（焙）　血竭　花蕊石　氷片

右為細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黄桂枝湯　形實色黒肯生紅腫脚骨下背脉浮数而洪紧食則嘔

生附子（一錢）　瓜蔞仁（一錢五分）　羌活（一錢）　甘草節（六分）　人参（一錢）

青皮（一錢）　黄芪（二錢）　半夏（六分）　白朮（一錢）　山藥（一錢）

水二鍾姜三片煎服　冬天加黄柏

牛膠飲　截癰疽悪瘡除處服之使毒氣不攻于内不傳悪症

牛皮膠（透明好者四兩净）　右用好酒一碗入膠内重湯煮令膠溶透者亦用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷（一錢）　升麻（五分）　桔梗（五分）　甘草（一兩）　黄芩（二錢酒炒）

生地（一兩）　黄芪　連翹（各二錢）　生黄連（一錢五分）

紅花（一錢）　帰稍（二錢）　官桂（三分）　當帰（一錢）

右十三味水酒各一碗煎至半碗服之酒膩并怡養心神不可妄想以動心火

左右串



此症發于左搭肩骨上生在以動之處可治難安串于右搭肩必難治矣可用鷄黄皮及綿絮焙乾為末濕則乾掺乾則清油調搽

如症發于右搭肩骨上生在移動之處可治難安串于左搭肩者亦難治之用藥搽掺依前左搭肩藥治之

另有良方在前左串右串二形圖后[illegible]方治之

---

兩肩兩脇瘡疽發



凡兩肩下兩脇邊成瘡疽因血虚而氣亦虚切不可服補陽之藥熱劑即補陽也倘受熱劑則虚熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜服十六味流氣飲內疎黄連湯治法與發背瘡疽同

湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

## 血潰流注疯



此症多生膏粱形重之人有此疾者好食煎炒炙煿糖果之類其症大者如鷄弹形像猶如紫李只腫不紅內串經絡之間流注骨節之內遍身痠疼百節疼痛用內托散加木瓜　白芍　連翹

再服乳香護心散　黃几丸

外用圍藥敷之不可遲也

凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

---

## 痼發



此証屬陰多生骨骼之間初生如梅子大在于皮肉之間內不疼不痒無力之人二十日始作紅腫有力人一月方作紅腫內先潰爛皮面上紫黑色破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏則難治矣急服排膿托裹散

排膿內補散　人參內補散　人參膏

五香連翹湯　蝋几丸　護心散

更用猪蹄湯頻洗之　未潰之先用鉄箍散敷之能消其一半

## 𤸎瘩



大抵下部之症以蒼术為主佐以黃栢之辛行以青皮加以甘草隨症用引經之劑則得効矣此毒受在肝腎經痛不可忍用內托流氣飲治之

蒼术　黃栢　青皮　甘草　芍藥　當歸　白术
檳榔　川芎　羌活　獨活　白芷　木瓜　牛膝
杜仲　冬加薄桂夏加黃芩　姜三片煎服

內托清氣飲　人參　茯苓　白术　官桂　陳皮
木瓜　紫蘇　枳殼　甘草　芍藥　當歸　蒼术
羌活　獨活　川芎　白芷　姜三片棗一枚煎服

再服紫蘇流氣飲　三香和氣飲（林藥用腿逆風及婦人癱瘓兼通用）

---

## 委中毒



此毒受在腎經寒氣阻滯而成加減紫蘇流氣飲治之

先用敗毒流氣飲

先服敗毒流氣飲紫蘇　厚朴　枳殼　桔梗　陳皮
烏藥　白芍　白芷　香附　檳榔　木香　木瓜
牛膝　杜仲　防風　甘草　姜三棗一煎服

後服紫蘇流氣飲
紫蘇　厚朴　甘草　香附　烏藥　檳榔　杜仲
木瓜　枳殼　桔梗　川芎　防風　當歸
姜三棗一空心服　排膿加人參黃芪

## 臂疽



此瘡受在臂經而臂屬少陽後此陰中之陰道遠位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒結聚成風故生此症也當用上下助瘡藥治之　敗毒流氣飲

內托流氣飲　內托羌活湯

羌活　官桂酒洗　大黃（酒洗各四分）黃芪（一錢五分）藁本

連翹　歸稍（各一錢）炙草　陳皮　蒼术（各五分）

白芷　右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆患上使藥力行之方能奏功如或不愈用鉄箍散姜汁醋火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥力

## 腿遊風



此瘡受小腸經傷于寒熱邪氣毒流于腿此是遊毒也當用紫蘇流氣飲治之后服敗毒流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇　檳榔　厚朴　甘草　香附　烏藥　獨活

白芷　荊芥　蒼术　黃栢　陳皮　木瓜　枳殼

川芎　防風　姜三棗一煎服

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　檳榔　陳皮　羌活　防風

荊芥　木瓜　桂枝　黃栢　獨活　烏藥　甘草

香附　山梔仁　热服

先用金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之

搽藥

輕粉二錢　黃連末三錢　孩兒茶一錢　黃柏末一錢　白芷末一錢

荊芥末一錢　雞内黃一錢　冰片二分　枯凡二錢　鉛粉三錢

右和勻為細末先用溫苦茶洗凈再用紙搌乾滋水

乾搽

## 陰囊毒　即外腎癰



此症因肝經濕熱不利遂流毒于膀胱腎經感冒寒暑

邪氣偏腎于陰之經絡以至血氣凝聚寒濕不散[illegible]

上腫而痛或潰爛皮脫腎子[illegible]宜用瀉肝清熱湯服

之

龍胆草酒拌炒　當歸稍　車前子炒　澤瀉

生地　芍藥　黃連　黃柏　知母

木通　淡竹葉　防風各一錢　甘草稍五分

右作一劑水二碗煎八分食前服

外用鐵箍散圍之

此症腐壞急用烏金散敷之

烏金散

麩（不拘多少炒存性為末）　紫蘇葉　俱為末香油調搽乾

摻亦可

口或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯

小柴胡　人參　黃芩　川芎　白朮

黃芪　當歸　甘草　黃柏　知母各一錢

半夏五分　白芍五分　右水煎服

痛甚加黃連　小便不利加木通車前子

口渴加天花粉麥冬五味

## 腎癰



此毒年高者因宿有疝氣痰及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻小注婦來二穴痛不可忍用手按之皮寬不急可用敗毒散加入當歸須　川楝子發散　用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之

更服黄九丸

倘或開刀須待其熟以油頭繩扎住腎子以小刀開海底穴其膿血即流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避湯火風氣及諸毒物

## 陰蝕瘡



此陰蝕瘡之生也皆由臓中虛怯腎氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時痒以漸成瘡作痛膿水湧流若不早治命亦難保先用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯温洗内服清熱消瘡解毒湯外用掺藥先用金絲膏後用紫金膏拔出毒水易能長肉

掺藥

輕粉（二錢）　孩兒茶（二錢）　紅絨灰（一錢五分）　[illegible]丹（一錢）

氷片（三分）　真珠（五分）　麝香（二分）　雞内金（煅）　松脂（一錢）

芦甘石（煅）一錢

大陰蝕瘡者即下疳也陰汗燥臭故莖根生疳瘡此處乃肝經所屬之分野

清濕瀉肝湯

升麻　羗活　柴胡　知母　黃栢　生甘草

澤瀉　青皮　川芎　生地　蒼术　龍胆草

木通　水煎　熱加黃芩　小便不利加車前子

虛加人参

又方　氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人参　黃芪　當帰　柴胡　升麻　草稍　黃栢

知母　胆草　紅花　白芍　黃芩（甘草稍能緩莖中痛故用之）

又方補中益氣湯加南星蒼术黃栢知母黃芩牛膝灯草

防風羗活散　治下疳

防風　羗活　荊芥　獨活　黃芪　牛旁子

山梔　甘草　木通　蒼术　車前子　天花粉

洗方

冬青葉（四五十葉）甘草　黃栢　防風　煎湯洗之

下疳掺藥

輕者用輕粉末一味掺上

又方

孩兒茶　輕粉　黃栢　氷片　橄欖核（煅一錢）

為末乾掺

蛀疳

輕粉　韶粉　各等分為末掺之

外蛀桿内蛀桿

氷片二分輕粉六分射香五分為細末掺孔内

内外蛀疳瘡并小便一切疳疾

蒼术二錢黃栢二錢秦艽一錢滑石二錢水煎服

如小便澁滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

黃芪　白蒺藜　羗活　白附子各二錢

末之用猪腰子一付竹刀切破入藥在内線扎定白酒煮熟空心服之

内外蛀疳身熱小便澁滯宜服小柴胡湯加龍胆草黃連車前子

下疳摻藥

青檳榔（燒灰一錢）　孩兒茶（一錢）冰片（三分）為細末

先用杏仁（四分去皮尖炒研）又加輕粉（四分）和研如泥先敷

患上一日米泔洗之后用前摻藥

又方

紅棗去核嵌明凡二分珎珠四粒煆過存性末之（乾摻）

疼痛不可忍

黑羊角穿山甲煆過研末各二錢乳香沒藥各一錢

空心酒下

熏法

棗荳一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾在多年馬

桶內在無風處熏之待出一身汗妙甚男婦並用

小便疳瘡大爛者

面粉（一兩）黃蠟（八錢）白蠟（一兩）冰片（一錢）

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下面粉次下冰片

為隔紙膏貼之五日后痛即止肉即生矣

## 陰蝕瘡

婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝胃三經之火

勃然而起遂致陰內生瘡其種不一或生陰蝕瘡或生

陰茄或生陰蕈或生疳瘡或生翻花瘡或生䘌瘡極痛

極痒狀如虫行淋漓膿汁等症皆由濕熱與心火相擊

而生惟陰茄難治性氣和緩之婦胸次坦爽服藥易愈

若性急悍妬之婦習與性成服藥百帖方愈必須忌口

絕慾戒性為要當以補心養胃與茯苓補心湯內補托

裏流氣飲間服之其陰中腫塊如棗核者名陰茄匾如

蕈者名陰蕈陰中極痒者名蝕瘡名䘌瘡餘類倣此

茯苓補心湯

白茯　乾葛　前胡　桔梗　甘草　陳皮　白芍
紫蘇　人参　半夏　當歸　熟地　川芎　枳殼
姜三片棗肉二枚灯心廿莖水二鍾煎服

補心養胃湯

陳皮　半夏　茯苓　甘草　台术　黃連　當歸
川芎　生地　青皮　白芍　梹榔　烏薬　遠志
滑石　山梔仁　車前子　玄胡索

內補托裏流氣飲

甘草節　茯苓　澤瀉　猪苓　紫蘇　山梔　黃連

台术　當歸　川芎　生地　白芍　人参　黃芪
木通　紫蘇　青皮　香附　苦参　澤瀉　皂莢

氷黃膏

用黃連二两水二碗文武火煎至一碗濾去查再重湯慢火煎至一酒杯加氷片三分射香二分軽粉五分硫黃末一錢俱研末調和用鵝毛潤陰内立効

一抹散

黃連末　鹿角灰（各一錢）紅絨灰（七分）鷄内金灰一錢
孩兒茶（七分）珍珠末（五分）氷片（五分）軽粉（五分）射香（三分）

右為細末乾掺患處

洗方

芭蕉根搗爛煎湯温洗避風

又方

川椒（五錢）蛇床子（半升）几三錢兆柳枝（各七枝）文一（两）
苦参一（两）米泔五六碗煎滚去查乗熱薰洗之

又方　治陰蝕䘌瘡

雄黃一（錢）硫黃（五分）兆仁（五粒）木鱉子一（枚去殼剉片）
文五錢入前薬在内作條放在馬桶薫之其虫即死

麻黃湯　陰腫或瘡或爛

麻黃　黃連　蛇床子（各五錢）艾（三錢）烏梅（三枚）大戟
防風　白几　右剉煎湯薰洗再用孩兒茶一錢軽粉氷片杏仁灰各五分為末掺之

陰中極痒及蝕䘌瘡

用大蒜搗碎煎湯洗之后以杏仁不拘燒烟盡研末絹綿包納陰户

又方取鷄肝或牛肝猪肝煮熟乗熱納入陰户其虫入肝内

又方水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星納陰户

又方以鯽魚胆搽之

陰方用茄根燒灰末之香油調匀鵝毛潤内

陰中堅痛

白丸五錢生大黃　生甘草各二錢五分為末綿包如棗核大入陰中

陰中生瘡　黃芩湯　當帰　黃芩　川芎　大黃

白丸（各二錢）黃連（三錢）右剉水五碗煎薰洗洗付雄黃硫黃輕粉末

陰爛

孩兒茶　鷄内金（各一錢）輕粉（五分）氷片（三分）為細末乾掺

陰瘡　與男子妬精瘡畧同

黃丹　枯凡　扁蓄　藁本（各一兩）硫黃（五錢）蛇脫（一條燒灰）為末搽之如不乾息再用芍藥末掺之

或隱處疼痛　塩三合炒熱青皮包熨之立止

陰冷　母丁香（廿粒）研末縫紗袋如指大入藥内納陰户

小便濕痛　牛膝（五兩）酒二升煮半升去柤作三服亦治血結痛無故血來龍骨一兩研末熱酒調下一匙

### 左右便毒



夫便毒者生于小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦

或上或下低悶肭氣或房事所傷或男女大慾不得直遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐之間而不泄或妄想不能忘情息念故結成毒然腎者作強之官伎巧所出一有所感精血凝滯此症遂生初起之時寒熱交作兩腿牵絆腫起不能屈伸乃症之漸也急服龍胆湯

龍胆草（一錢）木鼈（三枚）大黃（三錢）瓜蔞（一枚）桃仁紅花帰須（各等分）

水酒各一碗煎八分去查夜露一宿早空心温服（行利十餘次）

荆防敗毒散　穿山甲　甘草　紅花　羌活　當帰　川芎　赤芍

生地　金銀花　防風　木通　枳殼　烏藥　天花粉（各錢）槐花（末一錢）牛膝（五錢）

## 小腸流注



此症受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流氣飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　香附

防風　川芎　羌活　獨活　白芷　白芍　梹榔

茴香　澤瀉　玄胡索　姜三棗一煎空心服

清心流氣飲

白术　茯苓　猪苓　澤瀉　麥冬

青皮　防風　柴胡　羌活　赤芍　香附　生地

川芎　紫蘇　甘草　姜三棗一煎服

小便不利加車前子滑石木通　時服蠟凡丸

---

## 穿襠發一名疢瘥一名横痃

此毒因辛苦得之生于竅骨穴上若不速治毒潰傷于谷道内爛臟腑即死急服蠲毒散

蠲毒飲

甘草　貝母　赤芍　當歸　白芷　金銀花

青皮　木通　連翹　桃仁　龍膽草　天花粉（各一錢）

穿山甲（炮）如元氣欲泄加酒蒸大黄三四錢煎服飲酒隨量以助藥力行利十餘次其毒無膿血從大便中出

又方　欲作未作之時服之立消

牙皂七片灰火炒黃色去皮陰地上去火毒爲末（隔下）

代刀散　穿山甲　殭蠶　枳殼　姜黃

牽牛　赤石脂　大黃　白芷　貝母（各等分）

爲細末每服五錢早辰空心用酒調下行利十餘次

用薄粥補之其膿血從大便中出

灸初起便毒臟毒法

用濕蚯蚓糞捻成餅如銅錢厚放患處以艾火在餅

上灸之覺熱一二十壯爲度或痛或癢即可

后服敗毒散

[illegible]痏濕毒流注

此毒或因足瘡爪破有傷冲大風氣或因寒濕流注於

足脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色常出臭白水先用

三稜針刺週廻血出盡然後金絲膏貼之呼出毒水腐

肉然後將紫金膏貼看瘡已紅活再合隔紙膏貼之方

具後

面粉三錢　輕粉一錢　白蠟一錢　黃連（末）一錢　黃柏一錢

血丹一兩（飛過）爲細末清油燭調和攤隔紙膏貼之

又方摻藥　黃連（末）二錢　輕粉二錢　氷片二錢　血竭一錢

孩兒茶一錢右爲極細末乾摻

紫疥瘡



此症五藏六腑之積毒其氣蒸肺而肺主皮毛故發于經絡相傳頭面体膚手足形如紫疥或疼或痒遍生不拘何處項中果爲久則嘔逆沉重神思恍惚速治之方保無虞

### 清肌解毒湯

升麻　乾葛　粉草　防風　荊芥　連翹　薄荷
白芷　山梔　白朮　蒼朮　黃連　苦參　花粉
桔梗　羌活　胡麻　青皮　胆草　當歸　川芎
生地　赤芍　灵仙　白蒺藜

虛加人參煮酒加白花蛇蟬脫黃芩肉桂天麻馬鞭草等味以意消息之宜服苦參丸

### 煎湯洗法

荊芥　薄荷　苦參　白芷　蒼朮　柏樹枝
獨活　桑枝　柳枝　槐枝　鳳仙梗　金銀藤

用水不拘煎湯去相在無風處薰洗之拭乾用搽藥

### 搽藥

杏仁（一兩去皮）　風子肉（一兩二味另研如泥）　輕粉（真者五錢）　川椒末（三錢）
硫黃末（二錢）　荊芥末（一錢）　防風末（一錢）　白芷末（一錢）　樟冰（二錢）

---

枯凡（二錢）

右各另末和勻雄猪胆汁加生桐油調勻搽入肌肉不見藥為効

### 清肌燥濕解毒湯

蒼朮　白朮　防風　荊芥穗　胡麻子
白蒺藜　苦參（減半）　當歸　白芍　羌活
薄荷　白芷　川芎　石菖蒲　甘草

右十五味各等分磨末水和為丸每服二錢百沸湯送下

### 坐馬癰



此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷于內大腸之經並聚成毒發為[illegible]痛處乃毒症先用宣毒湯次用敗毒流氣飲

宣毒湯　白芷　赤芍　甘草（五分）大黃（酒三錢）

當歸稍（二錢）連翹　枳殼（各一錢）

水酒各一鍾煎一滾去查早辰空心服

又方紫蘇　人參　桔梗　枳殼　甘草

柴胡　川芎　羌活　白芷　防風

白术　芍藥　金銀花　姜三棗一煎服

後用內托追毒飲　人參　黃芪　厚朴

甘草　桔梗　枳殼　金銀花　黃連

烏藥　當歸　芍藥　白芷　（川芎防風）

## 附骨疽癰論

夫貼骨癰者即附骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此症之發盛暑身熱賊風入于骨節與熱相搏復遇冷濕所折或居勞太過兩足下水或坐卧濕地身体虛弱而受寒邪然風熱伏結壅遏附骨成疽着大骨節間其急者身不得轉動按之應骨痛経曰便堯皮肉生急洪洪如肥狀其緩者一點酸疼漸堯長大行步艱游以致骨肉不相續者失治令身成膿不消至死身變青黯但痛按之至骨久則結膿或結瘰癧其附骨疽久而附頭結膿以此為異其治附骨疽作賊風中之則痛深腰多尤偏枯攣曲之狀乃附骨疽之漸也因肢臥捲作寒作熱小便赤大便澀無汗須用紫蘇蘄艾鳳仙草煎湯熱熨之使腠理開發以布拭乾再用乾被覆之燒乳香熏之如虛者隨服人參膏略加附子以助其氣復以文火攻之萬無不愈者

貼骨疽



此症用筋頭按患處極痛是穴以墨點定艾灸百壯為期忽爾文壯爆起不拘壯数乃其驗也不必灸矣獨活寄生湯加人参二錢一服

附骨疽瘡之症其毒入于骨髓所犯甚深外膚若好而貼骨之肉已先内潰骨肉已不相連日輕夜重煎寒發热至百日有膿方可用火針刺之不若初起之際艾灸百壯方可保命若待其出膿百人之中能生幾何急服蠟凡丸

又雨陰湿倍加蒼术　白术　澤瀉　防風　木瓜

附骨瘡　治法同前

## 臟毒症



臟毒者其大腸盡處是臟頭一曰肛門又曰屎孔内是也毒者其勢究也皆喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和或房勞太過或飲醞𨠵之酒或食五辛炙煿等味畜毒在内流積為癰肛門腫痛大便堅硬則林痛其傍生小者如貫珠大者如李核煎寒作熱疼痛難安勢感腫脹翻凸虚浮早治易愈失治潰膿孔爛陷内寸許者難生血膿出而腫消痛減者易生也

一初起微腫即用湿蚯蚓糞捻成餅如錢厚放患上文壯如半粒豆大者燒之微勢即去再換餅燒之亦易如前法以十四壯為期外用氷香散掺之

爐甘石（火煆二錢）（黄連煎汁之将乾乳末听用）　乳香（一錢另研）　石膏（一錢另研）　水片（弍分）　射香（一分）　和研細末田螺搗爛取汁調

塗患上偶無田螺煎黃連汁亦可

先服托藥一劑追其毒

歸尾（三錢）　生甘草（二錢）　白芷（一錢）　黃連（一錢五分）　枳殼

檳榔　烏藥　赤芍藥（一錢）生地　天花粉（一錢）

皂角刺　桃仁泥（二錢）　紅花（各五分）　大黃（三錢）　穿山甲（炮三錢）

玄明粉（三錢）水二鍾浸一宿明早煎至一滚空心服之

行利六七次用薄粥補之若稍早腹反痛

清臟內托散

人參　黃芪　當歸　川芎　陳皮

甘草　黃連　生地　赤芍　白朮

黃芩　独活　枳殼　白芷　防風

牡丹皮　槐花　升麻　烏藥

水二鍾廣膠五錢煎服倘寒熱脾胃餘症以意增減

全在隨症活法

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之六

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

## 目錄（凡二十症）

鶴膝風圖說（方三）　膝腿毒圖說（方二）　人面瘡圖說

肫疽骨槽疽圖說　腳手發背圖說（方三）

骨瘻疽圖說　腳拐毒圖說　骨疽瘡圖說

跟疽圖說（方一）　鞋帶瘡圖說（方二）　血風瘡圖說（方三）

風疳瘡圖說（方二）　腎氣遊風圖說（方二）

裏外臁瘡圖說（方五）　飛遊毒圖說（方二）

紅絲瘡圖說（方一）　楊梅瘡圖說（方十八）

癬瘡圖說（方十二）　雀子斑圖說（方二）

諸瘤圖說（方七）

第六卷目錄（畢）

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之六

圖　論　方

## 鶴膝風



鶴膝風病風鼓槌風之類也氣血相並而行週于一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作矣多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受邪鬱為瘀滯不得運行所以作痛夜則痛甚行于陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕而積熱得發其血自行與氣相和其病乃止或因濫藥取効性急作勞常享厚味感冒風雨腿腫則痛甚皆瘀血流于經隧行久不治恐成偏枯以致膝腫髀細大痛兩足無力腳弱漸細骱肝枯槁拘攣不能屈伸治宜祛風順氣補血壯筋養陰除濕則氣血通暢自然愈矣

### 大防風湯

人參（一錢五分）　羌活　獨活　甘草　牛膝（各一錢）

白芍　熟地　白朮　防風（三錢）　黃芪

杜仲　川芎（各二錢）　蒼朮（一錢五分）　附子（二錢）

水二鍾薑五片棗肉二枚煎服飲好酒以助藥勢

### 追風除濕圍藥

多年陳小粉（四兩炒焦色）　乾姜（一兩）　官桂（一兩）　五倍（一兩）

白芷（一兩）　龜板（醋炙一兩）　當歸（一兩）　防風（一兩）　白芨（三兩）

烏藥（一兩）　乳香（一兩）

右為細末用老姜汁釅醋各半葱汁一分蜜少許火上熬熱調藥乘溫手搽四向空中出毒時用餘汁熱潤之以助藥力

### 四妙丸

蒼朮（二兩）　白芍　龜板（好酒炙酥各二兩五錢）　黃柏（五錢蓋酒拌炒）

右為細末酒糊丸如桐子大每服六七十丸當歸湯下酒亦可嚴寒加附子（二錢）

## 膝眼毒



此毒受在腎經膀胱不流氣血凝滯而濕熱攻于膝眼結成毒也圖藥用鶴膝風藥敷之煎劑用木香流氣飲

當歸　蒼朮　白芍　白朮　白芷　川芎　木香
牛膝　木瓜　烏藥　澤瀉　薄荷　紅花　五加皮
茯苓　威灵仙　水二鍾姜七片葱白二根煎服

次服大防風湯　方在前

又方治膝腫　歸須　赤芍　桃仁　蒼朮（各一錢）　黃芩
連翹　羌活（各五分）　木通　紅花　甘草（各三分）　黃柏（知母各錢）

一人痰濕流注膝紅腫如腫毒相似脈浮滑用前藥十二味加南星牛膝龍胆草

---

## 人面瘡



此症生于兩膝之上形如人面口眼俱全患人飽則不動飢則口眼俱動俗呼為寃業瘡膝蓋之間然膝者筋之府屈伸不能而行則使附筋將愈矣此係皮肉堅硬之所且生疽毒則裏先潰後爛皮膚攻作故成此形宜作善事解之須要真誠懺悔然后方可用藥初用流氣飲久不愈者服苦參丸補腎水再用猪蹄藥湯洗之以生肌定痛散摻之后用膏藥貼上

流氣飲　苦參丸　方具瘰疽圖后

又方摻藥貝母末用竹筒吹入瘡口內數日成痂而愈

## 肶疽　骨槽疽



肶疽肶高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知其因成膿在內一時不能出皮膚須用內托發出方可用針刺破

骨槽疽生于膝蓋上并脚趺上腕其痛時如刀割其痒似虫鑚急用艾灸瘡上三五壯便貼乳香萬應膏更服黃凡丸

治法同附骨疽

---

## 脚手發背



此症因心經有熱行履高低傷于足趺血聚成疽治法同參漏濕毒流注

加味流氣飲（治足上）　川芎　麻黄　甘草　肉桂
乾姜　半夏　茯苓　枳殼　白芷　厚朴　芍藥
陳皮　蒼术　姜三片水煎服

木瓜栻柳散（治足上）　栻柳　木瓜　紫蘇　陳皮
甘草　木香　當歸　赤芍　再服蝋凡丸

羗活散（治手上）　羗活　獨活　前胡　荆芥　甘草
烏藥　桔梗　薄桂　升麻　當歸　威灵仙

## 骨瘻疽



此症生于手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可忍漸長大如楊梅之狀血不出亦不生膿毒從経絡流于遍身有此疾者宜常謹防不可視為輕疾昔日山東唐世民感此醫者云此疽生為奇相恐是惡毒世民笑而言曰吾乃識字人天賜與吾為筆架後及一月遍身攻串其疽只口内出臭黄血水三五碗出水不至十日其亡矣後待洗浴停屍衆人持起遍体俱爛皮肉盡落今有此疾各宜仔細推情施治之宜用治疔之法加减行之

## 脚拐毒



此毒受在腎通于陽明筋聚之處疼痛傷心成毒也常用膝眼毒跟疽毒及鶴膝風藥治之

## 骨疽瘡



且骨疽瘡之發皆由血凝氣滞徹骨酸疼或房事過劳或乘虚入水感風合寒或風毒邪热侵乎荣衛或憂鬱傷干心肝胆腎経或飲醇釀焼酒煎炒炙煿等物或遠行又傷于酒色自然腫痛日久成膿初起宜灸百壮以骨热為度久宜用銀火針破之血膿元氣盛易愈白膿氣弱難愈治法以獨活寄生湯兼服十全大補湯倫加茅山蒼术新昌白术及肉桂乾姜人参黄芪當帰為先鋒之要剤繼以霹靂灵應散治之無不愈者肉桂乾姜白芷防風蒼术烏藥龜板酥炙五倍多年陳小粉炒黒各等分為末射香少許和匀老姜汁五合醋三合葱半觔和蜜一兩同搗取汁火上熬滚乘热調藥搽患處四向空中出毒氣時用餘汁煎热潤之以助藥力少劳戒氣絶慾除想十旬方愈若病人不遵從醫師之訓任一巳見恣情傲物憂慮萬端不能制六氣七情之私雖天醫院灵官亦不能治而况中醫乎噫恬澹虚無病安從來心有佛齋諸病生爲實此之謂也凡患病者宜自修省恐惧洒落坦衷指日可愈何須多服藥餌耗傷元氣并免饋送于良醫不亦善乎　治法與附骨疽治之脉

## 彔疽　一名牛繭蚕　一名土栗

此毒生于脚跟之上因行動高下肭傷故生此疽形如

疣瘨色熱膿性有紫色便不可刺破先用金蘇散或鉄箍散敷之避風戒色不宜行動先服羉毒流氣飲合服

除湿木瓜湯

蒼术　白术　茯苓　甘草　木瓜

薄桂　澤瀉　薏苡仁　柴胡　青皮

蟬脫　當帰　白芍　生地　烏藥

牛膝　黄栢　知毋　防風

痛加乳香　如虚加人参　黄芪　冬加附子

待其将潰用針挑破出膿水貼金絲紫金二膏藥

蛙帶瘡　脚心毒



---

蛙帶瘡受在寒濕足陽明為毒氣血相聚而成也當用定痛流氣飲治之

梹榔散

紫蘇　枳殼　厚朴　甘草　芍藥　陳皮　青皮

腹皮　香附　梹榔　防風　姜三片棗一枚煎服

脚心毒受在腎心經在脚心是為湿毒也乃名脚心瘡當服定痛流氣飲并梹榔丸治之

定痛流氣飲

人参　桔梗　芍藥　枳殼　烏藥

當帰　川芎　茯苓　白芷　甘草　乳香　黄芪

血風瘡



此瘡因婦人經脉不調或一月兩次或過月不來以此

血氣漬入足陽明經故生此瘡宜用木香流氣飲五積散

隔紙膏

黃栢（蜜炙）飛丹（各二錢）輕粉（一錢）面粉（一錢）

桐油調作隔紙膏貼之

又方黃栢（蜜炙）黃丹　蜜陀僧　蘆薈（各一錢）船底灰（二錢）

輕粉　樟氷　孩兒茶　五倍（各一錢）右為細末

清油調搽痛加乳香臭加射香浸淫加青黛

又方輕粉黃連黃栢飛丹五倍枯礬各等分

鼠疳瘡



凡風疳者經速脾胃絡足陽明經寒濕相傳風毒交接容于谷道之間注于承山之側初生癬疥破有黃水浸淫成瘡攻于遍体或麻木而破裂治法同前其中加減之法難以指明宜推類消息之

如聖膏　治一切風疳疥癬痒痛經年不効

麻油（八兩）巴豆仁（三錢）當歸（五錢）輕粉（二錢）黃蠟（三兩）

右為細末先將清油鍋內熬次入巴豆當歸末后下輕粉黃蠟搽患上

治法與腳拐毒方同

腎氣遊風



腎氣遊走毒在脚肚受在膀胱經冷氣傷腎之實後膀胱此乃風毒也當用紫蘇流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇　桔梗　厚朴　甘草　芍藥　白芷　陳

檳榔　香附　大腹皮

姜三棗一煎服

檳榔丸

檳榔（二兩）枳殼（二兩）大黃（四兩）木瓜（一兩半）木香（一兩）為末煉蜜丸如桐子大每三十丸空心任意送下　用鐵箍散（敷之）

## 裏外臁瘡



三里之傍陰交之側生之者因腎經寒氣攻下下焦內因風邪之所攻外有冷氣之所搏或因撞損而致生此瘡漸然潰爛膿水不乾蓋因濕熱風毒相搏而致然也治方于後

紫蘇流氣飲　三香和氣飲

又方

輕粉　黃丹　黃連　當歸　白芷　生地（為末乾摻）

又方

飛丹　黃蠟（各等分）用火熬作隔紙膏貼之

又方

伏龍肝（即竈中紅土）輕粉一錢　黃丹（煅過水飛）沒藥二錢

血竭二錢　滑石二分　孩兒茶一錢　絨灰一錢

鳳凰窠灰一錢（即鷄胎子內白嫩皮）

右為細末乾摻　肉深加天灵蓋　臭加射香

隔紙膏方　自然銅（五分好醋煅七次）乳香　沒藥

血竭（各錢）一　黃蠟五錢　銅青五錢　細芽茶（八錢各另研為末）

黃栢末（四兩）先用生桐油四兩煎滾取出先加栢末后加茶末待略溫再加細藥次加射香五分

## 飛遊毒



此毒因榮衛受其肌熱故生此疽赤癍走注不定用溫水洗患處用三稜針刺毒上二三十針或磁鋒砭之亦妙用拔毒散付之

拔毒散

乳香　黃栢　黃連　雄黃　末之鷄子清調付（患處周上）

解毒十宣湯

猪苓　澤瀉　當歸　生地　白芍　防風　荊芥
木通　甘草　黃芩　枳殼　小柴　天花粉
白水煎乳母及子同服尤妙

## 紅絲瘡



夫紅絲者心膀積毒氣血相凝滯于經絡之間發于肌膚之上紅絲貫穿或如一紅線或疼或痒皆由風熱相乘而生如箭之速若行至心間即死急當頭以磁鋒刺破擠出毒血其紅絲之中再刺之方絕其根急用當歸連翹解毒之劑治之須戒酒數日

清心解毒飲

當歸　生地　赤芍　川芎　升麻　乾葛　連翹
山梔　蟬脫　黃芩　防風　桔梗　羌活　木通
青皮　枳殼　玄參　天花粉

## 楊梅瘡一名廣東瘡一名徽瘡（徽音揮）



此瘡皆臟腑之積毒脾家之濕熱其起也有三因男子與生瘡婦人交感薰其毒氣而生或体虛氣弱偶遇生瘡之人穢氣入于腸胃而生或先患瘡之人在于客厕去後其毒氣尚浮于客厕之中不知偶犯其毒氣薰入孔中漸至臟腑或在頭頂中或在肋下或糞門邊先起有雄有雌雄者大如白果遍身生五六十或百枚分棵不成片雌者小如豆瓣遍身連片膿汁淋漓不能累人嬰兒患此者皆父母胎中之毒也宜用汗藥宜用服藥宜用搽藥不可服丸劑恐內藏輕粉易愈故也但輕

粉乃水銀昇也腐腸爛骨害不旋踵

汗法

用槐花半升揀去石灰枝梗鍋內炒焦下酒三升煎滚濾去查乘熱飲之以衣覆身出汗為妙

又汗藥

升麻　白芷　甘草　蒼术　當歸　穿山甲

赤芍　羌活　獨活　防風　荊芥　大柴胡

麻黃　連翹　木通　薄桂　桔梗　金銀花

水酒各一鍾煎八分乘熱服之以衣覆身出汗為妙

煎藥方

防風（一錢）木瓜（二錢）白蘚皮（一錢五分）連翹　黃芩

金銀花（各一錢）皂夾子（大）薏苡仁（炒）當歸　川芎

白芍　熟地（各八分）升麻　甘草（各三分）人參（一錢）

白朮（一錢）顛頂加藁本

冷飯糰四兩水六碗煎至四碗濾去查每藥一剤用汁二碗煎至八分瘡在上食遠瘡在下食前瘡在遍身不拘時服忌茄子糟物及牛肉茶葉此藥服四十剤方無后患

薰洗方　夏天一日一洗冬天兩日一洗

防風　芍藥　山梔　苦參　薄荷　金銀藤
蒼术　黃栢　地榆　黃芩　連翹　蘄艾
骨皮　花粉　荼草（各三錢）加鉛（一觔）紫蘇（一把）

水二斗煎至数沸去查傾在浴盆內將板一片放在盆上坐之上下週圍以竹圈或蘆席遮護之無風處拭乾滋水然后搽點藥

點藥

珍珠（一錢另研）杏仁（五錢去皮另研）輕粉（五錢另研）射香（二分）

右四味和勻每用雄猪胆汁調勻搽入肌肉不見藥為効如有膿水出再抱再搽

又方

鴨嘴胆礬為末水調塗之亦可

又方

水銀　軽粉（和研）杏仁　風子肉　孩兒茶（各等）

右各等分和勻在頭面者用鵝胆在身者用猪胆在脚用狗胆汁調搽

服藥久不愈下行藥

白殭蚕（三錢炒）全蝎（七枚酒洗焙）上當歸　白芷
穿山甲（炮各二錢）大黃（四錢炒）末之五更空心蜜湯調下作丸酒亦可用行利數次用薄粥補之明日或再隔一日如前服則濕熱蟲毒自消矣

輕粉毒方　此毒之發皆由起瘡之初求速愈而服軽粉故生此毒也發于四肢者易治發于頭面者難愈

人参（二錢）當歸（二錢）杜仲（一錢五分銅器中酒炒）茯苓（一兩）
牛膝（三錢）赤芍（一錢五分）黃栢　知母（俱用鹽酒炒褐色）
防風　甘草　白蒺藜　五加皮（各一兩）白术
陳皮　羌活　麻黃　白芷（各一兩五錢）

冷飯糰四兩煎服二法同前

年久軽粉毒

上茯苓（五觔）當歸（四兩）鉛（一斤）川椒（八兩）大酒二十觔文武火煮焚三枝官香為度埋土中三日出火毒飲之

軽粉毒膏

軽粉（三錢）爐甘石（一兩火煅過黃連汁浸之）牡蠣（一兩塩泥裹入煅通紅）
真菉豆粉（三兩焙乾）

右為末同生桐油調勻入磁盆中以艾火薰熱作隔紙膏貼之兩日一換

梅瘡破砕摻藥

五倍（一兩去中間白花虫屑為粗末炒斷烟為度）雞內金（七錢生用）黃栢（一兩去粗皮猪胆汁潤炙褐色）血丹（少許）氷片（二分）大紅絨灰（二錢）天灵蓋（煅存性二錢）

右各研細末和勻摻之

梅瘡摻藥家貧不能辦藥者

大黃（一兩）信（三錢）俱為末和勻外用麵糰包前藥炭

火煨熟內藥如糕樣再用火炙乾研細末先用防風荊芥湯或茶清洗過然后摻之黃水出即愈

斷根丸　龜板（童便浸七日酥潤炙黃研末）

槐花（净）樺皮（煅）各等分為末蜜丸酒下一方加木香

又日夜痛不能行動　紫花地丁草　蜂房（煅）乳香沒藥　升麻（各三錢）為末每用五錢酒調下

輕粉毒爛深不長肉

乳香（三錢）血竭（五分）孩兒茶（一錢）天灵蓋（煅二錢）末之加氷片二分乾摻

---

廣瘡輕粉煮酒方

車前草（一京生用洗去泥）蘄黃蛇（一條去頭尾）生地（四兩）白蠟（二兩）歸尾（二兩）藁本（四兩）川芎（二兩）牛膝（四兩）白芷稍（二兩）羌活（五錢）白术（四兩）甘草節（一斤或半斤）石南藤（二斤一斤）（微香長沙一分半）防風（八兩）薏苡仁（四兩）槐花（四兩净炒）鬱金（四兩）小紅棗（四十九個）冷飯團（一斤江西白色者妙）

用好葱三十根好大酒十五斤將藥切片各稱准酒放瓶內將藥入瓶內白綿紙數層又放竹葉縛緊瓶

口不冷出氣重湯煮之放大米在瓶口上米熟方好取瓶埋地下去火毒酒冷了取酒面上白蠟用鉛一斤打成餅將前酒內藥渣取出晒乾共為一處為末糊丸如桐子大每服六七十丸酒送下

廣瘡膏　松香（一斤四兩熬去查）杏仁（四百九十粒去皮尖）乳香（一兩）沒藥（一兩）銅綠（二兩）黃蠟（一兩）輕粉（一兩）萆麻子（四百九十粒去皮净肉）射香（三錢以上俱另研）

将各藥為一處放桕內搗及千餘下桕頭上抹油不沾桕頭不許雞犬見之不緑矣膏用紅絹攤之絕妙

## 癬瘡



夫癬之生也由于脾経湿热及肺氣風毒所致或坐卧當風酷暑漬水以致皮膚不仁遂成頑癬或如雲或如銅錢或如荷葉或長或歪其形不一發于上者屬陽易治發于下部胯間豚腿屬陰難愈年久者癬内濕热所化有疥虫極痒其名有六焉

一曰乾癬搔則出白屑索然彫枯如蟹爪路之形

二曰湿癬搔則脂水浸淫如虫在内極痒遇热湯浴之其痒不可當

三曰風癬搔則痺頑不仁全不知痛痒皮膚如木

四曰牛癬其状如牛領之皮堅而厚竹片刮之亦不隨水出

五曰狗癬時作微痒白點相連

六曰刀癬輪廓皆無如雲岩之氣運行無定

治法當清心火散肺風之藥服之

踈風瀉火湯

半夏（蔴油拌炒）　升麻　甘草　薄荷　石菖蒲
生地　當歸　防風　荆芥　苦参　天花粉
白朮　白芍　桔梗　白芷　連翹　白蒺藜

羗活　黄芩（酒拌炒）

三味丸

苦参（净末八兩）　白蒺藜（炒去刺净末四兩）　皂莢一觔煎膏加煉蜜為丸如桐子大每用二錢或酒或湯下

黑魚湯

用稀薟葉鋪在鍋底中間放魚不拘多少上以葉覆之白水煮熟食魚肉并汁其葉取出晒干磨末煉蜜丸服

搽藥

川椎皮（四兩）白芨（四兩）剪草（四兩）俱為末加巴豆肉十四粒木鱉肉四枚剉碎川椒末一兩河水調勻入竹確中用銀簪攪千餘下埋飯內煮一滚每用少許搽之先以穿山甲刮損方可搽藥

疥瘡及白疱瘡

用小麥一升鍋內炒焦下水銀一兩攪和如星取出為末用菜油調搽

又方

雄黃（一錢）硫黃（二錢）檳榔（一錢）枯凡（五錢）為絕細末香油調搽

又方

枯凡　苦參　白芷　花椒　蛇床（子）　風子肉（各一兩）輕粉（五錢）右為末桕油為丸搽入肌肉

又方

防風　荆芥　白芷　五倍　枯凡　樟氷　硫黃　輕粉　檳榔　右為末菜油調搽

清肌湯

半夏　菖蒲　苦參　胡麻　防風　何首烏

蒼朮　當歸　生地　乾姜　防風　威灵仙　紅花　水煎服

清心瀉火丸　蒼耳草（葉二兩）當歸　天麻（各一兩酒浸）

苦參（六兩）薄荷（葉）荆芥（各四兩）防風　黃連　蟬脫（各一兩）

右為末酒糊丸每七十丸白湯送下

又方　何首烏　艾各等分煎湯洗之

合掌散

檳榔（五錢）硫黃（五錢）面粉（五分）各為細末和勻每用少許香油調夜卧時塗外腎囊不可（洗手但揩搽乾三日即愈）

雀子班



雀子班者出于肺經或母受胎之際不守禁忌因夫醉

洞當風行房感集邪氣兇肺為五藏之蓋故肺風發外而成雀子斑也宜用驅風換肌膏治之

肥皂（二觔）甘松（二兩）三柰（二兩）牙皂（二兩）輕粉（五錢）
白芷（二兩）薄荷（一兩）天花粉（一兩）栢末（一兩）細辛（一兩）
乾葛（一兩）草果（一兩）防風（一兩）獨活（一兩）

右為末成丸每朝洗面用之再用玉面奩花粉

玉面奩花粉

杏仁（三錢研如泥）輕粉（一錢）面粉（三錢）白芷末（一錢）射香（二分）
氷片　用鷄子白調匀每少許如婦人搽面法

## 諸瘤



此瘿瘤受症陽在六腑流在經絡風寒濕熱傷于心肝脾腎之經血聚不散日漸增長或有破者可擇梅花散數之凡結聚者先用點藥付于瘿瘤中心待七日後方可取去惡物後用膏藥貼之内服秘方流氣飲治之不可輕易此乃宿瘤之疾

粉瘤紅玉膏

石灰一塊如錢大糯米十四粒同醃水化開一夜加辰砂

梅花散

寒水石　龍骨　血竭　黃丹

右為細末乾掺

箍瘤方

草烏（八兩）川烏（四兩）乾桑葉　朽木（各三兩）桑柴灰（二碗）
梗灰（石灰未化者一觔打末）

右朽木等四味燒存性同二灰研匀以水十碗淋汁如法熬膏用之

消瘤方

蕎麥（燒灰半碗）灰料茶（燒灰半碗）風化石灰一碗同和一處淋

三碗熬成膏后用木鱉一二枚巴豆五六十粒二件去殼去油胡椒四十九粒各研細爛再和研細入灰汁内再熬成膏入礶内蠟紙封之如用時不分大小用藥點于瘤上其藥自至根再上候茶褐色須臾間其瘤皆黑色不須再搽二三日其瘤乾枯自有瘡口用紫金散敷之

紫金散

黃丹（一錢五分）輕粉（二錢五分）為末乾摻瘡口

藥線繫瘤法

先用芫花根洗淨帶温不犯鉄器搗取汁用生絲線一條浸汁中一宿以線繫瘤上一夜即落不過二次將龍骨細茶呵子末三味付瘡口如無根以芫花煎濃汁浸之亦妙下部痔亦可用

痰瘤煎藥

陳皮　半夏　茯苓　甘草　升麻　鼠粘子
連翹　柴胡　昆布　黃芩　桔梗

時以自溺搽瘤上甚妙

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第六畢

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之七

宋燕山竇漢卿輯著
明三衢大酉

目錄（凡九症）

大麻風毒圖說（方八）　天疱瘡圖說（方三）
冷瘡圖說（方一）　癩瘡圖說（方九）
眉疳瘡圖說（方一）　頦疳瘡圖說（方一）
赤遊丹圖說（方二十一）　鼻痔圖說（方九）
附痔漏症（方五十二）

第七卷目錄畢

## 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書 卷之七

圖 論 方

### 大麻風毒



### 治麻風毒用胡麻散

胡麻子（十二兩） 苦參 荊芥 何首烏 葳灵仙（各八兩）
白蒺藜（炒八兩） 防風 菊花 甘草 石菖蒲
牛蒡子（各八兩）
右為細末用好酒調下日午半夜服之

### 白花蛇丸

白花蛇（一條酒浸二夕） 白附子 天麻 牛膝（各一兩）
當歸（酒浸一兩） 何首烏（二兩） 姜蚕（炒一兩） 威灵仙（二兩） 羌活
獨活 防風 萆薢 蔓荊子 苦參（各一兩）

甘草（炒七錢） 石菖蒲（二兩酒浸） 蟬殼（一兩） 白芍（四兩） 川芎（一兩）
蒼耳草（四兩） 雷丸（三兩） 赤芍（一兩） 風子肉（二兩） 蛇殼（一兩）
雄黃（五錢） 皂角（三兩） 烏藥（一二）
右為細末煉蜜丸如桐子大每五十九空心好酒送下

**蕪荑酒** 治久患枯攣三十年癩着牀及諸惡風眉毛脫落
生地 獨活 丹參 白附 甘遂（二兩） 赤脂（二兩半）
乾姜 蕪荑 麥冬 芫花 蘇子（一升） 栢子仁

茯苓 茯神 金牙 薯蕷 白朮 蔓荊子
杜仲 石楠 白芷 人參 烏頭 山茱萸
狼毒 川椒 防風 細辛 牛膝 寒水石
麻黃 當歸 柴胡 烏藥 牡礪 枸杞子
桔梗 狗脊 天雄 石斛 桂心
右計四十二味以酒二斗浸夏三日春秋六日冬九日合用

**叅朮散** 治手足癹涿皮膚一身盡痛眉毛脫落耳聾湿痒

秦艽　川椒　人参　茯苓　牡礪　細辛　麻黃
瓜蔞　乾姜　白附子　白术　桔梗　桂心　獨活
當歸　黃芩　柴胡　牛膝　天雄　石楠　杜仲
莽草　烏頭　甘草　川芎　防風　酒浸服之

又方　治眉毛脫落生髮

白芷　附子　防風　川芎　莽草　辛荑　細辛
當歸　川椒　大黃　猪膏　杒荊子　馬鬐膏（五兩）

## 大麻風論

人身中有八萬尸蟲共成人身無尸蟲則人身不成不立復有諸惡諸癩橫病諸風若生必害于人身也皆因喜怒不節坐卧湿地故為癩疾也宜服

黑白散　治大風麻癩眉髮脫落及瘡遍身生瘡遷延歲月猶如癬疥或如魚鱗其症不同痛痒不一若服百日眉毛再生仙效甚應

烏稍蛇（三兩）白花蛇（三兩將黑白二蛇用好酒浸一宿取出去皮骨用肉）
川烏（一兩手切片如錢大）何首烏　草烏（一兩同川烏好麻油浸一宿取出去油炒乾用）石菖蒲　荊芥　薄荷葉　白芍
木香　當歸　防風　白芷　川芎

天麻　羌活　獨活　甘草（各一兩）大黃（四兩生）
自然銅（三錢火燒赤色好醋淬七次另研細入用）

如患人稟受虛弱或遇中年將荊芥大黃羌活獨活薄荷各退一半用　右二十味並製度為末每服一錢酒調服夏月冷冬月熱服之一日三服午前茶清調服如能用一半末子打酒糊為丸每服七丸至十丸加至十五丸茶清送下一日亦三服隻日服丸子雙日服末子

按巢氏云風者十有九症為癩病有蟲者迁延年歲多死余傳此方果為應効可以全生洗浴除蟲法具述于後

淋洗浴湯法　治大風毒氣生瘡五蟲食肌痒痛如癬疥之類或如魚鱗之形亦黑癮疹瘡並皆治之

何首烏　苦參　荊芥　朴硝

右先用四味各剉四兩水十五碗煎沸却入雄黃白凡各五錢乳末初入合煎二三十沸去滓淋洗留滓再煎又加雄黃白凡末共各三錢煎淋洗　未煎藥先用蝋脂同好麻油勻和用鵝毛掃遍身有瘡又臘血痒甚處了却將藥湯同候少時其虫聞香必出方

用湯洗淨服煎藥百日可愈如或有一切久遠年深風毒瘡者皆可服之

解風丸

荊芥穗　防風　白蒺藜　苦參　胡麻子

薄荷

右各等分為末皂莢水和為丸一日服四五次用百沸湯或清飯湯送下

## 天泡瘡

此瘡之發不拘老幼受酷暑熱毒之氣蒸入肌肉初生一瘢漸至遍体漫爛無休合家相染此症須要淨湯淋洗切勿以穢氣觸之内服清肌燥湿湯外用泥金刮毒膏

清肌燥湿湯

蒼术　白术　升麻　甘草　澤瀉　木通　生地

白芍　苦参　黄栢　知母　黄芩　茯苓　枳殼

連翹　小柴胡

水二鍾姜三片棗肉二枚煎服

泥金刮毒膏

韭菜地上蚯蚓糞（三錢）玄明粉（二錢）消石末（一錢）研細末用新汲井水調勻鵝毛潤患上三兩日然后再用茶洗淨將檳榔天花粉黄連黄栢末各一錢面粉四錢和勻乾掺自愈

又方

白荷花貼之

## 冷疳



夫冷疳者臟腑虛寒腠理毒惡腹中热氣薫于肺而肺主皮毛故發于肌膚損傷榮衛乃有四疳之名血疳者風热注于皮間紫疳者赤暈行于時氣風疳者四肢如疥瘡之痒冷疳者膿水長流不得乾息若不早治日久深入骨髓損傷元氣命必難保治法以消風解毒活血除湿之劑為主并附搽薬于后

### 十神散

軽粉（三分） 松香（三分） 杏仁（三分去皮尖） 風子（三分） 栢末（三分實炙）

硫黃（二分另研） 枯凡（三分） 飛丹（三分火煅水飛） 面粉（三分） 鷄内金（三分炙存性）

乾用桐油調搽入肌肉湿用乾搽

## 小兒癩瘡



### 諸癩瘡

松香（四兩） 川椒（二兩） 白凡（二兩） 軽粉（五錢） 黃丹（五錢）

右為細末陳菜油調搽

### 如聖膏

清油（八兩） 巴豆肉（三錢） 當帰（五錢） 軽粉（二錢） 黃蠟（三兩）

右為末先将油鍋内次入巴豆帰末后下蠟溶收（搽之）

### 頭耳面疳瘡

枯凡 松香 黃丹 軽粉 平底紅 甘蔗灰

五倍 銅青 各為末先用葱椒煎湯洗净乾搽或

用菜油調和搽入肌肉見効

辣梨瘡　先用黄藜汁洗之醋湯亦可

皂莢（七莢廁內浸七日洗淨晒干火煅）　榆白皮（燒灰）　枯凡　牛烟膏

輕粉　銅青　霜毒肉浸油調搽

又方　諸小魚胆搗爛加生凡再搗搽瘡上入肌肉

又方　治一切風癬痒漭終年不効

輕粉　鷄内金　銅青　檳榔　冰

雀梅藤皮（煅灰）各等分為末搽入肌膚內

又方　剃去頭髮用糯米煮極爛擂碎泥頭上其蟲盡在糯米中日后脫落其髮日生方得除瘡此一妙（法也）

服酒製防風湯

防風　黄芩（炒酒拌）　升麻　甘草　蒼术　金銀花

川芎　生地　當歸　白芷　連翹　鼠粘子

羊鬚瘡

五倍子和棗肉（煅三錢）　銅青（一錢）　枯凡（二錢）　輕粉（二錢）

松香（二錢）　羊鬚（三錢煅灰如無以楊柳根代之）

黄連（一錢）　徫水（一錢）　檳榔末　杏仁（去皮尖）　風子肉（各三錢）

右為細末香油調付之

眉疳瘡

治小兒眉疳瘡耳額瘡用射香散

射香散

香附（一兩）　銅青（五錢）　射香（五分）

右為細末用米泔洗净瘡濕乾摻瘡乾用油調搽并治耳額牙疳

治法具在小兒癩瘡之內

齦疳瘡



治小兒鼻唇齦疳　此症受在心肝脾胃因食炙甘甜煿熱毒所傷為瘡流滯皮處結成惡毒或有白風或有疳風此小兒之疾眉疳鼻唇牙齦先服牛黃清心丸次服敗毒流氣飲治之

如治牙口疳用米泔水漱淨用前喉科氷片散內量加珠子銅青枯凡

（齦音銀齒牙之根曰齦）

赤遊丹



小兒患此赤丹皆從母胎中受蘊熱故發皮膚遊走不定但腫起于四肢收者輕四肢収于腹者重急治得生

小兒赤遊丹固蘊熱所致即胎毒也或母懷胎之時好食辛辣毒物沐浴熱湯冬天炭火以致熱氣入胎嗜慾無度或生下火烘衣裳或火烘床褥以致熱毒內外交攻半歲上下無有不發者初起身体發熱燃火視之其色紅赤啼哭不止其光遊走不定發于四肢生發于腹者死急用砭鋒砭去其紫血自下而上則毒血流下不可逆砭急用乳香末雞子清調勻塗砭處時用芭蕉

根汁塗之內服珠砂化毒丹生蜜調下再服紫金錠水磨汁下

拔毒濟生散

牛黃（二分）珍珠（五分）氷片（一分）欝金（如無蟬肚姜黃代之一錢）
犀角（鎊二錢）辰砂（二錢）綠豆粉（二錢）文蛤末（五分）

或加化毒丹　生蜜糞清調下若加粉草末尤妙

乳母流氣飲

歸須　赤芍　升麻　黃連　甘草　鼠粘子
連翹　生地　黃芩　薄荷　青皮　天花粉
木通　黃栢　梹榔　小柴胡

又方　露天客厠內糞清和水花珠搽之亦妙

又方　熱蟮血塗之即愈

凡丹入于腹中飽悶臍凸体若熖炭倉公復生不能治矣

或遊丹發于頭者何以治之必須將患兒眠在床上以脚根一頭加磚一二塊以墜毒氣于頭用磁鋒砭之使毒氣毒血從頭頂而出若乳母抱立在身砭之則毒氣順下遂壅咽喉必难生矣近观同道之灰顛

倒砭之不得其手法以害諸兒故不辭瑣瑣又門言之并附十丹毒于后

小兒十種丹毒

一飛竈丹從頭頂腫起漸發紅腫頸項俱浮眼睛紅色用生葱一束擣爛取汁塗之又方以朴硝五錢雄黃末二錢和勻芭蕉根汁調和用敗筆蘸汁潤之須令病者卧之將此汁自下潤至顛頂其毒從百會穴出若隨下潤之則毒氣侵于咽喉亦難治者大人患此亦同治法

二吉竈丹從頭額腫痛用赤小豆末雞子清調付之前方亦妙

三鬼火丹從面上起赤腫用伏龍肝末鷄子清調付再用芭蕉根汁潤之益母草灰為末醋調付之亦妙

四天火丹從背上起赤點用桑皮末羊脂調付之

五天竈丹從臂上起赤腫黃色用柳樹枝燒灰為末蜜調付之

六水丹兩脇虛腫用生鉄屑末或鉛砂或銹丁末猪糞調塗

七殃火丹從臍上起黃腫用梹榔末米醋調付之
八野火丹從兩脚上起赤腫用乳香末羊脂調付之
九烟火丹亦從兩脚上起赤白點用猪槽下土麻油調
搽
十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調搽
又方
用尾花擣汁和水取汁同伏龍肝末塗潤之
小兒爛皮火丹
蓮蓬（煆）灰　面粉　伏龍肝　栢末和勻為末乾掺

凡小兒火丹或頭上起或背上起者俱用慎火草擣汁
搽上（慎火草即尾花）
又方
芊芊活隨處有之取汁搽之
并附小兒生下滿身無皮但是紅肉逮以早稻米粉乾
撲生皮方止
又方
以伏龍肝末雞子清調塗　土墼泥研末塗亦可

## 鼻痔　一名息肉

鼻居面中為一身之血運而鼻孔為肺之竅其氣上通
于腦下行于肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣盛
一有阻滯諸病生焉鼻孔中息肉名曰鼻痔皆由六氣
七情所感而成若生上入眼名曰努肉若生下入鼻中
名曰息肉窒塞不通戒酒絕慾除煩惱戒憂愁內服煎
劑外用點藥庶平復矣

通氣辛荑散　藁本　羌活　防風　薄荷　白芍
辛荑　升麻　甘草　川芎　當歸　生地　黃芩
連翹　桔梗

白芷　黃連　麥冬　柴胡　山梔仁

水二鍾姜一片煎服

消痔散

密陀僧（一錢）信（一錢五分）白礬（一錢）煅法陀僧礬四邊信居其中放在新瓦上煅烟盡為度入地下一夜出火毒取出加射香二分為末吹入鼻孔內時用手指揉鼻上下三百度其藥味漸入痔易化水矣外用搜湿麵糊塞鼻孔使藥味上行一日三四次點之其藥磁礶收貯

又方

仰卧時用白蔔汁滴入鼻孔中即消

又方

鷄內金（炙研末細墅五錢）如射香（三分）鴨嘴胆凡（二錢）

銅綠（二錢）枯凡（一錢）

右各研極細和勻磁礶收貯以蠟固口勿令出氣臨用時點鼻中如前法夜間多點之其息肉十日之内漸漸脫落或點藥揉鼻后出水不須憂慮此息肉所化也如不能盡脫用鑷子徐徐擺動取出亦可恐落

其根不能盡去再點藥四五日以絕其根凡點藥務揉之

附鼻不聞香臭通氣湯

羌活　獨活　蒼术　防風　薄苛　荊芥　升麻

乾葛（各一錢）甘草（五分）川椒　白正（各三分）冬天加麻黄一錢

水二鍾姜三片棗二枚葱白三寸煎

附酒齄鼻

四五年久藏糟茄露調硫黄末塗之四日後即消

連翹仁細茶各半為末臨睡茶清送下三錢

附鼻衂　山梔燒灰為末吹鼻內　或田螺氷滴入鼻內

耳鼻出血方

射香（一分）沉香（三分）白凡（一錢）糯米（五十粒）

各為細末麵糊丸如豆大絲綿包之如鼻中出血塞于兩耳耳中出血塞于兩鼻如左耳出血塞右鼻孔如右耳出血塞左鼻孔如左鼻孔出血塞右耳孔如右鼻孔出血塞左鼻孔即愈

前藥二神湯耳鼻皆可服

生地（一兩）麥冬（一兩）水煎服之

## 痔漏症并圖說附

凡痔有五即牡痔牝痔腸痔脉痔血痔素問曰因而飽食筋脉橫解腸澼為痔臟腑所發多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩胡椒辛辣炙煿醲酒禽獸異物任情醉飽耽色不避嚴寒酷暑或久坐濕地恣意耽看久忍大便遂致陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃生五痔天道失常民心蕩肆今痔变成五五二十五類或左或右或內或外或狀如鼠妳形如櫻桃或膿或血或痛或痒或腫或脊久而不治漸成漏矣大法以凉血為主徐徐取効切不可用砒霜毒藥亦不可輕易割取致成漏瘡又有肛門左右別有一竅出膿血名曰单漏治之須以溫煖之劑補其內生肌之藥敷其外其竅在皮膚者易愈臟腑有損而致竅者未易治也　甲子冬麥麟謹識

## 二十五類圖記

蓮子痔

狀如蓮子

通腸痔

其根生於臟出糞即下

氣痔

感氣即下

漏痔

氣血衰敗久步流膿不自洗净

勾腸痔

其形連腸頭者

蓮花痔

形如蓮花

鷄心痔

其形如鷄心

垂珠痔

其形垂下如珠

貫煉痔

穿而貫膿

栗子痔

其形如栗子

菱角痔

形如菱角

盤腸痔

盤腸而生

子母痔

大小

翻花痔

形如翻花登厠即出

鼠妳痔

形如鼠妳

雙頭痔

有兩頭

泊腸痔 緊泊肛門者

夫妻痔 一圓一長即雌雄也

脫肛痔 肛門脫下痔漏

三迷痔 有三珠財迷色迷酒迷故多之

血攻痔 即血出

珊瑚痔 形如珊瑚

擔腸痔 其痔橫在肛門

櫻桃痔 形如櫻桃

雌雄痔 酒色食毒不慎此間黑色

右諸痔名類不同其種則一何也皆由大腸傳道以成風热濕而腎虛為冷氣相攻飽食猪鷄魚膾燒酒釃酒生酒五辛辣等味或登厠臟虛為風邪所襲六氣七情所感人生一素不能飲酒亦患痔者臟原故也亦有父子相傳者毋血父精而成腸風者血痔之漸也速服京血補劑少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

法製枯藥法

信（一两）　白凡（三两為末）　非用（五錢）　硃砂（五錢臨時生用）

芭豆（五粒去殼）

先将凡一两半安於瓦盆中隨将信摻在凡上再将凡覆上火熬枯取出為末加硃砂末五錢和勻碾細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許点上少頃黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草或茶蘼花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯亦可

今用藥開於後

護肉藥

鬱金（五錢）　黃連（五錢）　白芨（三錢）

右為末用蜜水調稀先将此藥塗在痔四邊好肉上御

用薄紙貼定因濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金秘方

用牡蠣二两煅過入地乞坑埋之去火氣為細末痔漏瘡若濕乾摻若乾以津調搽痔上

又秘方

砒霜（白色明净者五錢）　白凡（一两二錢明净者）

黃丹（二錢水飛過二次焙乾）　草烏頭（二錢為末緊将去皮生用）

蝎梢（八个瓦上焙乾）

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先将炭燒鐵銚透紅放冷揩

拭净将仳打碎如豆大将白礬焼令滾沸将碎砒投礬内拌匀以文武火煆旋旋攪入草烏蝎稍黄丹同研末收放新小瓶内如用先将痔漏以甘草湯或葱湯洗净将生麻油調藥少許以鵝翎掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡内必出黄水如膠其瘡漸消看漏深浅就将薄綿紙裹豬鬃三根先入在漏内試漏深浅就将藥紙撚之藥插入漏内其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取出再換新藥紙撚入漏内日上三次蚤午晚用藥俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色然

後不用紙撚藥其漏瘡根自落如漏不深入内上用藥點撚如瘡紅活平復不收口方用生肌散藥敷之立愈其瘡根永再不發矣

### 生肌長肉藥

血竭（五錢）　龍骨（五錢）　光粉（二兩）　白芷（五錢）

黄丹（三錢水飛炒）　輭石膏（二錢）　黄連（五錢）

海螵蛸（二錢）　黄栢（一兩）　五倍子（一兩）

右為細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口浅止乾掺入内生肌平復不用

### 點痔藥

氷片　乳香　没藥　熊膽

俱為末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞内化水以銀簪滴汁痔上甚効　田螺代之亦可

### 痔漏藥

用銅杓内制牛黄末一分先炒微烟即下硍末二錢候烟起再下白礬末九錢待滚乾取起仍入火微炒煆安地上出火毒為末後入乳香辰砂没藥氷片各一錢其為極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量

深浅長短用之如瘡孔爛大止用津唾調之填入孔内待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡即以五黄膏護外邊入錠時仍用唾調前藥末付在痔根上如痔根脱落掺生肌散并多服蠟礬丸

### 生肌散

龍骨（煆）　海螵蛸　赤石脂（各二錢）　乳香

没藥　血竭　輕粉　雄黄（各五分）

末出毛小鼠二枚炙乾

各為末如瘡臨用加氷片少許

又生肌散

寒水石（煆一錢） 龍骨（煆五分） 乾胭脂（三分） 輕粉（一分）

為細末乾掺新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子 久痔成漏

信（一錢） 白凡（二錢） 蜜陀僧（五分） 辰砂（五分）

先研信細入磁盆中次用凡舖信上烟盡為度再將蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頓漏納瘡口俟去腐肉方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石（一錢） 枯凡（五分） 白乾薑（五分） 草烏尖（三錢）

右為末葱汁調敷

痔腫者

用殼木鱉五倍為末蜜水調敷

諸痔

用螻蛄五枚搗碎水銀一錢射香（三厘）冰片（五厘）用銀蕪汁滴患上

痔漏

用鬭魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰為末血為丸如棗核大諒痔大小為之入內

漏孔不合

用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯通手就將漏洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用木屑燃之俟白烟出為度取出研末用津液蘸牙末點入漏孔處出黃水為効　黃牛牙齒散預製脩用

益氣清臟湯

人参 當歸 條芩（凉大腸） 黃連
生地 赤芍藥 槐角 川芎
升麻 枳殼（寬大腸） 秦艽 白朮
茯苓 甘草

水二鍾薑一片灯心廿根煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽（一錢五分） 當歸（一錢） 澤瀉 防風（各三分）
蒼朮（五分） 桃仁（一錢研為泥） 檳榔末（五分） 大黃（一錢雖大便燥亦不宜多）
黃栢（五分若大腸頭沉重者濕勝也更加之天氣大熱或燥熱甚者以意加之） 皂莢（一錢燒存性去皮）

右用桃仁梹皂三末另外餘作一服水煎至八查加三味

末調勻再上火煎一二沸空心服之所食美膳望之不犯胃氣忌生冷硬物桃李梅杏菓品油麵大料生葱胡椒之類第二服如前加木香末三分

秦艽防風湯

痔漏每日大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也

秦艽　歸身　防風　白朮（各一錢半）

黃栢（五分）　陳皮　大黃（煨各三分）　粉草

澤瀉（各六分）　紅花（一錢）　桃仁（二十枚）

右作一服水煎空心服

秦艽羌活湯

痔漏成塊下垂疙瘩不任其痒惟鷄心垂珠栗子雙頭子母夫妻櫻桃下垂等痔

秦艽　黃芪（各一錢）　升麻　大柴胡

甘草（各五分）　羌活（一錢五分）　細辛

藁本　紅花（各三分）　防風（七分）

秦艽當歸湯　痔漏大便結燥疼痛

秦艽　枳殼　當歸（各一錢）　桃仁（廿枚去皮研）

紅花（三分）　大黃（四錢煨）　澤瀉　白朮

皂角仁（各五分）　白水煎

當歸郁李仁湯

痔漏大便硬努大腸下垂多血苦痛不住

皂莢子（另末）　郁李仁　麻子仁（各一分）　秦艽（一錢五分）

蒼朮　當歸　生地（各五分）　枳實（七分）

澤瀉　大黃（煨各三分）

水二鍾煎成加皂莢子末切不可在風寒處大小便

紅花桃仁湯

痔漏如勾腸蓮花菱角翻花珊瑚盤腸等痔年久不愈

治法當補北方瀉中央

生地　當歸　紅花　防風

猪苓（各五分）　蒼朮（六分）　澤瀉（八分）　麻黃（二分）

黃栢（一錢五分）　木香（二分）　白水煎

槐角子湯

外痔併漏根蒂落下然後服此藥除腹內之毒

槐角子　枳殼　黃芪　黃連（各五錢）

薄荷（二錢）

右㕮咀作二服水二鍾煎至八分空心服

木香散　用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子　木通　車前子（各五錢）　淡竹葉

生地黃（一兩）　黃芩（五錢）　灯心（三十根）

右㕮咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

又方

痔貼藥之後恐毒未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

蒼朮澤瀉丸

飲酒食熱物脾主大熱而助三焦氣盛火生土也當瀉三焦若火熱退金得氣而反制木若木受制則五臟不生矣

蒼朮（四兩去皮）　地榆　皂莢子（各二兩燒存性）　澤瀉

枳實　秦艽（各二兩）

末之搗飯丸每服五十丸溫酒米飲任下一方去蒼朮加白朮

秦艽白朮丸

痔漏有膿血大便結燥腫硬疼痛

歸尾　枳實　澤瀉　白朮（各五錢）

秦艽　桃仁（製）　皂角仁（燒存性各一兩）　地榆（三兩）

末之和桃仁泥煉蜜丸每百丸鹽湯下乾物壓之

槐角丸

槐角去梗為末入烏牛膽內掛透風處為末煉蜜丸每服四十丸平胃散作湯下

腸風痔漏下血臟毒

大黃（煨）　桃仁（各三分）　當歸　梹榔

皂角仁　黃柏　荊芥　枳殼（各五錢）

蝟皮（炙）　黃連　秦艽　槐角（各一兩）

末之麵糊丸每五十丸食前白湯下鮮血下者加棕毛蓮蓬灰

大腸內結燥疼痛

秦艽　枳殼（麩炒各一兩）　桃仁（四錢）　皂角仁（七錢）

紅花（三分）　澤瀉　白朮　黃柏

黃連　防風　當歸（各三錢）　大黃（四錢）

末之麵糊丸每六十丸白湯下

黃蠟丸

黃蠟四兩丸如桐子大月朔服一丸次日服二丸三日

服三丸漸加至月盡三十九巳後每日減一丸至一丸止用酒送下輪流服之　其痔自痊一則不必服矣

潤腸丸

當歸（五錢）　枳殼（五錢）　百草霜（一兩五錢）　大黄（五錢紙包煨）

右為細末糊丸桐子大每服三十丸白湯下

巳破未破痔漏方

當歸（酒浸二宿晒乾火焙）　槐角子（炒焚皮）　蝟皮（炒黄）

地骨皮（净晒乾）

右為末各等分每服三錢五分空心温米湯調五更服之後畧睡一二刻火進米粥但宜乾餅一塊少言語自早坐至午怡情適性方愈

方

用青荷葉烧灰為末空心酒下三錢

又方

用金銀藤并花為末每日酒下三錢

療痔神方

橡子粉　糯米粉（各二兩為末炒黄）

每用二合滚湯調成餅飯上蒸熟空心食之

北氣收腸方

治糊花内痔痔頭落腸不收服此藥外痔不用

黄芪　白芷　防風　厚朴

當歸（各二兩）　川芎（一兩）　蔓荊子（一兩）　桔梗（一兩）

木香（一兩）　人參（三錢）　肉桂（五錢）

右為細末每服三錢空心棗子湯調下日進三服力壯其腸自收矣

猪肚膏

用雄猪肚一枚去垢淨入皂角刺一兩縛定兩頭煮爛去藥空心任意吃又不可用塩醬服三肚後即除根

一人患痔每日食海螺螄半升日醎以苦茶漱口約及二斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臓火屬陽海螄乃性寒味醎屬陰寒能敵火醎能軟堅茶又苦凉之味要又論之殆有理也

小兒生痔空心服甘草膏自愈

孫真人麝香膏

麝香（二分）　乳香（三分）　血竭（四分各為末）

右為一處以小紅棗煮去皮核肉和藥作餅依痔大小

放痔上用膏藥貼之痔內血水黃膠水流出此痔患之毒也一二次即愈

冊溪先生治漏瘡先用補藥以生氣血參芪歸术為主大劑服之乃王道平平之劑外以附子末津液作餅如錢厚放漏處艾灸之令微熱不可令痛餅乾再易之其餅隨瘡大小為之如困倦止之明日再灸以肉平為度仍前服補藥摻生肌長肉藥

熏痔方

用大雄鷄宰去血在湯鍋內燖去毛取出鷄將此燖毛

垢湯洗一二沸傾在淨桶內蓋定其氣少頃將陽物放桶上坐緊熏之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和撚成條放馬桶內坐薰之其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈倘加蜈蚣并艾熏後隨服益氣清臟湯秦艽蒼术湯調治之

洗痔方

馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滚坐熏候湯溫洗之

又方

牛膝搗爛煎湯洗之　紅花子打碎煎湯洗之

又方

魚腥草煎湯洗之　白地松煎湯洗之

洗痔國老湯

荆芥（一兩）　甘草（一兩）　藿香（五錢）

右不拘多少煎湯溫洗洗一次用藥一次用藥之後如大便閉塞用此外藥不用

又方

皮硝　鳳尾草　五倍子　韭菜子（各等分）

水一桶煎數沸放桶內坐之熏洗

脫肛痔

肺與大腸相為表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣

血虛脫肛以四物湯為主氣虛脫肛以參芪歸术為主血熱以凉血為主四物湯加黃栢

摻藥

乳香（五分）　沒藥（三分）　血竭（一錢）　紅絨灰（叁分）

牛黄（五分）　氷片（二分）　珎珠（三分）　孩兒茶（三分）
象皮灰（三分）　昇藥（三分）　五倍（二分）

右為極細末用後藥湯洗淨乾摻　須要避風

大人小兒摻藥

赤石脂　伏龍肝（各一兩）

為末付腸頭上日三次

升元大補湯

人參（三錢）　升麻（五錢）　白术（二錢土炒）　白芍藥（一錢酒炒）
生地（一錢姜汁煮）　歸頭（二錢）　黄芪（三錢）　黄栢
知母（各一錢俱鹽酒製）　粉草（五分炙）　山藥（一錢）
防風（一錢）　肉桂（五分）　附子（七分）　紅花（六分）

右作一服水二鍾薑五片棗肉二枚煎服川芎不用因泄氣故止之　虛甚倍加參芪歸麻

虛人脫肛補中益氣湯

加黄栢知母蒼术黄芩肛門痒加秦艽桃仁大便閉塞加皂角仁

冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際況人身小天地天在上人居中地居下豈不相應乎治之不能即奏功也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不効者病人亦要戒氣少勞為上策擇晴明和暖吉日在不通風淨㬉室中坐卧取頂上旋毛中百會穴以醬一匕搽上文灸三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣盖百會為一身之樞杻大能升提下陷之氣故能收功若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾翠骨又灸臍中隨年壯此法余用之甚効　諸痔漏亦治之

洗法

用生鐵五觔水二斗煎至五升出鐵洗之日三次明日再易新鐵如前洗之

又方

枳殼　朴硝　川芎　當歸
桑枝　艾葉（各一兩）　地榆　蒼术

右煎湯洗之

但肛門收上十有一二須服補劑調攝之其餘者漸漸恍息結痂偶遇喜樂之事忽然脫落一黑圈隨此腸有餘乃截腸也

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第七畢

## 跋宋太師瘡瘍經驗全書後

天地之大德曰仁仁者生生不息乃天地萬物生成之理也故神農黃帝造命生民嘗百草以治諸病立稚繪形圖成本草以詔後世故今之學者知藥性氣味皆賴此書之存也迨黃帝好生之德師岐伯設為問答之詞著內經以啓後人之所未啓醫道斯昭昭矣予家世業醫自宋太師子蘇公發迹瘍科繪形成圖因症立方秘藏久矣予次子夢麟業儒習醫素欲刊行此書以廣前人之緒自揣力薄止之今夏麟兒病中復翻閱太師公書并予試效瘡瘍疔症諸方叩之議論多切實有裨補愕而喜曰向為僉人浸諳貞汝遣吾意不期汝果能潛心于斯道也更能嚴訓子姪于深望焉遄以繡梓請命于予者四三予以家窘固却之復承同心諸友憫予之勤也各助貲樂成其善勉錄成帙刊行于世推廣濟物一念之仁予性素粗直恒多取怨于人陷以虛名困役老不能解尚賴斯業貽謀耳凡我後之子孫務存仁心為大本永繼箕裘毋興貪念以廢世業遺咎后世實予惓惓之至望也予不文僭書末簡維時為

隆慶戊辰一陽吉旦燕山　後裔乳泉竇楠頓首敬跋

---

## 宋竇太[illegible]瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷之八

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

### 目錄

小兒痘瘡圖說　禁忌十款方十六　踈痘丹（又方十二）

痘始形圖說　痘交會圖說　痘成功圖說

氣血交會圖說　氣血虧盈圖說二

氣血交會不足圖說二　保元濟會圖說二

榮衞相生圖序解九三　順逆險三法圖說二

痘出形　症順逆險治例　驗面部順逆險圖

始出圖　圓混圖　形色圖　起發圖　漿行圖

漿足圖　漿老圖　血盡圖　結痂圖　還元圖

痘論　氣血偏勝受傷圖　頂陷圖　倒陷圖

陽毒圖　臃腫圖　疔毒圖　內潰圖

氣血順逆篇　保元湯加減　保元湯

保元湯論　水楊湯　水楊湯論

四味升麻湯　十一味木香散　十二味異攻散

六味柴胡湯　四味鼠粘子湯　三味甘桔湯

三味消毒散　和解湯　四順清涼飲
解毒湯　大連翹飲　參蘇飲
四君子湯　生脉散　參苓白术散
术苓湯　七味肉荳蔻丸　三味穀精散
敗草散　白螺散　金華散
生肌散　滅瘢散　四聖丹
痘毒圖　方三

第八卷附世傳秘方目録　畢

## 第八卷世傳秘方

圖　論　方

### 小兒痘症



小兒痘瘡乃五臟六腑胎養穢液毒氣發於皮肉之間人生無不發者自幼及長必生一次又名曰百歲瘡胎毒之淺深發痘之稀密亦焉其理出於太極隱微之妙非天地至仁之心焉能斡旋此造化之大功乎保養之道蓋不容已也逐一開後以便學者覽焉

## 痘禁忌要略

○一凡男女欲出痘身體發熱鼻尖及耳尖小指冷者是出痘也須要避風為第一要緊若身體發熱則腠理空疎邪風入之而肺主皮毛傷風重者則咳嗽而風邪變於經絡痘多而細并發不出深可慮也

○一將卧房内打掃潔淨將門路有風入者即用紙糊之

○一將獨女胭脂揩眼睛則痘不入目

○一夫婦及役使之人須要穿潔淨衣服夜亦着衣服而寢須要齋戒以盡誠敬切不可起妄念倘少婦月經来

者迴避之

○一孝服鷄犬面生狐臭之人亦不許入出痘之所亦不宜喧嘩

○一出痘孩童睡卧切勿驚之以傷其心胆肝三經致有他症

○一父母役使之人不宜在痘兒面前搔頭摸耳待其漿足之際謹謹輪流看執其兩手切勿容他抓碎頭額夭旋以泄元氣務要小心

○一春夏天氣煖熱之時不可有炭火在房若感火氣非

---

壞眼即成熱痱不可治矣

○一百夏天出痘宜用薄草薦洒水上用蓆一條卧上週圍再用小盆盛水以收暑熱切不宜点蚊烟

○一痘後不宜即與荳腐魚腥肥肉食之以泄脾氣及後致病

○一痘瘡出不透腹痛其或黑陷者用蟬脫十五枚去翅足洗淨微火炙為末每服一錢滾湯調下酒亦可其腹即不痛而透出乳母亦服之

○一山查紅色者取肉為末湯調下其痘立透

○一陷入不起其色黑氣欲絶用穿山甲洗淨炒令黃脆為末每半錢紫蘇煎湯并加酒調服

○一倒陷黑色用人中白火煆為末水調三錢服之年大倍加

○一初起光壯忽然光陷心煩燥急氣喘妄語如見鬼神用人牙齒以酒濕紙包煆為末酒下

○一神仚透慣湯　痘發不起

紅曲（酒房中紫色者南貨店有之三錢）　紅花（一錢）　人参（一錢）

穿山甲（炮二錢）　蟬脫（一錢）　黄芪（一錢五分）　白术（土炒一錢）

當歸頭（七分）　甘草（五分）　肉桂（三分）

水一鍾薑棗各二枚大米一撮煎服

○一發痘時作瀉

人參（一錢）　白术（土炒一錢半）　乾山藥（炒一錢）　蓮肉（去心一錢）

茯苓（一錢）　砂仁（八分）　藿香葉（八分）　木香（三分）

肉桂（五分）　蒼术（三分去皮）　肉豆蔻（麪包煨去油一錢）

訶子肉（三分）　為末清飯湯調服

○一出痘虛弱不能發齊急服人參膏

用上等人參五錢剉片重湯文武火煎膏不拘時日夜服之一日夜服一二兩參為妙以多為勝

○一痘不起

用白老雄鷄冠上血白酒漿熱調服之

○一痘瘡不能脫靨每用乳香薰焼之此味能斂瘡口善治穢氣棗子亦可

○一痘經月不能脫痂眼亦不能開此積熱在內宜用鼠粘子觧毒湯治之立瘥

鼠粘子（炒研）　當歸　生地　芍藥（酒炒）

白术　防風　荊芥　甘草

黃連　升麻　黃芩　木通

紅花　小柴胡

水一鍾燈心煎服大人倍加

○一痘瘡入眼或病後生障翳用蟬蛻洗淨白菊花各等分為散每二錢入蜜一匙水一鍾食遠服之一日兩服

○又方兎子糞焙乾或末或丸茶清下

○又痘入眼痛楚恐傷眼睛用浮萍陰乾為末每服三錢隨兒大小以羯羊肝半箇用竹刀切碎搗爛和水取汁調食後服不甚者一錢已生傷目者十服方瘥

○一出痘後身体肢節上生瘡或生蝕瘡膿水不乾用蚕繭入白礬末塡滿炭火焼灰研末乾搽若不早治則潰筋骨以致難治

○一痘後生瘡

枯礬　輕粉　雞内金　蛇床子末

非丹　硫黃　雄黃　栢末

白螺螄灰　右研末和勻桐油調搽

○一痘後口中生瘡用咽喉科中氷片散吹之或日久腐爛臭氣此散中加人中白煆銅青枯礬麝香

○一出痘崩裂泄氣已為危矣用綿紙攤藥麵糊貼之內服獨參湯三日之內色紅而漿足平安者多矣

踈痘丹

冬月取活兔殺血大磁盤內陰乾刮下一兩雄黃二錢硃砂三錢同研細末用白雄雞冠上血和前藥丸如細綠豆大待小兒發熱時與服六七丸則出痘稀矣用白酒漿和砂糖湯下擇吉日修合

又方

狗蠅（七枚大身上能飛者夏月採冬月藏於耳中以綿取之焙乾為末酒調）

此方乃括蒼陳氏一孫三歲出痘發熱七日而兒忽倒靨色黑唇口氷冷諸醫不能治危迫之際有一士人告云有藥可起因以此調服之移時即紅潤如常甚祕其方久乃得之

又方

蛇蛻（一條洗淨焙乾）　天花粉（各等分）

右作細末以羊肝破開入藥在內麻布縛定用米泔煮熟切片食之凡痘後餘毒上攻目成內障不辨人物者食此旬日無不愈

又方

未出天花時三四歲者每月初一初二初三或十五十

六十七日用稿苗上青蟲晒乾末一撮辰砂四五分三日吃七八九歲用辰砂一錢餘倍之連服三日此痘坱

八月十五日對月剪葫蘆絲藤煎湯洗止可夫婦二人餘不見洗

踈痘散　身體發熱時吃

辰砂（一錢）　絲瓜蒂（三寸七枚）　明殭蠶（七條去頭足酒炒）

蝦殼（七枚去頭足）　右為末砂糖白酒漿調服

發痘奇方

用蛇蛻一條燒灰存性將白鴿血調和白酒漿調丁郎

發起

### 神功消毒保嬰丹

纏豆藤（一兩在秋其藤八月間收取毛豆梗纏繞細紅絲者是陰乾此藥為末秘花此藥）　黑豆（三十粒）

赤豆（七十粒）　山查　生地　辰砂

牛旁子（各一兩炒）　新升麻　連翹（各錢五分）　防風

荊芥　獨活　甘草　當歸（酒洗）

赤芍藥　黃連　桔梗（各五錢）　絲瓜（一條煆灰）

右各為極細末砂糖拌勻李核大每一丸煎甘草湯化

下其前藥預辦完每遇春分秋分正月十五七月十五

日修合勿令穢忌云云向太陽祝藥曰神仙真藥修合

自然嬰兒吞服天地齊年吾奉太上老君急急律令敕

七遍

### 踈痘鷄子方

冬月養童子雌鷄於靜室中飼以米穀不令食毒穢虫

等物守其生卵記取次第自一至七完足以稀網袋盛

第一卵投糞厠中（厠中不可有六畜糞）次日（仍投第二卵餘次第如之至第八日則第）

（一卵七晝夜足矣取埋土中一晝夜去穢氣次日煮熟空心與食乃祗起第二卵如前去穢煮食餘漸次如之）

右鷄子每年冬月與食七枚可使痘瘡（輕者不發重者悍快就之有驗）

---

### 萬金不換丹

辰砂（一兩）　防風　荊芥　蒼朮

黃芩（各一兩）

先將辰砂布包之懸於砂罐內次將四味入罐內用河

水注滿煮一晝夜止將辰砂晒乾研末酒下蜜調亦妙

每服五分服至二三錢正能保一生不出痘雖出不多

若有出痘不好者服此就退

### 四味萬兩金丹

用人貓豬犬屎虔燒少許微將蜜水調百者救生無一死

萬兩黃金也不消四味為末凡小兒出痘調服甚妙

小兒痘疹危急起死回生

嬰兒女三四月者屍骨燒末一錢酒調嚥下如草木回

春速效

### 稀痘散

五月五日取屎坑內蛆虫洗淨絹袋盛在風處待乾出

痘時取下為末砂糖調服

## 痘始形圖

陰始交陽

○ 血初載毒犯陽純陰之象

血初定位

初出一點血純陰之象也血初載毒犯陽循敍而出未變陽制故也吉凶悔吝於此而生焉

## 痘交會圖

陰中之陽

○ 氣至微陽始形之象

○ 氣滿微陰漸虧之象

陽中之陰

二變微陽之象也乃陽始制陰血盛之勢未降故也由是氣血交會之機於此而出焉

三變微陰之象也乃陰交陽制氣盛之勢獨尊故也由是氣血尊畀之道正則邪毒自除一有不得而凶咎扵此定矣

## 痘成功圖

氣血功收

○ 純陽毒化

乾坤道濟

功成毒化純陰之象也乃氣制血毒兩除之故由是生靈保合斯太極弥綸之道昭矣

### ○氣血交會圖說

夫人身一太極耳至氣血傳變陰陽交會之理無非一太極中來也故曰人生與天地一般大且人身所受之火毒中於有形之先發於有生之後曰痘者以其形而名之也發必假氣血而後解予嘗究其氣血形色之象宜乎有太極之道存焉故痘之發也有則形於中者曰氣周於外者曰血（血中白處曰氣外黑處曰血以一而為例則百千皆類）即陰陽動靜互為其根之理（陽動陰靜陰動陽靜之義此參太極之理以正痘之形象也）一皆

氣血交會制化其毒而形之也非氣之尊血之附則不能成其形也○陰始交陽初出一點血氣未至陰難交陽未得會之象也血能載毒包匕謂裹血包然系其體迹也○陽始會陰氣會血也氣能定位制下謂氣制血毒也其用行也是以陽剛於上氣居中而制血陰柔於下血團而附氣各就順其性也而從順之理得矣總結上文之意言陰陽性情守而不失各得其正也二變而爲○陰中之陽陰血成而陽氣初長血附於外體氣之道致言血性柔而附氣則不失於順之義三變而為○

陽中之陰陽氣盈而陰血漸虧氣尊於內成血之功效言性氣剛而拘血化毒則不失於稚之義氣和血就此極言氣血交會之道得其正萬殊皆貫同乎一春萃一而言則物物皆太極物物皆陰陽也陽施陰化非陽則不能以發其毒非陰則不能以化其毒血收氣足毒既發於外則人身之氣血若干矣○痘始成形痘之發千態萬狀總歸於痘之形色斯為氣血交會制毒之妙如道其形色災命莫不由此而終焉而火毒斯解厥功成焉足以見陰陽交會制毒得其全道矣斯毒也雖則巨細稀密之有殊而百十形狀皆類乎一性也痘之性能員如火之炎上水之潤下萬殊一本之義此言天地自然之理也惟其變態不一情也毒出陷塌紫褐黑白之形不類乎豆者此皆陰陽氣血虧盈之使然也性出於天地情出於陰陽情可化性豈人力為哉此申言毒受之理雖周流四体百脈關闢有準立有形雖實氣血之所為人可得而修為如理有偏倚而欲斡旋雖聖人莫能焉然陰陽者氣血之司命也交會尅勝之理有變毒勢反盛者可解耶擬治若陰始交陽之際陽交陰會之

初憂虞之象未可加治恐其藥性紊亂氣血交會之機若氣始定位血初歸附吉凶得失由此生焉苟失其正則宜治矣不然恐其氣血虧弱毒必內攻業是者當加調變氣尊血附乾坤道濟足以見陰陽治化收其全功矣竊觀造化生生非太極中求之世可得而知此誠百世不易之定法也與

## ○氣血虧盈圖說一

天道虧盈地道變盈此自然之理也人之氣血亦然故惟痘之為証不可使氣血之有虧盈也若氣體天而常

觀乎上血體地而常親乎下苟有生血之功而無益氣之理是故氣不可虧虧則陽會不及而痘之閉濇之形不成血不可盈盈則陰乘陽位而痘之倒陷之禍立至如此者則交會不足外剝內攻之大患不復有可拯矣此雖岐黃尚何益之有哉予因立虧盈圖以明其治道當以急務為先必須益氣之虧引血而入血入氣盈盈則能制血之有餘庶可以保合太和告諸究者使知氣血之不可庸治而謹之以隆斯道焉

# 氣血虧盈圖

榮衛假黑白之形



陰陽逆乾坤之道

## ○氣血虧盈圖說二

氣血者二五之精也始於有形付受之先以至於有父長養之後五內百骸周流不息如日月之經天潮汐之運海同此樞機運行無停而不少緩也故人之真元賴此而滋培一有凝而不及則諸証生焉信乎痘毒中乎陰陽之偏氣氣血自得陰陽之正理二者雖混於一途同其原而不同其道同其情而不同其性情性善惡名有攸分故不得不出人之生靈亦非氣血之能又烏足以保全哉且氣血之有虧盈果何而如是耶夫血載毒奔流諸腑上犯氣位是陰乘陽也陰血盈則陽氣虧虧則交會不及而陷於陰也且陰有乘陽之能而無陷陽之理故氣愈虧而血愈盈矣何則氣血自然各失其政則無以當其毒勢誠所謂剝床以膚者也譬諸君子小人之不相得猶氷炭之不可同器而處雖則聖人大化行於天下亦無如之何也已是故虧盈之理不可不明非扶陽抑陰之能豈足以悍其大患哉然治氣血之要猶大禹治水相山川之形勢度土地之高深一鑿一濬地平天成斯為順利業是者雖小道亦有可觀者焉務

須深究其旨而行之庶可以全中和之道詎曰不能

○氣血交會不足圖說一

夫一身之氣血有限慨所中之毒火無涯以有限而欲濟無涯則人之微命其能保乎苟非氣之制血血必泛濫不附毒斯下陷內攻之患立至矣雖天地聖人至仁之心不能以大造化而斡旋之況其下者可不謹耶予嘗深究其旨必當加治於治陷之先為要開明圖式俾其知乎我者用心於補益助氣拘血成漿則何陷之有哉

# 氣血交會不足圖

瘡變百千形狀

醫通乙半功夫



血瘡者氣不至元氣損也五日前則血載毒入泡燋臟腑為內攻如頭果之腐仁矣也無可治之理陷瘡者氣至不滿生氣絕矣不治七日後則血悖不附毒化槳為外剝如佳木之無屬矣但氣至不蕭血附有力補翊得人雖功虧一實於九仍亦可以修為攻後繁五陷之設於下度告學者當潛心於斯則道自見矣

---

○氣血交會不足圖說二

陽始會陰氣至血附根窠既立而中陷者為因元氣不足則不能續其後來而然也蓋陰血雖有附氣之功而陽氣使無制毒之力以致陷而不滿生生之道絕矣且陷有五一曰黑陷二曰血陷三曰紫陷四曰白陷五曰灰陷黑陷者為初出少稀後出加密陽會陰之次陽氣弱不能續其初出血無氣養故枯萎而黑陷也血陷者血盛於氣氣弱不能拘領其毒久則變而為紫陷也紫陷者為氣愈虛血無氣畜毒之盛負載不能前行血亦

為之離去也白陷者為氣不足其血亦弱久則變而為灰陷也灰陷者氣血衰敗而不榮也此等之陷一皆氣之虧損使然如折奇花少頃生氣既絕則憔悴不榮矣噫毒縱狠戾肆虐有生之正氣非藥之靈慧神功孰能裨補乾坤之大奈何灰紫二陷俱從自吉向凶傳變而來則難於施治矣於乎毒設陷并氣陷危機而又非造化人力之可及也

○保元濟會圖說一

惟人之榮衛根乎元氣元氣固則榮衛行脉之內外陰

陽相濟周流不息而無間斷矣蓋瘡毒之爲患非參之補品靈性奚足以平氣血而收治道也是故人參爲君守中修德由是元氣得以滋養甘草爲骨鯁之臣參贊造化由是陰陽得以和平黃芪爲藩維之臣承宣濟時由是衛氣得以補益桂爲使令行中外通運四維由是榮血得以開導然此方有君臣協恭上下相濟之道故總而名之曰保元惠及生靈建大功樂大忠誠王道之大豈虛語哉

# 保元濟會圖

君臣濟會體天道不息之機



氣血復元全藥性回天之力

## 〇保元濟會圖說二

夫元氣榮衛者即太極陰陽之根本也蓋榮行脈中衛行脈外內外回護互相滋養得天地生生之道而無替也且瘡毒之火實陰陽相亢而中與天之沴氣同其軌轍莫不因時感動而發猶鏡之取火鏡中之火雖在焉使無日之晶光相射則何能發也是故治瘡之要非得陰陽傳變盈虧之理則不能加治於氣血然氣在內外不及則血載毒出爲外剥氣在外內不續則血載毒入爲內攻即陽道虛陰往從之陰道虛則陽往從之之義

非保元湯善補氣血之過則不能施其功妙故用人參以固元內實則能續其衛氣之不足黃芪以補表外實則能益其元氣於有餘而又以桂制其血血在內引而出之則氣從內入血在外引而入之則氣從外出而參芪非桂之逐血引導則不能獨樹其功桂亦非甘草平和氣血則不能緒其條理雖則從其土地所宜以他藥攻之終不能出乎四品君臣之要劑予據此方立此圖開明治法將欲利平天下國家俾其從吾道者不費驪珠之索而有得焉

## ○榮衛相生圖序

榮衛者氣血之德也氣血者痘毒之廬舍也痘毒者氣血之賊也榮衛德盛則廬舍全榮衛德衰則廬舍剝盖人身榮衛虧盈之理攸繫氣血之盛衰則痘有滿陷即虧盈感應之使然也豈在形軀肥瘠毒出多寡可比哉然痘有稀稠不均亦出於氣血不調耳又非形軀宜與不宜出之也歟彼其氣血充溢則榮衛自然長養以施其政痘毒為賊詎敢剝其廬而為巢耶若其氣血德衰固不得不加滋養以順榮衛之情榮衛受益堅固內外力

戢其賊而有餘矣觀下圖式非濟會中來詎可得也夫人身元氣得太極之理而命以榮衛行運造化之功也保元湯亦得太極之理而命以氣味補益榮衛不足以成造化之功也是皆天地成就生人之大道存於中見於理昭然於停毒間以待人之知識非深粹玄默又焉得而發其機矣尚冀善醫者質焉斯為得道也

---

## 榮衛相生圖

醫明榮衛之相生



斯圖也氣出則荣血行於脉中血入則衛氣行於脉外氣順血隨運行百脉如環無端此保元濟會成功之妙也

道闡君臣之濟會

○荣衛相生圖解

血生之謂荣氣守之謂衛荣性好靜衛性好動動則情隨（言陰血之性隨氣之情則讚氣之道致也）靜則情順（言陽氣之性順血之情則成血之功効也）順則血生隨則氣守血生則內固氣守則外旺故血向心生氣從肺主血荣氣衛各盡相生之道人身荣衛即天地之乾坤乾坤者施天地之德也荣衛者施氣血之德也由是尊卑有位動靜有常合造化於一機而無差矣譬之荣衛者氣血之先鋒也痘毒者氣血之敵人也知者必加滋

養以攻其賊誠萬全之策也及窺其內交會之得失必應於外之形色善惡則瘡有枯榮變易信可驗也蓋瘡出皮膚間稀處必榮密處必枯亦滋養及與不及之應耳惟人受氣血於身是處有之猶天有風焉地有水焉二者於天地間無往而不在也夫開落萬物賴乎風滋養萬物賴乎水如天失應於風則開落不成地失應於水則滋養不及榮衛應瘡正在此耶有若瘡發光澤必先應於榮衛盛者枯陷必先應於榮衛弱者信乎榮衛即瘡之著龜也苟有不應乎形色正者不得不加治氣

血以待充溢然後榮血得以隨氣之情培根於內衛氣得以順血之情保障於外血入氣出交會順德瘡必宛應若桴鼓焉非保元湯何以得而濟其功美以應其滋養開落乎是考功効力在守則氣氣守則能拘血附位於是瘡形善而變化應矣否則榮衛相背交會逆德血不能載則塌氣不能拘則陷一有乖離抗若矛盾則瘡毒惡形亦必感於中而應於外也彼氣血之不守猶風水之泮渙理之自然其可疑也哉於乎大哉保元奏功之玄微而默效順太極之大道亦不可得而言也

## ○順逆險三法圖說一

凡治瘡疵非有鈞衡氣血之能者不得任其職也何哉人在氣交之中未免有內傷外感以致百病生焉唯瘡之出則異於是自

帝王至於士庶無不由此而一患也且夫毒之為害最為惡極必當察其氣運與衰以鈞衡之法而施治於氣血乃克有濟苟或氣血交會不足半功之能奚足以制其毒必須藥之半功協助氣血收其全功斯為至矣故立順逆險三法以為保元湯治瘡之鈞衡永為定例使為

醫者之有則焉生靈得失吉凶悔吝攸繫乎其間噫非三法之鈞衡則何以濟其氣血之虧盈上以報答

帝王下以惠及士庶及觀古人作醫案於藥者則書之乃出於一時之權耳繼其攄之於無知者不知其幾多誑可為後人之治例哉愚謂以權為例不若以例為法權出於變例出於恒常可法其常以為後世之例則權在其中矣

# 順逆險三法之圖

立三法治痘之科



成百世醫宗之本

○順逆險三法圖說二

夫痘有順逆險三者古無有也愚意妄立之名何則順者吉之象也逆者凶之象也險者悔吝之象也治痘而執此三者於以觀形色驗吉凶將無施而不當矣蓋痘之一証始於見影終於結痂凡十四日之間而已苟非三者察形色之善惡定性命之吉凶尚何以決生死人將治所不當治不治所當治妄投湯劑亂施死方貿貿焉不知所之被其枉死者多矣此三者之法所以不得不立也是故吉不必治治則反凶凶不勞治治則何益至加險者則宜治矣治之則可以轉危就安此古必然之理乎視痘三十年見其順者多逆者少惟險者介乎其間要之氣血有厚薄之不一也夫氣血盛斯毒易解氣血損則毒難愈惟氣血少弱者雖毒不能頓解然生意未始不因乎其中故必加以補益扶持之功治所當治順所當順斯其悔吝無不平矣予嘗苦心究討定立法式未足指迷於已往或可援溺乎將來觀者幸不以予言為僭妄而少加繹之之功庶乎此生精神不至虛用也

○痘出形證日期順逆險治例圖

醫家之法有望聞問切四者所以審其證之由也惟痘之為谷利乎觀其形色無深淺始終悉於此乎備矣且痘出乎淫火淫火者人身之精華妄動之異名也以氣血而中以氣血而守以氣血而發以氣血而解信非氣血不能始終也蓋觀氣血則吉凶傳變之證可驗治氣血則撥亂反正之道可收治者要之留心於其間則痘無難視矣苟能察其理而行之則不失其本末根據如有他法吾所不知也今以初出至痂落日期形證吉凶之

叅条以順逆險三法為則以明可治不可治之証盡為圖式凡圈內白者氣也圈外黒者血也圈內之圈者謂也圈外黒散者血不附也圈內黒圈者血乾也以次開列於後必備三法之階梯而圖下復立著意定形辨色証有體用之分投劑取功治有折衷之妙其體用之應變折衷之効順而有數存焉學者又不可不留心於此振吾道於生生之間亦足以近乎仁之用矣

# 驗面部順逆險之圖



# 氣尊血分者生

# 始出圖

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ● | ▨ | ⁙ |
| 初出血點<br>淡紅潤色 | 形如蚕種<br>紫黒乾枯 | 圓暈成形<br>乾紅少潤 |

三日初出之象如粟於口鼻腮耳作毒之間先發三兩點淡紅潤色者順之兆也順者不治自愈為氣得其正血得其行其毒不得妄行畢其虛也○於天庭司空太陽印堂之處先發者逆之兆也逆者不治為氣滯血滯致毒妄叅陽位無以當其勢也○鮮稠而紅潤澤成箇（精此險之際）（者[illegible]雖犯上其氣血未病受[illegible]之象未可加治使其氣血）（[illegible]）

# 毒叅陽位者死

# 陰陽得道而形圓

# 圓混圖

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ○ | ✹ | ⊙ |
| 氣溢血附<br>飽滿光絜 | 氣失血散<br>枯乾不栄 | 頂滿不滿<br>光紫有神 |

二三日根窠圓混氣之冲滿也氣之冲滿血必歸附為順順者不治自愈為氣血得其道也根窠無暈氣離血散為逆也者氣血交會不足致毒乘機而犯內也根窠雖圓而頂陷者血亦難聚為險險為氣弱不能領袖其血（[illegible]）

# 氣血成功而毒化

### 形圓而體王八象

### 色潤而現桂精華

**形色圖**

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ○ | ✿ | ⊙ |
| 氣滿血榮<br>鮮明光澤 | 綿密加泡<br>黑紫乾紅 | 根窠雖起<br>色慘不明 |

四五日觀痘勢之形色則知氣血之非虧受毒之淺深此治法之大要也其形尖圓光澤大小不一等氣和血乾順也順者自愈為氣歸血附各得其道而毒自化矣〇其形綿密如蚕種黑陷乾紅紫泡者逆也逆者不治為氣血相離縱毒內攻也〇其形根窠雖起色不光潔生意猶在險也險而（治為氣蒸血盛勢拔毒托上熱得宜餘）（分明用保元湯加芍藥桂米助衛和榮斯為禦捍之妙也）

### 氣血竝隆能制毒

### 盈虧雙治見神功

**起發圖**

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ○ | ⁂ | 回 |
| 氣會血附<br>紅活鮮明 | 氣背血離<br>乾枯綿密 | 氣弱血榮<br>色昏紅紫 |

五六日氣盛血榮於內則發揚於外為順順者自愈為氣血豐厚毒受制也氣雖旺而血不歸附其色灰陷或紫陷或發水泡痒塌為逆逆者不治為氣弱血衰致毒下陷而外剝也氣雖旺血雖歸附不厚其色光白不榮為險險者易治為氣盈血弱不及歸附用保元湯加木香歸芎助血歸附氣血以全中和之道也

---

### 氣血勝淫邪之毒

### 乾坤順造化之情

**漿行圖**

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ○ | ⊙ | ◎ |
| 氣化漿行<br>光潔飽滿 | 漿毒不行<br>神去色枯 | 氣血少足<br>光潤有神 |

五六日氣盈血附其毒自化化則成漿順也順者不治自愈為氣血得中其毒自解也〇氣陷血衰其毒內伏伏則不成漿逆也逆者不治為氣血相離不能制毒而外剝也〇氣交不旺血雖歸附不能成漿險也險者雖急治之為氣血少衰不能制作急投保元湯加桂米助其成漿而收濟患之偉功斯為治矣

### 豆漸收而毒溢

### 氣已滿而神凝

**漿足圖**

| 順 | 逆 | 險 |
|---|---|---|
| ○ | ✿ | ◎ |
| 氣足血微<br>神全光潤 | 氣陷不滿<br>色枯乾紫 | 氣弱血附<br>光潤不枯 |

七八日氣旺血附其毒化漿順也順者不煩治而自愈為氣旺拘血化毒之故也〇氣血乖離其毒不化漿逆也逆則難治為氣血不及不能振作以制其毒以發癱發疔者可生肉剝外傷者必死〇其氣血必綫毒雖化漿而不滿險也險則可治為氣血有凝不能大振以保元湯加桂米發湯助漿斯可以保全生命矣

血賴天和而保命

# 漿老圖

| 險 | 逆 | 順 |
|---|---|---|
| ◎ | ✿ | ⊙ |

氣壯血化　毒始去身　氣陷不滿　毒成外剥　氣平少中　紅黃色潤

入九日漿足氣血之功成矣氣血功成生命定矣如無他証順而也已○漿不足者氣血盡矣氣血盡而大命臨之逆矣○漿不沖滿血附線紅氣弱而險也以保元湯姜米以助其氣而駕其血斯漿成矣於此可見施治者之妙道也

氣刑盡化而成功

邪正明君臣道濟

# 血盡圖

| 險 | 逆 | 順 |
|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◙ |

氣平血收　光色始斂　氣弱血凝　枯朽剥極　氣少冲滿　血亦有力

十一二日血盡毒解氣調漿足此生生自然之理也為順○或血淡而漿薄或血凝而漿滯以見氣虧而毒不解為逆○血盡漿足濕潤不斂者内虛也為險以保元湯加參术助其收斂結痂也

真元固氣血成功

---

君道成而臣力致

# 結痂圖

| 險 | 逆 | 順 |
|---|---|---|
| ⊙ | ◎ | ◉ |

氣血歸本　神化功全　氣血不全　功虧一簣　氣血效功　神化大過

十三四日氣血歸本毒既殄滅漿老結痂順也○毒未殄形諸邪症作雖云結痂此其逆也○毒雖盡解漿老結痂之際或有雜症相仍以保元湯隨症加減不可峻用寒凉大熱之劑恐致内損之患故也

神化全而毒勢平

蛻盡客感淫邪之火

# 還元圖

| 險 | 逆 | 順 |
|---|---|---|
| ⊙ | ◎ | ✿ |

氣血無恙　痂落瘢明　氣血兩虧　天年盡矣　氣血功收　神化少全

十四五六日氣血功收痂落而無他症順之兆也○痂未易落寒戰咬牙譫語狂煩疔腫作者無可生之路逆之兆也○痂落潮熱唇紅口渴不食者險之勢也以四君子湯加陳皮山查黄連渴甚加參苓白术散不解以大連翹飲去黄芩主之証去之後多有内損或餘毒未解此則尤為難治也

補盡太和造化之功

○夫痘之體氣血之所形也陰交於肇形之前陽會於有象之後而成一有不得其形變常毒反害正矣氣血之變非毒之能變也人莫究顛因立順逆險圖式為則以驗氣血制毒吉凶得失之象焉是故順變為險氣失正矣險變為逆非勝正矣順從險變善補過矣順之性不失是氣血之功氣血雖變不離道体吉之象也順之情失氣血道微則變而為險險者悔吝之象也險不加治氣血氷釋則變而為逆逆者凶之象也由是順而正之存乎道逆而失之存乎斷險而得之存乎治故治痘之要見順勿藥遇逆莫治逢險急治治險至順即止此不易之法也慨世之庸醫但知求其方而不求其理誠謂買匱還珠何益於治

○氣血偏勝受傷圖

痘之初發陰陽交會不得其一則諸惡症生矣蓋氣血不能勝毒甚至滅亡得其生者百有一焉予嘗闊其痘之惡症七日前後為陷為泡為臃為疔為痒塌為倒陷如此者有因毒勝而不治有因毒勝而自痊難於知識療理惟其陽毒內潰媒孽於表裡受傷之初又非氣血能勝其所勝而救其危也故另立治法圖式開列於後尚冀治是者當加慎密深為我而察之

氣弱毒滯而成形

## 頂陷圖



七日前後頂陷者氣不足也氣不足不能收血而毒不能成漿蓋氣不勝毒故也七日前後見此宜治以保元湯加芎桂糯米溫胃助氣又以水楊湯沐洗之血不然加歸至十一二日漿足或有之如血氣光澤有起勢者亦不可過於治也深恐滿而過盛反虛百骸或血如死灰漿不滿足其血雖附不然而然有內証者生命不可保矣

血附漿行而順道

九仞山成功虧一簣

## 倒陷圖

兩儀道否治賴孤陽



內外俱虛之象氣血勢離故滿而復陷也

七日前後倒陷者氣血衰也七日後根窠發足漿行之次因瀉氣陷毒即隨氣血而反陷也如血不走歸附鮮明護衛之力猶在治必有可拯之理其血不顧亦不挾毒內攻禍復起於蕭牆豈可救乎急必保元湯加苓术肉荳蔻渴以參苓白术散主之又有峻用發泄毒劑致傷元氣而氣血隨毒氣反陷伏者有之用一（字保元湯者豈有促哉謂　綿九調治者不可輕視也）

毒聚媒孽之初

## 陽毒圖

功收裨補之後



外實內虛陽之象也故性外旺

七日前陽毒者凡瘡也或瘡未瘥及初結癥處內分必虛毒受氣血相擊周流百脉必掩虛處而出也蓋陽瘡陰毒混雜一黨反勝諸毒而名之也其毒濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也其毒枯燥乾紅氣血俱弱毒與諸瘡相抗而俱不成漿也治法同彼頂陷加枯轉潤紅变白其漿自溢於此可見治者之功効也

毒聚於已發之未發

## 臃毒圖

功收於欲危之未危



七日後發癰者陽毒也癰之毒併聚一處而假其名也蓋氣血不能拘收乘載其毒使氣弱血盛陽分空虛血則載毒傳注四肢合處合者海也曲池委中是也毒不成漿七日前後發者宜縱之發其毒併從此而出也若治其毒必從豆而散內攻臟腑必無可生之理如瘡毒已解血氣豈盛宜解散其餘毒以保元湯加解毒湯主之為妙

氣有全道之功

## 疔毒圖

毒無立身之地



中實外虛陰之象也故性犯內

九日後發疔疔者釘也毒叅陽位聚而自成窠穴也盖氣位弱而血分不容其毒性不能自散故聚結而成其形如氣周血盛則毒受制歸附豈有是耶結於四肢或小或大不近臟腑雖抵穿觔骨者易治結於頭面腹背逼近於內者其勢必攻穿臟腑難治如不穿者急治治不可加燄以保元湯加牛旁子當歸荊芥助氣逐毒待毒溢滿自釋也

起風寒不測之端

## 內潰圖



絕天地有生之路

（此目前內潰者肖爛也蓋因風寒所中腠理固密陰陽二分壅塞不通其毒內攻氣隘不能拘血血又不能載毒藏府之間毒入泡熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也如此危害生靈何其慘毒識者知瘡毒未出之時或有風寒阻隔氣粗熱盛身體戰動腹肚急痛謹防此患以和解湯升麻湯逐散寒邪開泄腠理縱毒而出豈有是証者哉）

### 氣血順逆篇

夫血向陰生氣從陽出此人身自然之定理欲向精生毒從火中此人身氣血之外物瘡向血生形從氣見此人身外物之虛位火客於人身之中寂然不動感而必通故瘡之形一出於氣血其惡形亦出於氣血謂其為症不善以毒名之實陰陽相抗氣血傳变而成者蓋陰盛於上陽微於下力不能上濟而施其化則毒從虛入彼外物不能終於虛位由是五陷從虧順变險矣倒陷從虛順變險矣陽毒從陰陰變逆矣陰毒從悖險变順矣六毒從凶逆变順矣內潰從順逆亦逆矣是故險從順変逆從險变理之自然其險变為順氣之功也逆变為順血之功也譬之君臣失政夷狄亂華夷狄不能壞天下而君臣壞之信乎氣血失政致[illegible]生傷明矣

### ○保元湯加減總要

夫瘡泄玄中消息醫宗心上工夫非刻猴雕刻之難豈象罔尋獲之易彌縫造化起萬命於迷途窺竊刀圭收全功於反掌是以人參益內甘草和中實表宜用黃芪助陽須憑官桂前三味得三才之道體後一味扶一命之顛危川芎功清陽而調血糯米溫中內以壯神豈藁非泄痢而莫投木香必積滯而可下當歸能活動其血對証方加芍藥能收斂其陰合宜則用胃不實始議白术茯苓瀉止即止心煩熱急與麥門五味渴除即除陳皮解熱淡黃連退虛熱毒疑滯而不起紫草當行氣鬱悶而不通山查負欲加之得當君子登堂用之不應小人入室寧可緩治於尺寸不可縱步於毫釐毒雖繁天横之機世可棄保元之劑屢試屢驗能收百中之功原古原凶獨補一方之力褒前人之旨闡當世之幽坐悟

行思火聲廿年小兒即生起死敢當諸氏大成匪我能之實天假也

### 保元湯

人參（二錢）　黃芪（三錢）　甘草（一錢）

右用水一鍾半生薑一片煎至五分不拘時服

○論曰

保元湯即東垣所製黃芪湯見蘭室秘藏小兒方夫是湯之劑不越人參黃芪甘草而已然此藥大抵性味甘温專補中氣而能瀉火故瘀火非此不去也三味之劑

借以治痘以人參為君黃芪為臣甘草為佐上下相濟治雖異而道則同嗚呼製方之義何其妙歟予嘗討其藥性之功用黃芪能固表人參能固內甘草能解毒究其痘之宜治必須此三味之神品偶用他方而更密察其味善惡之可否裁削而成暗合前人之旨非為陋竊東垣之製也今用以治痘令其內固外護扶陽助氣則氣於焉而生血於焉而附氣血充恙斯一身之真元可以保合而洸壞乱矣區區痘毒藉此領載則何難出之有哉惟其是藥有回生起死之功有轉危就安之力予

故借改為保元湯也知我者諒無罪焉或元氣血與毒本同一途何專理氣而不理血是亦一偏之説也故惟痘之一症與他症不同痘出陰分先動其血惟血本盛故能載毒使血一弱則何能有為而毒不能以自出此理雖然殊不知氣者又所以領載其血也若氣少餒則血無憑藉彼毒又將何從而載行氣分哉故治痘當先治氣此不易之常法也又曰血弱不能載毒奈何曰毒辟則貨也血辟則船也貨若船敗何以能負載耶又不觀孕婦出痘熱盛毒壅其胎必落落則血去氣陷毒復

歸內其人寧進其生歟或曰白术茯苓亦多益氣世多用之今不加入何也曰苓术雖益氣而性皆利燥淡泄通利水道之劑苟或用之則津液隨水而下其濕潤生息之氣不行於上辟諸地氣不蒸天氣不降尚何有天澤以救其物哉由是三焦為之枯燥氣脉為之壅塞漿毒為之不行毒遺皮肉間外剝之患其可復救乎或曰桂辛物也痘已出熱之極矣今更用此誠恐重實之症生焉曰是知桂雖辛而不知辛能發散且如毒壅於皮肉間與脉絡之處苟非此劑推動其毒而毒能自散耶

況此藥又能扶陽益氣充達周體翊助參芪之力而成偉功也夫我前謂治痘當固元氣者何也辟之用兵惟求主將無恙而已然後以戈甲粮草濟其武功若主將不能勝任則其本先已搖矣雖有戈甲粮草蟻聚如山將安施耶昔武侯未死而敵國不敢言戰武侯已死而敵國卽已據營豈非尤可信耶予故曰保元湯者治痘之要劑用兵之要道也予慨淺識陋見但以此升究理之心頗得試驗故敢捨立是書少濟窮鄉僻壤行道不及之處也

## 水楊湯

專治痘出隔頂漿滯不行或為風寒久尅者如初出收歛時俱不宜弃塲破損亦如之

水楊柳（五斤淨洗春冬用枝秋夏用枝葉剉斷用）

右用長流水一大釜入楊枝在內煎六七沸先將三分中一分置浴盆內以手試不甚熱亦不可太溫先服宜用湯藥然後浴洗患者漸漸添湯不可太煖浴洗久許乃以油紙捻燈照之纍纍然有起勢隔處暈暈有絲此漿影也漿不必滿足如不滿又浴如前法若力弱者只浴洗頭面手足可也若不赤鮮不厭其數洗以此法然燈照如無起勢氣血敗則津液枯矣可以輟洗

○論曰

痘毒不行漿乃陰陽二分氣澁血滯腠理閉密精氣雖盛不易疏通所以有是患也須以水楊湯浴洗待其開寒之處暖氣透通發泄和暢鬱蒸氣血斯其漿可易成也洗浴之間燈影之下觀其痘不覺隨手而發功効豈淺淺哉且服藥不過助氣血以成功耳然藥力差緩治難頓爾遊於手足面目若服藥後而更以此湯沃之其

藥氣藉此升提可不先斡萬竅功効如此烏得為風寒所阻而致遂成大患耶且洗之法必添湯久沃使其暖透骨肉通理內外斯毒氣隨暖氣而發行漿貫滿豈不如反掌也耶彼風寒尚可得而中乎予曾行醫村落民家見一老嫗抱患痘小兒以此湯沃之其痘頂陷初未漿足至次日又往觀之則漿待已滿矣予因扣之彼已忘其所來至家數里轉行轉悟其理遂得殆卽甫鍾一動而陳蟄啓戶東風一吹而堅冰解腹始雖二物竟則同一春也及觀群書皆無此法其後以是行之百發百

中遂著為外治之法傳告於世少補急救之一助云治者愼勿易而廢之誠可謂有燮理調和之妙道也

四味升麻湯

升麻　白芍藥　甘草（各一錢）　葛根（壹錢五分）

右㕮咀每服叁錢水一盞煎六分熱服

十一味木香散

木香　官桂　丁香　新蘿參

陳皮（去白）　大腹皮　訶子肉　前胡

半夏（湯泡薑汁製）　甘草（炙）　赤茯苓（去皮各等分）

右件㕮咀每服三錢生薑一小片煎六分稍熱服量兒大小加減服之

十二味異功散

木香　當歸　人參　丁香

陳皮（去白）　肉豆蔻（麵裹煨）　厚朴（去皮薑汁製已上各二錢五分）

官桂　白朮　白茯苓（各二錢）

半夏（湯泡薑汁製）　附子（炮各一錢）

右件㕮咀每服三錢水一大盞半生薑三片肥棗五枚煎七分空心熱服三歲兒作三次服五歲兒作二次服

---

一歲二歲兒作五次服

六味柴胡散

柴胡　甘草（炙）　玄參　人參（各二錢五分）

麥門冬（去心二錢）　龍膽草（一錢二分五厘）

右㕮咀每服三錢水一大盞煎六分稍熱服不拘時候

四味鼠粘子湯

鼠粘子（二兩炒）　甘草（炙）　升麻（各二錢五分）

射干（二錢五分）

右㕮咀每服三錢水一大盞煎六分溫服

三味甘桔湯

桔梗　甘草（炙）　防風（各等分）

右㕮咀用水一大盞煎六分食後服

三味消毒散

牛蒡子（炒二兩）　荊芥穗　甘草（炙各一錢五分）

右㕮咀每服三錢水一大盞煎六分量兒大小與服不宜多

和解湯

升麻　葛根　芍藥　甘草

人參　川芎　羌活　防風

右用水一鍾半生薑三片煎至五分

### 四順清涼飲

大黃　當歸　芍藥　甘草

右用水一鍾煎至五分

### 解毒湯

荊芥　甘草　鼠粘子

右用薑一片水一鍾半煎至五分

### 大連翹飲

連翹　當歸　芍藥　鼠粘子

防風　荊芥　木通　滑石

瞿麥　蟬蛻　梔子　車前子

黃芩　柴胡　甘草

右用水一鍾半薑一片煎至五分

### 參蘇飲

人參　紫蘇　半夏　陳皮

甘草　前胡　桔梗　枳殼

乾葛

右用水一鍾半薑三片煎至五分

### 四君子湯

人參　白朮　茯苓　甘草

右煎法同前

### 生脈散

人參　五味子　麥門冬

右煎湯當茶與服止煩渴

### 參苓白朮散

人參　白朮　茯苓　甘草

藿香　木香　乾葛

右煎法同前

### 朮苓湯

白朮　茯苓　豬苓　澤瀉

右用水一鍾煎至四分不拘時服

### 七味肉豆蔻圓

木香　砂仁（各三錢）白龍骨　訶子肉

肉豆蔻（各五錢）赤石脂　枯白礬（各七錢五分）

右細末糕糊為圓如黍米大一歲兒三十圓三歲兒一

百圓並温米湯送下或用木香煎湯送下

三味谷精散

谷精草（一兩）　生蛤粉（一兩）　生黑豆皮（二錢）

右為細末猜猪肝用竹刀批切片子掺藥在内以草纏定磁器内慢火煮熟食之

敗草散（[illegible]）

屋爛草（乃蓋屋多年爛草如無蓋墻爛亦可）

右草多年經霜雪雨露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述一味不以多少晒乾或焙乾為細末每用乾貼無時若遍身瘡破膿水不絕粘黏衣裳難以坐臥可用二三升攤於蓆上令兒坐卧其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎

白螺散　治痘瘡不收

白螺螄殼（不拘多少古墻上取）

右用去土洗淨火煉紅取出存性為極細末瘡口濕處乾掺為妙

金華散

專治痘症後肥瘡疳瘡疥癬能收水涼肌解毒

---

黃丹　黃栢　黃芪　黃連

大黃　輕粉　麝香

右為極細末瘡濕乾掺燥用臘猪油熬化調搽

生肌散

專治斑蝕不斂并痘後膿血雜滲不收等瘡

地骨皮　黃連（炒）　五倍子　甘草

黃栢

右為細末乾掺瘡上

滅瘢散

治痘瘡纔愈毒氣尚未全散瘡痂雖落其瘢猶黯或凹或凸

韶粉（一兩）　輕粉（一字）

右二味和研煉猪脂油調成膏塗之

四聖丹　治小兒斑疔極有神効

珍珠（三五粒研）　豌豆（四十九粒燒）　頭髮（不拘多少燒灰）

右為細末用胭脂調成膏子先用簪尖撥開疔口將藥點入疔内不拘大小瘡即時变為紅白色無不効者大凡人家小兒出痘瘡若有灰黑頂者十死一生盖因不

識内有斑疔又不曉治法故也今但於瘡灰黑色中認出有瘡大者為疔有黑疔線者為疔又有瘡臭氣者為疔亦有數等此藥活人多矣看依方治之立有神効不可忽也

## 小兒痘毒



此毒俱因瘡疹初作欠發表以致餘毒不散若發於面項胸脇者难生發於四肢者易治初作疼痛便覔腫不紅身不寒只有热此毒未成用人參敗毒散

人參　白朮　茯苓　木通
白芷　白芍　防風　荊芥
黄芪　當歸　川芎　連翹
水二鍾乳母同服　甘草

寒热交作患處紅腫用手按之其热如火用内托散加

人參　黄芪　金銀花　天花粉

其煎圖等藥具方在前

瘡瘍結痂後將死者以楊柳枝煎湯或加紫蘇葉同煎湯洗之用青絹軟者拖乾又用乳香燒薰衣服包裹尤妙

瘡後眼不能開用蟮血滴入眼內或用芭蕉根汁溫洗之妙

又痘毒蠲藥　蚵蚾乾一隻火炙碾末晚蚕炒研為末冬月用溫湯夏月用水調圓四面空中出毒

## 欽跋瘡瘍經驗全書後

先太師所著外科全書為先朝業醫者之軌範麟有家藏善本每展而讀之見其洞識本原析極理要脉絡分明經緯精覈一覽之際如視諸掌學者誠於此書而熟玩之天下信無不可瘳之疾矣顧世遠籍湮獲見者鮮麟乃請命家君招我同志少溪施君為之補其缺畧手同正其訛外付之梓人以廣其傳庶乎先太師仁人愛物之心得以不泯云謹識歲序於此

隆慶己巳春三月哉生明錫山十七代孫夢麟拜書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷第八畢

---

# 宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方九卷

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

## 目錄

瘡瘍總論　灸瘡瘍法　圍法貼紙妙訣
開刀手法　消毒潰堅湯　參芪內托散
參芪歸术膏　內踈黃連湯　內托復煎散
內疏黃連湯　十六味流氣飲　千金托裏散
護心散　清心內固金粉散　忍冬酒

蠟凡丸　神功活命湯　發背初起
又方　發背發不起　神効托裏散
木香散　豬蹄湯　透膿散
牛膠飲　竹葉黃芪湯　麦冬散
當歸黃芪湯　犀角散　桑枝散
五味子湯　蜜花散　梔子湯
加味四七湯　柿蒂湯　健脾散
加味四君子湯　加味治中湯　三和湯
大麦門冬湯　黃芪六一湯　六神散（托裏溫中湯）

第1012册　續修四庫全書　第 0　反正内

黃連清涼飲子　癰疽疔腫[illegible]瀉　梵針透膿散
復元通氣散　酒製大黃散　消毒飲
丁附五香湯　托裏溫經湯　內托榮衛湯
安神散　柞木飲　青金膏
乳香華茇散　梅瘡風癬經年　十全大補湯
金箍散　又方　瘰癧痰核藥　紫芷散
消毒散　奪命散　刻效散
拔丁圍藥　刮毒丹　千金烏龍膏
妙貼止疼散　隔皮取膿散　水龍收毒法

海浮散　又方　烏獲追膿散　追毒錠子
真君妙貼散　驪龍散　一艾二黃散
發背初起爛開　平肌追膿散　洪寶丹
痘毒四箍散　痘毒摻藥　痘毒圍藥
紅玉散　粗料煎油　煉松香法
製黃丹法　長肉紫金膏　千槌膏
咬頭膏　乳香長肉膏　太乙膏
麒麟竭膏

第九卷目錄　畢

## 第九卷附世傳秘方　瘡瘍總論　夌麟

人以五臟六腑為根本五臟不和則九竅不通六腑不和則留結為癰故癰者六腑不和之所生疽者五臟不和之所致六腑主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮厚而腫堅皆由六氣七情而成也然瘡瘍皆火之屬須分內外而治其本經曰膏粱之變足生大疔其源在裏發於裏也受持諸虛言內結而發諸處未到從何道出皆自從虛而出也如太陽經虛從背出少陽經虛從鬢出陽明經虛從髭出督脈經虛從腦出經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脈其源在表盛則內行若脈沉實當先踈內預絕其源脈浮大者當先托其裏恐邪氣傷內又有內外之中邪氣至盛遏入經絡乃生癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫治法大要托裏踈通榮衛三法托裏治其外之用踈通治其內之行榮衛治其中內之外者脈沉實發熱煩躁外無焮赤痛深在內邪氣沉裏故先踈通臟腑故先托裏防其內然內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當知榮衛周禮有腫瘍潰瘍今之癰疽是也內外

俱虛宜大補氣血為主後行五香散者當防虛實之失其瘡之發先發紅腫為氣血鬱積蒸肉化為膿其痛全在始作之時膿潰之後腫退肌寬痛硬漸減若發痛者虛也宜補之有穢氣觸者宜和解之風寒逼者宜溫散之以手按腫上熱則有膿不熱則無膿况瘡疽有表裏虛實用藥有補瀉溫凉稟受之厚薄形志之苦樂隨年歲時令而加減則病易療若內悞用寒凉之藥而外敷貼冷藥然欲望其消散是借寇兵也其害不淺大凡陽滯於陰脈浮洪弦數陰滯於陽脈沉細弱濇陽滯以寒

治之陰滯以熱治之細詳其意陽滯陰沖作熱治寒治求之寒熱固可作陰陽論於陰於陽分明是氣是血也氣為陽行脈外血為陰行脈內相並分派週流循環一身無停止謂之一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息共得六寸一身通行八十一丈得熱則行速而太過得寒則行遲而不及五味之厚七情之偏過氣為滯津液稠厚積而久也為飲為痰滲入脈內血為所亂因而凝濁運行泛溢或為沸騰此陰滯於陽也正血滯於氣也凡血病令人或藥以助邪病上生病血之病日增溢出脈外隊道溢塞升降有妨運化失令此陽滯於陰也正氣滯於血也病有寒熱則稟受之素偏虛邪之離合豈可以陽為熱陰為寒也浮洪弦数氣病之脈也烏可遽作熱論沉細弱濇血病之脈也焉可遽作寒論此萬病之根本豈止癰疽而已大凡腫瘍時作毒氣上攻治之潰陽後當作陰虛補之若老年潰後發嘔不食者效用人參黃芪白术膏大補取效佐藥隨時症加減劉守真謂諸惡瘡瘍而嘔者此濕氣侵於胃也藥中宜倍白术王海藏謂吐者有物無聲乃血病也有食入則吐有

食已則吐嘔者有物有聲氣血俱病也張仲景云嘔多雖有陽明証勿下之噦者無物有聲乃氣病也謂之逆者吃逆也火自下而上衝胃口作聲者病後胃虛所致陰火虛也病至此當作危矣但理無定在病有萬變為醫須隨時取中見可而進經曰知其要者一言而終不知其要流散無窮何謂情因是也何謂要治法是也治法惟東垣丹溪能轃其奧悉詳載於外科新録五善七惡具焉蓋煩燥時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便淋漓一惡也膿血大洩腫焮尤盛膿色敗臭痛不可近二

惡也喘粗氣短恍惚嗜睡三惡也不能下食服藥而嘔食不知味四惡也目視不正黒睛緊小白睛青赤瞳神上視五惡也肩項不便四肢沉重六惡也聲嘶色脫唇鼻赤青頭目四肢浮腫七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調匀二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清朗四善也体氣和平五善也然有症合七惡而皮緊急如善者有症合五善而没后虛如惡者此不可不察又曰飲食如常实热而大小便澀内外看相應肌肉好惡分明善也發渴而喘睛明睛角面鼻大小便滑目中不了肉黑而陷面青唇黯已潰肉青瘀吐嘔逆惡也凡同志之士乞再推明改削毋隱毋吝

## 灸瘡瘍法

夢麟

凡人患瘡瘍之症不拘何處其色鮮紅者為陽淡紅者為陰自有寒热之分用手按患處热如火烘者是頭聚或用湿綿紙帖患上先乾者為頭聚即用筆点記切蒜片如錢厚放患處置艾壯於上以火燃之若蒜片枯焦再易之待將畢三五壯着帋內上灸為佳至少者以二十一壯為期頭頂上五壯七壯為期艾炷止可如豆大但面心為陽中之陽禁灸其陽症不可灸者何恐火氣內侵势益昌大以火濟火故戒之惟陰症可灸鬱氣湿热積毒借火以接之然以火濟水自有相生之妙臨灸畢用口吹火至滅其火功借氣得以入內其症易散設或灸不能即散者灸遲故也雖不能全散大能解毒易潰膿易斂瘡口功難盡述惟臟毒坐馬癰以蚯蚓泥作餅代蒜片文灸之以热為度易之如前共十四壯為期若附骨疽癰毒入骨髓擇天氣晴明和煖尻神不犯吉日午時灸至申時止徐問病者骨中热否若果骨中热方効若灸不拘壯数忽然爆起者是病根脫矣即止之凡灸須（飲食料飯并飲好酒以通經絡以和氣血再令善笑談者以乱其精神亦妙方也体虛者禁灸）

大抵病有浅深劾有遲速亦有陰虛陽实呼吸轉移醫者須要胆大心小胆欲大者有决断之才識見之明當刺則刺當攻則攻不宜攻刺者止之則能知標本心欲小者有救急之義無苟取之心富者辞之傷廉貧者取之傷恵須見利思義斯称醫哉近有利巳害人之徒妬賢嫉能驚嚇病家深圖厚賂衒無定論巧言矜能謗毀前醫毫無識症立方之見起死回生之功徒貪財排訕耳竟亦何益其心不仁莫甚于此亦有病家輒聽其言不分賢愚自取其禍與前醫何干實庸工之悞也戒之

慎之亦有庸醫妄投藥劑輕用針刀大灸势愈重殊廢将調反怨後醫之不能捷功噫病不可急治者而治之徒傷命耳廣於治病者豈能遂病家之心乎亦有富家不念貧醫恃豪傲慢前恭後踞良醫断不肯屈志自壊自耳又有輕命重財不顧珍宝之藥待全愈伸謝豈誠語哉又有愈後伸謝痛財以致醫者不能敎本良可嘆也須當各盡其道方無愧於心若遇極貧患病之人皆施藥剂再助柴米救其一命則世業益隆子孫豈無賢能者興乎予因貧困不能悉施極貧醫藥特書此

---

## 圖法貼紙妙訣

凡用圖藥必加功夫挽千餘下其藥自稠軟手圓之留孔必須如鵞子形状須用薄紙貼之務要扯碎貼上免崩裂疼痛之苦待圖藥略乾再用調藥餘汁潤之以助藥力况藥乾不能入肌肉借湿以通竅耳宜深詳之

## 開刀手法　千金不傳

凡疮瘍之起疼痛因属於心火久而陽氣升上蒸肉化為膿若不三思原其膿之有無遽爾開刀則鮮血突出膿何從來致患者煎寒發熱日夜疼痛無法可止或患

症富家多請醫者謂治内相妬忌惟以開刀為首功多獲厚謝全不顧患者噫若用此心以仁術為盜徒矣予孫豈能世其業哉先将指頭按患上隨手而起四畔悉軟覌其頭聚擇尻神不犯吉日将刀頭向上開之方不致傷新肉取出刀再撚綿紙條潤油度之使膿水齊會半日扯出則膿水易乾外貼呼膿膏四圍再用拔膿散敷之

已上三法誓不輕傳者予慕軒岐得天地之心而壽醫仲景得軒岐之心而廣法豈可擅利於一已而害衆生

乎道見同道之交往往不善於圖藥惟賴利口聳人故意不待症熟輒肆開刀或同業妬忌以先開刀為首功多致患者不起哀哉此業也能生人能殺人況醫司人命故君子不可不慎也必須先去貪嗔之心次敦真實之念富不過求極貧不取稍有餘資再助以柴米之費免其日給之憂所謂作善降祥冥冥之中神明鑒察自已雖貧此心豁豁天道昭昭孝子順孫森出斯業亦得相承不亦善乎司馬温公曰積金與子孫子孫未必能守不若積陰德於冥冥之中為長久計大哉斯言也巍

巍莫及近覩貪利之徒驚嚇病家集利致富身沒之後天道禍淫所得隨所失子孫喪亡世業即斬不亦報乎昔張彥明為醫視人之疾皐切吾身推誠極救未嘗以財為較一日城中火炎遍圍殆盡烟焰中獨存其居以此見天道有陰扶顯助之靈又有陸汝循醫病至夜深而回路遇鬼卒百人其中有長大者一神黃袍披身汝循見之五首投地汗如雨下驚懼不勝神曰毋恐吾乃瘟神也汝有恒心不以富貴貧賤二其念今加瘟氣滿人間用藥治之以參蘇飲為要日後汝當壽顯歸家焚香告天曰貧富皆人用藥一心神今顯應民得全生三日之內蒲城皆疾乃馬頭瘟也眾名醫不能治汝修日製衣藥餌及千服果之先與貧者服之頓愈芳名遍傳求之如市家業富饒六子五婿悉果貴顯孝者能以張陸二公之心為心何患道之不行子孫不顯者哉此牌日切於身心者也焉敢少忽遂并梓行

## 諸癰疽發背總方秘傳試驗

### 消毒潰堅湯

治入法癰腫瘰癧惡節乳癰腦疽等症

羌活　黃連（酒炒）　黃柏（酒炒各錢）　生地（酒洗）

桔梗（五分）　黃芪（二錢）　人參（五分）　甘草（五分）

連翹（五分）　防巳（酒洗五分）陳皮　澤瀉（炒）

山梔仁（姜汁拌炒）五味（碎）　麥門冬　枳殼（炒）

猪苓（各五分）

### 參芪內托散

人參　黃芪（炒）　當歸（酒洗）　白朮（炒）

橘紅　甘草　升麻　川芎

生地（酒洗）　羌活　厚朴（姜汁拌炒）

腫瘍加連翹羌活　潰瘍加芍藥甘草　酒毒加酒炒連　氣加香附　痰加瓜蔞仁　發熱加小柴葫酒炒黃芩　渴加天花粉　惡心加半夏生薑　解毒加金銀花甘草節　在太陽上加羌活　陽明經上加鼠粘子白芷升麻　少陽經上加柴胡

### 參芪歸朮膏　衰老氣虛宜服

人參　黃芪　白朮（土拌炒）　當歸　[illegible]（各二兩）

胃不和加陳皮二錢水四碗煮剩膏以牛膝二錢煎湯入竹瀝勻之加姜汁

### 內疏黃連湯

嘔啘心逆發熱而煩脉沉而實腫硬麻木而皮肉不變色根係深大病源在內臟腑秘結當急疏利

黃連　芍藥　當歸　山梔

檳榔　木香　薄荷　連翹

茯苓　黃芩　桔梗　甘草（各一錢）

右除木香檳榔為末外餘剉每一兩水煎八分入檳香二末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利為度

### 內托復煎散

腫掀於外根盤不深形症在表其浮痛在皮肉邪氣盛而必侵於內須急服內托以救其裏也

黃芪　防風　地骨皮　芍藥

黃芩（酒炒）　白朮　人參　茯苓

甘草　羌活（各等分）

先用茅山蒼朮一觔剉片以水五升煎二升入前藥十二味再煎至已四鍾濾汁作四五服終日用之能除濕散鬱熱使胃氣和平若大便閉煩熱燥少服內疏黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料使榮衛俱行邪氣不能內侵也

## 內疏黃連湯

癰疽服　解毒補養氣血托裏排膿自無疼痛

黃芪　人參　白朮　當歸

川芎　芍藥　草節　黃連

連翹　白芷　羌活　陳皮

獨活　金銀花　防風（各等分）　竹瀝（臨服入）

痰中有血加童便藕節汁

## 秘傳十六味流氣飲

未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏內補散

人參　當歸　官桂（五分）　川芎

防風　白芷　桔梗　黃芪

炙草　厚朴　木香　白芍藥

大腹皮　烏藥　枳殼　蘇葉（各一錢）

不退熱加茯苓白朮地黃不進飲食加香附砂仁疼痛加乳香沒藥　水不乾加知母貝母　瘡不穿加皂角刺　大便閉加大黃枳殼　咳嗽加陳皮枳殼半夏杏仁薑　小便閉加麥門冬車前子木通滑石燈草　瘰癧加羌活夏枯草連翹青皮柴胡黃芩

右為末每六錢酒調下不飲酒者木香湯代之米飲亦可詳其所用之藥皆發散風毒調理氣血排膿止痛長肉生肌等藥氣不和加氣藥為主血不和加血藥為主

輕重量人氣稟用之服藥後飲酒以助藥力

## 千金托裏散

一切腫毒

人參　官桂　甘草　川芎

白芷　芍藥（各一錢）　木香　沒藥（三分）

乳香（二分）　當歸（五分）　連翹（一錢）　防風

厚朴（各一錢）　生薑（五片）　臨服加酒一盃

## 護心散

又名乳粉托裏散

癰疽初發便服毒氣不攻惡心煩悶吃嘔喘嗽以至瀉泄急服之

真乾菉荳粉（二兩）　乳香（五錢研）
和匀甘草湯調下此藥．不時吅之使藥味長流膏膈間
則毒氣不能攻心

清心内固金粉散

辰砂　人參（各三錢）　白茯苓（三錢）　菉荳粉（四兩）
雄黃（二分）　甘草（二分）　朴硝（五錢）　白荳蔻（五錢）
氷片　射香（各分）　皂角（一分）
右各另研每二錢蜜調下

忍冬酒

凡初起時便當服此不問發於何處
忍冬藤（五兩）　甘草（一兩）
水五碗煎至一碗再加無灰酒煎服

蠟凡丸

一切症服此能衛護内膜驅解諸毒自然消解及惡毒
瘡膧遍身等惡症
通明凡（二兩為末）　黃蠟（七錢）（貴人加木香　富人加沉香　平人加紫蘇葉　俱為末）
溶蠟下蜜一匙少溫入凡衆手拌匀丸如桐子大每服
五十丸溫湯下日三服未破内消已破易合蠟性實太

腸凡性解諸毒故用之也

神功活命湯

一切惡瘡癰疽發背便毒等症
皂角刺（二錢酒炒）　甘草節（六分）　川山甲（六分蛤粉炒）　金銀花（三錢）
貝母（七分）　防風（六分）　赤芍藥（六分）　歸尾（一錢）
没藥（六分）　白芷（五分）　乳香（一錢）　陳皮（分）
天花粉（一錢）　老酒煎如欲瀉加大黃　熱加黃芩
病　在背俞皂角刺為君　在腹募白芷為君
胷次加瓜蔞仁　在四肢金銀花為君

煎時須用大瓦罐以紙密封瓶口勿令泄氣服時須隨
瘡上下以分飢飽能飲酒者服藥後飲酒幾盃此藥並
無酒氣不傷臟腑氣血忌酸薄酒并鐵器服藥後身宜
側睡自有回生之妙如毒潰不宜服也

發背初起

川山甲（四片）　牛皮膠（四兩新瓦上炒灰）
右二味為末用酒二碗調和從容服公尽無大患不能
飲酒者酒丸清飲湯下

又方

凡人中热毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背热四肢麻木覔有紅暈在背後即取槐子一大把揀淨鐵鍋內炒褐色好大酒一碗煎滚去槐子热服待汗出即愈未退再服

發背發不起

川山甲（蛤粉炒黃去蛤）碾末五錢酒下

神効托裏散

癰疽發背腰乳腸癰腫毒骨痛增寒壯热狀若傷風

黄芪（蜜炙）　金銀花　當歸　粉草　多

酒煎服

木香散　又名化堅湯

瘡難消又不能作膿痛不止及小兒痘後生癰米湯下

地骨皮（五錢）　木香（五錢）　穿山甲（五錢蛤粉炒）射香（一分）

每二錢酒下

猪蹄湯

一切發背等症用此洗之能消毒氣去惡肉凡瘡有口急用之

香白芷　黄芩　赤芍藥　露蜂房（內有小蜂者佳）

當歸　羌活　生草　地骨皮

先將雄猪前蹄一隻白水四碗煮熟去蹄取汁澄去面上油膩取清汁加前藥煎三四滚取汁將軟筆或軟綿蘸藥湯徐徐洗之須要避風并人口中氣

透膿散

不用開刀服之一日夜自透出一頭

蛾口繭（用出了蛾者）

右將一枚燒作灰用酒調服切不可用兩枚三枚若服一枚只一頭多服多頭

牛膠飲

惡症忠險處服之使毒氣不攻於內不傳惡症

牛皮膠（淨洗四兩）

好酒一碗入膠內重湯溶透攪勻加酒隨意飲盡以醉為度不能飲酒者酒煎沸湯下蓋牛膠補肺氣實大腸壯胃止瀉

竹葉黃芪湯　諸症大渴

淡竹葉（二兩）　生地（八兩）　黃芪　當歸

川芎　人參　甘草　黃芩

麥門冬　芍藥　石膏（各三兩）

右作十服水煎

麥冬散　体热煩渴不止

黃芪　黄芩　麦冬（各兩五錢）升麻

赤茯苓　赤芍藥　玄参　當帰

甘草　知母　天花粉（各兩）生地（三兩）

右剉每約八九錢水煎热甚加淡竹葉灯心

一方去玄参當帰加人参棗肉

當帰黃芪湯

症已行臟腑而痛不可忍

當歸　川芎　生地　芍藥

黃芪　地骨皮

水煎發热加黃芩　煩燥不能卧加山梔　嘔逆乃濕氣侵胃倍加白术

犀角散

發背不曾服粉乳托裏散以致热毒衝於心絡故咽喉口舌生瘡甚至黑燥先服犀角散以解其毒免有此症

犀角　玄参　黃芪　升麻

---

不通　麥門冬　赤芍藥　生甘草

當歸　大黃（酒煨）

每五錢水煎服

桑枝散

舌上焦硬甚堅大燥厚如雞內金狀非瀉症乃腎水枯竭心火炎上平常人見之不宜有此必危難療

花桑枝（嫩者并）切碎炒香水三升煎二升一日服盡為妙若桑枝瀝治渴尤妙

五味子湯　治前症

五味子　黃芪　人参　麥門冬（各兩五錢）

粉草（一兩）

水煎日夜不時服之

蜜花散　治渴

金銀花（洗淨以瓦罐內用無灰酒浸滿候火夜將取出晒乾末之五兩）

蜜花渴時蜜湯下渴止為度此散腸厚者宜服恐作瀉故也慎之愼之

梔子湯　大發热不已

甘草　柴胡（一兩）　漏芦　連翹

山梔（各一錢）黃芩　防風　人参（各一錢）
茯苓　黃芪（二錢二分）
每一兩水煎
加味四七湯　喘嗽多痰
紫蘇葉　白茯苓（三味各一錢）半夏（姜汁浸炒）桑皮（二錢）
木香（一錢）枳實　厚朴（各一錢）甘草（二錢）
分四服姜七片煎
柿蒂湯
發喊連聲不絕神思疲倦至七八聲相連收氣不回者

難治
丁香　柿蒂　山梔　人参
茯苓　陳皮　半夏　良薑
甘草　竹茹　黃連
薑七片煎　虛人加知母黃栢　發喊者怒氣滿胸常
欲叫此肝經之症正難療者
健脾散　潰後瘡痛不食
蓮肉　砂仁（四錢）香附　藿香
茯苓（三錢）陳皮　山藥　蒼朮（各一錢）

---

木香（一錢）炙草（二錢）生姜　棗子（十枚）
右剉分作六服服之
加味四君子湯　嘔吐心悶
人参（一錢二分）炙草（五分）白朮（一錢五分）茯苓
白蔻　厚朴（各八分）陳皮（一錢）砂仁（一錢）
姜三棗二去核煎服
加味治中湯　潰後泄瀉不止
青皮（炒三錢）呵子（五錢）乾姜（炒）白朮（土炒）
茯苓（各一錢）人参　砂仁（各三錢）半夏（一錢）

甘草（一錢）
右作六服姜五片煎
三和湯　潰後手足浮腫
羌活　紫蘇　木瓜　沉香（各一兩）
木香　白朮　檳榔（各七錢五分）川芎（三兩）
甘草　陳皮（各七錢五分）大腹皮（二兩）
每用水煎服
大麦門冬湯　潰後小便淋瀝不通
麦門冬（一兩）人参（四錢）甘草（一錢）澤瀉（五錢）

天門冬（二分）　木通（三分）　滑石（二分）

右作四次水煎服

黄芪六一湯　一漬後虛汗如雨不止

黄芪（六兩）　粉草（一兩）

水煎服

六神散

諸瘡血出過多而心煩不安不得睡卧此忘心也

生地　熟地（各三分）　當歸　黄芪

人参（各二分）　川芎（三分）　水煎服

托裏温中湯

一人年六十七歲五月左臂膊上至肩下至手指色不变皮膚凉六脉沉細而微脉症俱寒醫曰此附骨癰也開已不遲燔針破之膿清稀次日肘下再開加吃逆與丁香柿蒂湯二服稍緩次日吃逆尤甚自痢臍腹冷痛腹蒲飲食減少時發昏瞶于左乳下黒處灸十四壯用托裏温中湯内有姜附丁沉或曰瘡瘍属火當盛暑姜附可乎予曰經云脉細皮寒瀉痢前後飲食不進此為五虚況吃逆胃中虛冷之極諸瘡痛痒属火是言其常此証内外相反當捨時從症非大方辛热剤急治不能救遂按之諸症悉去飲食進瘡势温膿色正又與五香湯数服月餘而安

丁香　沉香　益智　茴香

陳皮（各二兩）　乾薑　羌活（三分）　香附（四分）

木香（一分五分）　炙草（三分）　附子（一分）

右十味作一服姜五片煎至一盞無時温服内経曰寒滛於内治以辛热佐以苦温故用乾薑附子大辛热温中外發陽氣自裏之表為君羌活苦辛温透關節炙甘草甘温補脾胃行經絡通血脉為臣益智丁香沉香大辛热以散胃寒嘔逆不下食為佐内攻聚而為滿木香茴香陳皮苦辛去痞散滿為使已上方夏月脉症俱寒用之甚宜

黄連清凉飲子

一人年六十歲冬至后發背疽五七日腫势約七寸闊遲故不变症果生瘡重如石热如火痛倍常六脉沉数按之有力此膏梁積热之变邪氣酷热寒薬治之時冬月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思内經有假者反

之遂其時從其症可也

黃連 當歸 炙草 大黃（酒煎）

赤芍藥

右五味各等分每服一两五錢水煎服之利下其痛減七八明日再進前症悉除巳上邪氣酷热脉實用力者宜用

瘡疽疔腫發渴惡心胷満

茯苓 甘草 陳皮 半夏

連翹 黃連（炒） 鼠粘子 天花粉

羌活 香附 砂仁 枳殼

薑汁竹瀝和服

替針透膿散 服此頭即透出

此方有在前

復元通氣散

諸氣澁閉耳聾耳痛腹癰便毒無頭腫毒婦人乳癰

青皮 陳皮（各四两） 甘草（三两半生半熟） 穿山甲

瓜蔞仁（各二两） 金銀花 連翹（各一两）

末之每二錢酒下無頭津液調塗此方活血止痛消腫

---

消累大黃散

婦人七十形實性急好酒生腦疽五日脉緊急而澁急用大黃酒浸紙裹煨切細拌炒為末再以酒拌炒熟用人参加薑煎調服一錢两時刻再進一服睡少頃有汗竟来病巳去矣

消毒飲

年七十生項疽脉實而稍大因憂悶生热所致作太陽經漆之

歸頭 熟地（酒洗） 黃芩（酒炒） 黃連（酒炒各）

黃栢（酒洗） 黃芪 羌活 桔梗

人参 生地 陳皮 防巳

防風 澤瀉 甘草 連翹

水二鍾煎服

丁附五香湯

一人年七十冬至後生腦疽腫痛面大醫士俟瘡熟針出膿因怒笞侍妾瘡輙内陷凹一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身凉嘔吐脉極沉細而遲蓋衰老嚴寒時病苦楚飲食淡薄瘦瘁加怒精神損耗故此有寒

変也病與痈同乃製五香湯一劑加丁香附子五錢療後大發隨症調治而安内經言凡治病察其下謂察時下之宜也

## 托裏温經湯

寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中聚為赤腫痛不可忍惡寒發熱四肢疼痛

麻黄（四兩）　防風　升麻　葛根（各叁錢）
白芷　當歸　蒼朮（叁錢）　人参
白芍藥（各錢）　甘草（二錢）　柴胡（一錢）　陳皮（八分）

右十二味每一兩水二碗先煎麻黄湯去沫方下餘藥煎至八分温服卧煖處綿衣覆之得汗而散内經云冬月閉藏用藥多而少鍼石宜以苦温之劑温經散寒為要而腠理當以苦散之但辛發散之用麻黄苦温發之為君防風辛温散之升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經邪為臣血留不行則痛以白芷辛温當歸身和血散滯温熱腫則蒼朮苦甘温行經壯力能泄膚腠間湿热人参甘草甘温白芍酸寒調中益氣使托表為佐以衣覆首厚被蓋身卧煖處使經絡血温腠理開寒

邪散陽氣升汗出腫减八九第二服去麻黄防風加連翹粘子腫痛悉去内經云汗之則瘡已信然

## 内托榮衛湯

黄芪（五分）　防風　連翹　柴胡（各五分）
羌活　甘草　黄芩　人参
蒼朮（各五分）　當歸（一錢五分）　桂枝（八分）　紅花（二分）

右十二味剉分二服水酒各二盞煎八分温服内經曰天空西北左寒而右凉地不滿東南右温而左湿東南方陽也陽精降於下故右熱而左湿西北方陰也陰精奉于上故左寒而右凉適寒凉者脹之而湿热者瘡下之則脹已汗之則瘡已夫東南二方在人則丙小腸热甲胆風皆俱下性炎上其瘡外有六經形症内無便溺阻隔飲食如故小便自調知不在裏非痈也瘤癤小為癤大為癰其邪受風湿地氣自外而来侵内經曰榮氣不足逆於肉理乃生癰腫諸瘡痛痒皆属心火此瘡自外而入是丙小腸左迂入胆作痛而非痒此二方皆主血為病必痛此元氣不足榮氣逆行其初出未有傳变在於肌肉之上皮膚之間只於風热六經所行經絡地

分出也宜漏風濕热醫者只知陰覆其陽只宜汗此宜汗者乃濕热欝手足少陽致血脉凝逆滞衛不能週身元氣消弱也其風濕热滞於下故而赤腫微黯氣水惟上衝顏色多怒其瘡色腫微黯瘡热高起結硬作痛其脉止在左手右屬表在寸外洪緩而除是客邪在血脉之上皮膚之間宜急發汗通榮衛則邪去矣以内托榮衛湯發之

瘡疽夜卧不睡名安神散

辰砂　乳香（各一錢）　人参　酸棗仁（各錢半）

末之棗肉丸人参湯下

柞木飲

發背瘡疽未成者已成者並收奇功

乾柞木葉（四兩）　萱草根（五錢）　甘草節　金銀花

乾荷葉蒂　地榆（各兩）

右為末每五錢水二鐘煎八分作二次早晚各進一服

柤再煎

青金膏　走馬牙疳蝕損腐爛

乳香　〻信　輕粉（各錢）　青黛（二錢）

---

右為末油調新筆付紙上陰乾每用少許放患上以白紙封之

乳香蓽撥散　牙疼槽風

天麻　防風　草烏　蓽撥

細辛　乳香　川芎　朋砂

射香　薄荷

右為末每次口噙温水嗽之鼻内吹之

毒瘡久発風癬成瘡經年不痊

防風（五錢）　大黄（一兩）　黄連（五錢）　黄芩（五錢）

連翹（五錢）　梔子（五錢）　蛇床子（一兩）　枸杞子（五錢）

白蒺藜（五錢炒）　殭蚕（三錢炒）　牛蒡子（三錢炒）　胡麻仁（五錢）

蔓荊子（五錢）　蛇退（一錢）　蜂窠（五錢炙）　龍骨（五錢）

天花粉（五錢）　甘草（一錢）　威靈仙（五錢）

右為末米糊為丸每日三服忌酒肉塩味廿七日

十全大補湯

一切症潰後多服生肌長肉益氣滋血

人参　當歸　川芎　白芍藥

白术　黄芪　茯苓　甘草

生地　熟地　防風　陳皮

乾山藥　知母　黃栢　澤瀉

升麻　金銀花

秋冬天加厚朴蒼朮肉桂　春夏天加麥門冬青皮

黃芩山梔仁黃連

### 金箍散

黃栢（去粗皮一斤）川白芨（四斤）芙蓉葉（一斤）紫花地丁一斤

天花粉（半斤）白斂（半斤）

右為極細末隨瘡癤癰疽發背每用葱一把搗碎加蜂蜜少許再搗取汁調勻搽患處四向空中出毒乾再用餘汁潤之以助藥力蓋葱性能開腠理善走諸經發散風邪蜜乃百花之精潤肌竅解百毒與葱相反助諸藥力如葱汁不便夏月用蜜水冬月用蜜湯

### 又方

白芨（四兩）雄黃（一兩）楡皮（二兩）黃栢（一兩）

射香（一錢）

右為末猪膽研爛調勻搽四向空中出毒乾再易之

瘰癧痰核閧藥

---

昆布（一兩去沙石鹽水洗）射香（五分）氷片（二分）

南星（五錢）

末之用好醋薑汁蜜少許調勻搽四向空一孔乾再用餘汁潤之　一方加田螺殼煆存性三錢白芨末二錢五倍末二錢

### 紫芷散　治臂癰

紫蘇葉　白芷　官桂　草烏

白芨　黃栢（各三錢）

為末暗醋薑汁葱汁蜜少許和勻火上熬滚調藥待溫調勻搽四向空中出毒乾再潤之冬天加燒酒夏天宜用好苦茶洗之

### 消腫散

白芨　白斂　牙皂　殭蚕

赤豆　五倍　雄黃（各三錢）南星

半夏　大黃　黃栢　草烏

白芷　貝母　山茨菇　芙蓉葉（各五錢）

天花粉　牡蠣（各二兩）

末之姜汁靛青調敷

奪命散

烏梅　老茄子（經霜者）　芙蓉葉　青地松

威靈仙　過山龍　馬鞭草　豨薟草

益母草（俱等分）生井草　草烏　赤小豆

除井草等三味餘剉細入瓶内塩泥固濟火煅存性爲末丁瘡飛塩醋調貼疽背瘡加田螺殼灰皂角灰加黑背蜒蚰搗爛調鎖口丁瘡搽藥在瘡口内陽症紅腫猪胆汁蜜調小兒用毒茄青靛花胆汁調便毒猪腦調

刻效散　發背

黄瓜蔞一個　白礬　一錢

連皮子煆過爲末醋調敷乳汁尤妙

拔丁圍藥

蒼耳子搗爛加霜梅肉和匀貼瘡上葉梗煆灰亦可

剛毒册

黄栢　天花粉　南星　芍藥

蕪黄　蟬退　大黄

右爲末水與酸醋俱不拘

千金烏龍膏

---

治一切下部湿毒附骨腿瘡筋絡無名異症

多年陳小粉（半斤炒黑）　白芷（不炙）　肉桂（不見火）

五倍　炒　乾姜　炒　桔梗　龜板　煨

白芍藥　白斂　威灵仙　蒼朮　炒

烏藥（金毛不見火）飛塩　蛤粉　各五錢　白芨　六兩

右爲末姜汁葱汁睛醋蜜少許火上熬熱調匀搽四向空中出毒乾再潤餘汁以助藥力

妙貼止疼散　上部一切腫毒

白芨　一兩　乳香　五錢　桔梗　五錢　紫花地丁　三錢

白蘞　五錢

末之鷄子清如前調敷并潤之

隔皮取膿散

駱蹄（細末兩）蕎麥麵（二兩炒）　白塩　五錢　草烏　四錢去皮

五倍　一兩

末之水調作餅煨火炙黄去火毒研細醋調成膏攤貼其腫漸退

水龍收毒法　單治背瘡初起紅色者

背上用稠泥成圈中間放水下馬蝗數條待蝗呼毒血

一日三易其瘡即愈　謂之蝋釘

海浮散　瘡有惡肉不去

乳香　没藥

各半研細末摻上惡肉自消

又方

地榆研細末加雄黃末如前摻之

烏獲追膿散

黃芪　芍藥　白芷　天花粉

蛤粉　白芨

右為末蜜水調勻搽四向

追毒錠子　治餂胬肉堅不痛者

續隨子　斑蝥　大戟　五倍（各二兩）

麝香　山茨菇

末之糯米粥杵成錠子紝胬肉根下胬肉即脫

真君妙貼散

明淨硫黃（二兩）　蕎麦粉（二兩）

右為極細末井水和捏小餅晒乾或焙乾收之如遇惡
瘡再研細井水調敷痛處痛者不痛不痛者即痛而

驪龍散

發背癰疽破與不破二者之間功能捷叅

珎珠（八分）　牛糞（兩十二月生用餘月燒灰存性）　鐵繡（一兩）

右研細末以猪腦加醋調敷瘡口三五次乾再易之

一文二黃散　奪旗斬將之劑

發背黑不痛即為陰也用艾葉一觔硫黃雄黃末各五
錢以水同煮艾半日搗極爛候溫敷上再煮再易十餘
遍能知痛者可生全無痛者出紫血而死

發背初起爛開不住　合圍攻勝之劑

白塩梅皂角二味燒存性研末不發熱者米醋調塗四
圍連換即不走開

平肌追膿散　瘡頭冷者用妙

乾薑碾末雞子清調搽四向如潰爛用猪蹄湯洗淨瘡
口拭乾摻之覺热如烘平肌易愈　猪蹄湯法在前

洪寶丹

發背黑色四圍爛開用此把住好肉

天花粉（三兩）　薑黃　白芷（各二兩）　赤芍藥（二兩）

末之若病勢大热可用热茶清調敷如病少温則用酒

調散箍其膿加姜汁四分茶清六分

痘毒四箍散

黃栢　川烏　赤荳（各二兩）　石精黃（一錢五分）

俱各細末和匀水調冬天用寒湯

痘毒摻藥　并附

防風（五錢）　當歸（五錢）　乳香（一錢）　珎珠（一錢）

没藥（一錢）　血竭（一錢）　辰砂（一錢）　胎牛蹄（尖二錢一箇）

人參（一錢）

右為末乾摻

又痘毒圍藥

白芨（四兩）　雄黃（五錢）　黃栢（一兩）　天花粉（二兩）

文蛤（二兩）　紫花地丁（一兩）

右為末生荳漿調匀搽四向空中出毒氣時用餘漿潤之以助藥力

生肌長肉紅玉散

寒水石（火煅過去灰研如塵四兩）　血竭（一兩）　乳香（七錢）

没藥（五錢）　孩兒茶（一錢）　升藥（一錢）

右為細末如塵每用一七摻瘡口左（邊明日搽右邊輪流摻之其肉齊平）

---

太師公親製金絲萬應膏

此膏治癰疽發背諸腫毒定痛追膿生肌長肉收歛瘡口并治閃腰撲損嗟蒿落馬筋疼骨痛皮肉青腫並治之此膏天下魁首其妙無窮寶之寶之

粗料煎油

大黃（一斤）　貝母（半斤）　草烏（二兩）　地骨皮（四兩）

黃芩　黃栢　黃連　天花粉（各二兩）

小薊　大薊　赤歛　白歛

馬鞭草　威靈仙　白芨　赤芍藥

肉桂（各五錢）　玄參　細辛（三錢）　當歸

川芎　白芍藥　刘寄奴　牡丹皮

蘇木　紅花　蜂房　血餘

馬屁孛　良姜　續斷　桑寄生

木鱉　無名異　蓖仁　連翹

金銀花　烏稍蛇　金毛狗脊　象皮

羌活　獨活　仙靈皮　青皮

五加皮（各二兩）　地龍（三条）　白芷　防風

黃芪　姜黃　蛇脫（十条）　川山甲

續修四庫全書　第12　版反內

蝦蟆　血見愁　殭蚕　半夏
龜板　烏藥　皂角刺　天麻子
地榆　艾　苦參　南星
牙皂　甘松　三柰　藁本
骨碎補　全蝎　麻黃　蜈蚣（廿条）
蟬脫　五倍子　青風藤　何首烏
白蘚皮　木通　百合（各二兩）

巳上用真麻油二十斤春浸十日夏浸五日秋浸十五日冬浸一月文武火煎熬旋加桑柳槐枝各二斤鳳仙

梗稀薟草益母草芊芊活見腫消等草各少許新鮮者有水氣緩緩下之若驟下則油泛上發浮慎之慎之待藥焦黑濾淨查入油磁瓶中此藥必用絲綿襯麻布濾方精製再入鍋內慢火煎油滴水不散為度春夏明淨松香一斤下油二兩柳枝攪勻俟略溫旋下乳香血竭沒藥各一兩射香一錢春初天氣尚寒每斤再加油半兩秋初亦如之冬月嚴寒松香一斤下油四兩細藥同前攪至不粘手為度傾入水中多令人蘸水煉如黃金色再入水中浸三日出火毒任用

## 煉松香法

松香不拘入淨鍋中煎熬柳枝攪之俟其烊化將稻柴濾淨查俟冷結成塊取出任用其砂石木屑俱在柴中矣麟之製法果確也

巳前煎過油內加天鵞油每藥油一斤加鵞油一兩使諸藥味透入骨髓凡煎膏藥須隨四時以意消息

## 製黃丹法

黃丹先炒黑色傾入缸內用滾湯泡之再浸凉水滿缸時時攪之浸一宿水飛再搽一器內澄其細者斷其雜

砂之類將細好者晒乾方研極細如塵水氣尽方可用

## 長肉紫金膏

前油一斤飛丹節七兩柳枝攪之不粘手看四時軟硬為度油多加丹丹多加油以意消息其法全在時宜徐徐下細藥

沒藥　乳香　血竭　赤石脂（各一兩）
珎珠（三錢）　射香（三錢）　輕粉（三錢）　沉香末（三錢）
黃占（二兩）　白占（一兩）　孩兒茶（五錢）　雞內金（三錢焙）
天靈蓋（煅存性五錢）　鳳凰窠（煅存三錢）（鳳凰窠即初出小雞殼內嫩白軟皮也）

伏濕方下射香一錢　氷片七分埋土中七日出火毒

任用

不問癰疽惡瘡等症杖瘡磕損並治之并服

風痰者痛處貼之

赤眼頭疼貼太陽穴

痄腮等症貼腫處

頭目昏疼兩耳虛鳴貼項窩

腰脇痛貼患上時熨之

小腸氣貼腎俞穴并臍中

婦人血閉并小腸痛貼小腹下

乳癰瓜蔞湯下之五十丸

婦人血崩蓮蓬灰艾醋湯下三十丸仍貼臍下

年久脚氣不愈加蜈蚣貼膝三里痛處

年久臁瘡用葱鹽湯洗淨貼患上

急心疼紅荳湯下良薑湯亦可

風犬咬傷冷水下四十丸

喘急痰盛貼肺俞穴　便毒瓜蔞湯下

如腹內積聚癥瘕用檳榔湯下五十丸外加蟾酥射香貼之

腸癰內癰石膏湯下四十九

偶食自死物香油下五十丸

自要水吃用土珠黃泥水飲數十丸即可

或餘毒未盡發為毒瘡甘草湯下五十丸仍外貼之

千鎚膏　貼瘰癧

天麻子（肉兩）　杏仁（去皮七錢）　雄黃（五錢）　乳香（七錢）

没藥（七錢）　輕粉（三錢）　白芨（二兩）　俱另為末

松香（一斤另末）

麻油打成膏忌鷄犬婦人孝服百厭必須擇上吉日在

淨室鎚之方可應驗勉之勉之

咬頭膏

麻油（半斤）　益母草（一兩）　乱髮（三錢）　天麻子（七十粒）

白芷　江子肉（廿粒）　全蝎（七枚）　班猫（廿一）

桃柳槐枝（各三錢）　官桂（一錢）　文武火熬藥黑濾淨後入

黃丹（四兩）　乳香　没藥（一錢）　射香

粉霜　信　銅青　雄黃（各五分）

柳枝攪成膏為度

乳香長肉膏

用前金絲膏藥油內每觔加象皮一兩鳳仙梗五錢再煎去查天鵞油五錢另加黃白占二錢血竭乳香没藥各三錢射香一錢前法同前不載

## 太乙膏

玄参　白芷　當歸　赤芍藥
肉桂（去粗皮）　大黃　生地黃（各一兩）

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色濾去粗入黃丹一斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不黏手為度傾入磁器中以磚蓋口掘窖子埋陰樹下以土覆三日出火毒攤貼

## 麒麟竭膏

當歸　木鼈子仁　知母　五倍子
細辛　白芷（各半兩）　槐條　柳條（各二十七根長一寸許）

右件除槐柳條外並切碎同作一處

好血竭（三錢）　真輕粉（三錢）　滴乳香（五錢）　没藥（五錢）
好雄黃（四錢）　當門子（一錢）

右件各研細和作一處

松香（揀淨者為末十兩）　瀝青（為末二兩）

右件二味作一處

真香油三兩同前八味入鍋於文武火上三上三落不住手用槐條二茎攪令焦色即用綿濾去滓再將油入鍋先入松香瀝青末不住手攪如欲滾沸溢出即取下火攪約一茶頃滴少許入水以手圓之不軟不硬即取下火將次六味徐徐而下急攪令極勻凝則再上火勿令再沸遂傾入大盆水中半刻後手扯之漸漸軟和揉搦復如金絲之狀再入水浸之有暇再揉扯春夏頻換水如急用亦浸一兩宿如浸多日愈妙每用大竹管隨意

大小高一二寸填藥令滿而平兩面按油紙在上於緊火上急手揭下一面再上紙復烘次一面仍揭下厚則再用紙過為二箇如欲展火即印四五箇於大紙上奏成一片貼用治一切癰疽并發毒瘡各依常法烘開候冷貼之生者即用之就散熟者即穿逐敗生肌首尾皆可一切疔腫結核並貼患處一切臁瘡先用姜汁白凡入湯用鵞翎洗淨以牛蒡子葉或金剛藤葉貼瘡半日取盡惡水然後貼上膏藥克日安痊除小兒妳癬外一切乾濕白禿頭瘡剃去髮用香油攤薄煎餅二箇裹着

頭上一飯頃郎用大膏藥去餅滿頭貼之一二次換藥即效一切殿股黃湿痒痂等症並洗凈挹乾貼患處一切打撲傷損脞肭氣剌等病並貼患處頭疼貼兩太陽赤眼貼眼胞魚尾際兼傷風冷嗽貼脊心牙疼刮藥塞牙縫面腫者更貼面小兒疳痢等症用湿手圓如菉豆大米飲送下三二十圓一切風寒湿痺臂病貼臂腿痛貼腿且如腿痛貼痛處半日許未效即以熱湯露脚指在外從痛處淋洗至下仍以舊布帛蘸湯連布放於膏藥蒸之令熱又用磁尾刮脚甲指令其透快不可太甚

則其痛漸移下骨節間然後如法貼之逐節可去上面一箇俟其痛趕至脚腕又貼脚心仍剪去脚指甲自然痊可常有婦人因湿氣腿腫至腰胯大着連將油紙滿胯貼之用前法趕下又貼脚心數日間脚心膏藥下發一泡出黃膠水數日至老不發貼臂痛亦如此法大抵膏藥大如患處方能敵病小而不着肉安可望效也貼痛處好肉上即用帶熱貼貼瘡即不可熱貼也隨意舉用無不作效

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷第九畢

---

## 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷之十目録

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉[illegible]

炮製法　附子不可輕用　總論病家大畧

醫家切戒　七診　玄門脉訣圖

左手右手圖說　脉息節要　七表八裏

四時手脉　明當藏之病　從肝腎起凡五類

五藏相入　腑藏正面圖說　腑臟背面圖

肺巳下左側說　肺巳下右側說（圖二）

五藏系與心相連圖說　氣海膈膜圖說

脾胃胞系圖說　闌門水穀圖說　右腎命門圖說

經旨問答五節　逐日人神不宜針灸（凡十五欵）

五行相生相剋　五善　七惡　相死生　訣病生死

寒熱內外　怪脉　五臟死　五體敗　五證死

五色死　五聲死　五體死　五竭　五傷死

五不稱脉　五視死　色聲心序　急治餘症法

（坐臥宴息法　服藥有法）（安慰去後法　藏揩膿水紙法）（煎藥法　自保護法）（服藥治法　用藥加減法）

（割取腐肉法　膽導法）（蜜導法　禁忌食物）

第十卷目録　畢

## 第十卷附世傳秘方　炮製法

人参（去蘆飯上蒸）　陳皮（去白即橘紅）

半夏（滚湯泡洗去皮或用生薑汁浸或薑汁拌炒又能豁痰）　黄芪（去根或鹽水拌或蜜炙之）

白术（米泔浸炒濕用陳壁土炒）　茯苓（去粗皮赤白二種隨症用）

甘草（或炙或炒炙者能治小便痛）　當歸（酒洗）

川芎（大者撫芎小者又有一種西芎傷寒科同用余不可用）　白芍藥（或生用或酒炒或醋炒）

赤芍藥　台术（去梗微炒）

淮生地（酒洗不犯鐵器）　淮熟地（酒洗同上）

升麻（去鬚）　乾葛（剉片取末白者佳）

藿香（水洗去泥土味香者真）　白山藥（微炒）

防風（去蘆）　荆芥（去梗取穗）

羌活（去泥土并蘆）　獨活（去蘆）

薄荷（去梗）　黄芩（去蘆水煮濟上部用酒拌炒）

条芩（水煮堅實者是腐者用）　桔梗（去蘆頭炒）

天花粉（白色者佳去油色）　玄参（去老根）

白芷（水洗不宜見火）　蒼术（米泔浸後用芝麻拌炒茅山者佳）

厚朴（紫實者佳薑汁拌炒）　紫蘇（葉梗紅色者佳）

前胡（去蘆）　硬柴胡（去蘆）

軟柴胡（去蘆水洗）　麥門冬（水洗去心）

天門冬（水洗去心）　杏仁（湯泡去皮尖雙仁不用）

桃仁（去皮尖并双仁）　黄連（去苗或用酒或用薑汁拌炒）

黄柏（去粗皮鹽酒拌炒褐色）　知母（去毛鹽酒拌炒）

山梔（去殼黄者拌炒大者名伏尸不用）　猪苓（去沙石醋拌炒）

澤瀉（炒）　五味子（去梗槌碎）

吳茱萸（去葉煮三四滚取出晒乾再炒去梗）　山茱萸（去核）

枳實（同麸皮炒）　枳殼（去穰同麸皮炒）

烏藥（不見火）　青皮（同麸皮炒）

官桂（味濃肉厚者良名肉桂形薄味淡者名薄桂能行經絡）　秦艽（洗去泥土酒拌晒）

續斷（去蘆）　桑寄生（忌火）

鼠粘子（即牛蒡子炒研用）　龍膽草（酒拌炒須洗去泥土）

紫蘇子（去泥土微炒研末）　蔓荆子（炒）

麻黄（滚湯内去沫）　南星（白礬皂莢同煮）

貝母（去心）　連翹（去梗碾）

金銀花　瞿麥

白蒺藜（去刺炒）　紅花

牡丹皮（水洗去梗骨）　地骨皮（去梗水洗）

阿膠（蛤粉炒或生用）　百合（水洗）
茵蔯（去梗不宜見火）　紫菀（去根）
牛膝（去老梗酒洗）　杜仲（去粗皮塩酒拌炒斷絲）
檳榔（微炒）　大腹皮（黑豆汁煮晒乾再炒）
玄胡索（微炒）　香附（炒黃或用童便醋塩水浸任用）
辛夷（去蒂）　蒲黃（炒或生用）
蔔子（炒碾碎）　兜鈴（去筋膜）
江子（去殼去油即巴豆）　乾薑（或煨或煆灰用）
木鱉子（去殼）　皂角刺（酒拌炒）

皂莢（去絲筋）　猪牙皂角（炙）
砂仁（微炒研末）　肉果（糯米粉搜糰包入煨熟透亦可剉片以帋包打去油用）
木香（不見火）　天麻子（去殼）
苦參（酒拌炒）　冷飯糰（米甘洗木搗碎之忌鐵白者生紅色者能殺人）
萆薢　山查（研碎炒磨末去子）
神麯（炒黃色）　麥芽（炒）
白扁豆（炒）　香薷
滑石（碾末水飛）　大黃（或生或酒煨或蜜水浸煎）
寒水石（或生用或煆）　車前子（炒）

遠志（甘草水浸去骨）　細辛（不見火）
藁本（去蘆不見火）　石斛（去頭毛酒浸蒸晒乾）
赤根（即麻黃根止汗）　天麻（明亮者佳）
三稜（醋拌炒）　蓬朮（醋拌晒炒）
附子（炮）　白芨（川產者佳）
白蘞　何首烏
威靈仙（酒洗忌茶）　牽牛子（去皮取末）
殭蚕（炒）　薑黃
槐花（炒）　牛膠（或生用或麩皮炒）

五加皮（酒拌炒）　丁香（大者為母丁香去蒂）
淡竹茹（淡竹先刮去青用第二層）　海桐皮（不見火）
益智　甘菊（眼科用酒拌晒）
射干　薏苡仁（炒）
木瓜（紅色者佳）　瓜蔞仁（去殼）
地榆（水布揩淨）　牡蠣（火煆童便浸再煆）
川烏（炮）　菖蒲（九節者佳）
蟬脫（水洗去土）　款冬花（去梗）
茴香（忌火）　麻子（研）

酸棗仁（去殼取仁微炒）　茯神（去皮木）
白鮮皮（去梗）　川槿皮（去粗皮）
桑白皮（去黃皮炒或蜜炙）　甜瓜子（微炒破中瘡不可缺）
枇杷葉（布揩去毛蜜汁拌炒）　艾葉（去梗）
玄明粉（即朴硝冬天用白蘿蔔煮三沸取出傾入紅瓦盆內露一晨取開亮者又如法製用甘草湯煎取之）　芥菜子（晒乾根）
鳳仙子（微火炒）　黃蜀葵子（微炒）
馬鞭草（去老根）　稀薟草（去梗）
麝香（不宜見火藥店多將混沒多攙假拔毛熏研末埋）　鹿角（火煅）
犀角（銼或用水磨）　羚羊角（銼）

冰片（客商多有將硝和之火上燒起是硝香者是也）　雄黃（成石者不宜用）
硫黃（青色者不宜用）　牛黃（入口嘗香後香甜者真）
珍珠（入豆腐煮伏時）　輕粉（明亮輕浮者真）
五倍（去內蛀窠）　絨灰（用羊絨大紅絨煅灰摻藥內用）
人中白（煅）　雞內金（即雞肫內黃皮焙乾研末或煅灰存性用）
白礬（或生或火煅）　韶粉（即面粉）
樟冰　風子（去殼取肉）
乳香（箬葉上慢火炙黃色候冷研方細今有假者似之）　沒藥
血竭（香紅色者真屁氣者假）　孩兒茶

蟾酥　菉豆粉（微火焙乾水調搽瘡內用）
辰砂（水飛）　青靛（散者佳成粗者有石灰埋）
膽礬　穿山甲（灰火內炮）
昆布（水洗去沙土圓藥中用醋煮加薑汁）　海藻（水洗去沙土用烏豆煮乾研可用）
續隨子（去殼去油）　琥珀（拾得芥者真）
銅青（火上微煅）　金箔（多有假者）
赤石脂（粘舌者佳）　蛤粉（紫口蛤蜊煅灰研末）
硇砂（去石即桄砂）　龍骨（火煅）
海螵蛸（去塵土）　鱉甲（或煅或醋炙）

龜甲（童便浸七日長流水洗淨醋煅酥潤之）　花蕊石（火煅醋淬）
象皮（剉片炙）　丁皮（不見火）
橘葉（洗淨剪碎）　橘核
皂莢子　澤蘭
旋覆花（去蒂）　谷精草
細茶（去梗）　天竺黃（今有假者以化過人骨代）
蘆薈（水中兩切相移近者真）　草決明
石決明　冬青子（飯上蒸）
白冰參　紫花地丁

附子　不可輕用

附子味辛甘氣温大熱有大毒　製法以童便煮而浸之再用文武火以烈其毒且可助下行之力入鹽尤捷此佐使之藥通行諸經其性善走而不守浮中沉無所不至陽中之陽故行而不止用之得宜有奪旗斬將之功用之不宜有殺身殞命之禍每人參一錢為君止可下附子一二分為使再加甘草以解其毒内外之症遇嚴寒時候脣口沉塌四肢厥冷夾濕疼痛踡躄拘攣膝痛不能行步腰脊風寒伏陰傷寒方可下附子不審陰陽虛實一槩用之使人服后火鬱中焦氣鬱下焦咆哮喘急頃刻而斃凡用附子者其可不細審乎

解附子毒令多汲新水連飲数碗遂大嘔洩方解其毒此又不可不知也

但醫術淵奥皆臻要妙之門方法宏深盡藏幽微之理噫余非敢誇言立論但志在養生心存濟物况子幼家貧若此書秘于一家則公人之念泯矣遂校正之增衍以待來學

## 總論病家大畧

夢麟

夫人之身配天地陰陽善攝生者須飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱則榮衛周流六淫無自而入何病之有不善攝生者以酒為漿以妄為常起居不謹飲食失節形氣損傷六淫之邪相侵則醫藥之道作矣故莊子有養生主篇蓋心為吾身君主之官神明出為養生者所以養此心也脩心養性之術既不能習於未病之先調攝保養之功又不能察於已病之際夫既病矣須要安常處順視富貴如浮雲恬澹心志怡養精神不妄想不遷怒不作勞即有勿藥之喜若心猿意馬戚戚于功名孜孜于貨利瑣瑣煩惱汲汲榮辱病已在身心不在病或勞心或勞力而君主之官昧為五神失位六賊內戕欲疾之愈也得乎清真子曰大凡人臥病即于胸前寫一死字則百般思慮俱息此心便得安靜勝如服藥此真無上妙方也是故醫書云惟富貴之人從生至長無敢逆其意及其病也將平時所畜醫書看得一二便要誇言立論考訂醫人以是為非以非為是掘強爭論不知病之淺深脉之虛實藥之寒温若遇諂諛貪

利之筆心先自歎拱手聽命惟言是從不敢所論妄投藥劑輕用針刀日久傳変遂致病者势益危篤雖扁鵲復生不能治矣乃若直道醫人精思病源酌古准今與一藥而愈以奏回生之功苟不見聽則飄然而去肯狗情哉又有病者不肯服藥煎成傾于地徒為虛語應答反言醫之無功及至斃也眞情發露與醫何干故東坡先生有曰吾平生求醫已于平時默驗其工拙至于有疾必先盡告以所患而後使之診視使醫者了然知厥病之所從來庶病証先定于心而脉之疑似不能惑也

故雖遇中醫療疾亦能常愈吾求疾愈而已豈以困醫為事哉斯言眞警迷濟世之箴規也近世以來多隱所患而試驗醫之能否醫亦不屑下問挾己之長而治其病從前至後其誤益多矣與醫何尤實病家自悞之也故龍虎經云錬得陰陽元氣足始知成立自虛無黃庭經云修真之士窮造化之原知升降之路安神定息一念不生湛然無慾其氣週流自然造化老子曰綿綿若存用之不勤太素曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危因世人不知返本窮原之道故聖人指性命之

根令人歲神聚氣還返往來歸根復命也故人之生也賦性于天養性于地百年之身從此可保內外求証何由而生岐伯曰恬憺虛無病安從來一有拂鬱諸病生為正謂此也養生之士宜詳察之并附六不治于後

驕恣不論于理一不治　輕命重財二不治

衣食不週三不治　陰陽并藏氣不足四不治

形瘦不能服藥五不治　信巫不信醫六不治

## 醫家切戒

夢麟

聖人繼天立極憫黎元之疾辨察百藥以治百病由是有[illegible]之學而醫道興焉上醫治國中醫治人下醫治病[illegible]不治已病治未病不治已亂治未亂此治國治人[illegible]道盡之矣其下醫治病殆猶良將之用兵也量敵而後進慮勝而後會察色觀形便知臓腑之疾臨機應變務度緩急之宜今古不同世俗亦異若執古方以治今病猶拆舊屋以搆新屋不經匠手不可適于用矣況醫司人命任大責重不可輕易臨病之際兢兢業業心

到眼到手到因病立方因方用藥視人之疾猶已之疾不別其貴賤親踈推廣天地好生之德貧則施惠富無苟取推誠拯救務俾此業為仁術勿為盜蹠刼人于道路夫盜亦人也為貪心所使遂至汚名喪命醫乃九流中之高術人稱曰醫師豈可使下同于盜哉近世有初學之輩不讀内經百家群書輒就行醫開肆不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法識病用藥工中之甲能窮素問病受何氣便知用藥當服何劑苟圖富貴一遇病家即出大言警嚇生死噫渠既

病矣生死未可卜也所仰望者在醫人耳若果可治務要盡心日夜思所以愈之苟不可治亦更精思思之不可遂以不可治告之使彼早備送終之具免其倉卒失礼以致終天之恨若懷利心進退惑亂謂之行醫可乎近覩博奕好飲者流連勝負不知病家之急焚財肥家者較計豊嗇遂忘濟世之心莊子曰盜跖亦有仁義礼智信今醫人乘急取財猶甚于盜賊矣是可忍也孰不可忍也国語云無德而福隆猶無基而厚墉也壞無日矣魏子云薄氷當白日聚毛遇烈火所以喻今之祖父

聚歛而子孫輕廢之謂也理富言採金于千仞之山而人不顧其覆壓之禍者利于金也求珠于不測之淵而人不顧其沉溺之患者利于珠也此乃貪夫所徇醫以活人為業豈可徇利乎人而無恒不可以作巫醫巫所以禱鬼神干係雖輕然不誠則鬼神難格巫固非可倫于醫巫尚不可不盡誠況醫司人命其可視之如戲而不恒其德乎有陰德者天必報之苟望報而為算亦非仁人君子之用心矣余賴祖父之業勉承斯業然濟人利物之心竊有志焉毋以不孝為耻恐蹈夫孤陋寡聞

之域斯則余之曰兢兢焉者也予性甚粗予言偶得素多取友於人爲高明君子同道之士俯念蠢直不我咎也

### 醫家七診

一　靜其心　存其神也　二　忘外意　無思慮也

三　均呼吸　定其氣也

四　輕指于皮膚之間探其腑脉　浮也

五　微重指于肌肉之間取其胃氣　中也

六　沉指于骨上以取其臟脉　沉也

七　察病人脉息數來也

---

### 玄門脉訣

[illegible]

### 十二經

呼爲陽而應天　[illegible]

呼出心與肺　[illegible]

### 絡直訣

[illegible]

吸爲陰而應地　[illegible]

吸入腎與肝　[illegible]

已上十二經絡配合十二時以決死生學者須心細玩之



脉胃膀胱並屬陽道非但三焦及大腸小腸五藏之源氣治行於陽凡焦者有名無形尺主下焦小腸至足陽明

關主中焦及腰背脊一寸上寸主上焦頭皮及毛盡手陽明

臟喻山腑喻道收陰陽之道合於道五臟之氣候是以黃帝論氣之行著必分勇怯故扁鵲治病忌神明之失守叔和論脉辨性氣之緩急欲療病人先察其源五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活然用芳草石藥必察緩和看外證得神者昌失神者亾外證面塵色脫也脉診得沉細而微難治也

黃帝曰醫家之用功者以專持毒藥不察病之淺深而不問其情則精神不進志意不治故病不可愈內經所以閉戶塞牖数問其情夫用大毒之藥若善藥不能取効不得已而用之可也

脉息節要　七表八裏（浮芤滑實弦紧洪乃七表也微沉緩澁遲伏濡弱八裏也）

七表為陽（象易少陽之数也）

浮脉者輕手廼得重手不見脉見諸陽為表熱諸陰為表寒（浮動在肌肉之上浮爲陽病在表也）

芤脉者浮大軟而按之中央空兩邊實也（脉中間空虛沉主熱甚）

滑脉者不澁也多與實数相兼為病熱（或滑兼遲病寒也）

實脉者大而長沉浮皆得而数陽熱甚也

弦脉者耎虛而滑端直以長也（弦如張弓如琴弦也弦主風）

緊脉者不緩也或如轉索或如切繩者（緊脉主痛）

洪脉者極大而数舉按滿指實熱之極甚也

八裏為陰（象易少陰之数也）

微脉者若有若無極細而軟也多兼於遲主於陰寒微沉緩濇遲伏濡弱見諸陰脉也（不可便言為寒當以標本明之）

沉脉者輕手不見重手廼得動在肌肉之下也（沉屬陰病在裏）

緩脉者縱緩而不緊似遲而小疾也（緩而遲為寒緩大而長熱）

澁脉者澁而不滑也或如刀刮竹或澁而止住者（澁主心痛）

遲脉者一息四至已下也（氣虛損故脉遲病寒遲而不能数也）

伏脉者脉附於骨（附親迫也）沉之甚也（伏主物畜於內積飲不散也）

濡脉者按之似無而率指無力也（有似微弱主極冷多熱於足）

弱脉者軟虛而無力也（弱主虛冷必熱微而遲也）

四時平脉

春弦　夏洪（一云數一曰鈎）　秋毛（一云濇一曰浮）　冬石（一云沉）

○第二明當藏之病

其液汗　心風嗜怠　心風寸浮数　心風成癲癇

○從肝腎起

其聲言　心氣痛甚　心氣寸緊　心氣成伏梁

○從脾起

其味苦　心热狂走　心熱寸焦数　心熱風狂走

○從肝虛飢

其臭焦　心冷死矣　心冷寸沉涸　心冷成痰

真心痛手足冷

其色赤　心虛嗜驚　心虛寸濡弱　心虛成恐惧

右上五般之病除虛不炙餘四種並炙心俞第七腓相去二寸二分量病輕重上至一百下至三廿一七若從起處炙之亦差餘並做此也不須更叙（腓与椎同音第七腓第七脊之骨也）

○從肝起

其液泣　肝風筋脉痠痛　肝風關浮数

肝風瘰癧頸筋急

其聲吽　肝氣左脇痛　肝氣關緊強

肝氣風癖氣左脇妨

其味酸　肝熱骨節疼　肝熱関洪盛

肝熱成精目赤骨節煩

其臭死　肝冷不食菜吐水　肝冷關沉細

肝冷有痰飲清風

其色青　肝虛多恐懼　肝虛関芤濡

肝虛恐懼無力

右上五般病當炙肝俞從大腓下行至第九腓夾腓腓相去二寸三分候本藏脉或從餘藏來當炙餘藏還量老少病若重或輕量事而制之除虛不炙也

○從肺起

其液涕　肺風皮膚生瘡　肺風寸浮数

肺風鼻塞瘡疥

其聲哭　肺氣成上氣噎　肺氣寸緊数

肺氣上喘氣膈

其味辛　肺氣成瘕嗽病　肺熱寸洪濇

肺熱頭面生疱瘡

其臭腥　肺冷成面墨悲　肺冷寸沉細

肺冷右脇生癖氣

其色白　肺虛鐃滞皮痒　肺虗寸芤濡

肺虗鼻中肉結生

右件五般病除虗不灸餘並灸之從大腓下行至第五

腓夾相去二寸三分若從餘藏未候當藏脉量老少輕

重制之

○從脾起

其液涎　脾風旋重　脾風關浮数

脾風癱緩右邊多重

其聲歌　脾氣皆妨　脾氣閉緩實

脾氣皆痛久成瘦病

其味甜　脾熱鐃聯　脾熱關洪数

脾熱成黄亦為三消

其臭香　脾冷吐水　脾冷関細濇

---

脾冷風入尺胃痰飲脹満

其色黃　脾虛来欠　脾虛関浮扎

脾虛惡熱嗜饑嘔

右件諸病除虛不灸餘並須灸第十一腓兩邊相四寸

半季肋盡處即是隨病輕重而灸之若從餘藏来當候

脉而灸之量不妨藥治

○從腎起

其液唾　腎風旋吐痰　腎風尺浮数

腎風痰牽急

其聲呻　腎氣腦脊疼　腎氣尺浮緊

腎氣背脇疼煩

其味鹹　腎熱骨煩疼　腎熱尺洪数

腎熱陰毒時行

其臭腐　腎冷腰脚疼　腎冷尺沉細

腎冷腰冷痺

其色黑　腎虛頭足痠　腎虛尺浮弱

腎虛多風耳聾

右上諸病除虛不灸餘病並灸腎俞大腓下行至第十

四脽兩邊相去四寸是內腎又夾此脽相去七寸八分斜下是外腎俞亦主膀胱俞也不妨樂治之恐不審細仍為圖記之後人背面

## 第三五藏相入

肝病入心

肝風入心　為癇亦戍瘰癧項筋急頭痛舌縮壯熱

肝氣入心　為痃癖氣痛甚難忍左脇下痛

肝热入心　項筋急目赤舌乾火聹嗜驚恐

肝冷入心　為吐酣水飲食不下手足冷冷如鐵名心痛

肝虛入心　嗜驚惡罵躁暴不歡聞人語聲則叫呼

右此五般之病除虛不灸餘並灸之當候之脉從何生灸之即不錯也無須服藥大段灸之當候之脉穴同上

心病入亦推上子不合傳母之逆也病即難差

肺病入心

肺風入心　咳嗽唾血身體戰掉颼颼不安皮膚（搔痒瘡痒）

肺氣入心　胷中病痛取氣短卧不安胷背痛悶不已

肺热入心　嗽逆吐血皮膚生瘡喘息飲短面赤

肺冷入心　目中多淚悲思不已面目青黑色不常

肺虛入心　悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不灸量病輕重觀其老少斟酌之不妨服餌

心病入肺

心風入肺　皮膚生瘡白層白癜翻花疥癩肉中生結子

心氣入肺　胷背热悶胷前及背上热結子

心热入肺　皮膚热痰手足煩悶胷中及口生瘡

心冷入肺　雞皮白膚面無血色尫弱怯惧無色

心虛入肺　啼泣悲哀目中冷淚鼻塞口乾悲思

右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脉輕重老少藥性命時制之

腎病入心

腎風入心　為癇拂然而死輕則眼旋目前生花

腎氣入心　為痃癖氣動而改变為氣病面黄

腎热入心　為狂顛之病輕則骨煩名陰毒時行

腎冷入心　手足冷如鐵是名真心痛甚則死

腎虛入心　四体昏昏喜汗出足無力困悶昏昏

右此五般病亦候其脉除虛不灸視老少患状斟酌不

得不依

心病入腎

心風入腎　脚心熱吸吸無力手足骨節痠疼頭痛

心氣入腎　連臍痠痛兼膀胱及腰脚痛不可忍

心熱入腎　困不知痛處心意躁煩悶不耐痛

心冷入腎　手足冷如鐵痛甚即死名真心痛

心虛入腎　背吸吸耳聾目昏健忘嗜旋無力

右上諸病餘並灸之除虛不灸服藥量病老少衰弱斟酌俱本俞（俞音庶穴也）

脾病入心

脾風入心　嗜嘔吐頭重眼前昏昏往往見黃黃暈花

脾氣入心　背膊妨心中悶悶妨滿不飲食兩脇妨

脾熱入心　饒唾涕目黃疸身熱惡心變吐昏悶

脾冷入心　脾中痰飲時時吐水胃脉脹不欲食飲

脾虛入心　食了旋肌心中往往多熱來嗜欠臥

右上諸病除虛不灸餘並任灸量老少衰弱斟酌之不妨藥治

心病入脾

心風入脾　生热結子在肉中極則成疱瘡癤瘍

心氣入脾　胃脾中痛自臍上至心難忍則死

心热入脾　及热皮膚暈極風消渴消中消腎

心冷入脾　飲食不消背膊妨悶胃中細氣

心虛入脾　好嗜卧四體昏昏不知痛處無力

右上諸病除虛不灸餘並灸量老少衰弱臨時制之不妨藥治

腎病入脾

腎風入脾　手足戰掉四體不安習習昏困無力

腎氣入脾　腰脚背疼及胸兩脇妨痛甚膈氣

腎热入脾　[illegible]睡困重不知痛處所在面腫浮也

腎冷入脾　腰背疼及痺脚氣疼白虫蛔虫

腎虛入脾　腰脚無力虛吸吸四體困悶頑痺

右件諸虛不灸餘並任灸但且灸腎俞脾俞自若

肝病入脾

肝風入脾　肉中生結子瘰癧疱丁瘡及花等瘡

肝氣入脾　左右脇下妨痛甚則為顆瑰痛矣

肝热入脾　背脊上热腫成热癰極則成膿

肝冷入脾　好吐醋水不欲喫菜及水亦不欲也

肝虚入脾　喜太息来欠咨嗟唉煩悶擾也

右諸病除虛不灸肝合脾暈老少衰弱以意消息脾病入肝無異

腎病入肺

腎風入肺　頭旋鼻塞鼻涕疼頭重脚痠

腎氣入肺　肺胷脊欲得槌嗽逆無氣力

腎热入肺　皮膚热痛嗽逆戰掉久差風上氣

腎冷入肺　悲泣涕哭面無血色力微少

腎虚入肺　耳聾塞口乾痠疼腰膝無力

右此五般病除虛不灸餘並灸量其老少衰弱輕重制之

肺病入肝

肺風入肝　嗜卧丁瘡翻花結筋一聚生惡瘡

肺氣入肝　百脉脹口鼻青色行卧不得

肺热入肝　骨節麁肉生結子後為瘡也

肺冷入肝　鼻目多水出淚消消不絕肉帶青色

肺虚入肝　常驚怕狀似怯人筋中疼痛也

右此五般病除虛不灸餘並灸仍服藥勿使不慎口當使其脉勿使麁心量病輕重而制之腎病入肺無異前也

脾病入肺

脾風入肺　痕嗽生瘡在胷及頭面疥癩等瘡

脾氣入肺　或噎病膈氣上喘瘦病背膊中妨

脾热入肺　惡腫多患膿血疥癩是也

脾冷入肺　又胃嘔吐胷中疼心鏡吐稀唾等

脾虚入肺　皮膚白色搔痒欠嘔等是也

右上諸病除虛不灸當使其脉量病輕重從名治之

明藏府相入

脾病入胃

脾風入胃　胃中热惡心喫飯無味鼻中覔香氣（㥪吐水）

脾氣入胃　胃中妨悶喫食即脹滿妨勿食白麵餃之

脾热入胃　喫水多心热面目黄久不差成三消之病

脾冷入胃　胃好吐酸水不飲食心中痛久而成呟蝟

脾虚入胃　胃好可憶痔痔心悶欲食不喜食来欠多

右上諸病除虛不灸餘灸灸四支須灸脾俞差但依病

當量之胃俞第十二椎兩邊二寸三分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱　小便無度頭旋惡心眼昏腳痠疼

腎氣入膀胱　膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛橫伏結氣

腎熱入膀胱　小便難赤目精痛皮膚寒熱頭痛

腎冷入膀胱　遺溺氣腰痛白虫蛸帶下

腎虛入膀胱　令人無力房事不興腦轉耳鳴

右上諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊二寸三分是量老少衰弱燕治之臨時而制

心病入小腸

心風入小腸　腸鳴作聲或時激痛小便秘澀頭項痛

心氣入小腸　令人臍下疞痛赤白痢不祕澀難痛（疞音絞）

心熱入小腸　令人渴血熱悶煩痛腸中如湯不安

心冷入小腸　令人渴水穀不化臍中疞痛不知無計

心虛入小腸　令人神魂狂亂怯見恍惚多語悶攪

右上諸病當灸小腸俞第十七椎兩面二寸二分并灸心俞第五椎燕治之無妨量老少衰弱臨時制之胃中之病亦相透得病因種種不同治雜執法

肺病入大腸

肺風入大腸　腸中宛轉聞不欲食食即似吐吐清冷

肺氣入大腸　腸中痛不已成妨悶作聲脹滿不食

肺熱入大腸　令人糞色赤稀無度而不堪近

肺冷入大腸　令人腸中水穀不化名為水痢瀉之

肺虛入大腸　令人面色白胞肉枯瘦雞皮有鱗

右上諸病當灸大腸俞夾第十六椎兩邊二寸三分亦須服藥

肝病入膽

肝風入膽　常吐黃水爪甲及面並帶青色項痛

肝氣入膽　膽脹滿左脇下痛并髆脇中痛者也

肝熱入膽　目赤痛嗜驚叫呼面色惡為無度

肝冷入膽　不欲食菜如吐酸水左脇中第五肋中（妨悶）

肝虛入膽　嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右諸病當灸膽俞夾第十椎兩面二寸三分老少衰弱斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和熱氣相虛而得也因虛而風熱氣展轉涌入臟腑相薰成久而不醫遂重難差輕而易差便為良醫有重者而難瘥謂之

小手此盖謂自不識病源養之成重非醫之過也鍼有一月之功灸有終身之効藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六腑之病灸治五臟之病五臓主皮筋骨血其方内有藥重處用藥一件為治應藥脉流行無非灸道而貫之達者思矣

# 腑臟正面圖



大小腸九盤

喉達氣出入管也〇咽呑物為把要嗌也

肺金也聽陽降之而入故其治在右　肺體左而用右

　金胎於卯木　乘離生之

心君也居肺之下有膈膜用脊膂護君相

　木胎於酉金　坤脾生之

肝木也聽陽升之而出故其治在左　肝體右而用左

膽甲也氣始生十一藏取决于膽〇膻中氣之海三焦心包絡所居如天地之尊不係五行〇闌門大小腸會處泌别滲入水腸（水腸膀胱也）膀胱為胞之室津液之府

體左用右為虎　上接離下接坎中宮為媒
體右用左為龍　肺（魂肝升）　脾者為血氣之主持
肝（魄肺降）　魄者精氣之臣佐
魂者精氣之輔弼　心者神精氣之成化
腎者為專意之不移
五漏　憂喜思恐怒五者其實皆一心也
津脫者大汗　液脫者骨不利　凡此五者其脉
血脫者色夭
氣脫者目眯　精脫者耳聾　俱虛此其候也
精氣津液血脉六者其實皆一氣也

臟腑背面圖


胃脘
肺
肝
胃
脾
小腸
腎
命門
大腸
肛腸小留出處
一曰魄門

---

肺已下左側可見脾胃之所居


咽
喉
肺系
系脈之
肺
心
賁門
膈膜
胃
幽門
脾
心系七節
大腸之盤
小腸之盤
此一節謂之
一椎根脊椎

肺已下左側可見脾胃之所居以明水穀之傳受脾居胃上而與胃膜相連結覆小腸之上故胃之上口曰賁門迪引水穀之氣於肺播於諸脉胃之下口曰幽門傳導水穀之穢於小腸小腸之下至於闌門然後滓穢之物入於大腸水液之流入于膀胱清濁從斯而分矣

肺已下右側可見心系系于脊髓下通于腎


喉
咽
胃脘
肺系
結喉
心之系
七節
七節之旁中有小心此也
脊髓
肺
心
膈膜
胃門
肝系
胃上口為胃
脘下口也
脾系

黃帝曰七節之正傍有小心小心是何狀請以經正文言之內景云肺下右側心之系系于脊髓下通于腎心系有二一則上與肺連一自心入肺兩大葉之間曲折向後并脊膂小心連通脊髓于腎系通下見于第四圖其系從肺大葉兩間穿後兩脊正當七節間手厥陰心包主樞云脉出于胸中墟云大陵為心之原婁云手厥陰一陰也一名心主與三焦為表裏藏象云心下橫膈膜之上竪斜膈膜之下與橫膜相粘黃脂膜者小心也漫脂外筋膜如系與心肺相連者心包絡乃小心在漫處中非有形也

五臟系與心相通圖


上通喉門
上入肺中
心氣
心
膈膜
下系肝
下系脾胃
連肝膜
脾
肝膽
胃
下系腎
命門
胃下口自此而水谷
繇受入小腸

黃帝書云七節之傍（乃正視背骨之前便為傍非兩边之傍也）中有小心謂神靈之官也禁不可鍼刺刺則刺七節之間正與前相照亦為傍前後左右乃四傍也黃帝曰心形如未敷蓮花上有三毛中有七孔以通天真之氣乃神明之宇也藏真通于心心藏血脉之氣為身之君肺為華蓋心居此之下太素以小心作志心楊上善云脊有三七二十一節腎在七節之傍腎神曰志五臟之靈皆曰神神之所以任得名為志者心之神心為手腎為足皆少陰上下一經也

## 氣海膈膜圖


通肺
通心
通髓
氣海
膻中
膈膜
脾系
胃上口水穀自此入胃
肝系
腎系
其膜貫高遵脊髓通脊髓

黄帝云膻中者臣使之官喜樂出焉膻在兩乳間為氣之海也臍下一寸五分為氣海者生氣之海也父母之念合而成形天一生水為腎腎出臍下生為三岐任脉所發上衝過天樞至膻中三焦胞生氣之所會居焉所以為父母至尊不係五行男女身中之父母也以氣言之惟見其父不見其母靈樞云心主之脉起于胸中出屬心胞下膈歷絡三焦為表裏此命門相火與心主同胗于右尺午也氣血胸中同會所以有父母之称包主一名相火此坎之元氣與天五所[illegible]之榮氣混而為一充盈乎百骸綦絡乎一體睟于面盎于背血氣為人之神可以不謹養乎刺經云肝左肺右心表腎裏脾使胃市膈肓之上氣海居焉（氣者生之源生者命之主）故氣海為人之父母揚云心膈上下為肓心為陽父腎為陰母肺生氣心主血共榮衛于身故為父母

## 脾胃胞系圖


唇為飛門
齒為戶門
咽門
會厭為吸門
賁門胃上口也水穀自此入于胃
幽門為下口也水穀滓穢自此入于小腸
脾
賁門
幽門
胃絡
小腸

黃帝以胃為倉廩布養五臟故五藏稟氣于胃胃為五臟之本食入于胃脉氣流行通于四臟氣歸權衡以平氣口成寸以決死生又云飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合于四時五臟陰陽揆度以為常也此水穀氣味為養生之理也海云小腸下口泌別水入膀胱胞內上口胞却滲入膀胱下口出也仲景言胃口慄屎五六枚胃穀消水去形亡豈有之哉實在廣腸也故蜜導煎能及之指胃而言從陽明可下而言也觀者以意逆志斯得之矣

### 闌門水穀泌別圖



為龍曰大腸小腸會處為闌門闌隔也言闌約水谷從其泌別也其水谷自小腸承受于闌門以分別也其水滲灌于膀胱上口為溺便若谷之滓穢則自闌門而傳道于大腸故曰下焦者在膀胱上口主分別清濁也〇海云此箇膀胱上口內已有胞之系上口相附著而為一脂膜同接小腸下口矣便是膀胱有上口其實在胞之外却真是膀胱無上口也〇圖云大小腸會于闌門約水谷分前後小腸下口滲入膀胱上口丙與壬通此其內也又手足太陽為上下經此其外也一有形一無形內外相接而應脊骨空云督脉起于小腹以下骨中與女子入繫提此其孔溺之端也其絡循陰陽物合篡間繞篡後云此一端在古今傷寒辯惑後修明堂試大小腸會為闌門在臍上一寸（水分穴也）

右腎為命門主司精血并入小腸膀胱之系



平叔曰鉉（鉛精）者北方之正氣一點初生之真陽為藥母也北方之蟲坎二陰為龜地軸也一陽為蛇天根也陽生于子為大寶藏之命門者元氣之所繫出而在臍下通厥陰分三岐為三車升而上之高結元始降而為漏結而為鉛騰而至離補而成乾○雖云左尺為腎右尺為命門經又為神門其實左右皆腎也兩腎之中為神門神之與命陽也其脉在右手尺中者用也坎為腎之體如肺之體左而用脉在右肝之體右而用脉在左

內景云膀胱一名胞胞者鞄也以受水為津液之府故云膀胱者胞之室也又云胞鞄也鞄空也以虛承水液焉類纂云膀胱者胞之室也又云小腸下口泌別而水入膀胱上口又云下焦者當臍下當膀胱上口主分別清濁出而不內以傳道也又云闌門以分別其水則滲灌注入膀胱上口而為溲又云女繫胞其元始自心下系貫七節之傍其系曲屈下行挾兩腎之系下尾閭附直腸之右通二陰之間前與膀胱下口于溲便之處並行而出仍是精氣所泄之道若女子則子戶胞門亦自直腸之右膀胱下口相並而受胎也

海云古人有言膀胱有上口有下口滲泄只在闌門不言受盛之處即不甚詳且膀胱者即脂膜附著者形之物中間別無受盛若有上口下口水通闌門則當直出矣是殆不然闌門分別入于胞之上口胞別外脂膜便是膀胱上口胞內盛之別滲入膀胱當膀胱下口而出也胞即系而垂之與小腸下口相連于闌門處是上有口而下無口也膀胱即為脂膜而包裹其胞是上無口而下有口也不可言膀胱有上口也何以然經云胞痺者膀胱內痛按之若沃以湯澀

于小便王氷註云膀胱胞内居之此言足以知胞盛之而滲出外下入于膀胱膀胱下口中水溺得以出也又云胞遺熱于膀胱則為遺溺癃閉以是知胞與膀胱二也但胞在膀胱之内耳前人云膀胱有上口非不知無也所以言之者但恐說六府處更言胞字則辭理差混故只言胞上口為膀胱上口也讀者當識之胞受水而盛之胞自闌門而受納膀胱包裹其胞而外為脂膜豈復有上口耶胞既盛水而無下口則膀胱受胞之浸滲則有下口也脂膜垂墜粘連隂腸之道踈氣收禁而閉之至于盈則氣化而洩得以出也故經云膀胱者津液之府氣化則能出也以是知房室過度氣要泄下而精氣津液洩便妄出不禁而遺失腎由是而絶也存眞者不可妄于施不可不思本圖既言膀胱為胞室足以知膀胱盛圍胞也判然為二物也昭昭然矣雖云二物其體上下附著中間受滲兩為一也

經云藏有五心肝脾肺腎也府有五膽胃大腸小腸膀胱也三焦胞絡天地也計之十二矣又胞為一藏居膀

胱中是十三也又靈蘭云十二藏相使貴賤何如又云膻中者臣使之官喜樂出焉是十四也此之外更有何藏乎

答曰藏有十五也惟胞有二焉膀胱者胞内居之滲泄洩溺男子皆然女子受胎又為一胞經云命門者男子藏精女子繫胞此胞也其元始自心下系貫七節之傍其系則曲屈下行挾兩腎之繫下尾閭附脂腸之右通二陰之間前與膀胱下口洩溺之處並行而出乃精氣所泄之道踈若女子則子户胞門亦自直腸之右胞外膀胱下口相並而受胎也故經曰女子胞繫又云胞衣不下是為疾也胞有二可知此胞也包藏胚胎形質故云胞也○又經云右腎為命門其府則胞門子户女子胞者地氣之所生也藏於隂而象地故曰奇恒之府若此不云一藏則胞絡一無形矣一奇恒通入府矣

難經謂十二大經絡陽蹻陰蹻脾之大絡是為十五靈樞云任督二餘十五是十七也乎又為胃之大絡名曰虚里貫膈絡肺出於左乳下也其動應衣宗脉氣也是

為一十八焉又難經之奇經陰陽二維二蹻衝任督帶除二蹻與任督餘二維與衝帶合上十八是總二十七也俱在十六丈一尺中一日一夜周身之度也此為外景

經云手少陽三焦相火為外一府右腎命門為相火心胞主同肜亦名相火腎為生命之門常先身生一出而治在臍下分三岐上衝夾臍過天樞上至膻中兩乳間元氣所繫焉內一藏會三焦為胸中奇也又足三焦太陽之別並太陽正路入絡膀胱約下三焦通從頭至心

心至臍臍至足上中下三焦為言也生于內起于外主于中衢于表其實真元一氣也（男子得陰以生先生右腎故以右為命門女子得陽以長先生左腎故以左為命門乃正也非反也）聖濟經云至陰內景自然清淨至陽外景自然昭融葆其光襲其明精之又精神之又神可以相火可以命物變化云為可勝既哉（陽本根于陰陰本根于陽復與姤也是右為命門也一身之命門者腎為命火為用此二命門者離之用無形也所以命門者三也）活人既言傷寒諸家方論不一獨伊尹仲景之書猶大經也其餘諸子百家時有一得要之不可以為法此詔使是徧正學活法也金域百年惟潔古老人暨東垣先生可以到此

确龍云口廣三寸半脣至齒長九分齒後至外猒深三寸半大容五合舌重一十兩長七寸廣二寸半咽門重一十兩廣二寸半至胃長一尺六寸喉嚨重一十二兩廣二寸長一尺二寸九節（生氣入肺而能開胃者以其咽門之上便為胃口與肺相並而系胃也）手三陽各五尺計三丈手三陰各三尺五寸計二丈一尺足三陽各八尺計四丈八尺足三陰各六尺五寸計三丈九尺兩蹻脉從足至目各七尺五寸計一丈五尺任督二脉各四尺五寸計九尺凡此總八十六

丈二尺兩刻一周晝夜行五十度一萬三千五百息行八百八十丈活人漏刻圖明註四刻一周即是晝夜行二十五度六註難經亦云錯註如何前人未之改也

逐日人神不宜針灸（凡一十五款）

十干日人神

甲不治頭　乙不治喉　丙不治肩　丁不治心

戊不治腹　己不治脾　庚不治腰　辛不治膝

壬不治頸　癸不治足

鍼灸吉日

丁亥　丁卯　丁丑　甲辰　甲申　甲戌　丙子

丙午　丙申　丙辰　壬子　壬戌　壬午　庚午

辛巳　戊戌　戊申　己亥　己未

鍼灸凶日

每月　初六　十五　十八　二十三　二十四

二十八　小盡（即小月盡日也）療病令人長肉不安

男忌日

壬辰　甲辰　乙巳　丙午　丁未　辛未（不宜除日）

女忌日

甲寅　乙卯　乙酉　乙巳　丁巳　辛未（不宜破日）

男女忌日　除破滿閉日

白虎　黑道　血支　血忌　月厭　月殺　月害

月刑　獨火　火之日

天醫藥日　正月丑　二月寅　三月卯　四月申

五月卯　六月午　七月未　八月申　九月酉

十月戌　十一月亥　十二月子

逐月血忌日　正月（丑　二月未　三月寅　四月申　五月卯　六月酉　七月辰）

---

○四季人伸、（八月戌　十二月子）　九月巳　十月亥　十一月午

春左脇　夏在臍　秋右脇　冬在腰

○九部人神（一歲為始起于臍一年行一位週而復始）

臍一　心二　肘三　咽四　口五　頭六　脊七　腰八　足九

○十二部人神（一歲為始起于臍一年行一位週而復始）

心一　喉二　頭三　肩四　背五　腰六　腹七　項八　足九　膝十　陰十一

股十二

○十二支日人神所在忌鍼灸

子日（目）　丑日（腰耳）　寅日（胸）　卯日（脾鼻）　辰日（腰膝）　巳日（手）

午日（心）　未日（頭手）　申日（頭背）　酉日（背）　戌日（面頭）　亥日（頭項）

○尻神訣

一歲坤叉踝　二歲震牙腨　三巽頭口乳

四中尾尻肩　五乾背面耳　六兌手膊連

七艮腰項內　八離膝肋邊　九坎脚足上

肘肚亦依然（一云十歲又復原）

○逐日人神訣

一足大指鼻柱手少指　二外踝髮際外踝記　三股牙齒

肝亦同　四腰胃手陽明是　五口遍身足陽明　六手却無

兩育倚七內踝并氣衝膝八脘腹內與陰裏九尻足上
并足脛腰背內踝足趺止

○五行相生

木生火火生土土生金金生水水生木

○五行相尅

木尅土土尅水水尅火火尅金金尅木

○五善

動息自然　飲食知味　膿潰腫消　大小便利　語聲清朗
神采精明　色鮮不臭　体氣和平　五善見三　可保安寧

七惡

煩躁時嗽腹中痛面目四肢悉浮腫聲嘶色惡唇鼻青
肩背不便四肢重泄瀉作渴皆無度氣喘短粗常嗜臥
黑睛緊小白睛青目視不正飲食吐毒加腫痛瘡口黑
小便如淋溺常澁此為七惡見四危性命其間難保得

相死生

人雖久病不怕瘦削但十指紅潤準頭明朗雖危不死
若天庭黑山根青灼衣生兩耳髭鬚似鉄條眼光流射
出身死在三朝十日中指甲黑棺材紋見朝病暮死臥

---

中氣喘吼者易死臨中開眼者难生

訣病生死（古亦謂之四診）

病人眼有神氣者生氣脫者死天柱正目活者生目低
項下死瘦而不枯悴者生肥而無血者死有喜容而色
正者生悲啼者死舌濡唇者生舌短縮者死風而口禁
者生開口者死神光上黄明者生暗者死黑氣如散髮
者生聚者死黄紅如雲者生黑青氣斜入口者死氣光
而長者生短者死語聲響滑者生短澁者死人中潤澤
者生乾枯者死

寒熱內外辨

身熱欲衣被者　熱在皮毛寒在骨髓
身寒欲去被者　寒在皮毛熱在骨髓

怪脉

雀啄連來三五啄　屋漏半日一點落
彈石來硬尋即散　搭指散亂真解索
魚翔似有亦似無　蝦遊靜中跳一躍
寄語醫家仔細看　六脉見一休下藥

內診其脉外視其症內外叅之生死立應學者究心焉

五臟死

心絕一日死　何以知之臺眉喘廻視遲口如魚口（死夭）

肝絕八日死　何以知之面青但伏視而不見（泣出如水不止）

肺絕三日死　何以知之但口張氣出而短鼻色黑

脾絕廿日死　何以知之臍滿泄痢不覺出足腫

腎絕四日死　何以知之齒而黑目中黄腰欲折（白汗流）

五體敗

骨絕五日死　何以知之脊痛腰中重不覺翻覆耳

肉絕六日死　何以知之舌腫溺血大便赤然也

筋絕九日死　何以知之手足爪甲青叫呼駡而不休

脉絕三日死　何以知之口鼻張氣但出而短者死

腸絕六日死　何以知之髮直如麻乾曲身不得者死

五證死

肉及足卒腫一證　面腫蒼黑肝敗不堪治一日死

眼枯陷二證　手掌并缺盆骨滿敗一日死

聲散鼻張三證　脣反無理肺敗不治五日死

脣騫齒露四證　臍腫滿者脾敗不治十二日死

氣喘語遲五證　陰陽腫不起腎敗三日死

---

五色死

面赤目青死　面青目黄死　面黄目黑死

面白目黑死　面黑目青死

五聲死

氣聲絕腹脹如鐵脾絕死　妄語錯亂神去死

語聲散魂去身無肺死　語聲高魂去身無肝死

長呻吟志去身無腎死

五體死

頭重嘔吐一体死　足重心腫二体死

手爪甲青三体死　脚爪甲黑四体死

膝大如升五体死

五竭

髮直如麻是血竭　足爪甲青筋竭

齒燥如熟小豆骨竭　鼻張氣促出氣竭

耳鼻脣焦黑肉竭

五傷死　五傷脉不療

房事無度傷腎　傷腎左尺脉如屋漏解索雀啄（彈石）

食飽醉卧傷脾　傷脾右關如蝦遊雞足踐地魚翔

言無多憂傷心　傷心左寸尺如斷索雀啄屋漏

嗜食鹹熱傷肺　傷肺右寸夢雨之狀亦如弹弦之狀

用力無度傷肝　傷肝左関如擊弦之狀

五不稱脉

脉大而息細死　大人脉如小兒脉死

小人如大人脉死　息大而脉小死

熱病而脉沉死

五視死

病人目上看者死　病人目看斜者死

病人目直視者死　病人下看人者死

病人無睛光者死

凡辨生死之法但人改常者即死矣

色聲心序　但一改常者即死矣

夫人者稟之法者吐納之氣是也以陰陽氣造化之内而運者即手足是也與動吹变須會逆順若逆則五氣相反若順則五氣相生然以五氣之中則主五臟之内稟五非但人身草木尾祿悉同於此藥性方術亦復如然然知之鮮矣以圖之（於象合物會之若不赴心思惟察源理於波骨之内露五臟焉）

## 急治餘症法　夏麟新增

一病人雖患瘡瘍症或泄瀉或出汗或不進飲食或夜不寐宜先治之内症得愈則外症易痊矣此乃急則治其標也膏圑二藥仍前用之不可缺

## 坐卧安息法

一病人睡卧之際切不可高尚聲震動若驚之則病者血不歸心魂魄飛揚神不守舍病益增矣况寢室須要幽静明亮打掃潔淨切不可容孝服狐臭及生人眼看症亦不許婦人月經来者入房

## 安慰去後法

一病人卧床多不能自慰凡父兄子弟妻妾親友須善慰之不可以家事頻頻相干以傷其心又病人大腸乾燥或用蜜導法或用膽導法随便出之切不可扶起若扶起身去後偶大腸乾燥一脹則瘡口鮮血突出必難生矣此肝不能藏血故也

## 煎藥法

一凡煎藥必須親信恭誠之老實人致意洗淨藥罐務用新汲甜水為上量藥及水之大小斟酌以慢火煎熬分

數用紗絹濾去柤取清汁服之無不効也不可近於燈油之下又不可以他病藥礶同放一處恐悞服之况煎藥之人不可坐務立之酸物按藥則藥味甘甜物按藥則藥味苦又不宜服冷藥脾喜熱冷則不能運行

服藥治法

一在上不猒頻而少少服則滋荣於上在下不猒頻而多多服則峻補於下

服藥有法

一病在頭面頸項臂膊者先食而後藥病在胸膈心下

肚腹膀膝者先藥而後食病在四肢者陽中之陽須服藥於旦病在骨髓者陰中之陰須服藥於夜

濺揩膿水紙法

一揩膿水垢紙必須入一竹籃中掛透風處但蒸肉化膿此乃人之氣血所干者日中晒之則瘡口痛故在湿處則膿水不乾待平愈後用乾柴一束烧之

自保護法

一瘡瘍之症穢氣甚臭聞之則惡心難忍毒深者深能染人須自寡慾節勞以養元氣但正氣盛則邪氣不能侵臨看之際先用綿紙塞鼻孔須食薑蒜烧酒并充飽之物以敵穢氣切不可空心視之

用藥加減法

一古人處方立法本自不同藥不执方合宜而用旋為加減量老少虛實斟酌下藥切不可膠柱鼓瑟凡引經之劑再不可缺少隨機應变之法當以意消息之

割取腐肉法

一凡取腐肉先用猪蹄湯洗淨以去其垢方見新舊之肉看其果腐爛者用鈎摘定輕手徐徐恐臭氣割之切

不可誤傷新肉以致鮮血淋漓切勿急驟多加工夫割取畢掺海浮散外用膏藥貼之明日如前凡患背瘡切不容他仰卧若仰臥則瘡頭陷矣其欵生也得乎

蜜導法

用白蜜四两火上煎熬四五沸其色黃取出乾磁盆内待其將凝急分四分每分手搓作棗子形状長一寸其蜜導頭須要光滑恐傷肛門用油潤之徐徐塞入少頃再加一條旋增以去後為度

膽導法

用猪膀一枚膀口中放芦管一枚其一半芦管入肛門逞势一捻其膀汁衝入肛門大便即行矣

禁忌食物

騾驢牛羊鷄鵞猪頭蹄爪猪小腸及諸物首足翅掌停兎猫犬諸獸鴛鴦野鴨諸雀異鳥蝦蟹鯉鮎魚鱔鰍魚無鱗魚異名魚葫芦茄子大蒜甜菜波菜芥菜萱草蕎麦蒿笋荳腐麸粉胡㚘大栗銀杏桃李楊梅杏子櫻珠蒲萄胡椒花椒醋糞糖物煎炒炙煿燒酒醱酒等味及生冷發風動氣之物推類詳之

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷第十　終

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷第十一目録

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大西堂繡梓

蟲症方　又方　十腫　小便不通　又方　久痢
神效肚痛丸　噤口痢　烏金散　治婦人多年積塊
又紫金丹　又勝金散　黄病吃茶　肺毒面生瘡
哮喘咳嗽　小靈丹　濕氣風癱　腦漏　又方
噎食　哮乳　小腸疝氣　面上小癍　食肉而瀉
漏孔不合　婦人白帶　又方　白淋　心痛
濕氣作疼　經脉不調　足麻　又方　目疾　耳聾
又方　心疼　治肚痛　牙疼　又方　風牙　婦人白帶　口臭　魚口瘡　絶産　乏乳　婦人血崩
老幼久嗽　男白淋　頭疼　腰疼　老人遺尿
火丹　脚根裂　小兒遺尿　諸骨哽　虫入耳
兩眼腫　頭風六月畏寒　風痛數年　食肉生中毒
去牙　牛肉中毒　鳥獸肉中毒　菓中毒　蟹毒
花椒氣閉　水銀入耳　婦心痛數年　冷氣吐白沫
嘈雜吐清水　翻胃　病後身黄　九種心痛　腰痛

赤鼻　乾嘔　胃反嘔吐　噦逆　腰曲難伸　心痛
呑針　呑錢　頭腫　中惡卒死　婦人膝冷　婦人
足下强硬　兒尿不禁　婦新久腹痛　催生　兒枕
小便血　水瀉　噤口痢　九竅出血　牙冷痛
肚痛丸　小便出大便　過忍小便胞轉　寸白虫
五絶死　又方　自縊　又法　溺水死　又方二
木石壓死　又方二中惡客忤　又　夏月途中熱死
中河魨毒　六畜肉毒　巴豆毒　誤食桐油　虎傷
蛇傷　又方二絞腸沙　又方　痰喘　咳嗽　嘔噎
吐血　又方　鼻中出血　消渴　黄疸黒疸
小便不通　又方三大便不通　瀉利　赤白痢
諸痢　明目　赤眼　又方　蠅入耳　蟻入耳
蜈蚣入耳　牙疼　哮　水蠱　無故尿血　蜘蛛咬
腹滿　喘化　反胃　癆病　麥手金接骨　又方
折傷　刀傷　又方　蚘咬　又方　風犬咬　又方二
酒査鼻　又方　疝氣　又方二小腸氣　又方二
解諸般毒　骨哽　又方、雞魚骨硬　又方　火盪
（刀傷耳脹痛又方耳孔出膿身上出虱）、酒醉氣絶

第十一卷目録畢

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方第十一卷

蠱症用雄猪肚一箇入蝦蟆在内線縫之煮爛去蝦蟆食之服過十五度即愈（一方猪肚内入蓮肉十枚天麻子每二百粒線縫煮爛去麻子蓮肉熱白食之勿鹽）

又方　十腫水氣肚腹四肢重者卧不能食并一切氣血蠱水腫如服或大便先行次下水一服未愈隔三日再服不退再服五七日除根忌鹽醬一百二十日如不忌後發壯可治老難治

大戟（取膀胱水）甘遂（取肝水）麻黄（取皮膚水）葶藶（取心水）芫花（取遍身水）

烏桕樹根（取腹水）苦葫芦（取腎水）牽牛（取遍身水）細辛（取氣水）

檳榔（取沖血水）防風（取胃中水）蛤粉（取肺水）桑皮（取腸水）橘皮（取齒中水）

右各等分為細末每服一錢五更姜湯送下後補藥

砂仁五錢　木香一錢　訶子（一兩去核）丁香一錢　蒼术一兩

檳榔一錢　蓬术五錢　白术一兩　人参一錢　川[illegible]五

香附（炒一兩）常山一兩

右㕮咀每服三錢葱白三寸水一鍾煎八分空心午后日二服

十腫如用

一日青水先從面起其源在肺加大戟

二日黃水先從腹起其源在脾加甘遂

三日赤水先從胸膈其源在心加水銀葶藶

四日白水先從氣急脹滿其源在肺加藁本

五日黑水先從脚起虛腫其源在腎加連翹澤瀉

六日弦水先從頭目起其源在胆加羗活

七日風水從四肢腫起其源在胃加澤瀉

八日石水先從腹攻膈其源在膀胱加桑皮

九日囊水先從腸鳴脹滿水連臍痛者源在大腹加生姜汁

十日氣水癭水乍上乍下攻脇加大腹皮

膀胱有熱小便不通用朴硝不拘多少空心茴香湯下立通

又方

大田螺（四個）大蒜（五個去皮）車前子（三錢為末）

右三味研為一處為餅一餅貼入臍中以手帕縛之貼藥後少頃水從小便出一二餅而愈甚妙

又痢槐花散

槐花　荊芥穗　青皮（炒）右水煎服

神効肚痛丸

黃蠟　飛丹（略一）芭荳仁（七枚）杏仁（四十九粒去皮尖二味研細）

右将蠟溶化加丹并三味為丸每服七九姜湯下

噤口痢

用芥菜子洵净為末将紙包貼小腹并臍上如熱當不得将藥放下如口中不覺辣再敷得效方止

烏金散　治婦人二三十年積塊

大棗十枚巴豆十粒将豆入棗中安放舊鍋中燒炒黑色為度為末每服一錢酒調臨卧三藥一齊服之

先服烏金散中服紫金丹后服勝金散直到天明取下其積用紫金散補之

紫金丹

禹餘粮石燒紅酒淬三五遍為末麵糊丸每服三四十九白酒送下

勝金散

甘草　大黃　石膏（各等分）為末酒調下二錢

黃病好食茶

火鯽魚三兩個去腸帶鱗入茶末在腹内将湿紙褁

煨熟去茶末去魚鱗食之三五度則自然脫黃矣

肺毒頭面生瘡及大風等症

苦參　荊芥穗各等分為末用皂角濃煎汁為丸如桐子大每服五十七丸空心米湯下

哮喘咳嗽立効

蜒蚰七條入雞子內紙封火炙乘热吃下

小靈丹　治濕氣風癱等症能補十二經絡起陰發陽開三焦破積氣益子息安五臟除心热壯筋骨活氣血白髮变黑

石巾竹根（半斤）防風（四兩）荊芥（四兩）細辛（一升）

四味和為一處絹袋盛貯罈內文武火煮放陰處七日后服之每服空心半鍾一鍾為止大有神効

腦漏

藕節　砂仁殼　二味煎湯空心服

又方

川芎　防風　羌活　甘草　白芷　藁本　細辛

辛夷　獨活　木通　薄荷　桔梗

噎食

枇杷葉　甘草　厚朴　紅棗　忌茶

哮吼立愈

殭蚕七條焙黃為末米湯下茶清亦可

小腸疝氣三服除根

地椒（一名地蕨葉五錢）大戟（一錢五分）

水煮食前服服後比口三指△上于臍中兩臍傍各灸三壯艾炷如小麥大

面上小瘢

半夏末塩麪三味各等分搗為粉醋調勻敷上即退

食肉而瀉肉荳蔻十枚和精猪肉四兩打碎若褁煨熟食之立効

漏孔不合用石楠葉煎湯放在桶內熏洗待湯通手就將瘡洗淨后用黃牛面前牙四枚裝在小瓶內用木屑燃之待白烟出為度取出研末用津液蘸牙末點進之出黃水為效

婦人白帶

芍藥（炒黃色）白歛（炒）各等分為末每服三錢一日兩服酒下

實脾丸
乾山藥（一斤炒黃色）為末炒粳米二升一半為糊丸
米湯送下

白淋
廣皮（一斤）枳殼（五兩麩皮炒黃）木香（不見火三兩）
黃連（三兩姜汁拌炒）右四味為末空心白酒調下三
四匙日進三服白淋止再服煎剤二十帖方可成胎

治心痛
荔枝核（煅灰）用好生漆和為丸酒下五六丸即止

湿氣遍身作疼
野墻梅紅子一升好酒十斤煎隨量飲之

婦人經脉不調漸成癥瘕氣塊並皆治之
香附（一斤炒黃色）艾（半斤用好醋煮炒黃色）
右二味磨末用醋打糊丸如桐子大每服五六十丸
淡醋湯下日進二服忌生冷油膩等分

足麻貼藥
芥子　蒼朮　各等分為末每兩入射香三分姜葱
汁調搗成膏加白芨少許臨睡時貼上早辰去之将
睡再貼

又方服藥
蒼朮（米泔浸三錢七分丸上炒紫色）黃栢（二錢三分葱汁拌炒乾）
白水煎服之或為末作丸亦可

目疾羊胆一枚割開入蜂蜜一錢線扎緊兩手揉勻水
煑一滚即取出冷水浸半月后用點眼疾（羊胆百草之精蜂蜜）
（百花之蕋此為二百樣草頭方）

耳聾
甘草一塊削豆大紅綿包甘遂一塊豆大白綿包日

夜輪換塞耳

又方
吸鐵石（一錢五分）射香（二分）研末化黃蠟為丸豆如
指頭大綿包塞耳口內噙生鐵一塊牙咬緊此方通
一　神

心疼　胡椒七粒菉豆九粒研破燒酒下不止再服（即止）
冷肚痛陳皮青皮官桂各一錢水一鍾半煎温服
牙疼　巴豆花椒為末同飯為丸如米大入痛處
又方　土硃樟冰各等分為末綿包扎緊咬痛處吐涎

風牙　蜂房一個川椒（二十粒）小麥一撮腈醋半碗煎漱乘熱漱之

婦人白帶　魚膠慢火炒為末好酒送下

口臭　白芷（七錢）甘草（一錢）為末盐水調飲再擦漱妙

魚口瘡羝羊角燒灰末之每服一錢酒下左用左右用右

絕產　紅花　肉桂（各一兩）射香（五分）煉蜜丸豆大每服二十九牛膝煎湯送下永無產矣

乏乳穿山甲瓦上焙乾為末酒下

婦人血崩

烏鷄一隻紫草一錢入肚內縫合白酒煮熟去草將雞肉并酒三五次熱服如神　貫仲炒末酒下亦妙

老幼久漱

杏仁二两去皮尖胡桃肉四两去皮研爛蜜丸弹子大姜湯嚼下一九

男子患白淋者

滑石三两粉草五錢共燒為末先吃好酒一鍾后每服二錢冷茶送下白午前服紅午后服

頭疼川芎石膏各一錢水煎臨睡服

腰疼杜仲盐炒去絲為末腰子劃破將末裝內扎定飯上蒸熟食之

老人遺尿薔薇根煎湯常服　又夜起多小便以糯粉作糕炙黃食之　又方晚間少飲茶湯

火丹　煤查與青菜同搗如泥塗上　葱搗如泥塗上

脚根裂破白芨赤石脂末塞之五日不犯水、

小兒遺尿用紅紙剪馬四疋令小兒自安身下每夜如之

諸骨哽鮮開衣帶低頭視下部數次其骨不下行則上出矣

一切蟲入耳如在左耳以手緊閉右耳努氣至左耳其蟲自出

兩眼腫如蒸大用猪鬃四根各插攢竹精明四六撚之待睡一覺醒去之妙

一人頭風六月畏寒重裹綿絮三十年不愈予以蕎麥粉二升水調打餅二片更換合頭上微汗出即愈

一人風痛數年余以七葉黃荊取根皮加接骨草五加

皮酒煎服

去牙法用草烏末略搽即去用好塩湯洗之

一人食肉生中毒掘地深三尺取下土三升以水五升
煮数沸取青汁服一升而愈

食午肉中毒煮甘草膿汁飲即解

食鳥獸肉毒者大豆汁或塩汁服之

諸果中毒猪骨燒灰冷水下一匙

食蟹毒紫蘇煎湯服之

食花椒氣閉新汲井水解之

水銀入人耳皆死以金銀着耳邊水銀即吐出

一婦人患心痛数年用茶末一分信半分白湯調下吐
瘀血一塊而愈

冷氣吐白沬良姜末三分燒酒調下

嘈雜吐清水上好廣皮去白為末五更起坐床上安末
五分于手心男左女右乾舐下而卧服三朝必効服
此不好病難療也

翻胃水澄螺螄泥晒乾為末大酒下一錢

一人大病后身面俱黄四肢無力吐血成盆諸藥不效

螺螄十一枚水漂去泥速敲搗爛夜露五更取澄清
水服四次黄去血止而愈

九種心痛悪心吐水積聚氣滞是有虫也
乾漆四两慢火燒烟盡醋糊為九菉豆大食後酒醋
熱下三十五九不愈再加

腰痛曲而難伸　山查末三錢茶酒葱湯随下

赤鼻
枯凡三錢硫黄二錢卧時取三分于手心中唾調以
指塗鼻孔內睡醒再塗三日則变色七日全愈

乾嘔噦并手足厥者　陳皮（四两）生姜（半斤）水煎服

胃反嘔吐者半夏二升不切人参三两白蜜一升水一
斗二升和蜜搗之二百四十遍煎至四升温服一升
餘再服

噦逆橘皮竹茹湯又治噫氣五七日不止者
橘皮（二升）竹茹（二升）大棗（三十）生姜（半斤）甘草（五两）
人参（一两）水煎三四服

腰曲不伸重如帶石
赤茯　白术（各四两）炙草（三两）乾姜（各二两）每五錢（水煎）

一人心痛徹背背痛徹心

赤石脂　胡椒　乾姜（略各一兩）附子（五錢炮）烏頭（二錢炮）

煉蜜丸每服一丸酒下三服自愈

一女人悮吞針入腹用蚕豆煮熟同韮菜食之針從大便出

一人悮吞銅錢胡桃肉食之自化荸荠亦可

一人開藥舖忽頭腫如斗大如錐刺諸藥不効用煎甘草湯薰之另煎甘草膏飲之即愈　乃藥毒也

一人中悪卒死灸臍中百壯以皂角末吹鼻或韮汁灌耳

一婦人膝冷至足湯火不能温以附子治之不効用四物湯加黃栢知母四剤而愈

一婦人初足下強硬數月餘膝亦硬一年則手足骨節俱不能動卧床如癱又非風症知為虛也以人參當歸附子煎膏盡二筒而愈

小兒尿不禁　蜜一杯車前草汁和熬夜露清晨服之

婦人新久腹痛

玄胡蒼术梹榔良姜各一錢茯苓肉桂丁皮乾姜各五分三稜蓬术甘草青皮砂仁各八分連鬚葱白三根水煎服効如神

催生魚膠八寸尾上焙乾燒灰酒送下

産后兒枕痛山查一兩搗碎水二鍾煎八分入砂糖二匙痛立止

小便血用病人頭髮燒灰酒下

水瀉腹中響如雷者軟石膏火煆老米飯為丸如桐子大飛過黃丹為衣每服二十丸米湯下即効

噤口痢　蜂蜜沙糖并姜汁湯下　瀉用老米飲下肚痛炒米湯下

九竅出血清晨頭一吊水噀面即止

牙冷痛　蒜半瓣巴豆肉一粒綿裹塞耳内

肚痛丸

雄黃（二錢）巴豆仁（二錢不去油）丸如芥子大每三粒白湯下行利三四次痛即止

小便出大便五苓散加分利水谷之剤

過忍小便致轉胞滑石末葱酒調下二錢

寸白虫以黑亀一枚陳藏糟包裹火煆（存性為末糊為丸空心酒下三十丸）

### 治五絕死

自縊死溺水死打撲跌搕木石壓死産後血迷暈死中惡鬼擊死夜魘死凡心頭温者皆可救治用半夏湯泡七次為末丸如豆大吹入鼻中噴嚏即活或用皂莢為末吹入鼻中亦妙

又方

急於人中穴及兩脚尖母指甲離甲一韭葉許各灸三五壯即活臍中灸百壯亦効

### 救自縊

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據胸上數磨動之一人摩將臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以蘆管吹其兩耳無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰氣盛為難救爾

又法

以一人兩手掩其口鼻勿令透氣一人用手摩其頸痕兩時氣急則活

### 救溺水死

一宿者尚活用皂莢為末綿裹塞糞門須臾出水即活

又方救起放大櫈卧着脚後櫈坫起磚二塊却用鹽擦臍中待水自流出切不可倒提出水但心下温者皆可救

又方急解衣帶艾灸臍中仍令兩人以蘆管吹其耳中即活

救木石壓死并跌搕傷從高墜下跌死氣絕不能言者急掐開口以熱小便灌之（童便尤良）

又方撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛用乾荷葉五片燒令烟盡空腹以童便温一鍾調下三錢日三服

又方被打惡血攻心用小便一碗温服

救中惡鬼擊客忤一切卒死用菖蒲根生搗絞汁灌鼻中或口中即活

又方治鬼擊病卒着人如刀刺胸腹內痛不可按熱艾

水煮服若卒心痛爲客氣所中者當吐出惡物

救夏月途中熱死者不可用冷水灌沃及以冷物遏外得冷即死宜移置陰處急取路上熱土於死人臍作窩多令人尿溺於臍中又取路上熱土并大蒜同研爛水調去渣灌下

中河豚毒急以桐油多灌之吐出即愈再服濃甘草湯

食六畜肉中毒以壁上黃土水調服二錢即差

中巴豆毒以黃連大豆菖蒲汁並解之

誤食桐油令嘔呭飲熱酒乃解

救虎傷用生薑汁服兼洗傷處白礬末傅瘡上

救毒蛇傷并諸色惡虫毒氣入腹者用蒼耳草嫩葉擣汁灌之將渣厚敷傷處犬咬煮汁服之

又方用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈

治蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁

治絞腸沙用好明礬末滾水調服

又方治絞腸沙痛不可忍炒鹽一兩熱湯調服危迫者灌入口中或吐或利腸痛即止

治痰喘用胡桃肉三箇生姜三片臨睡細嚼飲湯下就

枕又再嚼如前飲湯下即安

治咳嗽久患連嗽四五十聲者用生姜汁半合蜜一匙煎熱溫服三服立効

嘔噎用蘆根五兩切碎水三鍾煎一鍾服

治吐血并鼻中出血用藕節擣汁飲之

又方用好綿燒灰麪糊爲丸酒下

治鼻中出血用亂髮燒灰井水調下更吹鼻中

治消渴用田螺五升水一斗浸經宿渴即飲水每日換水浸

治黃疸黑疸酒疸食疸用豬脂八兩亂頭髮如鷄子大二塊同煎臨服絞去髮分二服病從小便出

治小便不通用蚯蚓擣碎以冷水濾濃汁服半碗立通

又方用鹽填滿臍中艾灸鹽上

又方用炒鹽半斤布裹乘熱熨小腹

又方用豬膽投熱酒中服立通

治大便不通用豬脂二兩水一碗煮三沸飲汁立通

治痢瀉初起即以細茶生姜各三錢水二鍾煎至八分服之重者各五錢煎服即止不愈再服

治赤白痢用薺菜根葉燒灰湯調下極妙

治諸痢以文葉陳皮煎湯服

治眼目赤腫翳痛用鯉魚膽點之亦治雀盲

治赤眼用甘草水磨明礬傅眼胞上痛即止

又方以自己小便洗眼効

治蒼蠅入耳用皂角子研爛用生蟮血灌耳中

治蟻子入耳用猪精肉一指火炙令香置耳孔邊即出

治蜈蚣入耳用生薑汁或韭汁灌耳自出或以熟鷄肉一塊置耳孔邊自出

治牙疼用樟冰土硃和匀綿包嚼定痛即止

治哮用鷄子二枚畧敲損膜不可全損浸尿缸内三四日煮喫即効

治水蠱用商陸根赤者杵汁貼臍心絹帛縛定日易効

治無故尿血用亂髮和瓜甲等分燒灰酒服方寸匕汗血止用髮灰一字吹鼻中食中誤吞髮繞喉不出取己頭乱髮燒灰水調服一錢匕前後不通燒末三指撮投半升水中三服前後利血灰研飲方寸匕男女通用

治蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖去小尖頭孔内將一蚯蚓推入緊縛兩頭勿透氣但搖動即化水點咬處即効或用乾蔓菁根為末油搽後取煮湯飲

治腹滿不能服藥用獨顆蒜煨令熟去皮綿裹内下部中冷即易蛇虺咬人和酸草擣絞傅咬處鼻血不止用一枚去皮細搗攤一餅如錢大厚一豆許左鼻貼右脚心右鼻貼左脚心兩鼻兩脚心立瘥止則急以温水洗之或取便用塩嚼沃上煎湯洗妙

治喘化痰用猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇納半夏

白礬各一字入鑵子内封閉勿令烟出煆通紅去火細研入麝香一錢患上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

治反胃用驢便日服二合妙驢駒衣燒灰酒服能斷酒心痛絞結連腰臍取驢乳三升熱服驢耳垢治蝎螫付上或用黄丹醋調塗或半夏末水調塗或用楮樹白汁塗之皆取便立効

治勞病用玄參一觔和甘松六兩同為末煉蜜一觔和匀入瓷瓶内封閉地中埋十日取更用炭末六兩煉

蜜六两和匀入餅内封更埋五日取出烧令病人鼻
常聞香疾自愈矣
麥斗金接骨其効如神用古老钱廿箇背上有字者佳
好硃砂一錢自然銅五分乳香三分没藥三分先将
古老錢烧紅擂碎為極細末以後藥碾羅為細末和
匀用甜瓜子炒去殼擂細酒送下一麥斗又用酒送
下一麥斗良久不見響聲再服甜瓜子一麥斗酒下
催之不可多服一麦斗（即今之一茶匙也）
接骨用大蝦蟇尘研似泥縛定其骨自然痊

拆傷骨損用阡阡活老鴉眼睛藤濃煎湯洗之骨自上
人被鎗刀斫傷用匾栢搗爛加白蜜和匀傅患處縛緊
乾自愈矣
又方用何首烏搗爛加糟少許縛定骨拆處
蛇咬用人耳中糞搽咬傷處流盡血即無事
又咬極痛用烏龜板灰摻之即止
風犬咬用馬蘭頭草搗汁酒調一碗服之脚跟上出血
立愈
犬咬去毒血以米泔洗净紙上炒黄丹赤色貼上立妙

又乾砂糖搽上尤妙
酒查鼻四年内外藏糟茄露調硫黄末搽四日後盡白
又方用連翹稀細茶各半不拘時和嚼食半月即白
治疝氣用鬼饅頭黄泥固濟煅過為末空心酒下
治疝氣上衝如有物撐之心胱手足冷欲死者用陳皮
荔枝核炒黄硫黄各等分溶化投水去毒各為末飯
丸桐子大每服十五丸不拘時温酒下其疼立止
治疝氣偏墜不拘遠年近日用木香三錢破故紙一两
大茴香小茴香各五錢青盐一錢五分川練子二两

為末每服一錢温酒調下
小腸氣攻上者用烏藥良姜白牽牛青皮末之酒下二錢
神方硫黄火中溶化即投水中去毒荔枝核炒焦黄陳
皮等分為末飯丸每服十五丸其痛立止疼甚畧用
六丸不可多也
回春丸用茯苓一两白术一两炒山查炒枳實炒八角
茴香一两吳茱萸一两炒荔枝核一两橘核一两蜜
丸姜湯下
解諸般毒　食信用雄鷄血趁熱飲之立愈

諸骨硬用燒紅鋸齒放酒內飲之即愈

鷄骨硬用舊靴皮化灰食之即愈

又方用玉簪花根搗汁入喉不可着牙齒甚妙

鷄魚骨硬用苧蔴根擂汁灌下即化

又方用栗子肉嫩皮燒灰酒下

火瘡用乳香定痛散乳香半錢輕粉一錢米粉菉豆粉官桂各半两黃丹粉霜各一錢為末以牛皮膠化開稀稠入藥攪勻唇上試不熱可用取鵝毛搽患處安藥不定端午日取蝦蟆燒灰存性為末瘡湿乾摻

刀傷用未出毛老鼠同陳石灰楝樹根上白皮車前子同搗爛作餅陰乾為末摻之極効

耳脹痛不可忍用江魚齒火煅為末水調滴入耳中

又方用虎耳草搗碎取汁滴入耳內

耳孔出膿用枯凡石子射香輕粉各等分為末即愈

男子婦人身上出虱用槿樹根煎湯洗之即効

○酒醉氣絕用小遺桶傾去尿将水徐徐蕩去浮垢畢急将滚湯澆在尿垢上少頃取其清汁緩緩灌入口中咽下鼻中有氣息斯得生矣

瘡瘍全書附方卷第十一畢

---

# 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方卷第十二

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

## 目録

怯瘵一百有九

遍身肉出如錐　眼見飛禽形　眼虫至鼻

腹中有聲應　好飲油　卧則四肢不動

皮痒抓之血出　眼白黑見物形　喘不能語虫死

手足甲出肉刺　腸破腸出　口鼻氣凝如黑蓋

頭面發熱有光　身生泡水出有石片　醉吞水蛭

小便屎大便尿　玉莖硬不萎六土　身及面腫如蛇

大腸虫出不斷　兒身泡生出水　兒生無皮

寒熱肢有聲　腸出寸餘　鼻臭水流

肢脫而皮連　腹如鐵牌水出　眉搭而自不能視

皮血出脹如鼓　蛇瘕　蛟龍瘕　鼈瘕

雞瘕　尸厥　瘡如蛇出數寸　眼視物顛倒

婦胞傷不能便　產戶出肉線　產婦乳虫至腹

婦見壁前蓮花　病見物如獅　腫潰骨出

灸而血出手冷欲絕　頭皮蛆出　肋竅兒啼

頭風耳雀鳴　產婦舌不收　婦生虱
婦眼血出　產食茶粥一月身冷數塊　產門物如帕
婦三陰交血出欲絶　鬼孽身青　秋冬身紅點作痒
看剥死牛生泡　蚝入人竅　兒聞雷則昏倒
食下若別有咽至腸而痞　胸背皆駝　項與頭堅硬
心口痛　身痒入骨　喘不喘嘔不嘔心中憒憒
夏行飲水寒熱如刀刮　盤腸產　產後腹痛煩滿
婦腹諸病　婦腹痛陰中如石硬塞　兒遍身痒
陽物飛絲纏痛　胃寒腸熱　胃熱腸寒　疝引腹痛

口瘡不已　失音　脚指濕爛　新婚陰萎不舉
小便頻　女腕軟生物如豆痛　牙疼
卧身虱出　刮腸痢　婦因甑冲面腫
食肉痨虫　酒蟲　鼓脹　兒卒死吐利
狐惑　兒生月不開　鵞虱入耳　烟熏欲死
禿積　兒生有四死症　收蝎咒　老婦腹痛飢蟲
背發塊倦不食　眼赤鼻脹大喘　蟲如蟹走皮中
鼻毛三尺長而痛　離魂　穿斷舌心血出
身頭浮腫如蛇　蜘蛛咬　蛇咬

魅化為猫　食芹腹痛　治中鳩毒　食河魨戒服藥
喉爛氣腥　大胞匾脊　中惡客忤臍死　雄黄毒
產户番腸　救凍死　魘寐卒死　一切藥毒
喉嘔腸出　中惡中忤眼見鬼物　一切菌毒
耳中血出　中惡客忤　天雄附子烏頭毒
舌上血出　酒食蟲　肉毒嘔吐　解河魨毒
産傷胞破　解諸藥毒　五種蠱毒　解鱔鼈蝦蟆毒
癰口吐沫　治一切毒　巴豆毒二　解牛馬肉毒
小腸疝氣　解砒霜毒　草烏毒　解飲饌中毒

服藥中毒　食魚中毒　食馬肝毒　自死六畜肉毒
中惡熱悶　椒閉口毒　食蟹中毒　中毒　中諸毒
小兒雜症（凡一十四款）
甘草法　開乳法　浴法　不飲乳　初生七星瘡
驚哭有泱　遺尿　不小便　凍瘡　痘痂落血出
痘斑瘡　骨入肉　吞稻芒　吞釣鈎　尿狀
糞門秤鈎瘡　慢驚灸法　附蠱毒挑生蟲（四端）

第十二卷目錄畢

## 重校宋竇太師瘡瘍經驗全書附世傳秘方第十二

一人遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血擁用赤皮葱燒灰水淋汁洗内服淡豆豉湯數盞而愈

一人眼前常見禽虫飛去捉之即無此肝膽經為疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子各一兩為末每用水煎二錢和滓日三服

一人眼珠垂下至鼻大便血出名肝脹用羌活水煎數服即愈

一人腹中有物作聲隨人語言名應聲虫服雷丸而愈

一人飲油五升方快意此乃髮入胃血褁化為虫也用雄黃五錢水調服

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失説物望病如説某肉即以其與看不與食之失他物望也[illegible]中流出饞唾即愈

一人遍身皮底渾如波浪聲痒不可忍抓之血出不能止名氣奔用人参苦杖青塩細辛各一兩水二碗煎十數沸飲盡便愈

一人眼内白背俱黑見物依舊毛髮直如鐵條不語如醉名血潰用五靈脂末二錢酒調下愈

一人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆牙齒搖動氣出轉大即悶絶名曰傷寒併熱霍亂用大黄人参各五錢水三鍾煎八分服

一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜而愈

一人脅破腸出臭穢急以香油抹腸送入即不出又以人参枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪腎粥十日愈

一人口鼻中氣出盤旋不散凝似黑盖過十日漸漸至肩與肉相連堅勝鉄石無由飲食多因瘧後得之用澤蘭水煎日飲三盞五日愈

一人頭面發热有光色他人手近如火灸用蒜汁半兩酒調下吐物如蚍遂安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水内有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三稜莪术各五兩為末分三服酒調下

一人夜有醉者誤吞水蛭腹痛黄瘦不進飲食用小死魚三四箇猪脂煎溶攪勻入巴豆十粒研爛和田中乾泥丸如菉豆大以田中冷水吞下一丸泄下為度

一人小便出屎大便出尿名交腸用舊幞頭燒灰酒下五分愈

一人玉莖硬不痿精流無歇時如針刺捏之則脆乃為腎滿漏疾用韭子破故紙各一兩為末每三錢水煎日三服即止

一人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔一錢水調塗立消

一人大腸內蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調服五錢自愈

一小兒初生如魚胞又如水晶碎則水流用蜜陀僧羅極細末摻之

一小兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑臥一宿即生皮又方用白旱米粉乾撲上候生皮乃止

一人寒熱不止四肢如石擊之如鍾磬聲日漸消瘦用茱萸木香等分水煎服即愈

一人大腸頭出寸餘候乾自退落又出名截腸病用芝蔴油器盛坐之飲大麻子汁數升愈

一人鼻腥臭水流以碗盛而視之有鐵色蝦魚如米大走蹤捉之即化為水此肉壞矣一日食雞肉二次一月而愈

一人四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用黃芦酒浸一宿焙為末酒下二錢多服方安

一人腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行之狀遶身匝豕痒痛難忍扒掃不盡濃煎蒼术湯浴之以蒼术加麝香水調服之

一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食用蒜三兩取汁酒調下即愈

一人毛竅節次血出少間不出即皮脹如鼓口鼻眼目俱脹合名曰脈溢用生姜汁并水各一二盞服安

一人患蛇瘕乃蛇精及液沾菜上人悞食之腹內成蛇或食蛇亦有此症其人常饑食之即吐用赤頭蜈蚣一條炙末分二服酒下

一人患蛟龍瘕用粟水石飯三升每食五合日三服吐出蛟龍而愈

鱉瘕痛有來止或食鱉即痛用雞屎一升炒黃投酒中浸一宿焙為末仍用元浸酒調下

鷄瘕有病冷痰者醫曰因食白瀹鷄過多故也用蒜一枚煮服乃吐一物如升大痰裹開視之乃鷄雛也再服吐十三雛而愈

一人尸厥奄然死去腹中氣走如雷用硫黃一兩焰硝五錢細研分三服好酒煎覔烟起則止温灌之片時再服而安

一諸瘡如蛇出数寸用硫黃末塗即消

一人眼中視物倒植用梨芦瓜蒂為粗末水煎服得吐而愈

一婦產後有胞傷破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白牡丹根皮白芨各一錢水二碗煎至絹爛如餳空心頓服不得作聲作聲即不効

一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絶先服失笑散数服次以帶皮姜三斤研爛入清油二斤煎油乾為度用軟絹兜起肉線屈曲於水道邊以前姜熏之冷則熨之一日夜縮其大半二日即尽入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線断不可治矣

一婦產後兩乳忽細小下垂過小腹痛甚名乳懸用芎歸各一觔內用半觔水煎服餘用燒烟熏鼻口二料乃効

一婦見滿壁皆蓮花此痰症也服蒙石滚痰丸

一人患心疾見物如獅子伊川教以手直前捕之見其無物久久自愈繼服牛黃清心丸

一人患腫毒潰後不時出一細骨用生桐油調蜜陀僧如膏絹攤貼妙（此亦內熱骨乃所化之物也謂之名腐骨）

一人灸火至五壯血出一縷急如溺手令欲絶以酒炒黃芩二錢為末酒下則止

一人頭皮內時有蛆出以刀破皮用絲瓜葉搗汁搽之蛆出盡絶根

一人淵疝之發於肋下久則一竅有聲如嬰兒啼灸陽陵泉二七聲即止而愈

一人患頭風症耳內常鳴頭上耳內有鳥雀啾啾之声此頭腦挾風所為也用芎歸而愈

一婦產子舌出不能收以殊砂付其舌乃令作產兒狀以二女扶之壁外漸推盆盎令墮地聲嚮使婦聞而驚舌則收安矣

一婦忽生虫一對於地能行長寸餘自後月生一對醫以苦参加打虫藥為丸服之又生一對埋於土中過数日發而視之暴大如拳名子母虫從此絕根

一婦眼中忽有血如射而出或緣鼻流下但出血多時即經不行乃陰虚相火之病遂用歸身尾生地酒芍加柴胡黄栢知母條芩側栢葉木通枣仁紅花水煎食前服数劑而愈

一婦產後食茶粥每日二十餘碗一月後遍身氷冷数塊人以手指按其冷處即冷從指下上應至心如是者二年諸治不効以八物湯去地黄加橘紅入薑汁竹瀝一酒鍾十服乃可

一婦三陰交無故血出如射將絕以指按其竅縛以布條昏倒不知人事以参一兩煎湯灌愈

一婦產戶下一物如帕有尖約重一斤却喜血不盡虛急與黄芪白术升麻各五分参歸各一錢水煎服三劑而止

一人被鬼擊身有青痕作痛以金銀花水煎服

一人每至秋冬遍身發紅點作痒此寒氣收斂腠理陽氣不得發越怫鬱內作也宜以人参敗毒散解表再以補中益氣湯實表而愈

一人因剥死牛瞀悶令看遍身俱紫泡急刺泡處良久遂甦更以敗毒藥而愈（多服紫金錠）

蛇入人竅中急以手捻定以刀刮破尾用椒或辛辣物置尾以線繫之即自出不可拔

一小兒七歲聞雷則昏倒不知人事以人参歸身麦冬少入五味盡一斤後聞雷自若

一人但飲食若別有一咽喉斜過膈下徑達左脇而作痞悶以手按之則瀝瀝有聲以控涎丹十粒服之少時痞處热作一聲轉瀉下痰飲二升再飲食正下而達胃矣

一人胸背皆駝頸漸短問其故因食旱鱉所致患上用紫蘇煎湯洗淨次用龜尿搽之（取尿法　以龜置器中用鏡照之則尿出矣）

一人心口痛葱白三根搗爛面粉三錢和勻热酒調下立愈

一人頸項腫與頭相統按之堅硬漏蘆湯一劑服下發痒頃刻消散

一人田間收稻忽然遍身痒入骨髓用食塩九錢泡湯三碗每進一碗探而吐之三進三探則不痒矣

一少年玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩脇氣冲上手足倦弱先以小柴胡湯加黄連大剤行其湿热火加黄栢降其逆上之氣腫漸散莖中硬塊未消以青皮為君佐以散風之薬服之外以絲瓜汁調五倍子末付愈

一病人似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈用生薑汁半夏湯主之半夏片半斤生薑汁一升

水三升先煎夏至二升後入姜汁共煎一升半待温分四服日三夜一病止停服

一人暑月行百里渴而飲山水至晚以单席陰地上少睡頃間寒热吐瀉身如刀刮而痛醫皆曰中暑進黄連香薷飲不應予診其脉細緊而伏此中寒也衆皆笑曰六月中寒有是事乎予以附子理中湯服而効

冬天傷暑一婦冬月洒淅悪寒翕翕發热悪食乾嘔大便欲去不去諸醫以虛弱用滌痰二陳湯不効予治脉虛無力類乎傷暑衆不然深究之婦曰昨因天寒取綿套蓋之得此一症誠哉傷暑也但綿套盛暑晒之热收箱中必有暑氣今體虛得之易入故如是婦曰然遂用黄連香薷飲進二服即安噫冬天傷暑夏月中寒病亦少見問切之功不可不知也

一盤腸産者臨産腸先出而後産子既産之後其腸不收以醋半盞冷水七分調匀噴婦面三噴則腸收盡此良法也

一産後腹痛煩滿不得卧用枳實各燒黒芍薬等分為末麦冬下一錢許

一婦人腹中諸病用當歸一两半芍薬八两澤瀉川芎各四两白朮茯苓各四两為末酒下一錢

一産婦因子死經断不行者半年一日小腹忽痛陰户内有物如石硬塞之而痛不禁衆醫不識青林曰此石瘕病也用四物加桃仁大黄三稜檳榔胡索附子澤瀉血竭二剤而愈

一小兒遍身痒甚以生姜搗爛布包擦之而止

一人在山亭裸体而臥其陽被飛絲纏繞腫痛欲断以威靈仙煎湯浸洗而愈

胃寒腸熱水谷不化腹脹痞滿泄利不止用川烏（炮去尖）半兩山梔仁乾姜（生）各二錢半姜汁糊丸酒送下日進三服

胃熱腸寒善食而飢便溺小腹脹痛大便澁青皮三稜蓬术黃連各一兩巴豆霜二錢半麵糊丸如菉豆大或茶或酒隨下三五丸

疝氣牽引小腹痛

蒺藜（炒）附子（炮）梔子（一兩）每三錢水煎服

口瘡不已名赴筵散

黃栢　青黛　蜜陀僧各等分為末乾摻

失音不言

訶子（四枚生熟）桔梗（一兩生炙）甘草（二寸生炙俱各半）

每二錢童便水各一盞煎五七沸甚者不過三服

神應散春夏脚指叉濕爛

枯凡（六分）　飛丹（五分）為末摻之

一少年新婚欲交媾女子阻之乃逆其意遂陰痿不舉五七日以兎皐燒灰酒下二錢即起

小便頻數一日夜百餘次此脬氣不足服縮泉丸益智仁烏藥大如臂者等分為末酒煮山藥打糊為丸如桐子大卧時用鹽酒送下七十丸

一女子十六歲四肢軟皮處生惡物如黃豆大半在肉内紅紫色痛甚諸藥不效一方士將水銀四兩白紙二張揉熟蘸水銀三日自落而愈

牙疼新掘李樹根取白皮搗細濃浸時時含之絕根

臨卧渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛痒不可言狀雖喫水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯數次安

小兒刮腸痢眼閉口合名曰禁口痢用精猪肉一兩薄切片炭火炙以膩粉末五分旋鋪肉上炙令成脯如不喫放鼻頭聞香自然要喫

又方臘肉脯煨熟食之妙大人亦可服

一婦開甑為熱氣所沖面目腫而經閉用炊飯布經久者燒灰隨付隨消

一人患瘵二年一日無肉味腹痛不可忍恐傳染置空室待自終三日無肉或思鷄子病人自煎食將熟鼻中碍忽打嚔覺有紅線二尺自鼻出跳遂以碗蓋之

煎熟視乃痨虫也

一人自幼好酒片時無酒叫呼不絕全不進食日漸羸弱或执其手縛柱上将酒與看而不與飲即吐一物如猪肝入酒内其人遂安

鼓脹且食不能暮食痞滿名鷄屎醴飲

大黄桃仁鷄屎要乾者等分每一錢水一中姜三片煎湯調下愈后臨卧服

又方用猪血不着塩水待自凝硬瀝去水晒干為末酒下洩之妙

一小兒卒死而吐利不知是何病

狗屎一丸絞汁灌之無湿者水煎乾屎取汁亦可

狐惑証下唇有瘡曰狐乃虫食其肛黄芩煎湯洗之上唇有瘡曰惑乃虫食其臓因腹内热腸胃虚虫出求食用瀉心湯大黄二两芩連一两水煎服

小兒胎受热毒生下兩目不開

灯心黄連秦皮木賊各五錢水一盞煎澄清頻洗之

一室女近窓做女工忽患頭疼其諸藥不効一醫徐察知窓外畜鵞知為鵞虱飛入耳内咬而痛也以稀桿

煎濃汁灌之虱死而出遂不痛

一居民逃難石室中以烟攻之偶得葡萄食之而甦

又法以口呵地即不死

禿積　鲫魚一枚四两重去腸以乱髮填滿湿帋裹燒存性入雄黄生麻油調付　先用藥湯洗（即辣藜）

小兒初生身破裂者必死陰不起者必死股間無肉死無糞門者必死一云必假物以開之（近有女之陰亦不開者夫以小刀開之）

收蝎法每年除夜左手拽起前裙右手执三尺長棍向門榻上敲三下念呪云蝎云蝎螯螯螯不向梁上走却來這里螯一敲敲八節呪畢吸氣一口吹入于杖頭復吸其氣吹于执杖手心如此三次即已遇有蝎螫以手摩之即不痛可用一年次年除夜必如法為之否不驗也

一老婦喉心中咬痛得食則止心思香燥之物偶夏天猫繞脚而叫此婦素性愛猫取鹿脯嚼之喉中忽有一物出急取之堕地頭足皆有五寸長許乃飢虫也

一人背發一塊心神兀兀四肢倦怠飲食不進一醫曰此虱瘤也剖開果虱令許甘草湯洗净拭乾将多年

油木梳煅灰為末菜油調搽立愈

眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮如銅鐵乃目中熱毒氣結于下焦用白丸滑石各一两為末作一服水三碗煎至半冷不住飲尽乃安

一人有虫如蟹走于皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雷丸雄黄各一两為末摻在猪肉片上炙熟喫盡（自安）

一人髮上水珠如汗滴不止用甘草一斤煎湯三四碗作三四服其水即止此証自幼間服藥過多故也

一人鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖痛一摘一茎即后復生此因食猪羊血過多

用乳香硇砂各一两為末飯丸空心臨卧（水下十丸即落）

一人自覺自形作两人並卧不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人参茯神濃煎湯飲之（真者氣爽假者化也）

一婦六十余歳得飢疾每作時如虫吃心得食方解如是三四年來身熱終涼有一猫甚愛適猫遠叫取鹿糖一日喂喫猫至于再嚼煮一物上觸喉間引手探得之如母指大墜地以火照之其物頭尖而匾類嘴沙魚形身如蝦被腹有八子其病即愈

一人穿断舌心血出不止以米醋用鷄翎刷所断處其血即止仍用真蒲黄杏仁去皮尖硼砂少許為末煉蜜調搽或噙化而安

一人身上及頭面肉上浮腫如蛇状用雨滴堦磚上苔痕水化開塗蛇頭立消

一人被蜘蛛咬腹大如孕婦有遊僧見之教飲羊乳一日而平

妖魅变化為猫為兎為鬼病人為其所惑不肯言鬼魅然如痴用鹿角屑搗末用水調服頃間即實言為鬼所憑也

一人食芹菜忽患腹脹而痛醫曰蛟龍子多生芹上用餳糖粳米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐下蛟龍子有两頭者　我

明太宗皇帝好食生芹日久腹痛召太醫盛御醫治之盛詢知好食芹菜乃製田中泥土為丸服之二次明早利下虫無数皆小螞蝗小沙搭子耳其痛即愈

隆慶二年十一月友人吳家楼喉間忽生一塊形色如田螺頗堅硬一月餘爛開寸許氣甚腥臭至十二月邀麟診視之莫測其為何症不敢輕答坐良久細思之問其家眷平日曾患楊梅瘡否對曰不曾患此瘡止一日忽見孩兒頭面皆生楊梅瘡問曰此兒誰家子也對曰病人之長兒也遂原其由愛楼得子甚晚頗鍾愛晚以頭

枕父臂子口對父之口其毒氣盡烝于肺故喉之下肺之上爛一大孔急以鮮蚌大者以刀抉開取其水以絹濾净一日五六次灌之吐出臭涎盈斗將　冰片

孩兒茶　雞内金　朋砂　大紅絨灰　牡蠣

青黛　人中白　杏仁灰　等分末之極細吹入患處一日七八次外服人参　桔梗　甘草　玄参

黄芪　天花粉　鼠粘子　生地　芍藥　當歸

金銀花　小柴胡　冷飯糰　麦冬

右剉水煎服三月而愈

一少婦産兒後忽玉户中垂尺許如白腸之狀少不知事私以手摘断至晚腹痛號泣而絶此腸即生腸又曰胞户子宫切不可損損則傷生盖氣血衰敗未能收入宜多進活血之劑三二日間自然收入不足憂恐也予治四三人皆以此藥之力

一友人春月將熟羊肉熟猪肉露放月臺之上明日治以燕客凡二十餘人皆吐嘔不安唯二三人不吐嘔盖食肉少而酒多也一老醫云此盖夜露之毒也如秋夜之氣清露亦不毒今人以酒麯漬之良妙以甘草煎湯飲之即愈

隆慶三年己巳正月二十七日塩商胡小溪家人媳婦年方二十三歲懷脈九月矣一日食魚魚骨梗喉間至半日嘔吐繼之以血碗許魚骨尚在喉中忽吐出一條約有二尺餘形如小腸潤五分内有所食魚菜粉皮飯未化家人為推入口中尚餘五寸其夫復納入之遂昏倦自此嘔吐不止湯亦不能進延予治之遂將生炭火一盆放病榻前以好醋一碗沃之使醋氣盈滿其室清其神也進以牛黄清心丸腹覓有微痰再用人参養胃湯

倍加人参一分　紅花　牡丹皮　當歸　川芎

白芍　生地　阿膠　煎服五六貼病全愈矣

嗟夫此婦所吐之腸有類於腸耳若腸出而斷頃刻立斃豈有得生之理此吐出者肺之系也因嘔吐太甚被氣冲逆而断其連肺之一頭隨吐而出今既納入復吐不已氣不平耳今用醋湯以清其神牛黄丸以清其心煎劑以補益其血氣故旬日之間安妥如常此亦原其病而藥之耳豈肎效好利之人乘其危而邀名索物者同日而語耶醫者意也全在活法書此以為世勸

耳中血出不止　龍骨末付之

救凍死以热灰熨心冷即易之目開氣出以粥湯温補

凡中惡中忤忽然眼見鬼物惡氣驀然倒地四肢厥冷兩手握拳口鼻出清血此與尸厥同勿移動即令人圍繞燒火及射香安息蘇木桃頭之類待省方可移歸

舌上忽血出如簪孔赤小豆一升杵碎水三碗和擣取汁每服一盞不拘時服（槐花末摻上亦妙名曰舌衄）

婦人生産傷動尿胞破終日不能小便但漏溫耳

黃絲絹（一尺生者煎碎）白牡丹根皮千葉者（爲末用無不效）白芨末（一錢）水二鍾煮絹爛如泥空心服服時勿作聲作聲不效慎之

中惡客忤睡死射香一錢研和醋灌一合入腹即甦

一人患癖口出微膿如盤吐沫此肉潰透膜也瘡瘍透膜十無一生須大補亦不活也

琥珀萬安丸　治男婦酒食蟲

檳榔（四兩）白牽牛末　黑牽牛末（各二兩）雷丸　大黃

知母　貫衆（各一兩）沉香　木香（各半兩）蕪荑（一兩）

---

右爲末每用四錢五更先以嚼生姜一塊次用隔宿糖湯露一夕次早調藥服小服下黃赤黑白蟲積病根直至日晡喫白粥補之先嚼生姜免至惡心此方亦可水丸服四錢重

雄射散　治五種蠱毒

雄黃（末）射香（另研各一字）

用生羊肺一指大以刀切開內藥在內肺裹吞下

國老飲　治蠱症

白礬（末）甘草（各等分）右爲細末每服二錢食遠水調下或吐黑涎或瀉皆効若平生預服防蠱者宜以甘草濃炙煮服即內消不令吐神驗

保靈丹　治諸蠱毒一切藥毒神効

硃砂（另研一兩）大山豆根（五錢）雄黃　黃丹　射香

黃藥子　續隨子（生研）巴豆（不去油）斑猫（去翅足二錢半）

糯米（半升生炒）赤蜈蚣（二條一炙一生）

右各修製入乳鉢研和于端午重陽臘日修合勿令雞犬婦人見用糯米糊丸如龍眼核大陰乾瓷盒收每服一丸茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心頭

如洩斷度係声将次毒物下或自口出或自大便出娠則是血老則成鱉或蜂蛝等状粢丸凝血並下如口禁棺開下藥或蛇蝎諸毒以醋磨傳忠慮忌酒肉毒物一月惟軟飲飯可也

薺苨湯　解諸藥毒

薺苨　黒豆　甘草（各等分）　（薺苨能乱人参即此薺苨也）

右㕮咀每服七錢水二盞煎八分去柤溫服

奇方　治一切毒

白扁豆晒乾為末每服二三錢新汲水調頓服得利則安

一方　解砒霜毒

白扁豆　青黛　甘草各等分　巴豆（擂去殼用半片）

右為細末每服一錢以砂糖一大塊水一中化開調藥飲之毒随利后宜進五苓散益元散

又方　解砒霜毒以旱禾稈燒灰新汲水淋汁絹袋濾過令服一椀毒從下利即安

一方　藍飲子　解砒毒及巴豆毒用藍根砂糖三味相和研水服之或入薄荷汁尤妙

解巴豆毒　寒水石磨水服黄連煮汁服菖蒲（新者擣取汁服）

中巴豆毒　其証口渇臉赤五心煩熱利不止用芭蕉根葉擣

解草烏毒　詩曰

草烏之毒最粗凶　甘草濃煎服有功
米醋砂糖皆可用　白丸水點亦能攻

解天雄附子烏頭毒　防風棗肉濃煎服

解一切菌毒　掘一地窟取黄土以新汲水于内攪之澄清少取水飲之（名地漿）

解河豚毒　一時困急以桐油多灌之使毒物盡吐出為愈或以白丸子為末調湯服中河豚毒能殺人服此藥毒自消

解鱔鱉蝦蟆毒　生豆豉一大合新汲水一椀煮豆豉濃汁頓服效

解食牛馬肉中毒　大甘草四兩以無灰酒研服盡病人量飲之須臾吐大瀉如渇不可飲水飲之必死

附后方　服雄黄中毒防巳汁解之

金櫃玉函　治誤飲餅中毒者未審中何毒卒急無藥

可解只煎甘草薺苨湯服之入口便活

聖惠方　治中鴆毒气欲絕者用葛根二合水三盞調飲之如口噤者以物揭開灌之（鴆食半夏苗故有毒）

肘後方　治食魚中毒濃煮橘皮飲汁

梅師方　治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水研飲服之

梅師方　蜀椒閉口者有毒誤食之便气欲絕或下白沫身体冷急用井水三二碗飲之立解椒毒或煎濃豉汁服之

聖惠方　治食蟹中毒以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁或紫蘇湯並佳

葛氏方　食自死六畜肉中毒黃蘗末服方寸匕未解再服之

外臺秘要　服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

肘后方　服藥过劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調服之

輟耕錄　治食河豚者一日內不可服湯藥恐內有荊

芥與此物大相反亦惡烏頭附子之屬世傳中此毒者乃函飲糞清乃解否則必死又聞不必用此物以龍腦浸水服之能解或橄欖皆可解後得一方用槐花炒過與乾胭脂各等分同搗為末用菉豆粉水調灌大妙如無新橄欖以其核多磨汁服之良愈

一方　治中諸毒卒惡熱黃悶欲死者以人屎者最効須與水和服其乾者燒烟絕水漬飲汁名破棺湯

破棺散　治魘寐卒死及為墻壁竹木所壓水溺金瘡卒致悶絕産婦惡血冲心諸暴絕証

半夏（湯泡七次去滑為末吹入鼻中）

或以皂角末吹入亦可

凡魘者不可用灯照亦不得近前急喚但痛咬其足跟並大拇指甲邊或以皂角末吹鼻

硃砂散　治中惡中忤鬼气其証暮夜或登厠或出郊野或遊空室冷屋或人所不至之地忽然眼見鬼物口鼻吸着惡気驀然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出清血此証與尸厥同見此切勿移動即令親人圍繞燒火或燒射香安息香蘇木桂木之類直候記省

方可移歸

犀角屑（研末）生射香　硃砂各一錢

右為末每服二錢新汲水調灌之

又方　雄黃為細末每服一錢桃葉煎湯調灌下

又方　治人恍惚見鬼發狂平胃散加辰砂末棗湯

又方　治客忤中惡多于道路在外　得之令人心疞痛腹滿氣沖心胸不急治殺人好京墨為末每服二錢沸湯調服或瓦器盛湯用衣襯貼于肚上熨之湯冷則換

灸法　救魘死及一切卒死及諸暴絕証用藥或不効急于人中穴及兩脚兩大拇指離甲一韭葉許各灸三壯五壯即活

又法　灸臍中百壯亦効

灸大胞匾腎以炙壯放在大拇指甲并半在肉灸七壯七日避風勿洗足戒房勞即効

小腸疝氣以陽物扯長對小毛際卌匪左右兩边以物作處墨點記之小炎壯　灸七即愈

又烏絨樹莢內子微炒為末早辰空心好酒調下三錢

---

小兒雜症

小兒初生休與乳取甘草一指節長火上炙脆以水三合煮一合綿蘸兒口中可蜆殼上兒當快吐腦中惡汁后待兒飢渴更與兩服不吐盡一合止得吐惡汁后兒智慧無病

新生三日開腸胃研粳米濃作飲如乳與兒服

兒初生時以猪胆汁傾湯內浴兒永無瘡疥之疾（之月內用）

生下不飲乳及小便不通乳汁二合葱白一寸分四破銀石器內煎一合灌立愈

生下舌下有膜如榴子連于舌根令兒語言不發可摘斷微有血如血不止燒髮灰摻之又用白凡灰釜底墨酒調用　（此瘡名七星瘡或以細針挑之）

驚哭有淚是肚腹痛用蘇合香丸酒服

小兒睡中遺尿不自覺以桂末雄鷄肝等分為末日進三服

不小便塩安臍中熨之　尿血甘草煎服之

凍瘡取金毛狗脊上毛貼之

頭面瘡痂剝去膿血出以真麻油潤之免成瘢痕酥亦良

疵瘢瘡心燥卧眠不安孔小麻煎汁綿蘸拭乾

諸骨入肉不出者煮白梅肉爛研象牙末厚付骨則自出

稻芒入喉中取鵞涎灌之立出

釣魚鈎勾入喉中難出尤用木針撐口次以糯米珠如算盤珠樣穿線中扯由即出

尿床以羊肚盛水令滿紮兩頭煮熟開取水頓服

小兒月內臍門上忽有一瘡孔出乃秤勾瘡也深难療者急用白褐燒灰摻之

又方紅絨灰（二錢）　珎珠（五分）　輕粉（五分）　孩兒茶（二錢）

血竭（一錢）　乳香一錢

右各為末乾摻

慢驚灸法

以醬一匕塗在百會穴用艾圓如半粒黃豆大者灸五壯為度五壯之內不拘次第嬰兒哭声如平時無異者生其聲嘶不響亮者死累試累效百會穴在頭頂心旋毛中是穴凡嬰兒月內雖無驚病依法灸之能免一也之驚兒泄瀉灸之亦妙

---

附錄蠱毒挑生毒門端

福建諸州大抵皆有蠱毒而福之古田長溪為最其種有四一曰地蠱二曰金蚕蠱三曰蜈蚣蠱四曰蝦蟆蠱皆能变化隱見不常皆有雌雄其交合皆有定日近者數月遠者二年至期主家脩禮迎降設盆水於前雌雄遂入於水中交則毒浮其上乃以針眼刺取必於是日毒一人蓋陰陽化生之氣納諸人腹而托以乃育越宿則不能生故當日客至不暇恤宗親朋舊必施之凡飲食藥餌皆可入獨不置熱羮中遇

熱則消爛或無外人至則推本家一人承之毒初入腹者無所覺積久則蠱生藉人氣血以活益久則滋生長乃食五臟晚夕痛楚不可忍惟啜白沸湯可暫息須臾甚則叫呼宛轉爬刮床蓆臨絕之日眼耳鼻口涌出蟲數百形狀如一漬於水暴乾久而得水復活死者之屍雖火化而心肺獨存殆若蜂窠淳熙中畜蠱之人事泄呈之官檢其家得銀珂領子五色線环毬及小木棋子兩面書五逆五順四字盛以七孔合又針兩包各五十枚而十一無眼及大蜈蚣一條

率非尋常人家所有勸訊其人乃云所謂順逆椓子者降蠱之時所用以卜也得順者客當之逆者家當之釗之無眼者以眼盛藥既用則去之蓋所殺十一人矣万色線凡蠱喜食錦錦不可得乃以此代其銀珂鍼者歆嫁蠱移諸他處貨道旁眞見者取之也凡中蠱毒無論年代遠近但煮一鳥卵插銀釵於内併含之約一食頃取視釵卵俱黑即中其毒也其方五倍子二兩砒黄末一錢甘草三寸一半炮出火毒一半生丁香木香麝香各等分輕粉三分糯米二十粒

共八味入小沙瓶内水十分煎取其七候藥面生皺皮用熟絹濾去滓通口服病人平正仰臥令頭高覺腹間有物衝心者三即不時動若吐出以桶盛之如魚鰾之類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無妨旋煮白粥補忌生冷油膩酢醬十日後服解毒丸三兩又經旬日可得平復

昔一顯官與泉州高僧西遊道由峽程其村舍皆能畜蠱若就食必遭其毒無可柰何僧曰吾有神咒可無憂也食至僧閉目持誦俄見小蜘蛛延緣猱吻僧曰速殺之於是竟食無所損其咒曰姑蘇啄磨耶啄吾知蠱毒生四角父是穹窿窮母是舍耶女眷屬百千萬吾今悉知汝摩訶是特同行者競傳之所至皆無恙更傳解毒方用巴豆七粒巴豆去皮研粒入百草霜一處研細滴水研如菉豆大以茅香湯送下七丸　又方　治金蠶毒纔覺中毒先含白礬味甘而不澁須嚼黒豆而不腥者是也急取石榴根皮煎汁飲之即吐出活蟲無不立愈又以白礬芽茶搗為末冷水調服凡一切毒皆可治

昔一人脇下忽腫起如生癰癤狀頃間大如盌識者云此桃生毒也候三更以菉豆嚼試若香甜即是已果然速搗川升麻為細末以冷熟水調二錢速服之遂瀉下其生葱數莖根鬚皆具其瘇即消續煎平胃散調補凡食白粥經旬始復常

有一書生中鷄肉桃生使商人善醫與藥服之頃吐積肉一塊剖開筋膜中有生肉存已成鷄形頭尾嘴翅悉肖似凡食魚瓜菓皆能用桃毒初中時覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿十日則内物能動騰上則胸

痛沉下則腹痛積以瘦悴此其候也在上膈則取之其法用熱茶一甌投膽礬半錢於中俟礬化盡通口呷服良久以鷄翎探喉中即吐出毒物在下膈則瀉之以米飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃碾人參白术末各半兩同無灰酒半斤納瓶內慢火熬半日許度酒熟取出溫服之每日一杯五日乃止然後飲食如常此蠱毒挑生毒世人乃極難治者予偶閱古書中得之專附錄於後以備參考焉

少雲張寓忠

元鶴溪胡元慶先生著
吳郡　立齋薛己校補

# 癰疽神秘灸經

鐵研齋繡行

---

## 癰疽神秘灸經序

人具五臟之形而氣血之運必有以踈載之其流則曰歷曰循曰經曰至曰抵其交際則曰會曰過曰行曰達者槩又所謂十二經焉十二經左右手足各備陰陽者三陰右而陽左也陽順施而陰逆施以三陽言之則太陽

少陽陽明則陽有太少也矣而有陽明者取陰陽合明之意也以三陰言之則太陰少陰厥陰陰既有太少矣又有厥陰者取兩陰交會之義也非徒經之有十二又有系絡者爲系絡之數三百六十五所㠯附經而行週流不息若陰陽維蹻衝帶六脉皆有所繫惟任

督二經、則包手腹背、而有專穴、諸經滿而溢者、則受之、初不可常、而忽焉、宜與諸經並論、通考其穴、三百五十又七、此人身之常遍也、緊經血所滯蔟、而爲癰疽、爲疔癤、此皆氣血不能通之謂也、歷觀諸經、傳變不一、是經之滯、當審何經所蔟、何穴所滯、辨視其穴測用、火以攻之、蹤其源流、而無滯也、猶如溝渠塞其庭水泛溢、令胡元慶先生、深窮玅理、週遍玄微、遂緝十二經所滯之穴、毫端妙理、用以廣生民之福、同躋仁壽之域也、

至正甲子永昌楊子成序

# 癰疽神秘灸經序

人身之氣血、晝者行陽二十五度、夜者行陰一十五度、如環無端、會於寸口、是爲真息、滯者壅腫、或六淫七情、飲食起居所傷、則癰疽疔腫之症蔟焉、治者察其所受症之經、灸其應症之穴、使氣血流暢、隧道踈通、其功爲捷、或灸而毒不解、欲其潰歛、肰後投之以湯藥、而輔其不逮、尤當審各經氣血多少、地部遠近、禀賦虛実、而用之、輒用攻劫之劑、

未及患所、而腸胃先傷、反有所損、故上古之治疾、針灸為尚、而湯藥次之、前元鶴溪胡先生著神秘灸經、我朝節菴陶先生集神秘驗方、採玄蕟微、灸藥之功具載、二先生之用心、可謂精矣、後之醫者、必合是二書、而後可收全功、予嘗訪吾鄉貞菴都憲周公、出是書示予曰、子宜發明之、以惠斯人、噫公之心仁矣哉、予因喜而嘆曰、予家舊有是書、亡失者幾年、今復得之、其斯人

之幸哉、但其穴其方、有未詳、輙按針灸家書、以圖其穴之所在、式一穴、而可兼治者、六明著之、至于各方之劑、辨其性之寒熱温凉、別其証之陰陽虚実、補其缺略、鋟梓以傳、俾後之君子、酌而用之、庶乎前人幾微簡要之法、傳於世、而不泯云

嘉靖丁亥孟冬吉日南京太醫院院判

呉郡薛己謹識

# 癰疽神祕灸經

元鶴溪　胡元慶　著
呉郡　立齋薛己　校補
浪華　佐野古菴　謹副
國字　門生原泰菴　校正

## 手太陰肺經

肺之爲臟六葉兩耳四垂如蓋附著脊之第三椎中有二十四行分布諸臟清濁之氣爲主宰華蓋手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃上膈肺間起發也經過也還復也循巡也中焦者胃中脘臍上四寸

是也憂患太過則當胃發爲疽內堅如石外皮走動不赤微腫惡寒惡心偏於右者胃癰也偏於左者胃疽也三毒之發無有不先寒而後熱引臍走疼欲吐不吐甚則咳嗽膿痰脉浮大面赤者不治治法當灸曲池二穴七壯毒左灸右毒右灸左遂愈

愚按針灸經云曲池二穴在肘外輔骨曲肘以手拱胸取之紋盡處是穴又治風刺癮疹或痒痛或遍身疼痛或皮膚頑疥如虫嚙搔之皮脫成瘡隨患人年歲壯數灸之上部疔腫發背癰疽渾身瘡毒小兒丹毒及癰瘍四肢拘攣或紅腫疼痛歷節諸風尤效

肺疽一名肺癰其症之發蓋因心火太盛尅於肺金之故也得此疾者無不戰寒鼻塞咳嗽口臭咽乾胸悶氣短當急灸合谷七壯甚者吐痰如米粥者莫治尤當灸腎俞二七壯令益腎水水能尅火火静而金自安也

愚按針灸經云合谷二穴在手大指岐骨間陷中又治鼻痔及不聞香臭牙齦久爛不愈及風熱癮疹手背紅腫作痛有殊效凡瘡毒久不合灸此穴各七壯至七七壯極驗更服托裡藥（○）腎俞二穴

在十四椎下兩旁各寸半與臍平（見膀胱經圖）

肩癰在肩上按之至痛酸半體者是也甚者令人身熱惡寒當灸太淵穴二七壯便毒流通而自愈也

愚按發揮云太淵二穴在掌後橫紋陷中又治面上白疔肺癰咳嗽吐膿血或氣攻兩乳作痛及上牙疼肩癰治法太淵穴灸七壯

手太陰肺經圖


曲澤穴
大淵穴
肺癰
肺疽
胃口癰
胃口疽
灸穴見膀胱經穴
肩癰
臂癰
合谷穴

迎香疑衍

## 手陽明大腸經

手陽明起於商陽二間三間合谷陽谿偏歷下廉三里上曲池肘髎迎香五里臂臑肩顒巨骨當天鼎扶突禾髎終於迎香週流二十穴復流而已蓋此經氣血所滯發之爲疽爲癰爲腫爲毒隨症治之先䟽其滯何患不痊

蜂窠疽生於左肩下二寸其疽之發先熱後寒皮赤四十九竅如蜂窠急灸三間二七壯使毒氣無滯

愚按針灸經云三間二穴一名少谷在手大指次指本節後內側陷中

---

乳癰之發其症不一有發於乳上曰乳氣乳左曰侵囊乳右曰乳疽乳下曰乳岩當乳頭所發曰乳毒俱當灸足三里幷肩顒各七壯滯散而痊也

愚按發揮云肩顒二穴在肩端兩骨間陷中舉臂有空是穴〇三里二穴在膝眼下三寸䯒外廉兩筋間當舉足取之又治腿膝痠痛或嫩腫疼痛凡寸俱用同身寸圖見後

顴疔之發發於當面顴上其色白其頭陷如鼻有黑氣者不治治法當灸偏歷二七壯

愚按發揮云偏歷二穴在腕中後三寸

手陽明大腸經圖


顴疔
肩顒穴
乳岩
乳氣
乳癰
曲池穴
偏歷穴
三間穴
二間穴

足陽明胃經

足陽明經之流行從鼻交頞中旁約太陽之脈下循鼻外上入齒中還出挾口環唇下交承漿頞鼻之山根是也此經起於鼻兩傍迎香穴左右相交爲頞過睛明之下循鼻外歷承泣過於伏兔流於巨虛過流而注蓋其經之血氣所溉發症多矣法當分而治之髮疽之發發於當面入髮二分是○鬢疽之發於耳旁入鬢者是也○唇癰發於當唇是也○牙癰當牙根之所發於上者牙癰下者牙疽頂起牙者牙疔也或牙縫突肉所起者亦牙疔也治法灸神授一七壯隨人大指上直去骨罅處起用患人手一跨

愚考神授穴諸書皆無蓋祕法也

髮疽灸缺盆七壯

愚按針灸經云缺盆二穴一名天蓋在肩下橫骨陷中如瘰癧患在此穴即於此穴灸之亦效

鬢疽灸伏兔七壯

愚按發揮云伏兔二穴在膝上六寸起肉正跪坐而取之一云膝蓋上七寸

唇疽灸犢鼻七壯

愚案針灸經云犢鼻二穴在膝臏下骭骨上骨解大筋中又治膝中痛不仁難跪起膝臏腫潰者不可治不潰者可療若堅硬且勿攻先以洗熨即微刺之愈

牙疽當灸足外踝骨尖上三壯

愚考諸書皆無此穴乃祕法也又治霍亂轉筋及卒然轉筋欲死者急灸足外踝尖各三壯如菉豆大若轉筋在股內灸內踝尖轉筋在外股灸外踝尖神應針經云凡疽卒著五指筋急不得伸屈灸踝骨中尖數壯立瘥氣毒流注發於此經從缺盆骨起流注氣令復至天樞走注有九箇莫治治法當灸梁丘七壯　愚按發揮云梁丘二穴在膝上二寸兩筋間

足陽明胃經圖



## 足太陰脾經

足太陰之脈起於足大指之端循指內側白肉際過覈骨後上內踝前廉覈骨今作孤拐骨是也流注沖陽之所行陰行陽二氣之所滯發而爲疽其發不一對證治之腸癰之發於右脇下長五寸許闊三寸微腫甚者戰寒小腹痛也當灸衝門二七壯左右同法

愚按發揮云衝門二穴上去大橫五寸在府舍下橫骨端約中動脈

陰疽之發在足內股其形長其濶一寸許上而發下易治下而發上難治其色微赤痛甚曲膝不能[illegible]

是也當灸商丘七壯

愚按發揮云商丘二穴足內踝下微前陷中

腹癰之發發於臍下橫而腫微赤甚痛牽引背痛是也當灸箕門七壯

愚按發揮云箕門二穴在魚腹上越筋間陰股內動脈應手是穴

魚口疽一名橫痃發於左者曰痃發於右者曰魚口橫痃爲便毒當灸足大指端二壯穴在指甲後二毛間

愚按針灸經云三毛間即大敦穴也在足大指聚毛中

鶴膝風在膝內股當膝腫疼甚者見青筋引心痛是也當灸三陰交七壯甚則二七壯待膝伸直爲住再甚則當膝項灸七壯○脚氣亦灸此穴

愚按針灸經云三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中○膝項諸書無載蓋祕法也

穿骨疽在內踝骨中發痛內外甚痛不能行動者是也當灸隨患足大指端二壯（穴見前）

足太陰脾經圖



### 手少陰心經

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸心系有二一則於肺相通而入肺兩大葉間一則由肺葉而下曲折向後並脊膂肺絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五臟系皆通於心而心通五臟系也手少陰經起於心循任脉之外屬心系下膈當臍上二寸分絡小腸其支也蓋其經氣血所滯發症者六脉通之

喉癰之發正於咽喉之下赤腫連喉痛甚不能下飲者是也當灸少冲七壯

愚按針灸經云少冲二穴一名經始在小指內廉端去爪甲角如韭葉又治口舌患疔毒及舌腫大常治甚者更針舌青筋出血尤良

氣癰之發在於胸間乳上二寸赤腫痛甚引心者是也當灸靈道七壯

愚按發揮云靈道二穴在掌後一寸五分

癧疽之發正於臂上連肩青腫長而堅者是也當灸小海七壯

愚按針灸經云小海二穴在肘內大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之又治腋下瘰癧不問腫潰並效臂疼不能伸及齒齦爛或齒寒腦風頭痛尤效

腋疽亦灸少海穴七壯（穴見于前）

穿骨疽之發正手掌後三寸許兩筋間大如鶴子堅如石按之至骨痛甚者是也當灸神門七壯

愚按針灸經云神門二穴一名兌衝在掌後兌骨端中

兌疽亦灸神門穴七壯（穴見于前）

喉風喉閉灸少商少冲二穴七壯

愚按針灸經云少商二穴在手大指端內側去爪甲角如韭葉又云以三稜針刺微出血泄諸藏熱湊不宜灸常用此穴治前證及懸癰乳蛾喉毒喉風咽喉腫閉等症及頤頷忽腫大喉中閉塞水粒不下針之立愈若有瘀血或膿作脹更須針患處其功甚速雖暴死氣未絕針之亦活

喉毒懸癰當灸心腧穴不拘壯數待寬即止

愚按發揮云心腧在背第五推

手少陰心經圖



## 手太陽小腸經

手太陽之脉起於手小指之端循手外側上腕出踝中臂骨盡處爲腕腕下兌骨爲踝本經起小指端順而行之其經氣血凝滯發而爲疽依圖治之

侵腦之發正於銳背穴中髮下一寸大陽中是也其證之發戰寒霍亂熱頭痛如斫雙目引痛是也當灸支正七壯甚則二七壯

愚按發揮云支正二穴在腕五寸

鳳眉之發正於面目之間發而長如生瓜樣者不治皮赤引腫兩目皆閉侵髮赤腫痛不可忍者是也當灸陽谷七壯

愚按發揮云陽谷二穴在手外側腕中兌骨下陷中

黒疔之發在於耳中腫痛連腮赤腫者是也當灸後谿七壯

愚按發揮云後谿二穴在手小指外側本節後陷中

鼻疔之發在於鼻內痛而引腦門不能連氣鼻大如瓶黒者不治連牙不得開者亦不治法當灸腕骨七壯艾如菉豆大

愚按針灸經云腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中

項疽之發在於項中當脊不能回顧腫連兩耳者是也當灸天宗七壯艾如菉豆大

愚按針灸經云天宗二穴在秉風後大骨陷中

肩風之發在於肩上青腫者是也甚者痛連胸脇當灸肩貞七壯

愚按針灸經云肩貞二穴在肩胛下兩骨解間肩髃後陷中

馬口瘡生鼻下腫痛大如馬口當灸掌後五寸半七

十壯火爆爲度

愚案掌後五寸半諸書皆無此名蓋祕法也

手太陽小腸經圖



足太陽膀胱經

足太陽之脉起於目內眥上額交巔上目大角爲內眥髮際前爲額腦上爲巔巔頂也足太陽起於目內眥通睛明傳攢竹過神庭歷曲差五處承光通天絡行左右相交於巔上之百會復流於督脉之交會也後流飛陽交會之際其經氣血凝滞而發爲癰者尤當隨證治之

玉枕之發在於枕後髮中腫起痛引鼻塞者是也當灸風門三七壯艾如菉豆大

愚案針灸經云風門二穴一名熱府在二椎下兩旁各開寸半

發疽之生於當背脊外兩旁堅赤而腫在於膏肓穴相近者是也治法灸心腧七壯艾如菉豆大

愚按針灸經云心腧二穴在五椎下兩旁各寸半

背疽之發其證有五一曰發背二曰氣發三曰蓮子發四名荷葉搭五曰脊發治之當視其色赤腫易治黑陷莫治須觀得疽月令生身則生尅身則死假如春木青如疽黃不治夏令火疽及黑赤不治餘皆倣此如得疾急當騎竹馬法灸二七壯委陽二七壯便毒氣疏通而無滞也

愚案委陽穴在足膕中外廉兩筋間屈身取之治腸風痔漏尤效○騎竹馬所灸之穴乃心脉所過之地凡癰疽之疾皆心氣留滞故生此毒灸之則心脉即時流通如未成膿者即消雖成膿及潰者其毒頓減如穴得真誠有回生之功但患者多因取穴不便不肯用此法故常用隔蒜灸法亦效如癰疽發背疔腫惡瘡一二日至五六日不問痛否取大蒜切片如二錢厚置瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛毒氣自然隨火而散若瘡頭多或腫大者即用大蒜

搗爛攤患處用艾鋪蒜上燒之甚者明灸如漫腫或未發出瘡頭不明者用紙一片浸濕隨覆患處視先乾處即是瘡頭大抵氣血壯實或毒少輕者可假藥力消散或腐潰怯弱之人熟毒中膈内外不通不行針灸藥無全功矣丹溪云火以暢達拔引鬱毒此從治之意即此法也騎竹馬法圖増附於後以便取用

搭手在右當灸會陽二七壯

愚按發揮云會陽二穴在尾骶兩旁

腎疽當灸合陽五壯

愚案發揮云合陽二穴在膝約文中央下二寸婦人血崩尤效

附陰疽當灸崑崙二七壯

愚按發揮云崑崙二穴在足外後跟骨上陷中治風疹風熱冷痺亦效

## 足太陽膀胱經圖


玉枕疽
發疽
發疽
騎竹馬穴
右搭手
會陽穴
委陽穴
合陽穴
崑崙穴
發背
左搭手
腎疽
腎疽
附陰疽

## 騎竹馬圖



取同身寸圖

先曲患人中指用短篾一根男左女右手量取横紋盡處段爲則子名同身寸



腕當作肘

## 騎竹馬取穴法

將長篾一根男左女右於患人臂腕横紋處名曲池穴自穴量至手中指相平截段爲則子先令病人脱衣以竹杠一條騎定兩人前後杠起足要離地兩傍更以二人扶定毋令動揺却以前大篾則子竪杠上從尾閭起貼脊量至則子盡處以墨點記之却以同身寸則子就於墨記處兩邊各量一寸半盡處各以墨點之即是灸穴左右各灸二七壯

## 足少陰腎經

足少陰腎之經腎兩枚狀如石卵色黑紫當胃下兩旁入脊膂附脊之節十四推下與臍平其脉起於足小指之下斜趣足心又云足少陰起小指之下斜向足心之湧泉上循至咽喉其經血氣凝滯變症有三一曰心口疽二曰齒癰三曰赫癰隨症治之心口疽在當心兩乳之中者是也其疽發而先熱後寒赤腫引背痛甚宜灸陰谷二七壯艾如菉豆大

愚按針灸經云陰谷二穴在膝内輔骨後大筋下屈膝取之

齒癰之發在臍上五寸許其形長如鵞子令人寒戰咬牙癰迸兩脇宜灸築賓二七壯

愚按針灸經云築賓二穴在内踝上腨分中

赫癰在當臍大如瓜突出紅甚如癭瘤宜灸陰谷二七壯築賓二七壯

愚按發揮云陰谷二穴在膝内輔骨後大筋下小筋上按之應手伸膝乃得之○築賓二穴（見前）

足小陰腎經圖



（陰之陰之陰字當作陽字）

## 手厥陰心包絡經

手厥陰心包絡經起於胸中出屬心包下膈歷絡於三焦上脘中脘臍下一寸爲下焦也傳之分也其支循脇出脇下腋傳於大陰少陰之間入肘傳過此陽中之陰陰之陰也故厥陰之中存陽明之氣傳注三陰之所是經血氣凝滯發之爲毒有六治法當詳辨之

胸疽之發在於兩乳之中上二寸許發而頭痛心虛體倦其色赤腫痛引十指者是也當灸郄門二七壯艾如菉豆大

愚按鍼灸經云郄門二穴在手臂去腕五寸

肘癰之發於肘尖之上不能屈伸令人肩背痛引者是也當灸間使二七壯

愚按發揮云間使二穴在掌後三寸兩筋間陷中又治瘰癧疥瘡頑癬及腋腫痛

蛇頭一疔發于中指甲當項紫黑色痛引心腹甚者令人口青色急當灸內關二七壯甚者三七壯

愚按發揮云內關二穴在掌後去腕二寸又治鋭疽瘰癧

魚肚之發於中指中節中者是令人戰寒痛甚徹骨

宜灸合谷二七壯（穴見肺經圖）

合疔一名虎口發於大指丫中此疔小黑色者是當灸內關間使各三七壯（二穴見前）

### 手厥陰心包絡經圖



## 手少陽三焦經

手少陽三焦之脉起於手小指次指之端上循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘臂骨盡處爲腕腕盡處爲肘又云手少陽起於小指次指端關冲穴上出次指之間歷腋門循手表腕之陽池循至禾髎糸竹咽喉之所復流不竭此經氣血之滯發而爲患有七當審治之

顴疔在肉顴骨尖高處是發時寒甚咬牙口不能開合治法當灸外關二七壯

愚按發揮云外關二穴在手腕後二寸陷中

魚腮之發於耳下平顋中是也發時連牙通裏痛甚灸四瀆二七壯

愚按針灸經云四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中

瘰之爲證發於耳前半寸其形如鷄子經年不痊膿水長出是也當灸天井三七壯

愚按發揮云天井二穴在肘外大骨後上一寸兩筋間陷中屈肘得之又云曲肘後一寸又手按膝頭取之兩筋骨罅常治五痔瘰癧亦效

肩疽發於肩上引背腫赤當灸會宗三七壯

愚按發揮云會宗二穴在臂腕後三寸空中一寸

髎疽發於肩下腋相連腫者是也灸會宗七壯（穴見前）

瘰癧之發在於臂內堅如鵞子按之痛徹骨惡寒是也當灸腋門三七壯

愚按針灸經云腋門二穴在手小指次指間陷中

石榴疽發在臂者宜灸天井穴各經有之先腫似碗後皮翻轉如榴法無可治惟菊華藥煎湯洗淨又用菊華燒灰入輕粉對和勻敷之未嘗試驗

愚按見破後久則翻如榴實最頑惟隔蒜灸貼神異膏更服黃礬丸仙方活命飲有效

手少陽三焦經圖



### 足厥陰肝經

足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去内踝一寸足大指甲後爲三毛三毛後横文爲聚毛相去也足厥陰起於大指聚毛之大敦循足跗上廉行間大冲蠡溝陰中陰器章門食竇雲門百會週而流注蓋其經氣血凝滞外證之發有五内則有氣癖之發赤甲肝氣之所滞並附灸法當審而治之

咬骨一疽發於裏股無形作痛蓋毒氣在骨中所發也當灸陰包二七壯

愚按針灸經云陰包二穴在膝上四寸股内廉兩

筋間

透腦一疽發於當鼻上如鷄子堅硬按之痛連心者是也當灸膝關二七壯

愚按發揮云膝關二穴在犢鼻下二寸陷中

陰疽之生在於陰器之左連陰子腫赤痛連小腹者是也當灸中都二七壯

愚按發揮云中都二穴在内踝上七寸䯒骨中腸澼下沫諸藥不應灸之即止頑疝或攻腹作痛更效

玄疽之生在於陰器之右連陰子腫青痛連兩肋者是也當灸蠡溝二七壯

愚按針灸經云蠡溝二穴足踝上五寸

穡疽之生在於陰器之底連肛陰子腫赤痛連腰背者是也當灸三陰交二七壯（穴見脾經圖）

氣癖之生在腹皮裏膜外狀如覆杯者是也當灸章門二七壯

愚按針灸經云章門二穴一名長平一名脇髎在大横外直臍季肋端側卧屈上足伸下足擧臂取之

坐馬癰在陰前後中間在右名下馬癰在左名上馬

癰在内尖頭者名鶴口能殺人俱灸膝下外廉犢骨盡處是穴

愚考諸書皆無此穴乃祕法也

足厥陰肝經圖



## 足少陽膽經

足少陽膽之經一名膽在肝之短葉間兩葉之中也重三兩三朱包精汁三合足少陽之脉起於目銳眥內抵下耳後傳于瞳子髎循聽宮客主人上至頭角下懸鍾此經氣血所滯傳於肝絡循於一藏流注伏逆腫發有六當審而治之

馬力之發在耳後侵入髮際微腫堅硬如石甚者引頂痛也當灸劔巨一七壯在掌後二寸二分是穴

愚按劔巨穴書所不載蓋秘法也

挾癭之發在五日血癭肉癭筋癭氣癭石癭其發在於耳後下連頂腫起令人頭痛之甚有偏頭痛者不治如此疾者當灸肘尖二七壯

愚按諸書肘尖穴無載蓋秘法也又治腸癰已成膿即下未成膿即消或下瘀血孫真人云腸癰之症人多不識治之錯則殺人其證小腹腫而硬按之則小便如淋時或汗出而惡寒皮膚錯縱腹皮鼓急甚者轉側有水聲或臍生瘡或臍孔出膿或大便下膿血凡有此證宜速灸兩臂肘尖各一百壯如菉豆大則大便當大下膿血立愈觀孫真人云然愈知此法之妙又云治瘰癧連灸三次可除

病根治霍亂欲死諸藥不効者急灸兩肘尖百餘壯如菉豆大有廻生之功此法令患人端坐叉手至胸肘後突出尖骨是穴醫人在患人後灼艾屢用屢效

瘰癧之發於項耳之間累累如貫珠者是也法當灸金門二十壯掌後三寸半是穴

愚考金門穴諸書不載乃秘法也甚效肩尖亦效

淵疽之發發於肋下久則一竅有聲如嬰兒啼者是也用膏藥或紙貼只不能作聲去紙仍鳴此之候也異哉難治陋不能也當灸陽陵泉二七壯聲即止而

愈

愚按發揮云陽陵泉二穴在膝下一寸外廉陷中

附骨疽發於大腿之側痛徹骨寒則痛甚皮膚不腫不赤當灸懸鐘七壯

愚按針灸經云懸鐘二穴一名絶骨在足踝上三寸動脉中

鶴膝風灸膝眼穴二七壯

愚按針灸經云膝眼二穴在膝頭骨下兩旁陷中此證屬三陰不足非灸及大防風湯火龍膏決不能愈

足少陽膽經圖


氣癭
瘰癧
肘尖穴
金門穴
脇疽
劍巨穴
附骨疽
膝眼穴
陽陵泉
鶴膝風
懸鐘穴
踝

所云肘尖穴在臂內側小尖骨間前圖見外側腕骨乃盡之悞也故復具此圖以便用者二穴以指申按之若患處酸麻方是眞穴

肘尖穴圖


肩尖
肩尖
肘尖穴
肘尖穴

百會直鼻上入髮際五寸半是穴灸七壯治龍泉疽

任脉圖



後頂直鼻上入髮際七寸是穴灸二七壯治虎鬚毒

任脈起於中極之下以上至毛際循腹裏上關元至喉嚨屬陰脈之海爲督脈一源而二支督脈會陰而行背任脈會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之子午爲腹背天地之子午爲南北言可以分合也滯之則發虎鬚龍泉二毒治當隨詳

督脈圖



督脈起於下極之兪兩陰之間屏翳處也屏翳筋間爲篡篡內深處爲下極督脈之始也滯惟發於魚尾今人言對口疽是也當灸神關二七壯

愚考諸書無此穴蓋秘法也

六腑不和所生爲癰　五臟不調所生爲疽

陽滯於陰則生癰　陰滯於陽則生疽

## 看內癰疽訣法

癰疽生於外可見內者難治況隱於臟腑者宜乎詳審生於背者看兪穴生於腹內當看募穴

中府穴在乳上三肋間手太陰肺經募此穴處隱隱痛而不已者肺中生癰疽也穴痛處內覺微凸起者是也咳嗽喉中醒臭吐痰黃色如米粞槐若抱壞雞子臭或吐痰瘀血穢血（此內潰也）初起先以小青龍湯發散之方在神景書次以各藥凡內癰疽俱在大便出膿血惟肺癰從口出膿血經云膿盡則愈膿盡則死（常治潰後脈短濇者生脈洪大者死）其心膈之疽在氣分屬上焦宜瓜蔞飲子拔毒飲在肚腹屬中焦下焦氣血之分宜桃仁承氣湯薏苡仁湯治之

巨闕穴在心窩下蔽骨下一寸足陽明胃經之募在手厥陰心包絡地方起於胸中此處隱隱內痛心生

癰疽也痛處肉微凸起者是也
期門穴在乳下兩肋端足厥陰肝經之募穴處隱隱
內痛肝生癰疽也痛處肉微凸起者是也
章門穴在季脇端足厥陰肝經之募穴內隱痛不已
脾生癰疽也痛處微凸起者是也
中脘穴在臍上四寸足陽明胃經之募穴痛不已胃
生癰疽也痛處肉微凸起者是也
京門穴在脇下季脇本足少陽膽經之募穴內痛不
止痛處肉微凸起者腎生癰疽也
天樞穴在臍旁二寸足陽明胃經穴內痛不已大腸生

癰疽也痛處肉微凸起者是也
丹田穴在臍下一寸足陽明胃經穴處內痛不已肉
微凸起三焦生癰乃膀胱之毒也
關元穴在臍下三寸足陽明胃經穴內痛不已小腸
生癰痛處肉微凸起者是也
凡心之下內癰疽腹皮皆甲錯內如刀刺腹急按之
則濡小便如淋不調發熱無汗惡寒脈遲緊膿未成
可下有血脈洪數膿已成身無熱腹無積按之濡爲
癰

愚按內癰諸穴具圖于後以便考驗

## 九發圖



癰疽神秘灸經　終

ZW 21101000784509
S
Z121.5
156(1~12)

# 神驗灸經跋

薛己氏所校選之書有二十四種者或有二十六種者或又有十六種蓋此薛氏之意而門生為類聚而集之耶抑出后世好事之採摘耶有輯於七之上神驗灸經者初薛

己校補而與神驗方併而鋟之亦謂二十四種之中不採此書特摭神驗方其意何也此書有裨于兩家豈第他書之比哉然却脫此然則果出好事者之手而非薛氏家之意歟余讀書之暇嘗把此書校正亥豕旁副國字而終贈之書賈且告以梓行之事因識其歳月於策尾云

享保戊申冬至日

浪華後學古菴佐方教誌

享保十四載己酉孟夏穀旦

皇都書鋪　河南四郎右衛門繡梓